



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>

WIDENER LIBRARY



HX KIR6 Z



HARVARD
COLLEGE
LIBRARY

DICTIONNAIRE

CLASSIQUE

D'HISTOIRE NATURELLE.

Liste des lettres initiales adoptées par les auteurs.

MM.

AD. B. Adolphe Brongniart.
 A. D. J. Adrien de Jussieu.
 A. D. NS. Antoine Desmoulins.
 A. R. Achille Richard.
 AUD. Audouin.
 B. Bory de Saint-Vincent.
 C. F. Constant Prévost.
 D. Dumas.
 D. C. E. De Caudelle.
 D. H. Deshayes.
 DR. E. Drapiez.
 E. Edwards.

MM.

F. Daubehard de Férussac.
 FL. S. Flourens.
 G. Guérin.
 G. DEL. Gabriel Delafosse.
 GEOF. ST.-H. Geoffroy de St.-Hilaire.
 G. N. Guillemin.
 ISID. B. Isidor Bourdon.
 K. Kermé.
 LAM. E. Lamoignon.
 LAT. Latreille.
 LUC. Lucas.

La grande division à laquelle appartient chaque article, est indiquée par l'une des abréviations suivantes, qu'on trouve immédiatement après son titre.

ACAL. Acalèphes.
 ANNEL. Annelides.
 ARACHN. Arachnides.
 BOT. Botanique.
 CRUST. Crustacés.
 CRYPT. Cryptogamie.
 ECHIN. Echinodermes.
 FOSS. Fossiles.
 GÉOL. Géologie.
 INF. Infusoires.
 INS. Insectes.
 INT. Intestinaux.

MAM. Mammifères.
 MIN. Minéralogie.
 MOLL. Mollusques.
 OIS. Oiseaux.
 PHAN. Phanérogamie.
 POIS. Poissons.
 POLYP. Polypes.
 REPT. BAT. Reptiles Batraciens.
 — CHÉL. — Chéloniens.
 — OPH. — Ophidiens.
 — SAUR. — Sauriens.
 ZOOL. Zoologie.

DICTIONNAIRE

CLASSIQUE

D'HISTOIRE NATURELLE,

PAR MESSIEURS

AUDOUIN, ISID. BOURDON, AD. BRONGNIART, DE CANDOLLE, DAUBEARD
DE FÉRUSAC, DESHAYES, A. DESMOULINS, DRAPIER, DUMAS,
EDWARDS, FLOURENS, GEOFFROY DE SAINT-HILAIRE, GUÉRIN,
GUILLEMIN, A. DE JUSSIEU, KUNTH, G. DE LAFOSSE, LAMOUROUX,
LATEILLE, LUCAS, C. PRÉVOST, A. RICHARD, et BORY DE SAINT-
VINCENT.

Ouvrage dirigé par ce dernier collaborateur, et dans lequel on a ajouté, pour
le porter au niveau de la science, un grand nombre de mots qui n'avaient
pu faire partie de la plupart des Dictionnaires antérieurs.

TOME QUATRIÈME.

CHI-COZ.

st
PARIS.

REY ET GRAVIER, LIBRAIRES-ÉDITEURS,

Quai des Augustins, n° 55 ;

BAUDOUIN FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS,

Rue de Vaugirard, n° 36.

~~~~~  
1823.

S 7530.9

~~77 H 3822~~

HARVARD COLLEGE LIBRARY

17 Vols. # 20.

Brown Fund.

Recorded 17 July 1857.

2063  
47.14  
13.2

# DICTIONNAIRE

## CLASSIQUE

## D'HISTOIRE NATURELLE.

---

### C.

**CHIEN.** *Canis*. Linné. MAM. Genre de Carnassiers digitigrades , ayant trois fausses molaires en haut, quatre en bas , et deux tuberculeuses derrière chaque carnassière ; la carnassière inférieure n'a qu'un petit tubercule en dedans , mais l'inférieure a la pointe postérieure tout-à-fait tuberculeuse ; en tout, trente-huit dents. — Ce caractère, pris du nombre et de la figure des dents en général, convient à toutes les espèces de ce genre, comme aussi celui d'avoir quatre doigts derrière et cinq devant, dont l'interne est d'autant plus rudimentaire et situé plus haut, que les espèces sont plus actives et plus légères à la course. Tous ces Animaux sont remarquables par le grand développement de l'appareil olfactif, source pour eux des impressions les plus déterminantes ; par la douceur de leur langue où le volume proportionnel du nerf lingual annonce un sens délicat, mais surtout par la structure de la verge chez les mâles, structure dont le mécanisme nécessite la prolongation de l'accouplement, même après la consommation de l'acte générateur. Comme dans des espèces fort différentes cette prolongation de l'accouplement est constante, ainsi que

le rapportent G. Gmelin de l'Isatis, Guldoenstedt du Chacal, Aristote, lib. 5, cap. 2, *Hist. Anim.*, et Gilbert du Loup, il est à peu près certain que la même disposition appartient à toutes les autres. Et comme cette disposition devient un caractère fort important de ce genre, sa description, encore inédite, est, comme on va voir, aussi précieuse pour la zoologie que pour la physiologie générale. Nous en devons à l'amitié de Magendie le précis suivant :

« Le centre de la verge est formé par un os cannelé dont la cavité contient l'urètre ; autour de cet os se trouvent trois parties cavernueuses où érectiles distinctes : l'une appartient au corps de la verge, elle est peu susceptible d'extension ; la seconde qui forme le gland et l'urètre en avant, peut acquérir une dimension considérable durant l'érection ; la troisième est ce qu'on nomme le *nœud de la verge*. Elle se gonfle durant le coït, de manière à ce que son diamètre surpasse au moins trois fois celui du reste de l'organe, et s'oppose à la sortie de la verge du vagin. Ces divers tissus communiquent visiblement avec les veines, et leur gonflement tient à ce que les veines qui en

sortent subitement des compressions fortes durant l'érection, et surtout durant le coit. » (Voyez Journal de physiologie expérimentale, t. 4.)

Le naturel de toutes ces espèces présente aussi un grand nombre de conformités : elles vivent en troupes plus ou moins nombreuses, s'assujettissent à des règles fixes, soit pour l'attaque et la défense, soit pour la chasse des bêtes fauves. La voix de toutes les espèces sauvages est une sorte de hurlement susceptible de modifications nombreuses par l'approvisionnement et la domesticité, suivant le degré de perfection acquise ou progressive de chacun de ces deux états. Toutes ont la queue droite, ne descendant jamais jusqu'à terre, et constamment pourvue de poils plus longs que sur le reste du corps. Les deux sortes de poils existent simultanément chez les Chiens dans des proportions très-variées ; mais les poils laineux, quoiqu'en proportion moindre, se trouvent aussi bien chez les espèces des contrées équatoriales que chez celles des contrées tempérées. — C'est sur de mauvais renseignemens que Buffon a dit que les Chiens perdaient le poil avec la voix dans les contrées chaudes. Cette assertion, quant au poil, fondée seulement sur la variété de Chien domestique connue sous le nom de Chien turc, qui serait originaire de la Barbarie, si cette variété est identique avec celle qu'Aldrovande vit en Italie au seizième siècle, n'a rien de concluant. Car cette alopecie, purement accidentelle dans un assez grand nombre d'espèces de Mammifères, comme l'a observé entre autres Azzara, aura été perpétuée par un caprice de mode, en croisant les individus qui la présentaient.

L'expérience de tous les jours et de tous les pays n'a pas cessé de réfuter les erreurs de Buffon (T. V, p. 208), que tous les Chiens, de quelque race et de quelque pays qu'ils soient, perdent leur voix dans les pays extrêmement chauds ; qu'ils ne conservent, aussi, que dans les climats tempérés leur ardeur, leur cou-

rage, leur sagacité et les autres talens qui leur sont naturels ; que, par compensation, dans ces mêmes pays où les Chiens perdent leur aptitude aux usages auxquels nous les employons, on les recherche pour la table. Tout ici est faux ou confus : quant aux Chiens domestiques d'Europe transportés sous l'équateur, ils y conservent toutes leurs facultés, souvent exaltées même par l'influence d'un climat nouveau, et Buffon, à cet égard, aurait dû se souvenir des récits du Milanais Pietro Martire (*Raccolta delle navigaz. e viag. , Venezia, 1563 à 1565, da Ramusio, tome III, pages 29 et 31, verso*) sur les terribles auxiliaires que se firent les Espagnols dans ces Dogues affamés qui traquaient et dévoraient les Américains. Quant aux Chiens indigènes ou de race anciennement importée dans les contrées équatoriales, leur infériorité, sous le rapport de l'audace et de la vigueur, n'est qu'une conjecture mal fondée. Les Chiens de la Nouvelle-Hollande, ceux de la Nouvelle-Guinée et de Waigiou, situés sous l'équateur même, soit libres dans les forêts, soit à demi-domestiques, sont justement les plus intrépides et les plus vigoureux à proportion de tout le genre. En outre leur poil est aussi fourni, et leur voix aussi forte et aussi fréquente que dans leurs congénères sauvages du nord de l'Amérique et de l'Asie. Enfin il n'y a que ceux des îles océaniques, dégradés par un abrutissement particulier, qui soient aussi paresseux et aussi timides que des Brebis. Or, à cet égard, les Chiens de la Nouvelle-Zélande, sous un climat fort tempéré, ne diffèrent pas de ceux des Marquises et de Taïti, parce qu'ils ont été soumis à la même influence d'un régime d'abâtardissement. Il résulte de ces éclaircissemens que, dans la recherche de la patrie et de l'espèce primitive du Chien domestique, l'on ne doit pas se borner aux espèces boréales, comme l'impliquait le système exposé par Buffon. Ce qu'il dit ensuite (même

T. v) de l'incompatibilité de nature, quant à la génération, du Chien domestique avec le Loup et le Renard, n'est pas mieux fondé, comme lui-même l'a reconnu T. VII de son Supplément. Il suit donc de la production de métis féconds jusqu'à la quatrième génération, sans que rien prouvât l'impuissance de cette dernière, que rien n'implique l'unité d'origine de toutes nos variétés domestiques. Et comme dans l'Amérique, dans la Nouvelle-Hollande, avant la découverte par les Européens, il existait et des Chiens domestiques et des Chiens sauvages, et comme ces derniers y étaient évidemment indigènes, il suit encore que rien n'implique que ces Chiens domestiques ne provenaient pas des espèces sauvages du pays. Il résulte donc de cette double considération que les variétés si nombreuses de Chiens domestiques ou demi-domestiques, suivant la civilisation de chaque peuple, ne doivent pas être rattachées à un seul et même type primitif, modifié seulement par les influences des climats, de la domesticité, etc., mais doivent être rapportées, chacune dans sa contrée, à diverses espèces sauvages. Néanmoins les migrations, à la suite de l'homme, de chacune de ces espèces de Chiens devenues domestiques, auront amené entre elles des croisemens d'une espèce domestique à l'autre, croisemens dont les produits, modifiés tantôt avec une espèce sauvage, tantôt avec une autre, comme nous l'avons déjà montré pour les espèces du genre Chèvre d'après Pallas, auront amené les diversités si nombreuses que nous voyons aujourd'hui pour la taille, la figure et la qualité des poils; à quoi auront concouru aussi les influences du climat et du régime. Ces dernières influences, quand leur mode et leur durée persévèrent assez longtemps, peuvent amener un raccourcissement et un changement de figure du tube intestinal plus considérable, d'une variété domestique à une autre, que d'un genre à l'autre dans le reste des Carnassiers...

Il en résulte que les diversités si nombreuses que nous présentent les races domestiques du Chien, ne peuvent être ramenées à une seule souche sauvage, et qu'à plus forte raison plusieurs des espèces actuellement sauvages ne peuvent être considérées comme des transformations éventuelles et progressives d'un moindre nombre de types primitifs.

En Amérique et en plusieurs contrées de l'ancien continent, il existe des troupes de Chiens domestiques redevenus sauvages, connus sous le nom de Chiens marons. Tous ces Chiens vivent en troupes nombreuses, aguerries, soumises à une tactique régulière, comme on voit dans l'ancien continent les hordes de Chacals et de plusieurs autres espèces sauvages de *Canis*. Il serait bien étonnant que la souche sauvage de la pluralité de nos Chiens domestiques eût cessé d'exister indépendante, lorsque nous voyons toutes les espèces sauvages de nos autres Animaux domestiques herbivores, lesquels pour la plupart, eu égard à la nature de leur site natal et au petit nombre de leurs produits, n'ont jamais dû beaucoup multiplier, s'être conservées au milieu même des envahissemens de la civilisation en Europe et en Asie. Et cependant ces Animaux manquent de moyens de défense; la fuite est leur seule ressource, et ils subsistent même dans des îles assez petites, où leur race n'a pu être ni entretenue ni renouvelée par une émigration étrangère. Tels sont l'Égagry, en Sardaigne et en Crète, le Mouflon, en Corse. Or, l'exemple des Chiens redevenus sauvages, qui subsistent au milieu des colonies européennes et embauchent les Chiens domestiques, malgré les efforts persévérans pour les détruire, prouve que dans l'enfance et les premiers progrès de la civilisation, l'espèce sauvage, libre de toute habitude d'assujettissement, n'aurait pu être ou tout entière asservie ou tout entière exterminée. Comme on sait d'ailleurs que l'ame de chaque espèce reste immuable sous

toutes les influences physiques qu'elle subit en liberté, il est logiquement impossible que son naturel ait changé. Et puisqu'aucun témoignage ne dépose de l'extermination d'un Animal sauvage analogue au Chien, et que les anciens auteurs mentionnent toutes les espèces actuelles de ce genre dans les contrées où elles existent encore, il est évident que l'une ou plusieurs de ces espèces sauvages sont la source unique ou multiple de nos races domestiques mélangées ensuite comme nous l'avons déjà dit. Déjà Guldénstædt (*Nov. Comm. Petrop.*, t. 20) a démontré, selon nous, cette descendance par rapport au Chacal. Mais il nous semble que la multiplicité de forme, de grandeur et de contrées des Chiens domestiques connus, nécessite une origine multiple. Ainsi, par exemple, il serait difficile de dériver du Chacal ces Chiens qui existaient dans les deux Amériques, et surtout dans les Antilles, avant l'arrivée de Colomb. Et puisqu'il y a au moins trois espèces sauvages de Chiens proprement dits, sur le continent de l'Amérique sud, savoir, le Loup rouge, le Loup gris du Paraguay et le Chien des bois de Cayenne, outre le Chien antarctique des Malouines, il est bien plus logique, au défaut de toute preuve physique, d'admettre que les Chiens domestiques du pays provenaient des espèces sauvages indigènes, que de les dériver d'une espèce sauvage de l'ancien continent, lorsque, d'une part, la persévérance à ne pas sortir du pays natal est bien établie chez les Animaux, et qu'ensuite il n'existe aucune preuve que les peuples, qui se servaient de ces Chiens, eurent jamais de relations avec l'ancien continent. D'une au moins de ces espèces, le Chien des bois de la Guinée, ne montre pas d'ailleurs aujourd'hui plus de répugnance que les Chiens marons eux-mêmes pour la société de l'Homme. Il nous semble donc hors de toute vraisemblance que les Chiens dont parle Pierre Martire dans les petites Antilles, et Oviedo dans les mêmes Antilles et chez les Caraïbes de la

Terre-Ferme, provinssent d'espèces étrangères à l'Amérique. Or, il fallait que leur domesticité fût déjà bien ancienne, car ces deux auteurs espagnols, contemporains et témoins de la découverte et de la conquête, disent que, soit dans les îles, soit sur la Terre-Ferme, ces Chiens indiens étaient de toute nature et couleur de poil, la plupart pourtant l'ayant entre le lisse et le laineux, ce qui, pour le dire en passant, réfute péremptoirement l'opinion que les Chiens perdent le poil sous la Zone-Torride. A la vérité, tous étaient muets, c'est-à-dire n'aboyaient pas; mais nos races civilisées elles-mêmes (car nos Chiens, chacun selon le degré de civilisation de leurs maîtres, le sont eux-mêmes plus ou moins) sont d'autant plus silencieuses, que la société où elles vivent est moins perfectionnée. Et à cet égard les Chiens de nos bergers ne font guère plus entendre de voix que ceux des sauvages, soit des zones polaires, soit des zones intertropicales. L'aboiement du Chien, comme Guldénstædt (*loc. cit.*) l'a déjà dit, n'est donc pas une faculté innée, mais une habitude acquise; et de ce que telle ou telle espèce sauvage n'aboie pas, ce n'est pas à dire qu'elle ne soit la souche des races les plus aboyantes, puisque, redevenues sauvages, ces races reprennent l'aboiement, et ne conservent qu'un hurlement commun à la grande pluralité des espèces. Et comme, d'après les expériences de Buffon (rapportées Suppl., T. VII), les métis du Chien Braque et du Loup sont indéfiniment féconds, et comme il en est très-probablement de même de ceux du Chien et du Chacal, et des métis entre eux ou avec les types primitifs, nous pensons que, dans chaque continent, les Chiens domestiques y proviennent des espèces qui y vivent sauvages, sauf le cas d'importation évidente, comme cela est arrivé pour les Chiens domestiques dans toutes les colonies européennes.

Guldénstædt (*loc. cit.*) a le premier indiqué les différences qui séparent, quant à la figure des incisives



ves, le sous-genre des Renards de celui des Chiens et Chacals proprement dits. Dans ces derniers, les incisives sont très-profondément, les supérieures trilobées, et les inférieures bilobées, tandis que, dans les Renards, ces dents ont le tranchant presque rectiligne, du moins les dépressions de leurs bords sont bien moins profondes qu'aux Chiens. Ils signalent aussi les disproportions de longueur d'intestin entre les espèces du Chien, du Loup et du Chacal d'une part, et le Renard d'autre part; car, dans le Renard, l'intestin grêle est à la longueur du tronc, depuis le museau jusqu'à l'origine de la queue, comme trois est à un, dans le Chien comme quatre et demi est à un, dans le Loup comme quatre est à un, dans le Chacal comme cinq est à un.

Une autre différence sépare encore les Renards des Chiens, c'est la proportion plus grande des poils laineux aux poils soyeux chez les Renards, ainsi que la supériorité de finesse et de longueur des poils soyeux, surtout à la queue, dernier caractère exprimé par le nom de *queue de Renard*. Enfin, et ce qui est le plus décisif, à cause des différences qui en résultent pour les habitudes et le genre de vie, c'est l'allongement vertical des pupilles, d'où résulte pour eux la nécessité d'une existence nocturne. Ajoutez à cela que Cuvier a trouvé sur le crâne un caractère ostéologique qui distingue les Chiens des Renards (Oss. Foss., T. IV, pag. 464). Dans les Chacals de l'Inde, du Sénégal et du Cap, dit-il, comme dans les Loups et les Chiens, le front est transversalement d'une convexité uniforme entre les deux apophyses post-orbitaires qui descendent un peu, et n'ont point de fossette ni d'arêtes saillantes dans leur voisinage, si ce n'est les arêtes temporales qui s'unissent promptement en une seule sagittale. Dans les Renards, continue-t-il, il y a une fossette ou un creux en dedans, et un peu en avant de chaque apophyse post-orbitaire du frontal; les arêtes se rap-

prochent, mais la crête sagittale demeure long-temps une bande étroite plutôt qu'une vraie arête. D'après ces caractères, on ne pourrait aucunement confondre les frontaux de ces Animaux. Quant au reste des os de ces Animaux, il recannait que, sans une comparaison immédiate, il est difficile d'en exprimer et d'en saisir les différences qui ne portent que sur la grandeur et un peu sur les proportions.

Les Chiens proprement dits sont généralement d'une taille supérieure aux Renards; et même les espèces boréales des deux continents acquièrent des dimensions qui les rapprochent de quelques grands Ellis. Gellibert (*Obs. philopog. zool.*) dit qu'en Lithuanie les Loups ont cinq pieds du museau à l'origine de la queue, et qu'au Nord il y en a encore de plus grands. En outre la partie antérieure du corps est forte et ramassée, surtout aux épaules et à l'encaure. La partie postérieure est svelte et légère et un peu plus élevée; tous sont remarquables par l'obliquité de leur marche.

Dans les Renards, plus bas sur jambes à proportion de la taille, le corps plus allongé, la tête plus pointue et plus fine, les formes plus arrondies, annoncent plus de souplesse et de légèreté que de force. Aussi sont-ils, plus tôt qu'ils le loups, forcés à la chasse. C'est peut-être au sentiment de leur infériorité sous ce rapport qu'ils doivent leur instinct fondeur pour se vouer des retraites, quoique les espèces boréales le fassent aussi dans des contrées où la nature du sol et les circonstances du climat sembleraient devoir les en détourner. Il résulte encore de cet instinct particulier aux Renards une conséquence importante pour leurs mœurs. Elles sont plus solitaires et contraintes à la vie de famille. Dans cette sorte d'existence, chaque individu ne compte à peu près que sur lui-même; et l'espèce ne gagne rien à la mise en commun des forces, des ruses et de l'expérience des individus. Les Chiens proprement dits ont au contraire un instinct d'es-

sociation que les inspirations du besoin ont souvent rendu redoutable à l'Homme et à ses troupeaux. Malgré leur petit nombre actuel en Europe, les Loups, dans les cantons où ils sont un peu moins rares, se réunissent, au moins en hiver, par troupes qui combinent leurs mouvemens d'attaque, de défense et de fuite avec un ensemble de prévoyance et de ruse, dans lequel on ne peut méconnaître les perfectionnemens de l'instinct par l'expérience. L'on sait que cet instinct d'association, commun à toutes les espèces sauvages de *Canis* proprement dits, survit en domesticité à la perte de plusieurs facultés natives. Dans les villes de Turquie, les Chiens indépendans de chaque quartier sont formés en troupes qui, d'un commun accord, sont convenues de leurs limites, et entre lesquelles la guerre se déclare quand ces limites sont transgressées.

Ce genre est le plus cosmopolite de tous les Carnassiers par sa distribution géographique. Ses espèces, surtout celles qui appartiennent aux vrais *Canis*, se trouvent sauvages ou domestiques sur presque tous les points du globe. Toutes les îles de l'Océanique, excepté quelques-unes solitairement situées, sont peuplées de nombreuses variétés de Chiens domestiques. La Nouvelle-Hollande et les archipels des Papous, qui tiennent ce continent à l'Asie par l'archipel Indien, ont des Chiens sauvages que rien ne porte à considérer comme échappés à une ancienne domesticité. Les Chacals occupent une zone oblique à l'équateur depuis la Pense et l'Inde jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Sur cette même zone se trouvent échelonnés le Renard commun, le Renard Corsao, l'Adive de Buffon, et le *Canis megalotis* du Cap. Le Loup ordinaire répandu, avec le Renard noir ou argenté, le Renard croisé, le Renard fauve et le Renard tricolore, sur le nord des deux continents, s'avance sur chacun d'eux plus ou moins vers les tropiques, suivant les longitudes. L'Amérique du nord possède

au moins une espèce de Loup particulière, celui du Mexique; l'Amérique sud a le Loup rouge, le Loup gris, le Chien Crabier et le Chien antarctique. Toutes ces espèces n'habitent pas les mêmes sites, et chacune reste constamment dans le sien, excepté les espèces voyageuses du pôle boréal.

Toutes ces espèces de Chiens et de Renards sont sujettes à blanchir en hiver dans les zones tempérées, et à rester perpétuellement blanches sous les zones polaires. Chez toutes aussi, chez les Renards seulement à un degré supérieur, la proportion des poils laineux aux poils soyeux augmente, et la finesse des deux pelages devient plus grande chez toutes les espèces des zones froides et tempérées, à mesure que les climats deviennent plus froids. Néanmoins il ne faut pas trop multiplier les espèces sur les couleurs. Car, ainsi que Gilibert l'observe, par rapport au Loup, et Gmelin, par rapport à l'Isatis, dans la même portée, il se trouve des individus blancs, cendrés ou bleus tirant sur le noir. (V. ces aut. loc. cit.)

Toutes ces espèces ont à l'anus, au temps du rut, des suintemens ou même des sécrétions crypteuses, dont les organes ne paraissent se développer qu'à ces époques. Les odeurs qui émanent sont plus fortes chez les Renards que chez les Chiens; elles le sont davantage au temps du rut que dans les intervalles, et s'anéantissent même probablement chez les espèces boréales: car Gmelin (*Nov. Comm. Petz.*, t. 5) n'a pas trouvé le moindre vestige, ni d'odeur, ni de follicule odorant à l'anus de l'Isatis. La variabilité de cette particularité d'organisation chez les espèces de ce genre doit donc empêcher qu'on ne la prenne en considération pour les distinguer entre elles, ainsi qu'on l'a fait récemment pour tracer entre le Chien domestique et le Chacal une séparation qui n'est pas mieux fondée que celle qui porte sur l'aboiement.

Ce qu'il y a de bien remarquable, c'est, malgré la différence de leurs climats, de leurs tempéramens et de

leur stature, l'uniformité presque absolue de l'époque et de la durée de la gestation et du rut chez toutes les espèces qui vivent au nord de l'équateur. Le rut vient en décembre, et dure quinze jours ou trois semaines; la gestation ne se prolonge pas au-delà de neuf semaines. Frédéric Cuvier a vu que la Louve, à qui l'on avait assigné une portée de trois mois et demi, ne diffère pas de ses congénères à cet égard, quoiqu'en ait dit un observateur d'ailleurs exact (Gilibert, *loc. cit.*). Le nombre des petits varie de sept à vingt. Ce dernier nombre est assigné par Gmelin à l'Isatis. Les femelles n'ont pourtant pas plus de dix mamelles dont le nombre n'est pas toujours symétrique des deux côtés. Comme dans le genre Felis, elles ont pour leurs petits une sollicitude extrême qui se précautionne même contre leur père. La moindre atteinte à leur sécurité les alarme au point qu'elles donnent la mort à leurs petits, sans doute par peur de se les voir enlever, quel que soit le motif de cette peur. S'il est vrai, comme dit Frédéric Cuvier, que ce risque de mort pour les petits soit plus imminent à la première portée que dans les suivantes, et si dans le cas même d'une première portée, la mère ne tue jamais ceux des petits qui ont commencé de têter, n'est-ce pas que la sensation du plaisir d'allaiter (sensation qui peut aller jusqu'à la volupté, et s'attache si puissamment toutes les mères à leurs enfans) balance l'instinct de la liberté, et que dans les portées subséquentes, les femelles sont plus patientes contre les importunités, parce que leur mémoire leur rappelant les plaisirs de l'allaitement leur en montre encore la jouissance prochaine? C'est ainsi que partout les fondemens de l'ordre moral s'enracinent dans l'organisation.

**1<sup>er</sup> Sous-Genre.** — Les CHIENS PROPREMENT DITS, savoir : les *Canis* à poplite circulaire, à crâne caractérisé, comme nous avons dit ci-dessus, et à queue jamais tordue comme celle des Renards.

1. LOUP, *Canis-Lupus*, Buff. *Wolf* des Germains, *Wilk* des Polonais, *Wolk* des Russes, *Ulf*, *Warg* des Suédois, *Graben* des Danois, *Boijuku* des Tongousses, *Schonu* des Bourates, *Kuorchu* au Kamtschatka, *Zeeb* des Hébreux, *Gmelin* des Géorgiens. Buffon, T. VII, pl. 1, Schreb. pl. 88. — Grande espèce à queue droite, dit Cuvier, à pelage gris, fauve, avec une raie noire sur les jambes. C'est le plus grand et le plus nuisible des Carnassiers de nos contrées. Par la synonymie que nous en donnons, on voit qu'il habite depuis l'Egypte jusqu'aux deux extrémités est et ouest de la zone boréale de l'ancien continent; et du Kamtschatka, par les glaces et les chaînes des fls Aleutiennes, il aura passé en Amérique dont il habite aussi la zone boréale.

La taille de cette espèce varie beaucoup suivant les climats. Le froid lui est bien plus favorable, et il semble par-là qu'il est aborigène de la zone boréale de notre continent; il a toujours été aussi plus nombreux. Gilibert dit qu'en Lithuanie il a ordinairement cinq pieds de long; du muséum à l'origine de la queue; mais qu'il est encore plus grand dans les forêts plus septentrionales. En Espagne et en Italie, ils ont à peine trois pieds dans cette dimension. Buffon (*loc. cit.*) dit, d'après une assez mauvaise autorité, qu'il y en a en Afrique; et que les Loups du Sénégal ressemblent à ceux de France, quoiqu'un peu plus gros et beaucoup plus cruels; mais outre que des assertions vagues de ressemblance ou de différence ne sont pas concluantes, même sous la plume de Buffon, comme il est bien certain par l'observation immédiate de naturalistes de profession que la taille du Loup diminue à mesure que l'on s'éloigne du Nord, il est évident que ces prétendus loups du Sénégal ne peuvent être que des Hyènes; d'ailleurs, on a pu prendre aussi au Sénégal le Chacal pour le Loup. La couleur et le poil de cet Animal changent dans les différens climats, et varient quelquefois dans le même

pays. En Lithuanie, les jeunes ont le poil glacé de blanc, et jaunissent en été; les vieux grisonnent en hiver; quelques-uns sont glacés de noir; mais plus au nord, on en trouve de tout noirs ou de tout blancs. Buffon dit que ces derniers sont plus grands et plus forts que les autres. On en dit autant de l'espèce suivante. Ne seraient-elles pas identiques?

Buffon, et depuis Gilbert, admettent que la Louve porte trois, deux et demi, et Buffon, intéressé par système à séparer le Chien du Loup (*loc. cit.*, pag. 43), a insisté sur cette différence, comme péremptoire dans la question; mais F. Cuvier (*Mamm. lith.*) s'est assuré que dans cette espèce, comme dans tous ses congénères observés, la gestation n'est que de deux mois et quelques jours. Le Loup, qui est deux ou trois ans à croquer, vit quinze à vingt ans, est en état d'engendrer entre deux ou trois; les femelles, quoique plus précoces, ne le deviennent qu'après leur second hiver. La chaleur ne dure que douze ou quinze jours, commence par les vieilles Louves et finit par les jeunes; le temps du rut est moins marqué chez les mâles; ainsi ils ont des vieilles dès la fin de décembre et finissent par les jeunes en février et en mars. Aussi trouve-t-on des Louvetoux nouveaux-nés depuis la fin de mars jusqu'en juin. A la veille de mettre bas, la Louve se prépare, dans un fourré bien épais au fond d'un bois, une sorte de tanière où elle dispose, avec de la mousse et des feuilles, un lit commode pour ses petits. Le nombre ordinaire en est de six à neuf, jamais moins de trois. Ils naissent les yeux fermés: pendant les premiers jours, elle ne les quitte pas, et le mâle lui apporte à manger. Elle allaite deux mois; mais dès la cinquième ou sixième semaine, elle leur dégorge de la viande à demi-digérée; et bientôt leur apprend à tuer de petits Animaux qu'elle leur apporte. Jamais ces petits ne restent seuls, le père et la mère se relèvent auprès d'eux; au bout de deux mois, elle les

promène, et bientôt leur apprend à chasser. En novembre ou décembre, les jeunes commencent à vaguer seuls; mais, pendant cinq ou six mois, ils continuent de se réunir en famille.

Tout ce qu'a dit Buffon de l'indomptable féroce du Loup est faux ou exagéré. F. Cuvier vient de tracer l'histoire de deux Loups encore existants à la Ménagerie, et qui ont donné l'exemple d'un attachement pour leur maître aussi passionné, en même temps que réfléchi, et aussi pénétrant que jamais Chien l'ait pu éprouver. Une jeune Louve, prise au piège, est si sensible aux caresses, qu'elle s'en pâme de plaisir, au point de lâcher son urins; et ce besoin de caresses, elle l'éprouve de la part du premier venu, malgré la féroce que l'esclavage doit imprimer à son naturel. Il en est encore (*ibid.*) une autre Louve prise au piège, étant déjà adulte, vivant familièrement avec des Chiens qui lui avaient appris à aboyer contre les étrangers, et devenue si douce et si docile, que, sans son goût irrésistible pour la volaille, on l'eût laissée en liberté. Voilà donc trois exemples presque simultanés de Loups que domine le besoin d'aimer l'Homme et d'être aimés par lui. Et tout en reconnaissant, ainsi que nous l'avons déjà fait, que dans les Animaux, le caractère varie par nuances souvent assez fortes, d'un individu à l'autre, on ne peut voir, dans ces trois exemples, autant d'exceptions à la règle de l'espèce. Cette féroce des Loups de nos contrées ne tient donc qu'à l'instinct de conservation et de vengeance trop souvent irrité, tout comme aujourd'hui au cap de Bonne-Espérance les malheureux Boschismans traqués comme des bêtes par les colons, de pacifiques qu'ils étaient, sont devenus des agresseurs pleins d'une rage atroce et toujours active contre les ennemis qui ont lassé leur patience (F. Barrow. Voyag.).

En parlant du Chien domestique, nous dirons, d'après Buffon lui-même, Suppl. T. VII, quelles alliances fécon-

des peurent s'établir entre lui et le Loup.

Comme les autres espèces de ce genre, les Loups chassent, attaquent et se défendent avec une tactique combinée sur la nature du terrain, du gibier et de l'ennemi. Mais l'expédition terminée, ils se séparent. Le vigoureux de cet Animal est extrême, il peut emporter un Mouton, et quand on le chasse, il perco droit en avant et court tout un jour sans être rendu. Il évite le gibier de plus, d'un quart de lieue, quand il en est sous le vent. En général tous les Chiens ont de la répugnance pour le Loup, et se rabattent froidement. De son côté, il attaque les Chiens avec ardeur; Hérnès dit qu'il tua les Chiens ennemis qu'il trouve; chargés et restés en arrière dans les marches.

2. LOUP. NOM, *Canis Lycon*, L.; *Tschorn-Burri* des Russes, *Kulpos nigra*, Gesner, Quadr., p. 967, Buff., t. 9, pl. 41, Schreb., pl. 89. Habite aussi en Europe et se trouve même accidentellement en France. Ne diffère du précédent que par son noir profond et uniforme, et plus de férocité. La Ménagerie a possédé ensemble un mâle et une femelle pris dans les Pyrénées. Chaque année, dit F. Cuvier, ils firent des petits presque aussi défectueux et aussi lâches que leurs pères, mais qui n'avaient ordinairement ni les mêmes traits, ni le même pelage. On les eût crus d'une autre espèce ou de quelque variété du Chien domestique. Il lui parait assez probable que ces Loups n'étaient pas de race pure, et qu'ils étaient mêlés de quelque Chien: l'état sauvage où on les prit n'est pas une objection, car il n'est pas rare de voir dans les pays de forêts des Chiennes couvertes par des Loups, et nous allons exposer, d'après Buffon, lui-même, une suite de générations fécondes malgré l'esclavage, et provenant d'un Chien et d'une Louve.

Comme le nomenclateur a confondu cette variété du Loup, etc., si l'on veut, cette espèce, avec le Renard

noir ou argenté (*Can. argentatus* de Penn.).

3. LE CHACAL OU LOUP D'OR, *Canis aureus*, L., *Schakal* des Tatars; des Turcs; des Perses et des Russes; *Deeb* et *Dih* des Barbaresques; *Wau* des Arabes; *Adies* ou *Adibe* des Portugais de l'Inde; *Gôhi* des Indous; *Nari* à la côte de Coromandel; *Tarsen* Géorgie; *Mebbis* en Abyssinie. C'est aussi le *Thois* de Plin. (lib. 8, cap. 36), figuré par Guldensstedt (*Nov. Com. Petrop.*, t. 20, p. 449 et pl. 11; son crâne, pl. 12). Schaeber, pl. 14; Encycl. pl. 107, f. 5). Il ne faut pas confondre avec le *Tufi* des Turcs, qui, d'après Guldensstedt, est le Renard ordinaire, ni le *Tschakal* de l'Ukraine, qui n'est autre chose que le Loup.

Guldensstedt (*loc. cit.*) n'a rien laissé à désirer sur l'histoire de cette espèce. Tout ce que nous allons dire en est extrait: il a établi, entre cette espèce, le Loup et le Renard, les différences que nous avons énoncées dans les généralités de cet article; tant à l'égard des proportions de longueur et de figure d'intestin que de la figure des dents. Il a montré que, sous ces rapports, il y avait identité parfaite entre le Chacal et le Chien domestique; il a figuré, pl. 10, le cœur du Chacal, qui ne diffère nullement de celui du Chien représenté (Buff., pl. 46, t. 8), tandis que celui du Loup (fig. *ibid.*, T. VII, pl. 11) en diffère beaucoup sans se rapprocher de celui du Renard (*ibid.*, pl. 5), qui en diffère encore plus; le crâne qu'il a représenté (*Nov. Com. Petrop.*, t. 20, pl. 49) et qui l'est aussi, pl. 16, f. 19, 20, 21 et 22, T. IV des Os. Foss. de Cuvier, offre avec le Renard (représenté pl. 13 par Guldensstedt) les différences générales que ci-dessus, d'après Cuvier, nous avons dit exister entre les vrais Loups et les Renards. Il a (*loc. cit.*, pl. 474 et suiv.) donné le dessin comparatif de ces différences, ainsi que de celles qui distinguent leur dentition; différences dont la plus remarquable est que dans les Chiens les rangées dentaires sont continues, tandis que dans les Renards les trois premières

molaires ne se touchent pas, et que surtout il reste un large intervalle entre la canine et la première molaire. Guldénstædt observe même que la bosse pariétale, déjà plus développée dans le Renard que dans le Loup, l'est davantage dans le Chacal que dans le Renard, et que ces proportions correspondent avec le degré de ruse qui distingue ces espèces. La comparaison la plus attentive, dit Guldénstædt (p. 471), n'offre pas de différences sensibles entre l'organisation intérieure du Chacal et celle du Chien de berger. Cependant, ajoute-t-il, j'ai vu en Russie des Chiens à poil fauve brun, oreilles droites, museau pointu, de la taille du Chacal, et qui lui ressemblaient tout-à-fait.

Il observe en outre que le Chacal a de tout temps été extrêmement nombreux dans les montagnes de l'Asie-Mineure ou toutes les théogonies d'Occident plaçant le berceau de notre espèce; que nos Chèvres et nos Moutons, ces premiers bestiaux de l'Homme, y vivent encore à l'état sauvage; que par tout le Chien, dont la domesticité est, sinon antérieure, au moins de la même date, doit avoir vécu sauvage dans la même contrée; qu'aujourd'hui, comme depuis les temps historiques, cette contrée n'offre que quatre espèces sauvages, savoir: l'Hyène, le Loup, le Renard et le Chacal. Il aurait dû ajouter (comme nous avons dit aux généralités) que l'asservissement de l'espèce sauvage du Chien (quelle que cette espèce pût être), soit par l'asservissement domestique, soit par l'extermination, est physiquement impossible, comme le prouve l'existence actuelle des Chiens devenus sauvages, et les espèces toujours substantielles de l'Égypte et du Mouflon. Considérant enfin qu'anatomiquement le Chien domestique diffère du Loup, du Renard; que l'Hyène n'est pas seulement du même genre, que le Chacal, préférant les sites montagneux, a été plus à la portée des premiers Hommes, que le Loup et le Renard, qu'aujourd'hui les troupes

de Chacals s'approchent avec sécurité soit des caravanes en marche, soit des tentes dressées pour la nuit; que sa taille est moyenne entre celle des plus grands et des plus petits Chiens; que ses poils sont plus durs que chez aucun Chien, et d'une longueur moyenne entre les Chiens courts et ceux où ils sont plus longs; que les mâchoires sont encore plus conformes que l'organisation; que ses manières en domesticité sont les mêmes que celles du Chien; qu'il pousse de côté, dort couché au rond comme lui, va lui flâner au derrière amicalement; que son odorat, beaucoup moindre qu'on se l'a dit, est à peine plus forte que celle du Chien à l'approche de l'opage; que tous les Chiens n'ont pas la queue recourbée; que le Chien de berger la porte pendante comme le Chacal; que d'ailleurs, comme le prouvent les Moutons et les variétés même des Chiens, la queue est un organe très-variable par la domesticité; il en est de même des rapports (p. 468) non-seulement autorisent; mais nécessitent de regarder le Chacal comme le vrai Chien sauvage et la souche de toutes les variétés de Chiens domestiques.

Cette seconde conclusion me semble trop générale. Je crois que les nombreuses variétés du Chien de notre ancien continent sont le produit de nombreuses combinaisons avec le Loup, puis des nouveaux méis, soit avec la race domestique pure, soit avec le Chacal ou Chien sauvage. Ces alliances auroient multiplié, bien plus qu'on ne croit, des types indépendans, quant à l'origine, de ceux que l'influence de la domesticité et du régime alimentaire ont pu produire ailleurs. Nous ajoutons enfin que Dallas (Not. sur l'Hyène, p. 15) avait, avant Guldénstædt, regardé le Chacal comme le type sauvage et toujours substantiel du Chien domestique; les raisons qu'il en donne sont à peu près les mêmes que celles de Guldénstædt, à quoi il ajoute que les Chiens des Arabes, des Indes, etc., ressemblent tout-à-fait à ceux du Chacal.



Le Chacal, dit Cuvier (Oss. Foss. T. IV), se distingue à l'extérieur de tous les Renards, par sa queue assez grêle et qui n'atteint que le talon, par ses yeux diurnes et par sa tête de Loup : du reste, il lui paraît y en avoir deux espèces ou du moins deux races fort distinctes, le Chacal de l'Inde qui est beaucoup plus noirâtre (fig. *Mamm. lith.*), et celui du Sénégal qui est plus pâle (fig. *ibidem.*) Tous deux ont les extrémités fauves. C'est ce dernier pour lequel F. Cuvier a proposé le nom spécifique d'*Audub.* ; il a aussi reconnu que son odeur était beaucoup moins forte que celle du Chacal de l'Inde. Aristote distinguait déjà (*Hist. Anim. lib. 9, cap. 44*) deux espèces ou variétés de Chacal sous le nom de *Thos* ; donné aussi par Homère à un Carnassier qui vit en troupes pour chasser, et qui, attendu les pays connus d'Homère, ne peut être que le Chacal.

Ces deux espèces ou variétés de Chacal ont produit ensemble à la Ménagerie : ce fait prouve d'abord que Buffon se trompait en admettant que la domesticité, au moins de la part de l'une des deux, était nécessaire pour que des espèces différentes pussent se croiser. F. Cuvier en conclut que si la domesticité n'est pas une condition, au moins la privation de liberté est indispensable.

Il y avait six mois que ces deux Chacals étaient dans la même cage ; la femelle, du Sénégal, fut couverte, le 26 décembre, avec toutes les circonstances de l'accouplement des Chiens, et mit bas, le premier mars, cinq petits qui avaient sept pouces du museau à la queue, longue elle-même de deux pouces et demi. Les yeux étaient fermés, la conque de l'oreille était repliée sur elle-même, de manière que ses saillies et ses creux s'engrenaient ensemble et en fermaient complètement l'ouverture. Les yeux furent ouverts le dixième jour ; le pelage était laineux au corps, soyeux à la tête ; couleur générale gris d'ardoise en dessus avec une teinte fauve ; et gris pâle en dessous au quarante-neuf-

vième jour ; et à la fin du troisième mois ; la couleur générale était un fauve brun, avec du blanc autour de l'œil et aux jointures ; deux seulement ont vécu avec des différences très-prononcées dans le caractère.

Les Chacals vivent en troupes nombreuses, associées pour la chasse, l'attaque et la défense. Ils déterrèrent les cadavres, et quoiqu'ils aient, comme le Loup, une pupille diurne, c'est surtout la nuit qu'ils chassent et vont à la merande.

4. CHACAL A DOS NOIR DU CAP, *Canis mesomelas*, Schreber (pl. 95, Eneycl., pl. 107, f. 4), *Tentie* ou *Kentie* des Hottentots. Cet Animal, dit Cuvier (Oss. Foss. T. IV, p. 465), confondu mal à propos avec l'Adiva de Buffon, n'a pas les yeux nocturnes, et doit être, malgré la longueur de sa queue, rapproché, par ses yeux et par sa tête, des Chacals plutôt que des Renards. C'est du reste une belle et grande espèce très-distincte, fauve sur les flancs, ayant sur le dos une sorte de manteau noir ondulé de blanc et finissant en pointe sur la croupe : la tête est d'un tendre jaunâtre, le museau roux ainsi que les pattes ; la queue noire à la pointe à sur son tiers postérieur deux ou trois anneaux noirs. Très-commun au cap de Bonne-Espérance Kolb (Descript. du Cap) n'a donné que peu de détails sur ses habitudes.

5. LOUP DE JAVA. D'après F. Cuvier (Diet. des Sc. nat.), il existerait à Java, d'où l'Eschénault l'a rapporté, un Loup de la taille et des proportions du Loup commun, à oreilles seulement plus petites ; et d'un brun fauve noirâtre sur le dos, aux pattes et à la queue. Mais Cuvier n'en parle pas dans son Précis sur le genre *Canis* (Oss. Foss. T. IV, chap. 6).

*Canis du Mexique* contiennent  
6. LE LOUP DU MEXIQUE, *Canis mexicanus*, Lat. Séba (Thes. T. V, tab. 42, f. 2). A taille peu inférieure à celle du Loup ordinaire ; d'un gris roussâtre ; par-ci par-là mêlé d'un peu de noirâtre ; tout du museau, dessous

molaires ne se touchent pas, et que surtout il reste un large intervalle entre la canine et la première molaire. Guldensstedt observe même que la bosse pariétale, déjà plus développée dans le Renard que dans le Loup, l'est davantage dans le Chacal que dans le Renard, et que ces proportions correspondent avec le degré de ruse qui distingue ces espèces. La comparaison la plus attentive, dit Guldensstedt (p. 471), n'offre pas de différences sensibles entre l'organisation intérieure du Chacal et celle du Chien de berger. Cependant, ajoute-t-il, j'ai vu en Russie des Chiens à poil fauve brun, oreilles droites, museau pointu, de la taille du Chacal, et qui lui ressemblaient tout-à-fait.

Il observe en outre que le Chacal a de tout temps été extrêmement nombreux dans les montagnes de l'Asie-Mineure où toutes les théognies d'Occident plaçant le berceau de notre espèce, que nos Chèvres et nos Moutons, ces premiers bestiaux de l'Homme, y vivent encore à l'état sauvage; que partout le Chien, dont la domesticité est, sinon antérieure, au moins de la même date, doit avoir vécu sauvage dans la même contrée: qu'aujourd'hui, comme depuis les temps historiques, cette contrée n'offre que quatre espèces sauvages, savoir: l'Hyène, le Loup, le Renard et le Chacal. Il aurait dû ajouter (comme nous avons dit, aux généralités que l'ancienneté de l'espèce sauvage du Chien (quelle que cette espèce put être), soit par l'asservissement domestique, soit par l'extermination, est physiquement impossible, comme le prouve l'existence actuelle des Chiens redevenus sauvages, et les espèces toujours substantielles de l'Agagne et du Mouton. Considérant enfin qu'anatomiquement le Chien domestique diffère du Loup et du Renard; que l'Hyène n'est pas seulement du même genre, que le Chacal, préférant les sites montagneux, a été plus à la portée des premiers Hommes, que le Loup et le Renard, qu'aujourd'hui les troupes

de Chacals s'approchent avec sécurité soit des caravanes en marche, soit des tentes dressées pour la nuit: que sa taille est moyenne entre celle des plus grands et des plus petits Chiens; que ses poils sont plus durs que chez aucun Chien; et d'une longueur moyenne entre les Chiens où ils sont plus ras et ceux où ils sont plus longs; que les os sont encore plus conformes que l'organisation; que ses manières en domesticité sont les mêmes que celles du Chien; qu'il pisse de côté, dort couché en rond comme lui, va lui flâner au derrière amicalement; que son odorat, beaucoup moindre qu'on se l'a dit, est à peine plus forte que celle du Chien à l'approche d'un orage; que tous les Chiens n'ont pas la queue recourbée; que le Chien de berger la porte pendante comme le Chacal; que d'ailleurs, comme le prouvent les Montagnes et les variétés même des Chiens, la queue est un organe très-variable par la domesticité; il en résulte que tous ces rapports (p. 462) non-seulement autorisent, mais nécessitent de regarder le Chacal comme le vrai Chien sauvage et la souche de toutes les variétés de Chiens domestiques.

Cette seconde conclusion me semble trop générale. Je crois que les nombreuses variétés du Chien de notre ancien continent sont le produit de nombreuses combinaisons avec le Loup, pris des nouveaux méis, soit avec la race domestique pure, soit avec le Chacal ou Chien sauvage. Ces alliances ont été multipliées, bien plus qu'on ne croit, des types indépendants, quant à l'origine, de ceux que l'influence de la domesticité et du régime alimentaire ont pu produire d'ailleurs. Nous ajoutons enfin queallas (Not. ad. Darts. 15) ayant Guldensstedt regardé le Chacal comme la souche sauvage et toujours substantielle du Chien domestique; les raisons qu'il en donne sont à peu près les mêmes que celles de Guldensstedt, à quoi il ajoute que les Chiens des montagnes, qui ressemblent tout-à-

Le Chacal, dit Cuvier (Oss. Foss. T. IV); se distingue à l'extérieur de tous les Renards, par sa queue assez grêle et qui n'atteint que le talon, par ses yeux diurnes et par sa tête de Loup : du reste, il lui paraît y en avoir deux espèces ou du moins deux races fort distinctes, le Chacal de l'Inde qui est beaucoup plus noirâtre (fig. *Mamm. lith.*), et celui du Sénégal qui est plus pâle (fig. *ibidem*). Tous deux ont les extrémités fauves. C'est ce dernier pour lequel F. Cuvier a proposé le nom spécifique d'*Antelus*; il a aussi reconnu que son odeur était beaucoup moins forte que celle du Chacal de l'Inde. Aristote distinguait déjà (*Hist. Anim. lib. 9, cap. 46*) deux espèces ou variétés de Chacal sous le nom de *Thos*; donné aussi par Homère à un Carnassier qui vit en troupes pour chasser, et qui, attendu les pays connus d'Homère, ne peut être que le Chacal.

Ces deux espèces ou variétés de Chacal ont produit ensemble à la Ménagerie : ce fait prouve d'abord que Buffon se trompait en admettant que l'adomesticité, au moins de la part de l'une des deux, était nécessaire pour que des espèces différentes pussent se croiser. F. Cuvier en conclut que si l'adomesticité n'est pas une condition, au moins la privation de liberté est indispensable.

Il y avait six mois que ces deux Chacals étaient dans la même cage; la femelle, du Sénégal, fut couverte, le 26 décembre, avec toutes les circonstances de l'accouplement des Chiens, et mit bas, le premier mars, cinq petits qui avaient sept pouces du museau à la queue, longue elle-même de deux pouces et demi. Les yeux étaient fermés; la conque de l'oreille était repliée sur elle-même, de manière que ses saillies et ses creux s'engrenaient ensemble et en formaient complètement l'ouverture. Les yeux furent ouverts le dixième jour; le pelage était laineux au corps, soyeux à la tête; couleur générale gris d'ardoise en dessus avec une teinte fauve; et gris pâle en dessous au quarante-neu-

vième jour; et à la fin du troisième mois; la couleur générale était un fauve brun, avec du blanc autour de l'œil et aux jointures; deux seulement ont vécu avec des différences très-prononcées dans le caractère.

Les Chacals vivent en troupes nombreuses, associées pour la chasse, l'attaque et la défense. Ils déterrent les cadavres, et quoiqu'ils aient, comme le Loup, une pupille diurne, c'est surtout la nuit qu'ils chassent et vont à la mercuriale.

4. CHACAL A DOS NOIR DU CAP, *Canis mesomelas*, Schreber (pl. 95, Eneyd., pl. 107; f. 4), *Tendie* ou *Kentie* des Hottentots. Cet Animal, dit Cuvier (Oss. Foss. T. IV, p. 465), confondus mal à propos avec l'Adive de Buffon, n'a pas les yeux nocturnes, et doit être, malgré la longueur de sa queue, rapproché par ses yeux et par sa tête, des Chacals plutôt que des Renards. C'est du reste une belle et grande espèce très-distincte, fauve sur les flancs, ayant sur le dos une sorte de manteau noir ondulé de blanc et finissant en pointe sur la croupe; la tête est d'un zendré jaunâtre; le museau roux ainsi que les pattes; la queue noire à la pointe et sur son tiers postérieur deux ou trois anneaux noirs. Très-commun au cap de Bonne-Espérance. Kolb (Descript. du Cap) n'a donné que peu de détails sur ses habitudes.

5. LOUP DE JAVA. D'après F. Cuvier (Dict. des Sc. nat.), il existerait à Java, d'où l'Eschénault l'a rapporté, un Loup de la taille et des proportions du Loup commun, à oreilles seulement plus petites; et d'un brun fauve noirâtre sur le dos; aux pattes et à la queue. Mais Cuvier n'en parle pas dans son Précis sur le genre *Canis* (Oss. Foss. T. IV, chap. 6).

*Canis du nouveau continent.*

6. LE LOUP DU MEXIQUE, *Canis mexicanus*, Lit. Séba (Thes. T. 9, tab. 42, f. 2). A la taille postérieure à celle du Loup ordinaire; d'un gris roussâtre; par-ci par-là mêlé d'un peu de noirâtre; tout du museau, dessous

lait, n'aboyait pas; ses oreilles dessinées, rabattues comme aux deux générations précédentes, se redressèrent quand elle fut adulte; sa queue était longue et fraissante comme au Loup.

Cette femelle, couverte par son père, mit bas quatre petits dont deux furent dévorés en naissant. Les deux autres, mâle et femelle (*ibid.* pl. 49 et 50), devinrent doux et caressans, mais rien ne pouvait les empêcher d'attaquer la volaille. Le mâle à physionomie et allure de Loup, à oreilles larges et droites, avait à un an deux pieds huit poches du nez à l'anus en ligne droite, et près de trois pieds cinq pouces en suivant les courbures. La queue était longue de neuf pouces et demi, pendante, à poil touffu, mais assez court, noirâtre dessus; jaunâtre dessous. Elle était noire au bout; il y avait du blanc aux joues, à la poitrine et à la face interne des membres.

La femelle de cette quatrième génération était plus douce que son mâle.

Cette expérience, dirigée avec autant de précaution que de persévérance par Buffon lui-même, est une réfutation péremptoire du principe sur lequel on établissait la définition de l'idée d'espèce en zoologie.

Buffon (*ibid.*) cite encore deux exemples de Louves sauvages couvertes par des Chiens domestiques.

Il est évident que ces métis féconds entre eux n'ont pas manqué de l'être avec chacune de leurs souches. Quelle que soit donc la tige sauvage du Chien domestique en Europe, il est impossible que l'événement réalisé spontanément, pour ainsi dire à la même époque dans deux des trois cas précédens, ne se soit pas renouvelé un grand nombre de fois depuis la domesticité des Chiens. Il est donc évident que le sang du Loup est mélangé avec celui de nos grandes races de Chiens en Europe.

A la Nouvelle-Hollande et à la Nouvelle-Guinée, il existe en même temps et des Chiens domestiques et

des Chiens sauvages. La ressemblance trouvée par F. Cuvier entre leurs crânes et ceux de nos Mâtins, n'est pas moindre avec les crânes de Loups. Or, comme le dit Cuvier (passage cité plus haut), au sujet du Chien fossile, l'identité d'espèce n'est pas prouvée par cette ressemblance de quelques parties; et somme, ainsi que nous l'avons déjà dit ailleurs, la partie est aussi un motif de détermination; et puisqu'il n'y a pas de motif de ne pas supposer ces Chiens sauvages indigènes, les Chiens domestiques du continent australien et de ses îles ne peuvent donc être ramenés à l'unité avec aucun des nôtres. Ces Chiens de la Nouvelle-Guinée, d'après le docteur Quoy, médecin de l'*Uranie*, ressemblent; et pour la physionomie et pour le caractère, à ceux de la Nouvelle-Hollande, dont le commodore Philippe a donné la figure. (*Voyage à la Nouvelle-Galles du sud*, in-4.)

Il a moins de deux pieds de haut, est long de deux pieds et demi; la figure de la tête tient le milieu entre celle du Renard et du Loup. Oreilles courtes et droites, moustaches d'un à deux pouces de long; couleur brun pâle s'éclaircissant sous le ventre; jambes de devant blanches en arrière ainsi que les quatre pieds; la queue, un peu moins touffue que celle d'un Renard, est capiteuse; un peu courbée vers les jambes. Si la figure est exacte, le redressement de la queue, dont on a voulu faire un caractère, exclurait donc ce Chien de l'espèce des nôtres. D'ailleurs, quoi qu'on en ait dit, les Loups aussi portent la queue recourbée en haut. L'individu décrit par Philippe vivait en Angleterre chez la marquise de Salisbury; c'était une femelle; elle sechait comme les autres Chiens, n'aboyait ni ne grondait, même quand on la tourmentait; le Chien de Waïgion que le docteur Quoy a gardé jusqu'à sa mort de l'*Uranie*, me savait aussi que hurler. Il apprit, mais imparfaitement, à aboyer avec une Chienne française. Sans être méchant pour l'Homme, il tuait tout et attaquant

avec une indomptable colère, même les plus grands Chiens dont il venait à bout à force d'opiniâtreté. Philippe en dit autant de la Chienne qu'il a décrite. Celui de Quoy, d'un poil roux, avait les dents usées, parce qu'il vivait de Bernard-l'Hermite à Waigiau, où la nuit les forêts retentissent des hurlemens de ceux qui sont tout-à-fait sauvages. Quoy a vu à la baie des Chiens-Marins un Chien sauvage qui lui a semblé pareil au sien. Celui-ci s'accoupla inutilement avec une Chienne française.

Lors de la découverte de l'Amérique, il existait aux Antilles et sur le continent, chez les Caraïbes, plusieurs races de Chiens domestiques, de toute nature et de toute couleur de poil, dit Oviédo, lib. 12 et 13 (*Raccolta de Ramusio*, t. 5); mais ils sont muets, dit-il, d'ailleurs caressans, quoiqu'un peu moins domestiques que les nôtres. Pierre Martire dit aussi (*ibid.*) de ceux qu'on trouva sur une petite île voisine de la côte de Cumana, qu'ils avaient l'air très-sauvage (*brutissimo*), qu'ils n'aboyaient pas, qu'ils vivaient d'une espèce de Canard et d'une espèce de Rougeur. Or, Oviédo parle d'une race de ces Chiens qui servaient aux indigènes des Antilles à chasser l'Hutia, espèce de Rougeur à queue de Rat, figuré et décrit par Catesby (*Hist. natur. de la Caroline*, t. 11, pl. 79) sous le nom de Lapin de Bahama, et qu'on vient de publier sous le nom de Capromis (*N.* ce mot). Comme (d'après Humboldt) les Caraïbes à cette époque formaient, le long des bords de l'Orénoque et de ses affluens, une nation puissante, aussi bien que dans les petites Antilles, et comme il existe à la Guiane au moins une espèce de Canis, le Chien des bois (*Can. Thoiis*), que les indigènes, encore aujourd'hui, dressent à la chasse des petits Rougeurs, il nous paraît que c'est à cette espèce américaine, ou bien au Loup gris du Paraguay, qu'il faut rattacher ces Chiens domestiques, aux Antilles et sur la Terre-Ferme avant la découverte. D'ailleurs

il paraît bien que ces Chiens domestiques des Antilles et de Saint-Domingue n'y avaient pas de type sauvage, et qu'ils avaient été importés du continent; car, suivant Oviédo (liv. 12, p. 134, *loc. cit.*), de son temps, les Chiens domestiques n'existaient plus à Saint-Domingue, où, dans une disette, lors du second voyage de Colomb, ils avaient été détruits pour servir de nourriture. Or Oviédo, à cette même époque, dit qu'ils étaient très-nombreux à la Terre-Ferme. Il en faut dire autant de l'Alco du Pérou. Séba (*Thesaurus*) a donné une figure d'un Chien sauvage qu'il dit pris à Saint-Domingue. Mais l'Animal a été défiguré par l'empailleur ou le dessinateur. D'ailleurs, comme on vient de voir, d'après Oviédo, il est plus que douteux qu'il existât un Canis sauvage à Saint-Domingue, et Séba n'est pas une autorité quand il s'agit de la patrie des Animaux qu'il décrit.

Voilà donc au moins quatre espèces sauvages, savoir: dans l'ancien continent, le Chacal et le Loup, en Amérique le Chien des bois et peut-être un des autres Canis du Paraguay, dans l'Australasie le Chien Papou, auxquelles se rattache l'ensemble des Chiens actuellement domestiques.

Ces Chiens de la côte nord-ouest d'Amérique, que les indigènes tendent comme des Moutons, et auxquels Van-Couver a trouvé à l'entrée de l'Amirauté, sous les soixantième parallèle, des toisons si compactes; qu'on en peut soulever de grosses masses par un coin sans que leur senteur se sépare; ceux que le capitaine Ross a trouvés chez les Esquimaux, et qui ont les pieds palmés jusqu'aux ongles, et un instinct aquatique presque semblable à celui des Loutres et des Castors (fig. Martini, lithograph.); ces Chiens kamtschadales et tungousses qui tirent des traîneaux, et dont Marco-Paul a parlé le premier (*lib. 3, cap. 43, op. Ramusio*, t. 1, qui les a pris pour des Renards dans une note marginale); ceux qu'a vus Héarn à l'ouest de la baie

d'Hudson chez les Esquimaux qui les chargent sur le dos comme des bêtes de somme, et que les Loups attaquent avec tant de fureur, sont-ils d'une origine commune ou différente? Et dans le cas de communauté, cette origine se rattache-t-elle à l'une de nos races domestiques? Comme tous ces Chiens sont domestiques au service de ces Esquimaux qui peuplent les côtes polaires de nos deux continents, où ils passent encore aujourd'hui de l'un à l'autre, cette dernière opinion nous semble vraisemblable.

Buffon (T. V) a dressé une généalogie des Chiens rattachés à trois souches, savoir : le Mâtin, le Chien de berger et le Bogue. Il a groupé autour de ces trois points une quarantaine de races dont les unes sont restées isolées, et dont les autres, par des alliances simples ou multiples, ont formé d'autres races secondaires plus ou moins nombreuses. Il ne nous semble pas possible, dans l'état actuel, non pas seulement de nos connaissances sur ces races, mais de ces races elles-mêmes, de rattacher ces trois groupes à des points quelconques de la filiation que nous avons exposée dans cet article.

La distinction de ces races entre elles est plutôt un sujet d'économie que de zoologie; nous renvoyons, pour leur description, à l'ouvrage de Buffon, et, pour leurs rapports d'organisation, au Mémoire de F. Cuvier sur l'ostéologie des variétés domestiques (Ann. du Mus.).

#### II<sup>e</sup> SOUS-GENRE. — LES RENARDS.

Ils se distinguent des *Canis* proprement dits par une queue plus longue et plus touffue, caractérisée par le nom de queue de Renard, par un museau plus pointu, des pupilles nocturnes ou allongées verticalement, et des incisives supérieures moins échanquées ou même rectilignes sur leur bord horizontal : ils ont en général une odeur fétide, se creusent des terriers et n'attaquent que des Animaux faibles. Les Renards sont moins répandus que les Chiens : on n'en

connaît pas encore dans les archipels d'Asie ni dans la Nouvelle-Hollande.

#### Renards de l'ancien continent.

15. RENARD COMMUN, *Canis Vulpes*, Linn. Buff. I. 7, pl. 6, Schreb. pl. 90. *Fox* des Germains; *Fox* des Anglais; *Llwyhog* des Bretons; *Raj* des Suédois; *Zorra* des Espagnols; *Raposa* des Portugais; *Lis*, *Liszu* des Polonais; *Lisitsa* des Russes; *Tulhi* des Perses et des Turcs; *Schulack* des Tungouses; *Schual* des Hébreux; *Taaieb*, *Doren* des Arabes; *Nari* sur les côtes de l'Indostan.

Plus ou moins roux, le bout de la queue blanc, répandu en latitude depuis la Suède jusqu'en Egypte et dans l'Inde; d'après les récits des voyageurs, il appartient également au nord des deux continents.

Buffon a essayé inutilement de l'accoupler avec l'espèce du Chien; mais ses premiers essais sur le Loup avaient aussi été infructueux. Daubenton (Buff. T. V) pensait que l'odeur du Renard sauvage était la seule cause de l'antipathie des Chiens pour lui; que cette odeur changerait par les alimens et par le repos dans le Renard devenu domestique après une longue suite de générations, qu'alors les Chiens pourraient s'accoupler avec les Renards, et produire par ce mélange des métis semblables aux Chiens de Laconie dont Aristote fait mention (*De Anim.* lib. 8, cap. 28). Or, il y a quelque raison de croire que le Renard était effectivement domestique en Laconie.

Buffon (T. VII) croyait que tous les Renards, de quelque couleur et de quelque pays qu'ils fussent, n'étaient que des variétés d'une espèce unique, et bien qu'il en restreignît la limite la plus méridionale à l'Egypte et à l'Inde, néanmoins il admettait, par une singulière contradiction, que ceux du pôle antarctique étaient identiques avec ceux du pôle arctique. Il réforma dans la suite ces idées exclusives, en reconnaissant d'abord l'*Isatis*, puis le Renard du Spitzberg; Schreiber,

T. II, p. 358 et pl. 91, a décrit et figuré sous le nom de *Canis Alopex*, Braud-Raf des Suédois, une variété de cette espèce, dont les pieds et le bout de la queue sont noirs. C'est le Renard Charbonnier de France.

14. **CORSAC**, *Canis Corsac*, Pallas, second Voyage; Schreb., pl. 91, B; Adiva de Buffon, Chien du Bengale de Pennant, suivant Cuvier (Oss. Fos. T. IV, p. 463). — Petit Renard de l'Inde et de la Tartarie, à peu près de la couleur du Chacal, mais à queue longue, touffue et noire au bout, comme une queue de Renard; une raie brune de chaque côté de la tête, qui va de l'œil au museau. Il vit en grand nombre dans des terriers, par tous les steppes de la Tartarie. Les Kirguis, qui lui ont donné ce nom de Corsac, distinguent par le nom de Karagan (Schreb., T. II, p. 359) un autre Renard à couleur de Loup, et dont ils portent une grande quantité de peaux à Orenbourg. Cette diversité de noms donnés à deux Animaux par un peuple chasseur, naturellement bon observateur, est une grande présomption de diversité spécifique. Le Corsac passe pour ne boire jamais. Cuvier (*loc. cit.*) doute de l'authenticité de l'Adiva de Buffon (Sup. 3, pl. 16). L'Animal que Buffon décrit (*ibid.*) sous le nom d'Isatis, et dont il dit que les Tartares portent annuellement 50,000 peaux à Orenbourg, est le Corsac d'après sa description même, et surtout le pays qu'il lui assigne. C'est à tort qu'il en conclut que c'est l'Isatis de Gmelin, et qu'il intitule de ce nom la figure 17.

15. **RENARD BLEU** ou **ISATIS**, *Canis lagopus*, Gmelin, Schreber, pl. 93, copié Encyclop., pl. 107, f. 2; *Fialtracka* des Suédois, *Pesex* des Russes.

Gmelin (*Nov. Comm. Petrop.*, T. V) a donné une bonne description de l'Isatis et son histoire naturelle.

Le dessous des doigts garni de poils; pelage très-fourré, très-moelleux, presque semblable à de la laine, mais point crépu; presque long de deux pouces sur tout le corps, ex-

cepté à la tête et aux pattes où il est presque ras; le tour des narines et la pointe de la mâchoire inférieure nus et à peau noire; ongles de tous les pieds noirs à la base et blanchissant à la pointe; le cinquième doigt des pieds de devant presque aussi fort que les autres, un peu plus court seulement, et son ongle plus recourbé. On avait jusqu'à Gmelin reconnu deux variétés dans cette espèce. Mais par la concordance de renseignements exacts que lui fournirent deux chasseurs expérimentés, l'un d'Iakutsk, l'autre de Jenisseïk, il a constaté que des femelles, soit blanches, soit cendrées, étaient presque toujours suivies de petits dont les uns sont blancs et les autres cendrés; que néanmoins la couleur grise est plus rare que la blanche dans une même portée, et que sur trois portées, qui sont quelquefois de vingt petits chacune, il n'y a souvent qu'un individu cendré, tandis qu'il n'arrive jamais que tous les petits d'une portée soient de cette couleur. Il s'ensuit donc que la différence de couleur ne constitue pas une variété permanente, mais est purement accidentelle. L'uniformité de couleur n'est donc pas une nécessité de l'état sauvage.

L'Isatis entre en chaleur, dit Gmelin, vers la fête de l'Annonciation de la Sainte-Vierge; pendant cet état qui dure environ trois semaines, ils restent hors de leurs terriers. La femelle porte à peu près neuf semaines, et met bas vers la fin du carême des sept à vingt-cinq petits. Ceux d'une mère blanche sont d'un gris-roux en naissant; ceux d'une mère cendrée sont presque noirs. Pendant les cinq à six premières semaines la mère sort peu du terrier. Vers le milieu d'août elle les mène promener. Leur poil alors a un peu plus d'un demi-pouce de long; les individus blancs ont déjà une raie brune-cendrée sur le dos; les individus cendrés sont tout noirs, et ne subissent plus aucune variation que dans la longueur et le reflet du pelage. Dès le milieu de septembre les blancs sont d'un blanc pur, ex-

cepté la raie du dos et une barre sur les épaules qui noircissent, et les font alors nommer croisés (*Kressowiki*); le noir des épaules disparaît tout-à-fait, et bientôt aussi celui de l'échine, et, en novembre, l'Isatis blanc est parfait et se nomme *Nedopeses*. En décembre, les poils ont acquis toute leur longueur; la mue commence au milieu de mai, et finit en juillet. A cette époque les adultes ont la même livrée que les nouveau-nés de leur couleur, et parcourent comme eux toutes les phases de la coloration. Le poil est d'autant plus adhérent que l'Animal est plus jeune, et que la saison est plus froide.

L'Isatis est indigène de tout le littoral de la mer Glaciale et des fleuves qui s'y jettent, partout où le pays est déboisé et découvert, et au nord du soixante-neuvième degré de latitude. Ce n'est que sur les montagnes nues qu'il descend davantage vers le sud. Quoique, dans ses émigrations, on le voie souvent au sud de ce parallèle, jamais il ne s'y arrête, et surtout n'y creuse de terrier. Ces terriers sont toujours pratiqués sur des hauteurs. Il passe rarement plus d'une année dans la même contrée. Ses émigrations, nécessitées par l'épuisement du gibier, se règlent en général sur celle des Lemmings et aussi du *Lepus Totali*, dit Gmelin. En général ces émigrations se font au solstice d'hiver. Ils sont de retour au bout de trois ou quatre ans. Néanmoins chaque contrée n'en est jamais absolument déserte.

L'Isatis est de plus grande taille vers l'embouchure du Jenisseik et du Chatanga que vers la Léna, et à la Léna qu'à la Kolyma. Cette contrée paraît plus favorable au développement des Animaux que le reste de la Sibérie: au moins, dit Gmelin, les Lièvres, les Loups, les Ours blancs, y sont plus grands que partout ailleurs.

Le Renard du Spitzberg, décrit et figuré par Phipps (Voyage au Spitzberg), et reproduit par Buffon (Supplém. 7, et Encyclop., pl. 106,

f. 3), a bien, comme l'Isatis, la tête et les pattes à poils ras; mais la figure de la tête en diffère beaucoup par la distance aux oreilles des yeux rapprochés du museau: Phipps lui a trouvé fort peu d'odeur, comme Gmelin à l'Isatis.

RENARD DE LALANDE, *Canis Lalandi*. V. sa figure dans les planches de notre Dictionnaire. *Canis megalatis* de la Mammalogie Encyclopédique. — Plus haut sur jambes que notre Renard, dit Cuvier (Ossem. Fossiles, loc. cit.) sa tête est plus petite, sa queue encore plus fournie; mais surtout les oreilles beaucoup plus grandes, égalant presque la tête, et remarquables encore par un double rebord à leur bord inférieur et externe; son pelage est gris-brun, fauve-pâle et plus laineux en dessous; le devant de ses quatre pieds brun-noirâtre, le dessus et le bout de la queue noirs; tout le pelage de cet Animal est plus laineux et crépu que celui d'aucun autre Renard. Le poil même des pattes est comme crépu. Découvert en Cafrerie, et rapporté par De Lalande.

#### *Renards propres à l'Amérique.*

16. RENARD NOIR, *Canis argentatus*, Penn., F. Cuvier (Mamm. lith., livraison 5<sup>e</sup>). Confondu avec le Loup noir, *Canis Lycaon*, par Gmelin (*Systema Naturæ*). Noir, à reflet argenté partout, excepté aux oreilles, aux épaules et à la queue où il est d'un noir pur; le bout de la queue est blanc, ainsi que le dedans de l'oreille et le dessus des sourcils; museau et tour de l'œil gris; iris jaune.

Longueur entre tête et queue, un pied cinq pouces; de la tête, six pouces; queue, onze pouces; hauteur au garrot, un pied un pouce; à la croupe, un pied deux pouces. — Il a vécu à la Ménagerie. Conformé comme le Renard ordinaire, il en a aussi les allures: il marche, comme lui, la tête et la queue basses. Il était très-doux et bien apprivoisé, grognait comme un Chien quand quelque chose lui



déplaisait. En été il souffrait beaucoup de la chaleur; son odeur est désagréable, mais différente de celle du Renard ordinaire. Le Renard noir est du nord de l'Amérique; mais, d'après Lesseps et Krakenninikoff, il se trouve aussi au Kamtschatka, quoiqu'il y soit rare.

17. **RENARD TRICOLORE**, *Canis cinereo-argenteus*, Schreb., F. Cuvier (Mam. lith., livraison 23), mal figuré pl. 92, par Schreber, qui, dans le texte, le nomme *Gris-Fuchs*, copié dans l'Encycl., pl. 106, f. 4. — Noir, glacé de gris dessus; tout le dessus du corps et la face interne des membres d'un fauve plus éclatant vers les flancs, plus pâle sous le ventre et la poitrine. La ligne de séparation des couleurs du dessus et du dessous est droite sur les flancs, et le fauve y est d'un beau roux cannelle; la tête sur le chanfrein autour des yeux, et de-là jusqu'au bord interne des oreilles, d'un gris roussâtre; le reste du museau blanc et noir. La partie postérieure des joues d'un fauve clair, et l'intérieur de l'oreille blanc. Les ongles et les parties nues de la peau sont noirs; l'iris d'un brun roux; les poils soyeux, blancs à la racine, ensuite annelés de noir, puis de blanc, sont noirs à la pointe. La bourre laineuse est en très-grande quantité, d'un gris pâle, avec la pointe rousse dans les parties fauves. Celui qui a vécu à la Ménagerie venait de New-Yorck. Il n'était pas familier, sans être pourtant méchant. Il exhalait déjà une mauvaise odeur, quoique sa seconde dentition ne fût pas terminée. Des zones froides et tempérées de l'Amérique nord.

Cuvier (Ossem. Fossil. T. IV, p. 463) ne pense pas que le Grey-Fox, *Canis virginianus* de Catesby (Hist. Nat. de la Carol. t. 2, pl. 78, et Schreb. pl. 92, B), diffère du Renard tricolore.

18. **RENARD ÉCRISÉ**, *Canis decussatus*, Geoff., *Can. cruciger*, Schreber, pl. 91, A. Cette espèce, que Cuvier (Diagn. An. T. 1) réunissait au Renard ordinaire, est admise au-

jourd'hui par lui comme distincte (Ossem. Foss. T. IV, p. 463). Elle est de la taille du Renard ordinaire. Tout le corps et surtout l'échine, la queue, les pattes et les épaules d'un gris noirâtre, provenant des poils annelés de noir et de blanc, plus foncé vers les épaules. Une grande plaque fauve de l'épaule jusqu'à la tête, et une autre de même couleur sur le côté de la poitrine, dont le roux est exagéré sur la figure de Schreber, où la queue est aussi toute noire, quoique l'extrémité en soit blanche. Les reflets du noir de ce Renard et ses ongles rappellent ceux du Renard argenté; mais l'iris de celui-ci est jaune, et il serait bleu sur le *C. cruciger*, d'après la figure de Schreber. — Le Renard croisé est du nord de l'Amérique; Krakenninikoff parle aussi de Renards à croix noire au Kamtschatka. Mais, ainsi que nous l'avons déjà dit ailleurs, les deux bords du détroit de Béring, réunis par des chaînes d'îles ou des continents de glace au moins temporaires, ont en commun les mêmes Animaux.

19. **Le RENARD FAUVE DE VIRGINIE** (Dict. des Sc. Nat. T. VIII) n'est pas admis par Cuvier dans le précis qu'il vient de donner du genre Chien (Ossem. Foss. T. IV). Voici les différences de sa tête et de celle du Renard ordinaire, d'après F. Cuvier. Les crêtes osseuses d'insertion du muscle temporal, au lieu de se rapprocher, à partir de l'angle postérieur de l'orbite, comme dans le Renard commun, restent parallèles jusqu'au milieu des pariétaux, où elles commencent à se courber, pour ne se réunir que vers la crête occipitale, de sorte qu'au sommet de la tête, elles sont distantes de plus d'un pouce. Du reste, cette tête a exactement les proportions de celle du Renard.

D'ailleurs le Renard fauve d'Europe est commun au nord des deux continents. Il paraît même que, comme en Russie et en Sibérie, il est plus grand en Amérique qu'en Europe.

*Renards fossiles.*

20. Cuvier (Oss. Foss. T. IV, pl. 32) a représenté, fig. 1 à 18, des dents, des phalanges et plusieurs autres débris d'un Chien fort voisin du Renard, si ce n'est pas le Renard lui-même. « Il faut, dit-il, que ces os de Renard soient communs à Gaylenreuth, car j'ai tiré tous ceux dont je parle d'un bloc de quelques pouces de diamètre, composé en grande partie d'os d'Ours et d'Hyène. Il est donc très-probable que ce Renard était contemporain de ces derniers Fossiles, car la substance osseuse n'en est pas moins altérée; à moins toutefois que la Stalactite n'ait enveloppé des os récents, en même temps qu'elle incrustait d'anciens ossements, comme il arrive dans les brèches osseuses de Nice. » (A.D.NS)

**CHIEN DE MER.** POIS. Nom que les pêcheurs donnent presque partout aux Poissons du genre Squal. *V.* ce mot. (B.)

**CHIENDENT.** BOT. PHAN. Désignation vulgaire de plusieurs Graminées traçantes, dont les racines de deux espèces, le *Triticum repens* et le *Digitaria stolonifera*, sont employées en médecine. L'on distingue sous les noms de

**CHIENDENT AQUATIQUE**, le *Festuca fluitans*.

**CHIENDENT A BOSSETTES**, le *Dactylis glomerata*, L.

**CHIENDENT MARIN**, l'*Arundo arenaria*, L. On a étendu ce nom à des Fucus et même à des Zostères.

\* **CHIENDENT MUSQUÉ**, l'*Andropogon Schœnanthus* dans quelques colonies.

**CHIENDENT QUEUE DE RAT**, l'*Alopecurus agrestis*.

**CHIENDENT RUBAN**, l'*Arundo Donax* et le *Phalaris arundinacea* à feuilles variées.

**CHIENDENT A VERGETTES**, l'*Andropogon digitatum*. (B.)

**CHIENDENT FOSSILE.** MIN. L'un des noms vulgaires de l'Asbeste flexible. *V.* ASBESTE. (LUC.)

**CHIENG TUENDEN.** MAM. L'un

des noms persans du Rhinocéros. (B.)

**CHIERSSY.** BOT. PHAN. Syn. de Cerisier en Épire. (B.)

**CHIETOTOTL.** OIS. Espèce indéterminée d'Étourneau du Mexique. (DR.Z.)

\* **CHIETSE - VISCH.** POIS. Syn. hollandais de Duc, espèce du genre Holacanthé. *V.* ce mot. (B.)

**CHIGOMIER.** BOT. Nom adopté comme français par quelques botanistes, pour désigner les Arbres du genre Combretum. *V.* ce mot. Il vient du galibi *Chigouma* qui désigne les mêmes Végétaux. (B.)

\* **CHIGUÈRE.** MAM. *V.* CABIAL.

\* **CHIH.** OIS. Espèce du genre Courlis, *Numenius Chih*, Vieill. *V.* COURLIS. (DR.Z.)

**CHIHUCHINE.** BOT. PHAN. Syn. de *Bromelia Karatas*, à Cumana. (B.)

**CHIL.** OIS. Espèce du genre Pitpit, *Anthus Chli*, Vieill. Du Paraguay. *V.* PITPIT. (DR.Z.)

\* **CHIJAR - SCHARABAR.** BOT. PHAN. (Forsk. kh.) *V.* CHAIAR - XAMBAR et CHIAR.

**CHIKAL.** MAM. Pour Chacal. *V.* CHIEN.

**CHI-KEU.** BOT. PHAN. Syn. chinois de *Citrus fulca*, Lour. *V.* CITRONNIER. (B.)

**CHIKOURGEH.** BOT. PHAN. Pour Chicourgeh. *V.* ce mot. (G.N.)

\* **CHI-KU.** BOT. PHAN. Même chose que CHICOY. *V.* ce mot. (B.)

**CHILBY.** POIS. (Sonnini.) Syn. arabe de *Silurus mystus*. *V.* SILURE. (B.)

**CHILCA.** BOT. PHAN. C'est dans Feuillée (t. 37) le *Baccharis Ivaefolia*. Ce nom est étendu au Pérou aux espèces du genre *Molina*. *V.* ce mot. (B.)

\* **CHILCOQUIPALBOTOTL.** OIS. (Hernandez.) D'où par contraction Chiltototl. *V.* ce mot. (B.)

\* **CHILDARIUM**. BOT. CRYPT. Syn. de Fougère dans Avicène. (B.)

**CHILEANAUTLI**. ois. (Hernandez.) Syn. mexicain de la Sarcelle rousse à longue queue, *Anas dominica*, L. V. CANARD. (DR. Z.)

**CHILER**. REPT. SAUR. Syn. turc de Caméléon. V. ce mot. (B.)

\* **CHILI** ou **THILI**. ois. D'où Tilly de Buffon. Syn. de *Turdus plumbeus*, Gmel., au Chili. V. MERLE. (DR. Z.)

**CHILIBUÈQUE**. - MAM. Syn. de Llama au Chili. V. CHAMEAU. (B.)

\* **CHILIMOLIA**. BOT. PHAN. (Humboldt et Bonpland.) Syn. d'*Anara Humboldtii*, Cand. (B.)

**CHILIODYNAMIS**. BOT. PHAN. Vieux nom grec du *Cucubalus behen* et du *Gentiana cruciata*. V. CUCUBALE et GENTIANE. (B.)

**CHILIOPHYLLON**. BOT. PHAN. C'est-à-dire Mille feuilles. Syn. d'Achillée et de Renouée chez les Grecs. (B.)

**CHILIOTRICHUM**. BOT. PHAN. Genre nouveau établi par H. Cassini, dans la famille des Synanthérées, et qu'il place dans sa tribu des Astérées. L'ayant formé aux dépens du genre *Amellus*, il s'est cru obligé de donner de nouveaux caractères à celui-ci, après avoir examiné avec plus de soin que les autres botanistes antérieurs les fleurs de deux espèces d'*Amelles*. Pour faire ressortir les différences que présentent les deux genres, il a donc tracé les caractères de l'un et de l'autre. Nous nous bornerons à un abrégé de ceux du *Chiliotrichum*: involucre cylindroïde, imbriqué; réceptacle garni de paillettes linéaires et frangées; fleurs radicales; celles du disque à cinq lobes longs et linéaires, à anthères incluses; style divisé en deux branches exsertes; akènes cylindracés, parsemés de glandes, et surmontés d'aigrettes longues, filiformes, rougeâtres, très-faiblement ciliées, en tout semblables à celles des demi-fleurons de la cou-

ronne. V. le mot *AMEILLE* (dont les caractères sont exposés d'une manière concordante avec ceux donnés par Cassini) afin d'en faire la comparaison avec le nouveau genre en question, lequel d'ailleurs ne renferme qu'une seule espèce, le *Chiliotrichum amelloïdeum*, *Amellus diffusus*, Willd., Arbuste du détroit de Magellan. (C. N.)

\* **CHILLA**. MAM. Selon Molina, synonyme de Renard au Chili où il est peu croyable que se trouve l'espèce européenne. (B.)

**CHILLI**. BOT. PHAN. Syn. mexicain de Piment et de Gingembre. V. ces mots.

\* **CHIOLOB**. MAM. (Erleben.) Syn. buratte de Polatouche. (A. D. NS.)

**CHILOCHLOE**. *Chilochloa*. BOT. PHAN. Ce nouveau genre de la famille des Graminées, proposé par Patisot de Beauvois dans son Agrostographie, est formé aux dépens des genres *Phalaris* et *Phleum*. Beauvois y a rapporté les espèces suivantes: *Phalaris cuspidata*, *paniculata*, *Phleum arenarium*, *asperum*, *Boehmerii*, L. Il se distingue: 1° des *Phalaris* par ses fleurs en épis, par les écailles de sa lépicène allongées, subulées, et par le rudiment filiforme d'une seconde fleur, qui existe sur l'un des côtés seulement de sa glume; 2° des *Phleum* par l'absence des arêtes sur les valves de sa lépicène, par la présence du rudiment d'une seconde fleur. (A. R.)

**CHILODIE**. *Chilodia*. BOT. PHAN. Famille des Labiées, Didynamie Gymnospermie de Linné. Ce genre, dont on doit la connaissance à R. Brown ( *Prod. Flor. Novæ-Holl.*, p. 507 ), est ainsi caractérisé: deux bractées supportent un calice bilabié dont le tube est strié; la lèvre supérieure entière portant à l'intérieur une côte transversale; l'inférieure bifide; corolle oblique, ayant la lèvre supérieure entière et en forme de casque; l'inférieure partagée en trois lanières, dont la médiane est plus grande et bilobée; les anthères

sont mutiques et sagittées. Brown n'en a décrit qu'une seule espèce, le *Chilodia Scutellarioides*, indigène du port Jackson, et qui a ses feuilles entières, linéaires et roulées sur leurs bords. Il observe que ce genre tient le milieu entre les Scutellaires et les Prostanthères dont il a le port, mais dont il diffère par des caractères faciles à saisir. (G.N.)

### CHILOGLOTTE. *Chiloglottis*.

BOT. PHAN. Genre nouveau établi par R. Brown dans la famille des Orchidées. Ce savant botaniste le caractérise ainsi : périanthe bilabié dont les divisions extérieures latérales sont camalioulées et comme roulées en cornet au sommet. Le labelle est onguiculé, ayant un disque glanduleux sur son limbe, et à sa base un appendice en languette; le gynostème ou la colonne est bifide à son sommet, où se trouve une anthère terminale à loges rapprochées l'une de l'autre, dans chacune desquelles il y a deux masses polliniques comprimées et pulvérulentes. Ce genre, qui a beaucoup d'affinité avec le *Cyrtostylis* et *Pterostylis* du même auteur, ne se compose que d'une seule espèce, *Chiloglottis diphylla*, Br., indigène du port Jackson de la Nouvelle-Hollande. C'est une Plante herbacée, glabre, bulbeuse, munie de deux feuilles radicales, rapprochées, ovales et marquées de plusieurs nervures. Sa hampe, qui n'a vers le milieu qu'une seule bractée ou feuille dégénérée, ne porte aussi qu'une seule fleur de couleur rousse. (G.N.)

### CHILOGNATHES. *Chilognatha*.

INS. Première famille de l'ordre des Myriapodes, établie par Latreille (Règn. An. de Cuv.) et convertie en un ordre par Leach (Linn. Soc. Trans. T. XI, p. 376). V. MYRIAPODES. (AUD.)

### CHILOPODES. *Chilopoda*. INS.

Deuxième famille de l'ordre des Myriapodes, établie par Latreille (Règn. An. de Cuv.). V. MYRIAPODES. (ACD.)

CHILPANXOCHITL, BOT. PHAN. (Hernandez.) Probablement le *Lobe-*

*lia acuminata* chez les Mexicains. (Z.)

CHILTOTOTL. OIS. Syn. mexicain du Tangara scarlatte, *Tanagra rubra*, var., Lath. V. TANGARA.

(DR..Z.)

CHIMACHIMA. OIS. Espèce de Faucon du Paraguay, du nombre de ceux que Vieillot place dans son genre Caracara. V. FAUCON. (DR..Z.)

CHIMERA. MOLL. En donnant le nom de *Chimæra* à l'Animal qui se trouve dans la Pinne marine, Poli (Test. des Deux-Siciles) n'a eu probablement en vue que l'Animal seul. Il n'est pourtant pas possible de séparer ainsi et de comprendre sous deux noms et la Coquille et l'Animal qui l'habite. V. PINNE. (D..H.)

\* CHIMÈRE. POIS. Pour Chimère. V. ce mot. (B.)

CHIMALATL. BOT. PHAN. Syn. mexicain d'*Helianthus amœnus*, L. V. HÉLIANTHE. (B.)

CHIMALOUBA. BOT. PHAN. Syn. caraïbe de *Switenia*. (B.)

CHIMANGO. OIS. Espèce de Faucon du Paraguay, du nombre de ceux que Vieillot place dans son genre Caracara. V. FAUCON. (DR..Z.)

CHIMAPHILE. *Chimaphila*. BOT. PHAN. Dans la Flore de l'Amérique septentrionale de Michaux, le professeur Richard avait déjà observé que les *Pyrola maculata* et *umbellata* pouvaient former un genre distinct des vrais *Pyroles*, par leur port, leur stigmaté sessile et indivis, par leurs anthères s'ouvrant au moyen de deux petites valves. Ce genre a été définitivement établi par Pursh dans sa Flore de l'Amérique du nord, publiée à Londres en 1814, et ce voyageur lui a donné le nom de *Chimaphila*. Il ne comprend que les deux espèces que nous venons de mentionner, savoir, le *Chimaphila umbellata* ou *Pyrola umbellata*, L., Plante vivace qui croît en Europe et jusque dans l'Amérique septentrionale, et le *Chimaphila maculata*, Pursh (*Pyrola maculata*, L.), originaire des États-Unis, et dif-

filant surtout de l'espèce précédente, dont elle a le port, par ses filaments velus, ses feuilles lancéolées et non épineuses, et marquées d'une bande blanche. (A. R.)

**CHIMARRHIS.** BOT. PHAN. Sous ce nom, Jacquin (*Pl. amer.* p. 61) a constitué un genre appartenant à la famille des Rubiacées et à la Pentandrie Monogynie de Linné, et qui offre pour caractères : un calice adhérent dont les bords sont entiers ; une corolle infundibuliforme, ayant le tube court et les cinq divisions du limbe étalées, velues extérieurement jusqu'à leur milieu ; les filets des étamines hérissés à leur base ; un style et un stigmate bifides ; capsule biloculaire, chaque loge monosperme. Le *Chimarrhis cymosa*, Jacq., est l'unique espèce de ce genre. On l'appelle vulgairement à la Martinique dont il est indigène, *Bois de rivière*, ce que signifie aussi en grec le nom imposé au genre par Jacquin. C'est un Arbre élevé, dont les feuilles opposées et ovales, et les branches glabres et nombreuses forment une cime très-élégante. Les fleurs, de même que celles de la plupart des Rubiacées, sont petites et disposées en grappes axillaires ou terminales. (G. N.)

**CHIM-CHIM-NHA.** BOT. PHAN. Probablement l'*Aralia octophylla*, cultivé en Cochinchine. V. ARALIE.

**CHIM-CHIM-RUNG.** BOT. PHAN. Syn. cochinchinois de *Sterculia foetida*. V. STERCULIE.

**CHIMERE.** *Chimera*. POIS. Genre de l'ordre des Chondroptérygiens à branches fixes, établi par Linné, et subdivisé depuis en plusieurs sous-genres, de telle sorte que le genre des Chimères proprement dites, *Chimera*, Cuv. (*Règn. Anim.*, T. III, p. 140), ne renferme plus que l'espèce qui a pour caractères : un museau simplement conique ; la deuxième dorsale commençant immédiatement derrière la première, s'étendant jusque sur le bout de la queue, qui se prolonge en un long filament, et garnie en dessous d'une

autre nageoire semblable à la caudale des Squales. Ainsi caractérisé, ce genre ne comprend que la Chimère arctique, *Chim. monstrosa*, Linn., vulgairement le Roi des Harengs. La femelle a été figurée par Bloch (194) et Lacépède (I, XIX, 1). Cette espèce habite les mers de l'Océan, et suit les Poissons voyageurs. Sa longueur est de deux ou trois pieds, sa figure fort extraordinaire et sa couleur argentée. Les Norwégiens mangent ses œufs et son foie. (B.)

**CHIMERE ANTARCTIQUE.** POIS. V. CALLORHYNQUE.

\* **CHIMICHICUNA.** BOT. PHAN. L'un des noms de pays du *Nycterisium* de la Flore du Pérou. V. ce mot.

**CHIMIDIA.** BOT. PHAN. Syn. galibi d'*Himantia*. V. ce mot.

**CHIM MI VU.** BOT. PHAN. Syn. chinois d'*Arum cuculatum*, Lour. V. GOUET.

\* **CHIMONANTHUS.** BOT. PHAN. Lindley a fait un genre du *Calycanthus præcox* auquel il a donné le nom de *Chimonanthus*. Loiseleur Deslongchamps nomme ce genre *Meratia*. Il se distingue surtout des *Calycanthus* par ses étamines toutes égales, dont les cinq externes sont fertiles, persistantes, se soudant par leur base de manière à boucher entièrement la gorge du calice. Le *Chimonanthus præcox*, Lindley, est un Arbuste originaire du Japon, ayant ses rameaux effilés, des fleurs jaunes axillaires et solitaires. On le cultive dans les jardins. (A. R.)

**CHIMONICHA ET CHIMONIKA.** BOT. PHAN. Syn. de Pastèque chez les Grecs modernes. (B.)

\* **CHIMORUR.** ZOOL. (Gaimard.) Syn. de Cheveux bouclés aux îles Carolines. (B.)

**CHIMPANZÉE ET CHINPENZÉE.** MAM. Pour Champanzée. V. ce mot.

\* **CHIN.** OIS. Syn. grec d'Oie sauvage que les Grecs modernes nomment China. (DR. B.)

\* **CHINA.** BOT. PHAN. Ce nom désigne, dans la droguerie et chez les

Espagnols, diverses parties des Végétaux suivans :

\* CHINA CEAORA, le *Byttneria ovata*.

\* CHINA CORTES, le Quina des bou-  
tiques.

\* CHINA RABIEZ, la Squinco. (B.)

CHINA. MIN. Nom vulgaire que donnent, à Almaden del Azogue, les ouvriers au Minerai inférieur dont on extrait le Mercure. (LUC.)

\* CHINAOUN. BOT. PHAN. (Gaimard.) Syn. chamorre d'une variété du Vaquois, *V.* ce mot, à l'île de Guam, dans l'Archipel des Mariannes. (B.)

\* CHINA-PAYA. BOT. PHAN. Nom vulgaire du *Fernifuga* de la Flore du Pérou ou Chili. (B.)

CHINARS ET CIACAS. BOT. PHAN. Syn. arabe de Hêtre. (B.)

\* CHINCAPALONES. BOT. PHAN. (L'Ecluse.) Même chose que Chinkapalones. *V.* ce mot. (B.)

CHINCAPIN. BOT. PHAN. Nom de pays du *Fagus pumila* ou Châtaigner de Virginie et espèce de Chêne de Michaux. (B.)

\* CHINGHA. INS. Syn. espagnol de Punaise, dont *Chincha de agua*, Punaise aquatique. Syn. de Noto-necte. *V.* ce mot. (B.)

CHINCHE. MAM. Espèce du genre Moufette. *V.* ce mot. (B.)

\* CHINCHELCOMA. BOT. PHAN. Syn du *Salvia oppositifolia* de la Flore du Pérou. (B.)

\* CHINGHI. MAM. Même chose que Chinche. *V.* ce mot.

\* CHINCHI. BOT. PHAN. (Dombey.) Syn. péruvien de *Tagetes minuta*. (B.)

CHINCHILCULMA ET CHINCHINCULMA. BOT. PHAN. Nom de pays du *Mutisia acuminata* de la Flore du Pérou. *V.* MUTISE. (B.)

CHINCHILE. MAM. L'Animal désigné sous ce nom est probablement le Chinohilla. (B.)

CHINCHILLA. MAM. On désigne sous ce nom, au Pérou et dans le commerce, la fourrure d'un Animal très-mal connu et qu'on s'accorde à rapporter au même genre que le Hamster. *V.* ce mot. (G.)

CHINCHIMALI. BOT. PHAN. (Ca-

vanilles.) Syn. péruvien de *Tagetes tenuifolia*. (B.)

CHINGHIN. MAM. (Sonnini.) Probablement pour Sin-Sin. Syn. arabe de Pitheque. (A. D. NS.)

CHINCHINCULMA. BOT. PHAN. *V.* CHINCHILCULMA.

CHINCO. MAM. Même chose que Chinche. *V.* ce mot.

CHINCOU. OIS. Espèce du genre Vautour, *Vultur ginginianus*, Gmel. *V.* VAUTOUR. (DR..Z.)

\* CHINE-CHINE ou SIN-SIN. MAM. Espèce indéterminée de grand Singe de Tartarie et de la Chine. (B.)

\* CHINÉE. INS. (Geoffroy.) Syn. de *Bombyx Hera*, L. *V.* PHALÈNE.

\* CHINEESCHE-BILANG. POIS. (Ruysch.) Sorte de Carpe indéterminée d'Amboine. (B.)

\* CHINESISCHERAAL. POIS. Syn. allemand de *Trichiurus lepturus*. *V.* TRICHIURE. (B.)

CHINET ET CHINETTO. BOT. PHAN. Variété de Bigarade à Nice et en Provence. (B.)

CHINGOLO. OIS. Nom que l'on donne dans l'Amérique méridionale à une espèce de Gros-Bec qui, d'après la description d'Azzara, doit avoir beaucoup de ressemblance avec le Moineau domestique. *V.* MOINEAU. (DR..Z.)

CHINGUIS OU CHINQUIS. OIS. *Pavo tibetanus*, Lath. *V.* ÉPERONNIER. (DR..Z.)

\* CHINGULAI. MOLL. Espèce du genre Cône, *Conus Ceylanensis*. *V.* CÔNE. (B.)

CHIN-HIAM. BOT. PHAN. Syn. cochinchinois d'Aloexyle. (B.)

CHINKA. OIS. Syn. chinois de la Poule sultane, *Fulica Porphyrio*, L. *V.* TALÈVE. (DR..Z.)

CHINNE. MAM. Même chose que Chinche.

CHINOI. OIS. Syn. d'Oie en grec moderne. (B.)

\* CHINOIS. POIS. Nom spécifique de plusieurs Poissons appartenant à différens genres. (B.)

CHINONES. BOT. PHAN. (Gouan.) L'un des noms de l'Oranger aux environs de Montpellier. (B.)

**CHENORODON.** BOT. PHAN. Pour  
Cunorodon. *V.* ce mot. (B.)

**CHINOTTO.** BOT. PHAN. *V.* Chit-  
NET.

**CHINQUAPINE.** BOT. PHAN. Même  
chose que Chincapin. *V.* ce mot. (B.)

**CHINQUIES, CHIQUIES ET  
CHIT-SE.** BOT. PHAN. Probablement  
la même chose que Chicoy, *V.* ce  
mot, espèce de Diospyros de la Chi-  
ne, dont les fruits se mangent secs, et  
qui paraît être le Figocaque des Por-  
tugais. (B.)

**CHINQUIS.** OIS. *V.* CHINGUIS.

\* **CHINTACH.** BOT. PHAN. Syn.  
hébreu de Blé. *V.* ce mot. (B.)

\* **CHINTA-NAGOU.** REPT. OPII.  
(Russel.) Nom indien d'une variété du  
Naja. *V.* ce mot. (B.)

**CHIN-TCHIEN-KHI.** OIS. Même  
chose que Chinguis. *V.* ce mot. (B.)

**CHIOCOAR.** BOT. PHAN. Sorte de  
bière qui se fait dans l'Amérique mé-  
ridionale avec la graine du Maïs. (B.)

\* **CHIOC-ROYA ET EKME.** BOT.  
PHAN. Sorte de Garence très-é-  
mployée dans la teinture aux environs  
de Smyrne. (B.)

**CHIOCOQUE.** *Chiococca.* BOT.  
PHAN. Genre de la famille des Rubia-  
cées et de la Pentandrie Monogynie  
de Linné, fondé par ce célèbre na-  
turaliste et caractérisé ainsi : calice ad-  
hérent à l'ovaire, présentant un lim-  
be libre urcéolé à cinq dents ; une co-  
rolle infundibuliforme, quinquéfide,  
régulière, dont les découpures sont  
réfléchies et l'entrée du tube barbue ;  
cinq étamines insérées à la base de la  
corolle et non saillantes hors de cel-  
le-ci ; style unique et stigmaté indi-  
vis ; drupe ou baie à deux noyaux,  
suborbiculée, comprimée, couron-  
née par le calice persistant ; chaque  
noyau, d'une consistance coriace et  
chartacée, ne renferme qu'une seule  
graine. Les Plantes de ce genre sont  
des Arbres ou des Arbrisseaux, le  
plus souvent grimpans, à feuilles  
opposées, très-entières, à stipules  
placées entre les pétioles, et à fleurs  
en grappes axillaires.

La vaste famille des Rubiacées ayant  
été partagée en plusieurs sections natu-  
relles ou tribus, le genre qui nous oc-  
cupe a été placé par Kunth (*Nouv. Gén.  
et Species Plant. æquinoct.*, 3, p. 362)  
dans la tribu des *Coffiacées* à côté  
du nouveau genre *Declieuxia*, qui  
n'en diffère que par le nombre, di-  
minué d'une unité, des parties de la  
fleur, et par ses étamines exsertes.  
Deux ou trois espèces seulement de  
*Chiocoques* ont été décrites dans les  
auteurs, car d'après les observa-  
tions de Swartz, rapportées dans le  
Mémoire publié récemment par de  
Jussieu sur les Rubiacées, une es-  
pèce à panicule terminale appartiendrait  
au genre *Psychotria*. Le *Chiococ-  
ca racemosa*, L., est un Arbre de  
huit à dix mètres de hauteur selon  
Bonpland, dont les feuilles sont ova-  
les ou elliptiques, acuminées, pres-  
que coriaces, les grappes de fleurs  
tournées et penchées du même côté. Il  
croît aux Antilles, et principalement  
à la Jamaïque. C'est une variété de  
cette espèce, que Browne a le premier  
fait connaître sous le nom de *Chiococ-  
ca scandens*. Kunth (*loc. cit.*) en in-  
dique deux autres variétés, l'une à  
pédoncules et à pédicelles glabres,  
l'autre ayant ces organes pubescens,  
et qui ont été rapportées de la Hava-  
ne, ainsi que de Cumana en Améri-  
que méridionale, par Humboldt et  
Bonpland. (G.N.)

\* **CHIODA.** BOT. PHAN. (Gaimard.)  
Syn. de Bananier à l'île de Guam,  
dans l'archipel des Mariannes. (B.)

\* **CHIODECTON.** BOT. CYPR. (*Lichens.*) Acharius a établi ce genre  
dans son *Synopsis Lichenum*, p.  
108 ; il avait auparavant placé les  
deux espèces qu'il y rapporte dans le  
genre *Trypethelium*, dont il ne nous  
paraît pas différer sensiblement, et  
auquel nous croyons qu'on devrait  
le réunir. Nous allons néanmoins rap-  
porter le caractère assigné par Acha-  
rius à ce genre : « Réceptacle général  
» (fronde) : crustacé, cartilagineux,  
» uniformément étendu ; adhérent ;  
» réceptacle partiel en forme de ver-

» rue, composé d'une substance pro-  
 » pre colorée (blanche); apothécies  
 » presque globuleuses, pulvérulentes,  
 » noires, homogènes intérieurement,  
 » réunies plusieurs dans l'intérieur  
 » d'une même verrue, et se faisant  
 » remarquer à leur surface par des  
 » points saillans. »

Les deux seules espèces connues  
 de ce genre croissent dans l'Améri-  
 que méridionale sur l'écorce du Quin-  
 quina jaune et de l'Angusture, *Cus-  
 paria febrifuga*.

(AD. B.)

CHIO-HAU. BOT. PHAN. Syn. chi-  
 nois de Rhinchosie. *V.* ce mot. (B.)

CHIOMA DI GIOVE. BOT. PHAN.  
 Syn. italien de *Dryas octopetala*. (B.)

CHIONANTHE. *Chionanthus*. BOT.  
 PHAN.. On appelle ainsi un genre de  
 Plantes de la famille des Jasminées et  
 de la Diandrie Monogynie, qui se  
 compose d'un petit nombre d'espèces  
 originaires de l'Amérique septentrio-  
 nale et méridionale, de Ceylan et de  
 la Nouvelle-Hollande. Ce genre offre  
 les caractères suivans : ses fleurs, gé-  
 néralement blanches, forment des  
 espèces de grappes qui terminent les  
 ramifications de la tige, ou des épis  
 placés à l'aisselle des feuilles supé-  
 rieures; elles se composent chacune  
 d'un calice régulier à quatre divi-  
 sions plus ou moins profondes; d'une  
 corolle de quatre pétales linéaires  
 très-longs, quelquefois, mais rare-  
 ment, soudés par leur base de deux  
 étamines presque sessiles (rarement  
 il en existe trois ou même quatre);  
 le pistil offre un ovaire globuleux à  
 deux loges contenant chacune deux  
 ovules; le style est simple, terminé  
 par un stigmate bilobé; le fruit est  
 une drupe peu charnue, ovoïde, al-  
 longée, souvent terminée en pointe,  
 contenant un noyau osseux à une ou  
 à deux loges monospermes. Les es-  
 pèces de ce genre sont des Arbrisseaux  
 élégans, portant pour la plu-  
 part de grandes et belles feuilles op-  
 posées, simples, caduques ou persis-  
 tantes.

On doit réunir à ce genre le *Thoni-  
 nia* de Thunberg et de Linnaeus; le

*Linaciera* de Swartz, auquel cet au-  
 teur donne pour caractères : une corol-  
 le de quatre pétales et une base bilobu-  
 laire. En effet nous avons trouvé que  
 plusieurs espèces de *Chionanthus*, tel-  
 les que *Chionanthus compactus*, Sw.,  
 et *Chionanthus acuminata*, avaient  
 presque constamment une corolle  
 formée de quatre pétales distincts. En  
 second lieu le nombre des loges et  
 des graines observé dans le fruit  
 mûr, est un des caractères les moins  
 importans dans la famille des Jasmî-  
 nées, à cause de son extrême variabi-  
 lité dans les espèces du même genre;  
 et comme l'ovaire est constamment à  
 deux loges dans tous les genres de  
 cette famille à l'époque de la fécon-  
 dation, il n'y a rien de surprenant  
 que le fruit offre également deux lo-  
 ges dans quelques espèces du genre  
*Chionanthus*.

Pout-être devra-t-on également  
 réunir au genre qui nous occupe ici  
 le *Magepea Guyanensis* d'Aublét  
 (*Guy.* p. 81, t. 31), malgré ses fleurs  
 tétrandres. En effet tous les autres ca-  
 ractères le rapprochent du *Chionan-  
 thus*.

L'une des espèces de ce genre est  
 cultivée dans les jardins où on la con-  
 naît sous le nom d'*Arbre de neige*, à  
 cause de la belle couleur blanche de  
 ses fleurs; c'est le *Chionanthus vir-  
 giniana*, L., Arbrisseau de neuf à  
 dix pieds, qui est originaire de l'A-  
 mérique septentrionale. Il recher-  
 che les lieux humides, le bord des  
 ruisseaux, et y forme des buissons  
 épais. Ses feuilles sont opposées, ova-  
 les, aiguës, d'un beau vert; ses fleurs  
 forment des espèces de grappes axil-  
 laires. On le multiplie, soit par le  
 moyen de graines, soit par marcottes,  
 soit enfin en le greffant sur le Frêne.

Le CHIONANTHE DES ANTILLES,  
*Chionanthus Caribæa*, Jacq. Coll. 2,  
 p. 110, t. 6, f. 1. Ce bel Arbrisseau,  
 dont les feuilles sont coriaces et per-  
 sistantes, ovales, acuminées, les grap-  
 pes de fleurs terminales, porte aux  
 Antilles, et surtout à la Martinique,  
 le nom de *Bois de fer*, à cause de son  
 extrême dureté. (A. B.)



\* **CHIONE**. *Chione*. MOLL. Genre de l'ordre des Acéphales testacés, établi par Megerle (Nouveau Système de Conchyliologie) aux dépens de celui des Vénus de Linné, et ayant, suivant lui, pour caractères : coquille presque équivalve, un peu cordiforme, dentelée sur ses bords; la valve et l'anus manifestes; les lèvres inclinées en avant; la charnière presque médiane, à quatre dents, sans aucune autre latérale.

Poli a décrit sous le nom de Calliste l'Animal de ces Coquilles. Megerle rapporte à ce genre vingt-une espèces rangées dans les deux sections suivantes :

† Coquilles épineuses ou aiguillonées en avant.

La *Chiona dysera*, *Venus dysera*, L., peut être considérée comme le type de cette division. Cette Coquille vient d'Amérique. Elle a été figurée par Chemnitz (*Conch.* 6, tab. 98, fig. 287—290).

†† Coquilles non épineuses.

Ici vient se placer la *Chiona gallica*, *Venus gallica*, L., figurée par Chemnitz (*loc. cit.*, tab. 30, fig. 508—310). Cette espèce vit dans les mers de l'Europe et de l'Amérique. (AUD.)

\* **CHIONILLE**. MIN. (Pinkerton.) Syn. de *Flos-Ferri*. V. CHAUX CARBONATÉE CONCRÉTIONNÉE. (B.)

**CHIONIS**. OIS. Genre de l'ordre des Palmipèdes, d'abord établi par Forster. Caractères : bec dur, gros, conico-convexe, comprimé, fléchi vers la pointe; base de la mandibule supérieure recouverte par un fourreau de substance cornée, découpé par-devant, garni de sillons longitudinaux; mandibule inférieure lisse, formant un angle ouvert; narines marginales, placées au milieu du bec, sur le bord de la substance cornée; pieds médiocres; une très-grande partie du tibia emplumée; doigts bordés d'un rudiment de membrane, celui du milieu et l'extérieur demi-palmés; l'intérieur uni seulement vers la base à celui du milieu; ailes médiocres, deuxième

remige la plus longue; poignet tuberculé.

Une seule espèce compose ce genre, et encore se trouve-t-elle assez rarement dans les collections, quoique l'Oiseau vivant se rencontre fréquemment sur les rives de l'Océanie, où plusieurs individus, rassemblés en petites troupes, emploient paisiblement la majeure partie de leur existence à chercher dans le sable les petits Animaux marins que laisse la marée en se retirant, ou qu'y lancent les vagues. Les observations sur les mœurs et les habitudes particulières du Bec-en-fourreau sont encore trop bornées pour qu'on puisse donner de cet Oiseau une description complète; on ignore également tout ce qui, chez lui, a rapport à la reproduction. Forster a le premier fait connaître le Bec-en-fourreau qu'il a nommé *Chionis*; Latham en a depuis formé un genre auquel il a donné le nom de *Vaginal*; il l'a, ainsi que plusieurs autres ornithologistes, placé dans l'ordre des Echassiers; mais celui des Palmipèdes le réclame, quoique les membranes qui unissent les doigts ne soient pas pleines et uniformes.

**BEc-EN-FOURREAU NÉCROPHAGE**, *Vaginalis Chionis*, Lath., *Chionis necrophagus*, Vieill., *Chionis Novae-Hollandiae*, Temm. Tout le plumage blanc; joues nues ou garnies de petites verrues jaunes ou orangées; une grosse verrue brune au-dessus des yeux; gaine cornée du bec jaune ou noire; tubercule du poignet noir. Longueur, seize à dix-huit pouces.

(DR. Z.)

**CHIOZZO**. ROIS. Syn. italien de Goujon. (B.)

\* **CHIPA**. BOT. FRAN. Syn. galibi d'*Icica decandra*. V. ICIQUIER. (B.)

**CHIEAU**. OIS. Espèce du genre Canard. V. ce mot. (B.)

**CHIPITIBA**. BOT. BRAN. (Surien.) Syn. caraïbe de *Sapindus venosus*, Rich. V. SAVONNIER. (B.)

**CHAPIU**. OIS. Nom donné à une petite famille d'Oiseaux granivores

du Paraguay, et qui fait partie du genre Gros-Bec. *V.* ce mot. (DR..Z.).

**CHIPOLIN** ou **CIPOLIN**. GÉOL. *V.* MARBRE et STÉATITE VERTE.

**CHIPU**. BOT. PHAN. 'Du Dictionnaire de Dêterville. Pour Chipa. *V.* ce mot. (B.)

**CHIQET** ou **CHIQUET**. OIS. Syn. languedocien de Grillon. *V.* ce mot. (B.)

**CHICUAHOHOHL**. INS. Du Dictionnaire de Dêterville. Pour Chiquatototl. *V.* ce mot. (B.)

**CHICUAQUATLI**. OIS. Même chose que Chiquatototl. *V.* ce mot.

**CHICUATOTOTL**. OIS. (Hernandez.) Et non *Chiquahohohl*. Espèce de Barge du Mexique imparfaitement connue. (B.)

**CHIQUE**. INS. On désigne sous ce nom un petit Insecte très-commun aux Antilles et dans l'Amérique méridionale. Les Brésiliens lui donnent le nom de *Bicho*, appliqué aussi à d'autres Insectes. Cet Insecte est le *Pulex penetrans* de Linné; il pourrait bien appartenir plutôt au genre *Acarus* qu'à celui des Puces. Quoi qu'il en soit, il est fort incommode à Rio-Janeiro : il pénètre dans le tissu de la peau de la plante des pieds, s'y nourrit et y dépose ses œufs. Son introduction a lieu sans aucune sensation douloureuse et sans changement de couleur à la peau. En peu de jours, la Chique commence à se développer et à se rendre sensible par une démangeaison, d'abord légère, plus vive ensuite, et qui finit par devenir insupportable. On ne voit, dès le commencement, qu'un petit point noir sur la partie qui sert de retraite à cet Insecte parasite. Il arrive souvent que la démangeaison se fait sentir au côté opposé à celui où la Chique a manifesté sa présence. Au point noir succède une petite tumeur rougeâtre, ou bien de la couleur de la peau, lorsque l'Insecte est situé profondément. Elle acquiert en peu de temps le volume d'un pois, si on ne se hâte d'extraire la Chique. En

perçant la peau qui recouvre cette petite tumeur, on reconnaît facilement une espèce de sac ou de globe pareil à un kyste, d'une couleur noire ou brunâtre, et contenant un pu sanieux et un nombre infini de globules blancs, ovales-oblongs, qui ne sont autre chose que les œufs de l'Insecte.

Lorsque, par négligence, on laisse séjourner long-temps ce kyste, il s'ouvre spontanément, et donne lieu à une plaie sur laquelle les œufs se répandent. De nouveaux insectes ne tardent pas à se manifester dans les parties voisines, et il se forme de nouveaux ulcères dont la guérison est très-difficile, et quelquefois même impossible. On observe que les personnes, qui ont déjà eu cette incommodité, sont plus disposées à l'éprouver de nouveau. Ceux qui transpirent beaucoup des pieds y sont moins sujets. Il est constant que cet Insecte préfère l'épiderme endurci de la plante des pieds et le voisinage des ongles; il est excessivement rare de le voir aux mains et à la face dorsale des pieds, à moins de la plus grande insouciance. Dans ces cas, les ulcères ne font que précéder la carie des os et la chute des orteils.

Le traitement consiste à déloger l'Insecte : on se sert d'une épingle pour ouvrir la peau, mettre le sac à découvert, et le cerner soigneusement, en évitant de le percer. Le seul moyen de détruire la Chique est d'emporter tout le sac. S'il ne restait aucun œuf dans la plaie, la présence seule du kyste ou de ses débris suffirait pour exciter une inflammation erysipélateuse, et donner lieu à des ulcères de mauvaise nature. Les Nègres sont très-adroits dans cette opération qui peut être faite par le malade, et que les chirurgiens du pays ne pratiquent jamais. Après l'extraction, on applique sur la petite plaie du tabac en poudre, de l'onguent basilic, de la pommade mercurielle, de l'onguent gris, du Muriate mercuriel doux et même du plâtre. On peut assure-t-on, au moyen de l'onguent

basilic, faire mourir et dessécher l'insecte sans causer aucune suppuration; mais il faut, pour cela, avoir soin d'employer ce remède de très-bonne heure. On préconise aussi l'eau mercurielle ou Nitrate de Mercure dissous dans l'eau. On conseille dans ce cas de percer le sac avec une aiguille trempée dans cette dissolution:

Gaimard, jeune médecin très-distingué, et qui a eu la bonté de nous transmettre plusieurs renseignements sur l'Animal curieux dont il est question, a vu à bord de l'*Uranie*, en rade de Rio-Janeiro, et quelques jours après le départ (janvier 1818), plusieurs personnes affectées de Chiques. Le kyste, de la grosseur d'un petit pois, était blanchâtre et arrondi; les œufs qu'il contenait étaient agglomérés, ovales-oblongs et visibles à l'œil nu. Un des officiers eut des Chiques sans éprouver aucune espèce de démangeaison; mais ce cas est rare. *V. Puce.* (A. D.)

**CHIQUERA.** ois. Pour Chicquera. *V. ce mot.*

\* **CHIQUECHIKITI.** BOT. PHAN. (Surian.) Syn. caraïbe de *Cacalia porphyllum.* (B.)

**CHIQUECHIQUI.** BOT. PHAN. Nom de pays d'un Palmier indéterminé d'Amérique. (B.)

**CHIR.** BOT. PHAN. (Mentzel.) Syn. grec de *Dipsacus fullonum.* *V. CARDÈRE.* (B.)

**CHIRADOLÉTRON.** BOT. PHAN. (Dioscoride.) Syn. de *Xanthium.* (B.)

**CHIRANTHODENDRON.** BOT. PHAN. (Lescallier.) Syn. de *Chairostemon.* *V. ce mot.* (B.)

**CHIRAYITA.** BOT. PHAN. Nom de pays d'une Gentiane indéterminée d'Amérique, employée comme fébrifuge par les naturels du pays. (B.)

\* **CHIRBAZ.** BOT. PHAN. L'un des noms arabes de la Pastèque. (B.)

\* **CHIRETTA.** BOT. PHAN. Nom d'une substance ligneuse que les Indiens de Calcutta emploient comme fébrifuge, et qui paraît être produite

par un sous-Arbrisseau. Cette substance est jaunâtre, recouverte d'un épiderme brunâtre; elle est fortement amère. Son analyse chimique, faite par Lassaigue et Boissel, leur a donné: 1° une résine; 2° une matière amère, jaune foncé; 3° une matière colorante, jaune brunâtre; 4° de la gomme; 5° de l'Acide malique; 6° des Chlorures de Potassium, Sulfate de Potasse et Phosphate de Chaux; 7° de la Silice; 8° des traces de Fer. (DR..Z.)

**CHIRI. MAM.** Mot malabare qui a été mal à propos donné comme celui de la Mangouste. *V. ce mot.* (B.)

**CHIRICOTE.** ois. (Azzara.) Espèce du genre Râle, *Rallus Chiricote*, Vieill. *V. RALE.* (DR..Z.)

**CHIRIMOYA.** BOT. PHAN. Syn. péruvien de Corossol, par corruption de Chirimolia. *V. ce mot.* (B.)

**CHIRIPA.** BOT. PHAN. Palmier épineux des bords de l'Orénoque qui pourrait bien appartenir au genre *Cuphane* ou *Bactris.* *V. ces mots.* (B.)

**CHIRIPÉPÉ.** ois. Et non *Chiripède.* Espèce du genre Perroquet, *Pithecus Chiripape*, Vieill. *V. PERROQUET.* (DR..Z.)

\* **CHIRIPIBA.** BOT. PHAN. (Surian.) Non caraïbe d'un *Croton* indéterminé. (B.)

**CHIRIRI.** ois. Espèce du genre Coua, *Carcyzus Chiriri*, Vieill. *V. COUA.* (DR..Z.)

**CHIRIRIA.** ois. Pour Chirivia. *V. ce mot.*

\* **CHIRIST.** ois. Syn. vulgaire du Guignard, *Charadrius morinellus*, L. *V. PLUVIER.* (DR..Z.)

**CHIRITES.** MIN. Stalactites qui affectent la forme d'une main. (B.)

**CHIRIVIA.** ois. Et non *Chiriria.* Syn. espagnol de Bergeronnette. *V. ce mot.* (DR..Z.)

**CHIRIVIA.** BOT. PHAN. *V. CANOIRA.* C'est aussi un synonyme espagnol de Panais. (B.)

**CHIRL** ou **SCHIRL.** MIN. Pour Schorl. *V. ce mot.*

**CHIROCENTRE.** *Chirocentrus*. POISS. Genre établi par Cuvier, à la suite de la famille des Clupéas, dans l'ordre des Malacoptérygiens abdominaux, et qui rentre dans la famille des Siagnotes de Duméril. Les Chirocentres, dit Cuvier (Règn. Anim., T. II, p. 178), ont, comme les Harengs, le bord de la mâchoire supérieure formé au milieu par les intermaxillaires, sur les côtes par les maxillaires qui leur sont unis; les uns et les autres sont garnis, ainsi que la mâchoire inférieure, d'une rangée de fortes dents coniques, dont les deux du milieu d'en haut et toutes celles d'en bas sont extraordinairement longues; leur langue et leurs aros branchiaux sont hérissés de dents en cardes, mais ils n'en ont point aux pelatins ni au vomer. Au-dessus de chaque pectorale est une longue écaille pointue, et les rayons pectoraux sont fort durs; leur corps est allongé, comprimé, tranchant en dessous; leurs ventrales extrêmement petites, et leur dorsale plus courte que l'anale vis-à-vis de laquelle elle est placée; l'estomac est un long sac grêle et pointu; le plore près du cardia; la vessie natatoire longue et étroite. L'on n'a pas observé de cœcum. Une seule espèce constitue jusqu'ici le genre qui nous occupe, c'est le Sabran de Commerson. Elle a été distraite du genre Ésoce où Lacépède l'avait placée, en la mentionnant sous le nom d'Ésoce Chirocentre (Pois., T. V, p. 317). Elle était le *Clupea Dorab* de Forsk. (Faun. Arab. n° 108) et de Gmelin (Syn. Nat., T. 1, 1406). Le Chirocentre est un Poisson de la mer Rouge et des mers de l'Inde, de forme linéaire, revêtu d'écailles entières qui se détachent aisément, dont le dos est d'un bleu brunâtre. Le vertex est plane, l'iris argentée, la ligne latérale droite, la caudale bifide jusqu'à sa base, D. 17, P. 14, V. 7, A. 54. (A.)

\***CHIROCÉPHALE.** CHUET. Genre établi par Bonedict Prévost (Journal de physique, T. LVII, juillet 1803, p.

57—54 et 89—117) sur une espèce de Branchiopode à laquelle il a cru reconnaître des caractères propres, et qui en présente, il est vrai, d'assez singuliers. Nous rapportons cette espèce au genre Branchipe, V. ce mot, et nous la croyons la même que le Branchipe paludeux, *Cancer paludosus* de Müller. (AUM.)

**CHIROCÈRE.** *Chirocera*. INS. Genre de l'ordre des Hyménoptères, section des Térébrans, famille des Pupivores, tribu des Chalcidies, établi par Latreille (2<sup>e</sup> édit. du Nouv. Dict. d'hist. nat. T. VI, p. 544) sur une espèce trouvée par Léon Dufour aux îles d'Hyères. Ce nouveau genre est très-voisin de celui des Chalcis et n'en diffère que par ses antennes dont les sept derniers articles, à partir du troisième, se prolongent d'un côté en forme de rameau ou en manière de peigne. L'espèce rapportée par Dufour ressemble beaucoup au *Chalcis rufipes* d'Olivier (Encycl. method.) (AUM.)

**CHIROMYS.** MAM. Pour Cheiromis. V. ce mot.

**CHIRONE.** *Chironia*. BOT. FRAN. Genre de la famille des Gentianées et de la Pentandrie Monogynie de Linné. Ce célèbre naturaliste ayant désigné sous ce nom générique un groupe de Plantes indigènes, pour la plupart, du cap de Bonne-Espérance, et lui ayant assigné, parmi ses caractères, celui d'avoir les anthères roulées en spirale après la floraison, presque tous les auteurs, s'arrêtant à cette seule considération, ont placé dans le genre *Chironia* des Plantes qui se rapportent à d'autres genres connus, ou qui en forment de particuliers. Dans le petit nombre de Chirones décrites par Linné, il en est même qui sont susceptibles d'en être détachées pour être réunies à d'autres genres. Tous les botanistes conviennent que la présence d'un seul caractère ne suffit pas pour autoriser à placer une Plante dans tel genre connu, puisqu'il faut en outre des rela-

tions plus prononcées dans toutes ses parties, avec celles du genre où on veut l'intercaler. Ainsi, les *Gentiana Centaurium*, *G. spicata*, *G. maritima*, L., que Smith et De Candolle ont placées parmi les Chirones, forment un petit genre très-naturel, indiqué anciennement par Reneau-me sous le nom d'*Erythraea*; et bien caractérisé par le professeur Richard, dans le *Synopsis* de Persoon, mais où se trouvent décrites des espèces appartenant à d'autres genres. V. à ce sujet le mot ERYTHRAË. Toutes les Chirones de l'Amérique septentrionale, décrites par Michaux, appartiennent au genre *Sabbatia* que Pursh et Nuttall ont établi et caractérisé d'après les indications d'Adanson. Les *Sabbatia*, par leurs affinités avec les *Calcea*, les *Chironia* et les *Erythraea*; réunissent intimement ces divers genres en une section de la famille des Gentianées. Le *Chironia trinervis*, Lin. (Zeyl., p. 90); nous paraît devoir être rapporté au genre *Scabœa* de Brown, composé des *Exacum albens*, *cordatum*, etc. Il a le port de ces dernières Plantes, et les sépales du calice ailés. Cette Plante, de l'île de Ceylan, est figurée dans Burmann (Zeyl., t. 67) et conservée dans son herbier, que possède à Paris M. Benj. Delessert, sous le nom de *Lysimachia folio sinuato calyce carinato*, etc. Enfin le fruit du *Chironia baccifera* étant, comme l'indique le nom spécifique, une baie au lieu d'être une capsule, et cette Plante présentant en outre des différences d'avec les Chirones dans son calice et son stigmate, Moench a proposé d'en faire le type d'un nouveau genre auquel il donne le nom de *Rœslinia*.

Si nous adoptons les principaux retranchemens que nous venons d'indiquer, le genre *Chironia* se trouve réduit à un petit nombre d'espèces, tel, à peu d'exceptions près, que l'avait constitué Linné. Il se reconnaît aux caractères suivans : calice à cinq sépales ovales et arrondis à leur sommet, terminés par une pointe courte, et soudés jusqu'à la moitié de leur

hauteur; corolle à cinq pétales, soudés inférieurement en un tube court presque cylindrique, et appliqué sur l'ovaire, séparés supérieurement, et s'évasant en un limbe très-grand, à divisions arrondies, obtuses et vivement colorées; cinq étamines alternes avec les pétales, insérées à l'angle de division de ceux-ci, dont les filets sont courts et les anthères, d'abord adnées, beaucoup plus longues que les filets, à quatre valves biloculaires, s'ouvrant par deux suture latérales, se roulent en spirale après la floraison; ovaire ovoïde surmonté par un style décliné assez long et par un stigmate capité; capsule ovée, formée de deux valves dont les bords sont tellement rentrés à l'intérieur dans quelques espèces, qu'ils partagent le fruit en deux ou quatre loges; c'est en ce sens qu'il faut entendre l'expression de *Portcarpum 4-loculare*, assignée par Persoon comme caractère des *Chironia*. D'après Gaertner, le fruit du *Chironia frutescens*, L., est une baie de même que celle du *Ch. baccifera*, seulement un peu plus petite. Si la consistance du fruit se trouva la même dans deux Plantes supposées de genres distincts, elle ne peut servir de caractère générique, et, en conséquence, le genre *Rœslinia* de Moench deviendrait inadmissible.

Les Chirones habitent la partie la plus australe de l'Afrique, depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'au nord du pays des Hottentots. Il paraît que, de même que nos Gentianées européennes, elles se plaisent dans les pâturages élevés des montagnes. On donne en effet pour stations à certaines espèces le sommet de la montagne de la Table, les montagnes des Hottentots, les collines du Cap, etc. Un petit nombre d'espèces ont été transportées dans les jardins d'Europe où leurs fleurs, d'un rose vif, imitent celles de la Peruvienne rose de Madagascar. Elles exigent une terre légère, comme le terrain de bruyère; une chaleur pas trop élevée, mais pas non plus au-dessous de celle des

serres tempérées ou de l'orangerie. Leur culture n'est pas facile, et, en général, il est difficile de les conserver long-temps, parce qu'il leur faut, avec une chaleur moyenne, beaucoup d'air et de lumière. Elles ne peuvent en effet supporter l'air stagnant des serres ordinaires. Les arrosements doivent être peu fréquents, et leurs semis demandent une attention soutenue pour qu'ils réussissent. Malgré l'embarras que causent tous ces soins, les *Chironia frutescens* et *linoides*, L., sont assez répandues, et leur prix est peu élevé comparativement à celui de Plantes infiniment moins agréables. La première est un sous-Arbrisseau à feuilles pubescentes, ainsi que toutes les parties de la Plante. Ventenat a décrit et figuré (*Hort. Cels.*, T. 31), sous le nom de *Chironia decussata*, une espèce plus belle encore que le *Chironia frutescens*, et tellement semblable à cette dernière Plante dans toutes ses parties, que nous avons peine encore à ne pas la considérer comme une simple variété. Dans ces deux Plantes, l'estimable botaniste iconographe Turpin a signalé un nouvel organe, auquel il donne le nom de phycostème, et qui nous paraît être un disque glanduleux, répandu sur le calice, ayant de l'analogie avec celui qu'on remarque à l'intérieur du calice des Rosacées. (G.N.)

**CHIRONECTE.** *Chironectes*. MAM. Genre carnassier de la famille des Marsupiaux, établi par Illiger sur une espèce de Didelphe aquatique, dont on a fait aussi une Loutre.

Cette espèce a dix incisives en haut, huit en bas, deux canines à chaque mâchoire; nombre indéterminé de molaires; le museau est pointu; les yeux tournés de côté; oreilles nues et membraneuses; tous les pieds ont cinq doigts, les postérieurs seuls sont palmés avec le pouce sans ongle; la plante du pied porte à terre dans la marche; tous les autres doigts ont des ongles aigus et recourbés. La queue est cylindrique, écailleuse,

longue et préhensible. Les femelles ont une poche abdominale qui n'est que aux mâles.

On en connaît une seule espèce. Le **CHIRONECTE YAROK**, petite Loutre de la Guiane, Buff., Suppl., T. pl. 22; *Lutra minima*, Zimm., *Diaphis palmata*, Geoff. D'à peu près pied de long; la queue a six ou sept pouces; la tête est pointue, le museau fin, oreilles grandes et nues; queue est nue, la peau en est ridée comme du chagrin; elle est plate dessous; six grandes taches symétriques d'un brun noirâtre règnent long du dessus du corps, sur un fond gris-jaunâtre: de ces taches, trois succèdent depuis le museau jusqu'à l'épaule, les deux autres flancent le dos, la sixième est sur la croupe et s'étend jusqu'à la base de la queue et sur le dehors des cuisses; une tache blanche derrière chaque œil tout le dessous du corps blanc; pelage doux, laineux près du corps, traversé par des soies assez roides.

D'après une note de Langsdorff (*Mammal.*, p. 262), ce savant Russe a trouvé près de Rio-Janeiro un *Chironecte* de deux pouces de long, chez qui le pouce de derrière était compris dans la palmure, à queue velue et non prenante, à pelage très-doux et d'un gris uniforme, marqué de deux bandes en travers des lombes. Il vivait au bord des ruisseaux dans les forêts, et nageait bien. (A.D.N.S.)

**CHIRONECTE.** POIS. Sous-genre de Lophies. V. ce mot. (B.)

**CHIRONOME.** *Chironomus*. INSECT. Genre de l'ordre des Diptères établi par Meigen aux dépens des Tipules et réuni par Latreille (Rég. Anim. de Cuv.) aux Tanypes. L'auteur du genre (*Descript. syst. des Diptères d'Europe*, T. 1<sup>er</sup>, p. 18) décrit soixante quinze espèces. Parmi elles, nous citerons les Chironomes plumeux, *Chironomus plumosus*, Fabr.; annulaire, *Tipula annularia*, Degée, Bosc; bossu, *Tipula gibba*, Fabr., ou la *Corethra gibba* de Latreille (Considér. génér. Meigen (*loc. cit.* t. 2, fig. 6) en donne

une bonne figure; *V.*, pour quelques autres espèces et pour la description générique, le mot *TANYE*. (AUD.)

**CHIRONIUM.** BOT. PHAN. Deux *Laserpitium* et un Panais ont été regardés comme la Plante qui porte ce nom dans Dioscoride et dans Théophraste. Il a aussi été étendu à l'*Inula Helenium* ainsi qu'à un Hélianthème. (B.)

\* **CHIRONS-NATTER** ou **COULEUVRE CHIRON.** REPT. OPH. Syn. de *Coluber fuscus*. (B.)

**CHIROPTÈRES.** MAM. Pour Chéiroptères. *V.* ce mot.

**CHIROSCELE.** *Chiroscelis.* INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Hétéromères, famille des Mélasomes, établi par Lamarck (Ann. du Mus. d'hist. nat. T. III, p. 260) sur un Insecte rapporté de la Nouvelle-Hollande et ayant, suivant lui, pour caractères : antennes moniliformes, composées de onze articles, le dernier plus gros et en bouton ; lèvres supérieure plate, saillante, arrondie, entière ; le dernier article des palpes antérieurs plus grand et sécuriforme. Menton très-grand, en cœur, fortement échancré, cachant la base des palpes ; corselet bordé, tronqué aux deux extrémités et séparé des élytres par un étranglement ; élytres connées. La forme générale du corps rapproche les Chiroscèles du genre Ténébrion, mais ils s'en distinguent par les antennes et par les deux jambes antérieures qui offrent des dentelures au côté externe ; sous ce dernier rapport, ils avoisinent les Erodies dont ils diffèrent cependant par leur corps étroit et allongé. L'espèce décrite par Lamarck, et qu'il a figurée (*loc. cit.*, pl. 22, fig. 2), est encore remarquable par deux taches rousses, formant comme deux lacunes particulières, situées, une de chaque côté, sur le second anneau de l'abdomen. Ces taches sont ovales, et la peau dans cet endroit paraît membraneuse plutôt que coriace ou cornée ;

l'une et l'autre sont couvertes d'un duvet très-fin ; et comme elles ne consistent pas en une seule différence de coloration, mais qu'elles ont une nature toute particulière, ne ressemblant en rien à celle des végétaux, Lamarck pense qu'elles servent à quelques fonctions de l'Animal, peut-être bien à la transmission d'une lumière phosphorique. Cette espèce porte, à cause de cette particularité, le nom de Chiroscèle à deux lacunes, *Ch. bifenestrata*, Lam.

Fabricius a décrit, sous le nom de *Tenebrio digitatus*, un Insecte de la côte d'Angola et de la Guinée, qui, suivant Latreille, doit être rapporté au genre Chiroscèle. Cette espèce faisait partie de la collection de Dufresne. (AUD.)

**CHIROTE.** *Chirotes.* REPT. SAUR. Ce nom, formé d'abord par le savant Duméril pour désigner, dans ses Leçons, un genre de Saurien que caractérisent deux membres antérieurs seulement, doit être préféré à celui de Bimane qu'ont donné d'autres naturalistes au même Animal. La qualification de Bimane suppose deux mains : or, les organes de la locomotion dans un Lézard ne sauraient être des mains, dans le sens rigoureux qu'on attache à ce mot, et qui emporte avec lui l'idée du principal moyen par lequel le tact s'exerce. Les vrais Bimanes composent d'ailleurs un ordre de Mammifères dont il a déjà été question, et dans lequel l'Homme marche en tête des autres Animaux, non comme roi ; non comme but de la création, mais comme plus compliqué dans son organisation. Schneider avait désigné l'Animal qui nous occupe par le nom de *Chamaesaura*, qui n'est pas moins vicieux que Bimane. Les caractères du genre Chirote consistent dans une tête ronde, obtuse, à peine distinguée du corps par une simple ride, ayant des écailles polygonales, grandes, peu nombreuses ; narines et yeux peu prononcés ; les mâchoires presque égales ; corps long, cylindrique, revêtu de grandes écailles verticillées,

quadrilatères, semblables sur le dos et sous le ventre : deux pates antérieures seulement, très-rapprochées de la tête, épaisses, garnies de cinq doigts ongulés et distincts ; queue obtuse. Cuvier place le genre Chirote dans la famille des Scincoidiens et le dernier de tous. En effet ce n'est presque plus un Lézard, et dans le temps où les formes extérieures suffisaient pour déterminer, aux yeux des naturalistes superficiels, le rang qu'occupe chaque être dans l'ordre de la nature, il n'y avait pas plus de raison pour faire de Chirote un Lézard qu'un Serpent. Quoi qu'il en soit, Oppel, en adoptant ce genre, l'a placé parmi les Chalcidiens, petite famille qui renferme les derniers Scincoidiens, ou ceux qui n'ont qu'une paire de pates, soit antérieures, soit postérieures.

Une seule espèce de Chirote, *Chirotes mexicanus*, Dumér., nous est jusqu'ici connue. Lacépède la décrit le premier sous le nom de Gannelée (Ovip., p. 61, 5, pl. 41). La figure qu'il en donna est reproduite dans l'Encyclopédie par ordre de matières : c'est le *Laocerta lumbricoïdes* de Shaw, le Bipède cannelé de Daudin, enfin le *Chamaesaura propus* de Schneider. Cet Animal se trouve au Mexique. Mocino en rapporta de fort beaux individus dont il donna plusieurs à Duméril ; et dont il nous avait enrichi nous-même quand nous connûmes cet aimable et respectable savant à Madrid. Le Chirote du Mexique a huit à dix pouces de longueur ; sa grosseur n'exécède pas celle du petit doigt ; il est revêtu d'environ deux cent vingt anneaux, ou plutôt demi-anneaux qui, se joignant sur les côtes fort exactement, y forment deux lignes longitudinales. Deux lignes de pores règnent au-devant de l'anüs ; la langue peu extensible est terminée par deux petites pointes cornées. Le typan, invisible au dehors, est recouvert par la peau. Sa couleur, qui est celle de la chair, sa forme, son aspect, son grand poulmon comme les Serpens, en feraient un Amphis-

bène en diminutif, si la nature ne lui eût accordé deux pates. (B.)

**CHIROTHERCA** POLYP. Rumph a décrit sous ce nom le *Spongia villosa* de Pallas ou Eponge épaisse de Bosc. (LAM.-X.)

**CHIRPUIS**. BOT. PHAN. Syn. de *Sium sisarum*, L., selon le Dictionnaire de Dérerville. V. CHERVI. (B.)

**CHIROQUINCHUM, CIRQUINSON ET CIRCUINÇA**. MAM. Syn. du Tatou à six bandes ou Encoubert. (B.)

**CHIRRI** ou **CHIRIRI**. ORS. Espèce du genre Coua, *Coccisus Chirri*, Vieill. V. COUA. (DR..Z.)

**CHIRURGIEN**. ORS. (Brisson.) Syn. de Sucana. V. ce mot. (DR..Z.)

**CHIRURGIEN**. POIS. Espèce d'Acanthure. V. ce mot. (B.)

**CHISMOBRANCHES**. MOLL. Ordre établi par Blainville, et dont les caractères sont d'avoir une cavité respiratoire contenant des organes de la respiration non symétriques, et communiquant avec le fluide ambiant par une simple fente placée entre le bord antérieur du manteau et la partie supérieure du dos de l'Animal. Cet ordre comprend quatre familles désignées sous les noms de Mégastomes, Hémicyclostomes, Cyclostomes et Gonioclostomes. (AUD.)

**CHISMOPNES**. POIS. Duméril (Zool. anal., p. 105) donne ce nom, qui signifie respirant par une fente, à sa troisième famille des Poissons, qui constitue en même temps le second ordre qu'il établit dans la classe des Poissons ; il la caractérise ainsi : Poissons cartilagineux, sans opercule, mais à membrane aux branchies ; ouverture des branchies en fente sur les bords du cou ; quatre nageoires paires. Les Bandoires que l'auteur sépare des Lophies, celles-ci, les Balistes et les Chimères, parmi lesquelles Duméril comprenait encore le genre Callorhynque, constituent la famille des Chismopnes qui rentre tout entière parmi les Plectognathes



et les Acanthoptérygiens de Cuvier. (B.)

\* **CHISSIPHUINAC ET HACCHI-QUIS.** BOT. PHAN. Nom de pays du *Monnina salicifolia* de la Flore du Pérou. (B.)

**CHITAN.** BOT. PHAN. Syn. espagnol de Fraxinelle. (B.)

\* **CHITINE.** CHIM. Substance nouvelle découverte par Auguste Odier (Mém. de la Soc. d'hist. nat. de Paris, T. 1<sup>re</sup>, p. 29) dans les élytres et autres parties solides des Insectes. Elle constitue la base et environ le quart de ces enveloppes qu'on avait considérées jusqu'à ce jour comme analogues à la matière cornée des Animaux vertébrés. On l'obtient en traitant les élytres par la Potasse à chaud; elle est par conséquent insoluble dans cet agent qui ne fait que la priver des autres matières animales qui l'accompagnent. C'est là un premier caractère qui permet de la distinguer de beaucoup d'autres corps, tels que la corne, les cheveux, l'épiderme, lesquels sont solubles dans la Potasse. La Chitine offre encore pour caractères, d'être soluble dans l'Acide sulfurique à chaud, de ne point jaunir dans l'Acide nitrique, de brûler sans se fondre, c'est-à-dire en laissant un charbon qui conserve la forme de l'organe dont il provient; enfin de ne point contenir d'Azote. Par ce dernier caractère, elle se rapproche des substances végétales, et l'auteur la compare sous ce rapport au Ligneux.

Les membranes des ailes ne sont formées que de Chitine, et les nervures qui sont plus solides sont de la même nature que les élytres, c'est-à-dire qu'elles contiennent, outre la Chitine, 1<sup>o</sup> de l'Albumine; 2<sup>o</sup> une matière extractive soluble dans l'eau; 3<sup>o</sup> une substance animale brune, soluble dans la Potasse et insoluble dans l'Alcool; 4<sup>o</sup> une huile colorée soluble dans l'Alcool; 5<sup>o</sup> enfin, trois sels, qui sont le sous-Carbonate de Potasse, le Phosphate de Chaux et le Phosphate de Fer.

Thouvenel, Beaupoil et Robiquet ont trouvé, dans leur analyse des Cantharides, une matière parenchymateuse. Elle n'est autre chose que la Chitine.

Auguste Odier a retrouvé la Chitine dans la carapace des Crustacés, et il se propose de la rechercher dans l'enveloppe des Mollusques et des Zoophytes. (AUD.)

\* **CHITINI.** BOT. PHAN. Même chose que Chatini. V. ce mot. (B.)

**CHITINN.** MIN. On soupçonne que la pierre qui portait ce nom chez les anciens était le Péridot. V. ce mot. (B.)

\* **CHITISA.** BOT. PHAN. V. CHATETH.

**CHITNIK OU SHITNIK.** MAM. Syn. russe de Hamster. (A. D. Ns.)

**CHITON.** MOLL. V. OSCABRION.

**CHITONIER.** MOLL. Animal de l'Oscabron. V. ce mot. (B.)

**CHITOTE.** MAM. (Barbot.) Quadrumané d'Angole, qui est probablement un Maki. (B.)

**CHITRATIA ET CHYTRACULIA.** BOT. PHAN. V. CALYPTRANTHES.

\* **CHITRAM OU KITRAN.** BOT. PHAN. Syn. arabe de Cèdre. V. ce mot et MÈLÈSE. (B.)

**CHIT-SE.** BOT. PHAN. V. CHIN-QUIES.

**CHIU OU CHUY.** OIS. Syn. du Guirnegat, *Emberiza brasiliensis*, L., au Paraguay. V. GROS-BEC. (DR. Z.)

**CHIUCUMPA.** BOT. PHAN. Même chose que Chinchilculma. V. ce mot. (B.)

\* **CHIULO.** OIS. Syn. italien de la Maubèche, *Tringa Canutus*, Gmel. V. BÉCASSEAU. (DR. Z.)

**CHIURE DE PUCE.** MOLL. Nom vulgaire et marchand d'une Auricule de Lamarck. (B.)

\* **CHIURE DE MOUCHE.** MOLL. Coquille du genre Olive. V. ce mot. (B.)

**CHIVAFOU.** BOT. PHAN. Vieux nom français du *Berberis vulgaris*. (B.)

**CHIVEF.** BOT. PHAN. Syn. persan de Figuier, étendu par quelques botanistes anciens à un Arbre, qui pourrait bien être le Papayer. *V.* ce mot. (B.)

**CHIVES.** BOT. PHAN. Même chose que Cives. *V.* ce mot. (B.)

\* **CHIVI.** OIS. Espèce du genre Sylvie. *V.* ce mot. (DR..Z.)

**CHIVIN.** OIS. Syn. vulgaire du Bec-Fin Passerinet, *Motacilla Passerina*, L. *V.* SYLVIE. (DR..Z.)

\* **CHIVINO.** OIS. Syn. italien du Scops, *Strix Scops*, L. *V.* CHOUETTE. (DR..Z.)

\* **CHI-XAC ET CAY-BAON.** BOT. PHAN. Même chose que Chi-ken chez les Cochinchinois. *V.* CHI-KEN. (B.)

\* **CHLAEN.** OIS. Syn. helvétique de la Sittelle, *Sitta europæa*, L. *V.* SITTELLE. (DR..Z.)

**CHLÆNIE.** *Chlænus*. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, établi par Bonelli dans ses Observations entomologiques (Mém. de l'Acad. des sc. de Turin), adopté par Latreille qui le place (Règn. An. de Cuv.) dans la famille des Carnassiers, tribu des Carabiques, section des Féronies, entre les genres *Epomis* et *Oode*. Les *Chlænies* ont les palpes extérieurs filiformes, le dernier des maxillaires cylindrique et le même des labiaux en cône renversé. Les Insectes propres à ce genre ont tous, dans le sexe mâle, les articles dilatés des tarses antérieurs garnis, en dessous, d'une brosse très-serrée et sans vide. Par-là ils se rapprochent des *Callistes*, des *Epomis*, des *Dinodes* et des *Oodes*, et s'éloignent au contraire des genres *Dolique*, *Platone*, *Anchomène* et *Agone*. On peut rapporter à ce genre les *Carabes festivos* de Fabricius, figuré par Panzer (*Fauna Ins. Germ. fasc. XXX, fig. 15*), *spoliatus*, Fabr. et Panzer (*loc. cit. fasc. XXXI, fig. 6*), *sonatus*, Pan-

zer (*loc. cit. fasc. XXXI, fig. 7*, et *Krit. revis. fasc. I, fig. 39*), *vestitus*, Fabr. et Panzer (*loc. cit. fasc. XXXI, fig. 5*), *holosericeus*, Fabr. et Panzer (*loc. cit. fasc. XI, fig. 9*), enfin le *Carabus cinctus*, Fabr., représenté par Herbst (Arch., p. 135, n° 26, tab. 29, fig. 7) et qu'il ne faut pas confondre avec le *Carabus cinctus* de Rossi. (AUD.)

**CHLAMYDE.** *Chlamys*. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères, établi par Knoch (*Neue Beträge zur insectenkunde*, p. 122) aux dépens des Clythres de Fabricius, et adopté ensuite par Olivier et Latreille. Ce dernier entomologiste (Consid. génér., p. 238) le range dans la famille des Chrysomelines, et lui assigne pour caractères : antennes en scie, courtes, se logeant dans des rainures de la poitrine ; palpes labiaux fourchus. Les *Chlamydes* appartiennent (Règn. Anim. de Cuv.) à la famille des Cycliques, tribu des Chrysomelines, et sont placées à côté des Clythres dont elles diffèrent par leurs palpes labiaux qui paraissent fourchus à cause du prolongement de l'extrémité du second article formant saillie au-delà de l'origine de l'article suivant. Elles ressemblent aussi aux *Gribouris* sous plusieurs rapports, et s'en distinguent cependant par leurs antennes courtes et en scie. Du reste, leur corps est raboteux, raccourci et couvert de tubérosités : il offre le plus souvent des couleurs métalliques très-brillantes ; la tête est enfoncée dans le prothorax, et les yeux sont, comme ceux des *Gribouris*, réniformes ou marqués antérieurement d'une entaille assez profonde ; le prothorax est court, presque aussi large que les élytres, et muni d'un petit rebord latéral ; l'écusson est petit, et paraît carré ou même un peu plus large à son extrémité qu'à sa base ; les élytres embrassent l'abdomen par les côtés, et sont coupées comme lui carrément en arrière ; les pattes sont courtes, et se replient dans les enfoncements qui se trouvent

de chaque côté de la poitrine et du corselet; le pénultième article des tarses est bilobé. On ne connaît ni la manière de vivre, ni les métamorphoses de ces Insectes qui sont très-recherchés par les collecteurs, et qui sont tous originaires de l'Amérique.

Knoch (*loc. cit.*) a décrit et figuré deux espèces: la *Chl. tuberosa* (tab. 4, fig. 1, 2), et la *Chl. foveolata* (tab. 4, fig. 9). Olivier (Coléopt., T. V, p. 875) en mentionne et en représente quatre sous les noms de *monstrosa*, *plicata*, *gibbera* et *difformis*. Ces espèces, à l'exception de la dernière, avaient été rapportées par Fabricius au genre Clythre. On peut y ajouter encore son *Clythra cristata*. Kirby (Linn. Soc. Trans., T. XII, p. 446) a décrit, sous le nom de *Chl. Bacca*, une espèce nouvelle trouvée au Brésil. (AUD.)

\* **CHLAMYDIA.** BOT. PHAN. Sous le nom de *Chlamydia tenacissima*, Gaertner a décrit et figuré le fruit du Lin de la Nouvelle-Zélande, *Phormium tenax* de Forster. Cette seconde dénomination n'ayant pas prévalu, ce genre sera décrit sous son nom antérieur. *V. PHORMION.* (G..N.)

**CHLAMYS.** INS. *V. CHLAMYDE.*

\* **CHLAMYSPORUM.** BOT. PHAN. Ce genre, établi par Salisbury, est le même que le *Thysanotus* de R. Brown, qui, dans le *Prodrom. Floræ Nov.-Hollandiæ*, en a décrit dix-neuf espèces et donné d'excellens caractères génériques. *V. THYSANOTHE.* (G..N.)

\* **CHLÉDIPOLE.** BOT. CRYPT. Pour Chlépidole. *V. ce mot.* (LAM..X.)

**CHLEDRISTOME.** *Chledristomus.* MOLL. Rafinesque établit sous ce nom un genre voisin des Ascidies, que caractérise un corps plane à quatre bouches supérieures saillantes, ridées en étoiles. Il n'en mentionne qu'une espèce des mers de la Sicile. (B.)

**CHLÉNACÉES.** *Chlanaceæ.* BOT. PHAN. Dans son Histoire des Végétaux recueillis aux îles australes d'Afri-

que, Aubert Du Petit-Thouars a proposé d'établir une famille particulière pour quatre genres nouveaux qu'il a observés, et auxquels il a donné les noms de *Sarcotæna*, *Schizotæna*, *Leptotæna* et *Rhodotæna*. L'un des caractères les plus saillans de cette nouvelle famille, consiste dans un involucre contenant une ou plusieurs fleurs. Chacune d'elles offre un calice persistant à trois divisions très-profondes, une corolle formée de cinq pétales, quelquefois réunis et soudés par leur base en un tube, de manière à former une corolle monopétale. Les étamines sont tantôt déterminées, au nombre de dix, tantôt indéterminées. Leurs filets sont grêles et naissent d'une sorte de godet qui embrasse la base du pistil. Celui-ci offre un ovaire libre, surmonté d'un style et d'un stigmate trilobé. Le fruit est toujours une capsule plus ou moins globuleuse, enveloppée dans l'involucre qui devient épais. Cette capsule présente trois loges contenant chacune une ou deux graines; elle s'ouvre en trois valves septifères; rarement elle ne présente qu'une seule loge et qu'une seule graine par suite d'avortement. Ces graines sont renversées; elles contiennent un embryon à cotylédons foliacés et un peu ondulés, renfermé dans un endosperme corné.

Les Végétaux, qui forment cette petite famille, sont des Arbrisseaux ou des Arbustes, portant des feuilles alternes, simples, entières et munies de stipules. Leurs fleurs, quelquefois très-grandes et fort élégantes, sont réunies à la partie supérieure des rameaux.

Ces quatre genres, dit Du Petit-Thouars, entrent bien dans la Monadelphie du système de Linné; mais le *Leptotæna* appartient à la Décandrie, et les trois autres à la Polyandrie. Ce caractère de Monadelphie appartient à plusieurs familles; la plus remarquable est celle des Malvacées, et ces nouveaux genres paraissent s'en rapprocher. Leur involucre peut être comparé au calicule qu'on

observe dans beaucoup de genres de cette famille; la réunion des étamines n'est pas exactement semblable, car dans le plus grand nombre des Malvacées, les filamens même sont réunis en tube, au lieu qu'ici ils partent d'un tube distinct. La forme de la capsule s'accorde assez, mais la position des graines est différente. Elles sont en général redressées dans les Malvacées, et renversées dans les Chénacées, qui, par ce caractère, se rapprochent des Tiliacées.

Jussieu ne partage pas entièrement l'opinion du savant Du Petit-Thouars relativement aux affinités de cette nouvelle famille. Il lui trouve beaucoup plus d'analogie avec les Ebénacées et en particulier avec la nouvelle famille des Styracinéas, établie par Richard, dont elle ne diffère essentiellement que par la présence de l'involucre.

Cette famille n'est, ainsi que nous l'avons dit précédemment, composée que de quatre genres, savoir :

Étamines au nombre de dix.

*Leptolena*; Du Petit-Thouars.

Étamines nombreuses.

*Sarcotena*, Id. — *Schizolena*, Id.

— *Rhodolena*, Id. (A. R.)

\* CHLÉPIDOLE. *Chlepidola*. BOT.

~~CHLÉPIDOLE~~ (*Chaodinéas*?) Genre de Plantes marines, proposé par Rafinesque qui lui donne pour caractères: corps gélatineux de formes diverses, offrant à sa surface des rides ou sillons fructifères épars. — Nous ne connaissons aucune production marine parmi les espèces végétales à laquelle ce caractère puisse se rapporter; nous ne le trouvons que dans quelques Alcyons desséchés et informes, de sorte que l'on est forcé de s'en rapporter à Rafinesque pour ce genre comme pour tant d'autres qu'il a décrits un peu trop laconiquement. Ce naturaliste indique deux espèces de Chlépidoles: la première le Chlépidole tubuleux, la seconde le Chlépidole lobé. L'un et l'autre sont des côtes de Sicile.

(LAM. X.)

\* CHLIDONIE. *Chlidonia*. INF.

Savigny donne ce nom à un Animal qu'il regarde comme un Polypier, et qui nous semble le *Vorticella Polypina* des auteurs; il est figuré dans le grand ouvrage sur l'Égypte. Bory de Saint-Vincent le rapporte à sa classe des Psychodiales. V. ce mot.

(LAM. X.)

CHLOANTHE. *Chloanthus*. BOT.

PHAN. Robert Brown appelle ainsi un genre nouveau de la famille des Verbénacées, auquel il assigne les caractères suivans: calice campanulé, à cinq divisions égales et foliacées; corolle tubuleuse à deux lèvres, ayant la gorge dilatée, la lèvre supérieure bífide, l'inférieure à trois lobes, dont le plus grand est celui du milieu; quatre étamines didynames, saillantes; un stigmate à deux divisions aiguës, et pour fruit une drupe contenant deux noyaux à trois loges monospermes, celle du milieu étant vide.

Ce genre se compose de deux espèces originaires du port Jackson à la Nouvelle-Hollande. Ce sont deux petits Arbustes pubescens, ayant des feuilles opposées, simples, décurren-tes et linéaires. Les fleurs sont jaunes, portées sur des pédoncules solitaires et axillaires. (A. R.)

\* CHLOË. *Chloëa*. ANN. Genre de l'ordre des Néréidées, famille des Amphinomes, fondé par Savigny (Syst. des Annelides, p. 14 et 58), et ayant pour caractères distinctifs: branchies supérieures en forme de feuilles tripinnatifides, écartées de la base des rames, existant sans interruption à tous les pieds; cirres existant aussi à tous les pieds, et en outre un cirre surnuméraire aux rames supérieures des quatre à cinq premières paires de pieds; antennes extérieures et moyennes subulées, l'impaire de même; point de mâchoires; trompe pourvue d'un double palais inférieur et de stries dentelées.

Les Chloës ont le corps plutôt oblong que linéaire, déprimé et formé de segmens médiocrement nombreux. La tête est bífide en dessous,

et garnie en dessus d'une caroncule verticale, comprimée, libre et élevée à son extrémité postérieure; la bouche se compose d'une trompe pourvue à son orifice de deux doubles lèvres charnues, et, plus intérieurement, d'une sorte de palais inférieur, ou de langue épaisse, susceptible de se plier longitudinalement, et marquée de stries saillantes, obliques, finement ondulées. Les yeux sont distincts, au nombre de deux, séparés par la base antérieure de la caroncule. Il existe des antennes complètes, divisées en moyennes, impaires et extérieures. Les moyennes paraissent très-rapprochées, placées sous l'antenne impaire et composées de deux articles, le premier très-court, le second allongé, subulé. L'antenne impaire et les antennes extérieures sont en tout semblables aux moyennes. Les pieds sont à rames peu saillantes, la rame dorsale étant pourvue de soies simplement aiguës, et la rame ventrale de soies terminées par une pointe distincte. On remarque des cirres très-longs, déliés à la pointe, peu inégaux; le supérieur sortant d'un article cylindrique; l'inférieur d'un article globuleux; ce dernier plus court. Enfin, comme nous l'avons dit aux caractères génériques, il existe un petit cirre surnuméraire.

La dernière paire de pieds consiste en deux gros styles cylindriques, terminaux. Les branchies se trouvent être insérées sur les côtés du dos près de la base supérieure des rames dorsales, et elles consistent chacune en une feuille tripinnatifide inclinée en arrière.

Les Chloés se rapprochent des Pleiones et des Euphrosynes par l'existence des branchies et cirres supérieurs sans interruption à tous les pieds, ainsi que par l'absence des mâchoires. Elles diffèrent cependant des premières par la forme des branchies et par la présence du cirre surnuméraire. On ne les confond pas non plus avec les secondes à cause de la disposition de leur trompe, et aussi à cause des antennes, des branchies et

du nombre des cirres surnuméraires.

Ce genre ne se compose encore que d'une seule espèce, la Chloé chevelue, *Chl. capillata*, Sav., Lamk., ou l'*Amphroditia flava* de Pallas (*Misc. zool.*, p. 97, tab. 8, fig. 7-11), *Amphinoma capillata*, Brug. (*Encycl. méth. Dict. des Vers*, T. I, p. 45, n° 1, et pl. 60, fig. 1, 5), *Terebella flava* de Gmelin (*Syst. Nat.* T. I, part. 6, p. 3114, n° 7), et *Amphinome jaune* ou *chevelue*, Cuv. (*Dict. des Sc. nat.* T. II, p. 71, et *Règn. Anim.* T. II, p. 527). Cette belle espèce a été rapportée des mers de l'Inde.

(AUD.)

CHLOËNIE. INS. *✓* CHLÉNIE.

CHLONION. BOT. PHAN. (*Dioscoride*.) Probablement l'*Eryngium cappestre*. *✓* PANICAUT. (B.)

CHLORANTHE. *Chloranthus*. BOT. PHAN. Un petit Arbuste originaire de la Chine et du Japon, ayant à peu près le port du Thé, a été nommé *Chloranthus inconspicuus* par Swartz dans les Actes de la Société Linnéenne de Londres, année 1787, à cause de la couleur verte de ses fleurs qui sont fort petites. L'Héritier en a publié une description et une fort belle figure dans son *Sertum anglicum*, T. II. Sa tige est faible, rameuse et presque stolonifère. Elle est ornée de feuilles opposées, oblongues, ovales, aiguës, dentées en scie, très-glabres et persistantes; entre chaque paire de feuilles, on trouve de chaque côté deux stipules subulées et persistantes.

Les fleurs forment des espèces de panicules terminales; chacune d'elles est environnée d'une bractée squamiforme, lanéolée, aiguë; le calice adhère par sa base avec l'ovaire qui est séminifère; il est sous la forme d'une écaille latérale aiguë; la corolle est formée par un seul pétale latéral, trilobé, auquel sont insérées quatre étamines sessiles; leur fruit est une baie ovoïde, terminée en pointe et à une seule loge.

Il est fort difficile d'assigner d'une manière positive la place de ce genre

dans la série des ordres naturels. Il paraît avoir quelques rapports avec les Rûbiacées.

(A. R.)

\* **CHLORATES. MIN.** Résultats de la combinaison de l'Acide chlorique avec les bases salifiables. La plupart de ces sels jouissent de la propriété extraordinaire de détonner par le choc d'un corps dur. La détonnation est due à la facilité et à la rapidité avec lesquelles le Chlore se gazifie; elle dépend aussi de la résistance qu'oppose au développement subit du gaz, l'air qui environne la portion de Chlorate soumise au choc ou à la percussion. Quelques Chlorates se décomposent très-brusquement aussi, et avec production de chaleur capable d'enflammer les corps qui se trouvent au contact, par la présence d'un peu d'Acides sulfurique, nitrique; etc. Cette production de chaleur paraît avoir pour cause le prompt passage de l'état de Chlorate à celui de Chlorure; on a profité de cette propriété pour construire des allumettes très-commodes: elles consistent en une petite esquille de Sapin garnie à l'une de ses extrémités d'un mélange de Soufre et de Chlorate de Potasse; on trampe légèrement cette extrémité dans de l'Acide sulfurique; le mélange s'enflamme et communique l'ignition au bois. Il n'existe point de Chlorates dans la nature. (DR. Z.)

**CHLORE.** *Chlora.* BOT. PHAN. Famille des Gentianées, Octandrie Monogynie, L. D'abord confondu par Linné avec les Gentianes proprement dites, ce genre en a été séparé par Adanson, Linné lui-même, Jussieu et Lamarck, qui lui ont donné le nom sous lequel Rенеаume l'avait anciennement indiqué. Moins exact dans ses rapprochemens, Tournefort l'avait placé au milieu de son *Centaurium minus*, genre monstrueux où nous trouvons des espèces appartenant à quatre groupes bien distincts. En admettant le *Chlora perfoliata* comme type de celui dont il s'agit, nous y observons les caractères génériques suivans :

calice à huit divisions très-profondes ou à huit sépales linéaires, légèrement soudés par leur base; corolle hypocratériforme; dont le tube est très-court et le limbe étalé, à huit lobes; étamines également au nombre de huit, insérées à l'entrée du tube, très-courtes; anthères non spirales après la fécondation, mais éprouvant une simple torsion ou renversement en arrière par la contraction de la partie dorsale des loges; ovaire surmonté d'un style unique et de deux stigmates qui ont chacun la forme d'un croissant ou d'un fer à cheval renversé, ce qui a fait dire que le stigmate est quadrilobé; capsule unifolculaire, ovoïde, recouverte par le tube marcescent de la corolle: graines disposées sur deux rangées longitudinales, insérées aux bords épaissis des valves.

On ne connaît qu'un petit nombre d'espèces de *Chlora*, qui ont toutes un aspect fort remarquable par la largeur et la couleur glauque de leurs organes foliacés. La plus commune en Europe est la *Chlore perfoliée*, *Chlora perfoliata*, L., Plante qui s'élève souvent au-delà de trois décimètres. Elle est fort reconnaissable à ses feuilles ovales, pointues, embrassantes, opposées, soudées par la base de manière à simuler une feuille unique traversée par la tige, très-lisses, blanchâtres ou d'une couleur glauque. La tige est rameuse au sommet, et elle porte des fleurs terminales d'un jaune doré très-agréable. On la trouve en abondance sur le bord des fossés à Meudon et à Sénart dans les environs de Paris. Cette Plante a été décrite par Hudson (Angl. 1, p. 146) sous le nom générique de *Blackstonia* qui n'a pas été adopté. La France méridionale et particulièrement les environs de Marseille nourrissent encore une autre espèce bien distincte. C'est le *Chlora sessilifolia*, Desv., *Chlora imperfoliata* de Linné fils, Plante en général plus comparative à la précédente, et qui s'en distingue par ses feuilles simplement rapprochées, et par sa corolle beaucoup plus grande.

Le *Chlora dodecandra*, L.; ou *Chironia Chloroides*, Michx., appartient au genre *Sabbatia* d'Adanson. *V. SABBATIE*. Les rapports nombreux de structure que cette Plante offre avec les *Chlores* et les *Chiroues*, établissent un lien qui unit ces trois genres en un groupe très-naturel. (G.N.)

\* **CHLORE.** CHIM. Substance gazeuse, verdâtre, d'une odeur très-pénétrante et fortement irritante; d'une densité de 2,47; insoluble par la chaleur; acquérant les propriétés acides les plus marquées par le simple contact de l'eau (ou d'un corps humide), que le *Chlore* décompose en s'emparant de son hydrogène pour se convertir en Acide hydrochlorique, et dont l'Oxigène, se portant sur les corps exposés à la double action du *Chlore* et de l'Eau, devient la principale cause de leur altération presque subite. Le *Chlore* est le seul gaz simple qui, ainsi que l'Oxigène, dégage de la lumière par une compression forte et rapide; il paraît ne se combiner avec quelques corps qu'autant qu'il y soit aidé par la présence de l'Eau. On l'obtient, avec toutes les précautions possibles de dessiccation, dans les vaisseaux où on doit le recueillir, en distillant dans une sorte d'appareil de Woulff cinq parties d'Acide hydrochlorique concentré sur une partie de Peroxide de Manganèse, pulvérisé. Schæele découvrit le *Chlore* en 1777; Berthollet le soumit aux plus brillantes, aux plus utiles applications de 1785 à 1788; Davy, ainsi que Thénard et Gay-Lussac, chacun de leur côté, donnèrent à la fois en 1809 des vues nouvelles sur le *Chlore* que bientôt après Ampère qualifia de ce nom. (DR.Z.)

\* **CHLORIODIQUE** (ACIDE). MIN. Chevreul nomme ainsi la combinaison de l'Iode avec le *Chlore* qui, en effet, jouit de propriétés acides particulières. (DR.Z.)

\* **CHLORIDIUM** BOT. CRYPT. (*Mucedinées*.) Link a fondé ce genre dans ses Observations mycologiques (*Berl. Magaz.* vol. 3, p. 13). Il lui a

donné le caractère suivant: « filamens » simples ou peu rameux, droits, non » cloisonnés; sporidies insérées irrégulièrement sur toute la surface. » Ce genre est très-voisin des *Botrytes* qui n'en diffèrent qu'en ce que leurs sporidies sont toutes réunies au sommet des filamens qui sont cloisonnés. Cependant Persoon, à cause de ces caractères, a cru devoir le réunir aux *Dematiium*; mais nous devons observer ici que les *Dematiium* de Link et ceux de Persoon sont très-différens. Dans les premiers, les filamens sont décumbens et dépourvus de sporules. On ne peut les confondre avec le genre qui nous occupe. Dans les seconds, les filamens sont droits, couverts de sporules, et différens par conséquent très-peu des *Chloridium*. La seule espèce connue de ce dernier genre croît sur les herbes qui se pourrissent; elle est composée de filamens courts, roides, opaques, peu rameux; à divisions redressées; les sporidies sont vertes, réunies en petits groupes épars sur les filamens. Elle a été figurée par Link, tab. 1, fig. 16. (AUD.B.)

\* **CHLORIME.** *Chlorima*. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères; section des Tétramères, établi par Germar aux dépens du genre *Brachyrhina* de Latreille, et adopté par Dejean (*Catal. des Coléopt.*, p. 92) qui ne fait pas connaître ses caractères. Il en possède vingt-cinq espèces dont trois seulement appartiennent à l'Europe. Ce sont le *Brachyrhinus viridis*, Lat. (*Generi Crust. et Ins.* T. II, p. 258); qui se trouve en France, et les *Chlorans Fallax*; Illig., et *Pollinosa Fabr.*, dont l'un est de Hongrie et l'autre d'Autriche. (AUD.)

**CHLORION.** OIS. (Aristote.) Syn. présumé du Lorient, *Oriolus Galbula*, L. (DR.Z.)

**CHLORION.** *Chlorion*. INS. Genre de l'ordre des Hyménoptères, section des Porte-Aiguillons, établi par Latreille qui le range (Règn. An. de Cuv.) dans la famille des Fouisseurs. Ses caractères sont: mandibules uniden-

tées au côté interne; antennes insérées près de la bouche à la base d'un chaperon très-court et fort large; palpes maxillaires filiformes, guère plus longs que les labiaux; lobe terminal des mâchoires court et arrondi; languette à trois divisions courtes, celle du milieu échancrée. Les Chlorions ont plusieurs points de ressemblance avec les Sphex, les Pronées et les Dolichures; ils diffèrent des premiers par l'insertion des antennes, et des seconds par le lobe terminal des mâchoires ainsi que par la languette; enfin ils se distinguent des Dolichures par la longueur relative des palpes maxillaires et labiaux. Les Insectes propres au genre que nous décrivons sont tous exotiques; leur corps brille d'une couleur verte métallique. On possède quelques détails sur leurs habitudes. Le Chlorion comprimé, *Chlorion compressum* de Fabricius, très-commun aux îles de France et de Bourbon, a été observé par Cossigny, et Réaumur a consigné ces observations dans ses Mémoires sur les Insectes (T. VI, p. 280). Quoique la description qu'il en faisait été rapportée plusieurs fois, nous croyons utile de la reproduire par ce seul motif qu'elle a pour objet une espèce étrangère, et que déjà peu instruits sur les mœurs des Insectes indigènes, nous ne savons presque rien sur ceux des contrées exotiques.

« Ces Mouches, dit Réaumur, d'après le rapport de Cossigny, assez rares dans l'île de Bourbon, sont très-communes dans l'île de France. Elles volent avec agilité. Ce sont des guerrières qui ne nous craignent pas; elles entrent volontiers dans les maisons, elles volent sur les rideaux des fenêtres, pénètrent dans leurs plis et en ressortent; lorsqu'elles y sont posées, elles sont aisées à prendre... La piqure de leur aiguillon est plus à redouter que celle des aiguillons des Abeilles et des Guêpes ordinaires; cette Guêpe-Ichneumon dards la sion bien plus loin hors de son corps, que ces autres Mouches ne peuvent darder le leur.... Cossigny n'a pas eu oc-

casion d'observer si ces Guêpes-Ichneumons, d'une couleur si belle et éclatante, en voulaient aux Abeilles; mais il leur a vu livrer des combats dont il ne pouvait que leur savoir gré. C'était à des Insectes qui leur sont fort supérieurs en grandeur, et sur lesquels néanmoins elles remportaient une pleine victoire. Tous ceux qui ont voyagé dans nos îles, connaissent les Kakerlagues (*Blatta amer.*); souvent même ils les ont connues avant qu'il y eût été arrivés; nos vaisseaux ne sont que trop fréquemment infectés... Dans nos îles, elles s'introduisent partout, elles hachent tout, elles n'épargnent ni habits ni linge. On doit donc aimer des Mouches qui comme les Guêpes-Ichneumons dont il s'agit actuellement, attaquent ces Insectes destructeurs et les mettent à mort. Cossigny, qui a été témoin de quelques-uns de leurs combats, les a très-bien décrits. Voici ce qu'il a vu. Quand la Mouche, après avoir rôdé de différents côtés, soit en volant, soit en marchant, comme pour découvrir du gibier, aperçoit une Kakerlague, elle s'arrête un instant, pendant lequel les Insectes semblent se regarder; mais, sans tarder davantage, l'Ichneumon s'élance sur l'autre dont elle saisit le museau ou le bout de la tête avec ses mandibules; elle se replie ensuite sous le ventre de la Kakerlague, pour le percer de son aiguillon. Dès qu'elle est sûre de l'avoir fait pénétrer dans le corps de son ennemie, et d'y avoir répandu un poison fatal, elle semble savoir quel doit être l'effet de ce poison; elle s'abat, donne à la Kakerlague, elle s'en éloigne, soit en volant, soit en marchant; mais après avoir fait divers tours elle revient la chercher, bien certainement de la trouver ou elle l'a laissée. La Kakerlague, naturellement peu courageuse, a alors perdu ses forces; elle est hors d'état de résister à la Guêpe-Ichneumon, qui la saisit par la tête, et, marchant à reculons, traîne jusqu'à ce qu'elle ait conduit à un trou de mur dans lequel elle propose de la faire entrer. La rou-



est quelquefois longue, et trop longue pour être faite d'une traite; la Guêpe-Ichneumon, pour prendre haleine, laisse son fardeau et va faire quelques tours, peut-être pour mieux examiner le chemin; après quoi, elle vient reprendre sa proie, et ainsi, à différentes reprises, elle la conduit au terme....

» Quand la Guêpe-Ichneumon était parvenue à la traîner jusqu'où elle le voulait, le sort du travail restait souvent à faire; l'ouverture du trou était trop petite pour laisser passer librement une grosse Kakerlague; la Mouche, entrée à reculons, redoublait quelquefois ses efforts inutiles pour l'y faire entrer; le parti qu'elle prenait alors était de sortir et de couper les élytres de l'Insecte mort ou mourant, quelquefois même elle lui arrachait quelques jambes; elle rentrait ensuite dans le trou, toujours à reculons, et, par des efforts plus efficaces que les premiers, elle faisait, pour ainsi dire, passer le corps de la Kakerlague à la filière et la conduisait au fond du trou. Il n'y a pas d'apparence, ajoute Réaumur, que la Guêpe-Ichneumon prenne tant de peine pour manger dans un trou une Kakerlague qu'elle mangerait tout aussi bien dehors. Il est plus probable qu'elle est déterminée à soutenir toute cette fatigue pour une raison plus intéressante, et que c'est pour donner une bonne nourriture à quelqu'une de ses larves. » Jurine a fait du Chlorion le type de son genre *Ampulex*. V. ce mot. Son *Ampulex fasciata*, qui est indigène, a beaucoup de rapports avec le genre Chlorion.

Une autre espèce, appartenant très-certainement à ce genre et originaire du Bengale, a reçu le nom de Chlorion lobé, *Chl. lobatum*, Latr. (AUD.)

\* CHLORIQUE. MIN. V. ACIDE CHLORIQUE.

CHLORIS. ois. Nom latin du Verdier, *Loxia Chloris*, L. V. GROS-BEC. (DR. Z.)

CHLORIS. *Chloris*. BOT. FRAN. Genre de la famille naturelle des Ges-

minées et de la Triandrie Digynie, remarquable par ses fleurs disposées en épis unilatéraux et généralement fasciculés au sommet de la tige. Les épillets contiennent de deux à quatre fleurs, dont l'inférieure est seule fertile; les autres sont mâles, neutres ou simplement rudimentaires. La lepicée se compose de deux valves lancéolées, inégales; terminées en pointe à leur sommet. La glume, dans la fleur hermaphrodite, est formée de deux écailles, dont l'externe, qui est plus ou moins convexe en dehors, porte à son sommet une, deux ou trois arêtes dressées, souvent denticulées sur leurs parties latérales; l'écaille interne est mince, plane et mutique; la fleur, qui surmonte immédiatement la fleur hermaphrodite, présente la même structure dans sa glume; la troisième et la quatrième sont rudimentaires, pédicellées et mutiques. Dans la fleur inférieure, les étamines sont au nombre de trois; l'ovaire est surmonté de deux styles portant chacun un stigmate plumeux. Le fruit est nu, c'est-à-dire non enveloppé dans les écailles florales.

Tel que nous venons d'en tracer le caractère, le genre *Chloris* des auteurs modernes diffère sensiblement du genre *Chloris* de Swartz. En effet plusieurs espèces qui y avaient été successivement ajoutées, ont été rangées dans d'autres genres ou en ont formé de nouveaux. Ainsi la *Chloris curtispicula* de Michaux a été placée dans le genre *Dinocha* de Delille; les *Chloris falcata* de Swartz et *monostachya* de Michaux ont formé le genre *Campulosus* de Desvaux; les *Chloris cruciata*, *Chloris virgata* de Swartz et *Chloris mucronata* de Michaux sont devenues les types du genre *Rhabdochloa* de Beauvois. V. CAMPULOSUS, RHABDOCHLOA, DINOCHA.

Toutes les espèces du genre *Chloris* sont exotiques; elles croissent également dans l'ancien et le nouveau Continent, dans l'Amérique méridionale; les Etats-Unis, les Indes-Orientales et le cap de Bonne-Espérance. Elles sont en général d'un as-

pect agréable et d'un port élégant.  
(A. R.)

**CHLORITE. MIN.** Talc Chlorit, Haüy; la Chlorite, Broch. Ce nom, qui signifie Matière verte, a été donné à une Pierre ordinairement friable ou du moins facile à pulvériser, qui est composée d'une multitude de petites paillettes ou de petits grains luisans, s'égrénant avec facilité sous la pression des doigts, et donnant une poussière assez douce au toucher.

Sa couleur, qui varie du vert-bouteille foncé au vert-jaunâtre, paraît être due à une grande quantité de Fer qui lui donne la propriété de se fondre, au chalumeau, en une scorie noire, plus attirable à l'Aimant que la Chlorite dans son état naturel. L'humidité lui fait répandre une odeur argileuse. Les minéralogistes ont établi trois variétés de cette espèce :

1. La **CHLORITE COMMUNE**, *Gemainer Chlorit*, et *Chloriterde*, la Chlorite terreuse, Broch.

Elle est en masse plus ou moins solide, même terreuse et friable; quelquefois composée d'un grand nombre de petits prismes hexaèdres; ses couleurs varient du vert foncé, quelquefois même du brun jusqu'au jaune-roussâtre. L'analyse qu'en a fait Vauquelin a produit : Silice, 26; Magnésie, 8; Alumine, 18, 5; Oxyde de Fer, 43; Muriate de Soude ou de Potasse, 2; Eau, 2. Total, 99, 5.

Vauquelin a fait aussi l'analyse d'une autre variété de Chlorite qui se trouve à l'Oisans, département de l'Isère; elle est d'un blanc d'argent nacré, et se fond au chalumeau en un émail blanc-verdâtre.

La Chlorite commune se trouve dans les filons des roches primitives; elle pénètre et colore souvent les Cristaux dans lesquels elle est toujours mêlée, surtout ceux de Quartz, d'Aixinite, etc. On la rencontre dans presque toutes les chaînes de montagnes primitives. On en cite en Saxe, en Suède, etc.

2. La **CHLORITE SCHISTEUSE**, *Chlo-*

*ritthiefer*; la Chlorite schisteuse Broch. Sa couleur est le vert foncé presque noir; elle a une structure schisteuse, et ses feuillets sont courbes. On la trouve en masses assez solides. Elle se rencontre surtout en Corse, en Suède, en Norwège, etc.

D'Aubuisson en a décrit une variété que l'on trouve à Saint-Marcel-de-Tenis en Piémont; elle a assez de dureté pour être employée à la fabrication des meules de moulin. (Journ. des Min., T. XXIX.)

3. La **CHLORITE BALDOGÉE**, *Grunderde*; la Terre verte, Broch; Talc zoograpique, Haüy; Baldogée, Saussure. Elle est d'un vert assez pur, sa cassure est terreuse, à grains fins, elle est facile à pulvériser.

On la trouve en rognons, dans les cavités des roches à pâtes, telles que les Basaltes, certaines laves, etc. Saussure l'a observée sur le chemin de Nice à Fréjus; Brongniart et Cuvier (Ossem. Foss., T. II, p. 267) disent qu'elle se trouve dans le calcaire grossier des environs de Paris. Enfin on l'exploite à Bentonico près de Verone, et elle est connue dans le commerce sous le nom de Terre de Verone; elle est employée comme matière colorante dans la peinture à l'huile et dans le Stuc. *V. TALC.* (G.)

\* **CHLOROCYANIQUE** (ACIDE MIN. Gay-Lussac a ainsi nommé la combinaison du Chlore avec le Cyanogène que Berthollet, à qui la découverte en est due, considérait comme une Acide prussique oxygéné.

(DR..Z.)

**CHLOROMYRON. BOT. PHA.** Ruiz et Pavon avaient décrit, dans Flore du Pérou, un nouveau genre auquel ils avaient donné le nom de *Verticillaria*; ce nom a été changé à celui de *Chloromyron* dans le *Synopsis* de Persoon, et c'est sous celui qu'il a été depuis généralement désigné. Il paraît qu'on a ignoré pendant long-temps ses affinités, puisque, dans le Supplément de l'Encyclopédie, il est dit que ce genre a des rapports avec les Liliacées; un travail récent

Choisy de Genève sur les Guttifères (*V. Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Paris*, 1<sup>er</sup> vol., 2<sup>e</sup> partie) le fait entrer dans cette dernière famille. C'est le cinquième genre ou le second de la tribu des Garciniées, avec les genres desquelles, et notamment avec l'*Ochrocarpos* de Du Petit-Thouars, il a beaucoup de rapports, et dont il ne diffère que par le nombre trois des parties du fruit. Choisy lui assigne les caractères suivants : calice à deux sépales ; corolle à quatre pétales ; point de styles ; stigmate sessile, concave et à trois lobes ; capsule triloculaire.

Le *Chloromyron verticillatum* de Persoon est figuré sous le nom de *Verticillaria acuminata* dans le Prodrome de la Flore du Pérou, t. 15. C'est un Arbre à feuilles oblongues, acuminées, entières, et à rameaux presque verticillés, qui s'élève à plus de vingt mètres, et dont le tronc droit et épais laisse suinter, à travers les incisions de son écorce, une résine verdâtre, très-abondante, surtout dans le temps des pluies, que les habitans de Pozuzo, au Pérou, recueillent avec soin et à laquelle ils donnent le nom de Baume ou Huile de Sainte-Marie.

(G.N.)

#### CHLOBOMYS ou AGOUTI.

*Dasyprocta*. MAM. Genre de Rongeurs caractérisé par quatre molaires partout, dont la construction encore peu observée sépare tout-à-fait ce genre des Cabiais et des Cochons d'Inde auxquels on l'avait réuni. Ces molaires sont formées d'un tube d'émail qui se plisse une ou deux fois aux intermédiaires de chaque rangée, en bas sur le côté externe, en haut sur l'interne. Ce repli de l'émail ne descend que jusqu'à la gencive. Au-delà le tube est cylindrique jusqu'au fond de l'alvéole, où il est tronqué horizontalement. Dans cette troncation se voient les sommets moussus de quatre, cinq ou six petites tubes d'émail, les uns cylindriques, les autres élargis, pour peu que la couronne de la dent soit usée, on y aperçoit le ponce

de chacun de ces tubes séparés les uns des autres par un ciment contenu dans le tube général ; leur cavité est aussi remplie de ce ciment ; quand la couronne n'est pas encore commencée de s'user, elle est striée transversalement par cinq ou six collines que forment autant de replis du fond du tube extérieur d'émail. En consultant les articles Cabiai et Cobiaie, on verra combien la structure de leurs dents diffère de celle-ci. Les incisives sont plus arquées que dans la plupart des autres Rongeurs, surtout les supérieures dont la courbure excède un demi-cercle. Il n'y a pas de gorge profonde en dehors de la rangée dentaire inférieure comme dans les Cobiaies et les Cabiais. L'os de la cuisse est aussi renflé que dans les Cobiaies, et le rocher est creusé comme chez eux d'une cavité où se loge un prolongement particulier du cervelet. L'aire transversale de la fosse ethmoïdale est égale au trou occipital ; mais l'amplitude de cette fosse est supérieure à proportion à celle qui existe chez les Cobiaies. Aussi les cornets de l'ethmoïde et maxillaires y occupent les deux tiers de la longueur de la tête. Il n'y a que les Cochons où l'organe de l'odorat soit plus développé. Le trou sous-orbitaire est fort grand ; mais comme dans la plupart des Rongeurs, il ne donne pas seulement passage aux nerfs sous-orbitaires, une partie du masséter le traverse pour s'insérer sur la face antérieure du maxillaire. Les yeux sont gros et saillans ; les paupes sont grêles et sèches ; celles de devant ont quatre doigts distincts et un tubercule court et renflé en place de pouce ; celles de derrière, d'une longueur disproportionnée, n'ont que trois doigts armés de forts ongles. La plante en est nue et calluse, état qui se prolonge un peu sur la partie postérieure du métatarse. La queue n'est pas apparente extérieurement, ou très-courte. Elle a de cinq à sept vertèbres. Le nombre des mamelles varie d'une espèce à l'autre. Il n'y en aurait que deux paires dans l'Agouti patagouien

sui vant Azzara, et cinq ou six dans l'Agouti d'après Daubenton. Ni l'un ni l'autre n'aurait non plus de scrotum selon les mêmes observateurs. Chez toutes ces espèces aussi, les femelles ont l'anus et la vulve débouchant dans une seule et même fente de la peau. Le poil varie en longueur depuis le ras jusqu'à trois pouces. Chez tous, il est roide, fort droit, et se détache facilement par l'horripilation comme chez plusieurs espèces de Cerfs.

Aucun de ces Animaux ne creuse de terrier; ils vivent sous les arbres abattus ou dans les cavités de leurs troncs. Ils se richent même quelquefois dans des trous assez élevés; leur œil est très-développé. On n'en connaît pas encore l'anatomie. Mais d'après Azzara et Moreau de Saint-Méry, ils voient mieux la nuit que le jour, et les Chiens les attrapent bien plus aisément de jour.

Il y en a quatre espèces assez bien déterminées, à quoi il faudra peut-être en ajouter une cinquième, à laquelle se rapporte vraisemblablement l'Animal figuré pl. 18 du Supplément de Catesby (Histoire naturelle de la Caroline, t. 2). De ces quatre espèces, deux seulement sont communes aux îles de l'archipel Mexicain et à l'Amérique méridionale. L'Akoui huppé est propre à la Guiane, et paraît limité par l'Orénoque et l'Amazone. L'Agouti patagonien ne se trouve pas au nord de Buenos-Ayres.

Ces Animaux sont omnivores, par conséquent n'ont pas besoin de faire de provisions. C'est par erreur que Buffon leur attribua cette habitude. Ils ne font annuellement qu'une seule portée.

1. *ABOYFACUTI*, *Chloromys acuti*, Buffon, T. VIII, pl. 50; Azzara, T. II, p. 18 (Quadr. du Paraguay). C'est le *Onia* des Portugais.

Long de vingt pouces, haut de neuf à dix pouces aux épaules, d'un pied à la croupe; tête assez semblable à celle du Lapin, mais à physionomie caractérisée par ses yeux saillans et ses oreilles demi-circulaires, nées

et hautes d'un pouce et demi seulement; la lèvre supérieure fendue: le pelage est d'un jaune verdâtre, parce que chaque poil, généralement jaune, est annelé de deux ou trois cercles noirs; le jaune domine tout le long du dessus du corps; tout le dessus et la face externe des membres sont nuancés de vert, nuance d'où F. Cuvier a fait le nom *Chloromys*. Les poils de la croupe ont jusqu'à quatre pouces de long, les autres n'en ont guère plus d'un. Comme les Lapins, ils soutient, en mangeant, ses alimens avec les pates de devant, mais ne les porte pas à la bouche. Il fait, en octobre, deux petits, et a trois paires de mamelles d'après Azzara. Mais il paraît qu'il a un plus grand nombre de tubercules qui en ont imposé à Daubenton.

Il ne se trouve pas au sud du Paraguay. Il est devenu rare aux Antilles.

2. *AKOUKI*, *Chloromys Akuschi*, Buff., Suppl. T. III, pl. 56; Schreb. pl. 171, B. A poil brun piqué de fauve, avec une sorte de manteau noir qui commence derrière l'épaule et s'élargit beaucoup sur la croupe. A peu près de la taille du précédent. Les poils du dos sont plus doux et plus soyeux que dans l'Agouti proprement dit; aux pates, le poil est ras. La queue est très-mince et double en longueur de celle de l'Agouti. Azzara a douté de l'existence de cette espèce parce qu'elle ne paraît pas habiter au sud de l'Amazone. On dit qu'elle se trouve aussi à Sainte-Lucie ou, néanmoins, les Colons ne distinguent pas deux espèces.

3. *L'AGOUTI HUPPÉ*, *Chloromys cristata*, F. Cuvier; *Cavia cristata*, Geoff. (Ménag. natur. du Muséum, pl. 3, 5<sup>e</sup> livraison).

Le noir, dans l'Agouti huppé, domine autant que le jaune dans l'Agouti ordinaire dont il a la taille, de sorte que sa teinte est d'un vert beaucoup plus foncé; le dessus de la tête, le cou et les pates entièrement noirs; depuis l'intervalle des yeux jusqu'au milieu du cou, les poils sont relevés en forme de crête ou de lanière. En

outre son chapeau est droit au lieu d'être busqué comme dans la première espèce.

4. AGOUTI PATAGONIEN, *Chloromys patagonicus*, Penn. (*loc. cit.*) pl. 59, Shaw, *Gener. zool.* T. II, p. 165; Lièvre Pampa d'Azzara (Quadrup. T. II, p. 51). A poil gris-jaune piqueté de blanc au dos, passant au noir sur la croupe où tranche fortement une bande blanche qui, en passant près de la naissance de la queue, va d'une hanche à l'autre. Tout le ventre et le dessous de la poitrine sont également blancs; les poils en sont assez solides pour faire des tapis de sa peau; il n'existe pas au Paraguay, commence d'être nombreux au sud de Buenos-Ayres entre les trente-quatrième et trente-cinquième degrés de latitude, dans les Pampas où il s'étend jusqu'au détroit de Magellan; vit constamment avec une femelle; ils courent de compagnie quand on les chasse, mais ils ont bientôt las. La nuit, ils font entendre une voix aiguë et forte qui articule o, o, o, y. Il répète ce cri quand on le prend ou le tourmente: pris jeune, il s'apprivoise aisément ainsi que ses congénères. Azzara ne l'a jamais vu se réfugier dans les Viczaches ou terriers des Viczaches, sorte de Rongeur qui semble faire le type d'un genre particulier. V. ce mot. L'oreille a plus de trois pouces de hauteur et deux pouces de large; elle est bordée de poils qui la dépassent d'un demi-pouce; l'intérieur est garni de poils blancs, l'extérieur de poils bruns. Azzara n'a trouvé que deux paires de mamelles à la femelle qui ne porte aussi que deux petits comme celle de l'Agouti ordinaire. Les Indiens non-soumis et les journaliers mangent sa chair qui est blanche. On la trouve inférieure à celle de la plupart des espèces de Tatous. Azzara (*loc. cit.*) a le premier rattaché cette espèce au genre Agouti.

Desmarest (Mammalogie, p. 361) dit que le prince Maximilien de Neuviel a établi une cinquième espèce d'Agouti, qui, d'après le site

qu'indique son nom, différerait des précédentes; c'est le *Cavia rupetris*; mais il dit ne la pas connaître. Nous ne la connaissons pas non plus.

(A. D. NS.)

CHLOROPHANE. MIN. Variété de Chaux fluatée de Sibérie, compacte et violette, qui brûle en donnant une belle lumière verte. V. CHAUX FLUATÉE.

(LUC.)

CHLOROPHOSPHORIQUE (ACIDE). MIN. Nom que Davy a donné à la combinaison du Phosphore avec le Chlore jusqu'à saturation. Cette combinaison, qui présente des propriétés acides particulières, fut l'un des résultats des importants travaux du chimiste anglais.

(DR. Z.)

CHLOROPHYTE. *Chlorophytum*. BOT. PHAN. Ce genre a d'abord été constitué par Ker dans le *Botanical Register*; mais c'est à R. Brown, qui en a rapporté une espèce de la Nouvelle-Hollande, que nous emprunterons ses caractères génériques: un périanthe à six divisions profondes, étalées, égales et persistantes, renferme six étamines dont les filets sont glabres et filiformes; l'ovaire, divisé en trois loges polyspermes, est surmonté d'un style grêle et d'un stigmate; à cet ovaire succède une capsule triloculaire, trivalve, et qui présente trois lobes comprimés et marqués de veines; les semences peu nombreuses, comprimées, ont leur ombilic parfaitement nu.

Ces caractères, et surtout ceux du périanthe persistant et de la structure de la capsule, suffisent pour faire distinguer ce genre du *Phalangium* de Jussieu dont il est d'ailleurs très-voisin. R. Brown (*Prodr. Flor. Nov.-Hol.*, p. 277) y rapporte l'*Anthericum elatum*, Hort. Kew, une espèce non décrite du Cap, et la Plante qu'il a trouvée sur les côtes intra-tropicales de la Nouvelle-Hollande et qu'il a nommée *Chlorophytum laxum*. Ces Plantes appartiennent à la famille des Asphodélées et à l'Hexandrie Monogynie de Linné. Leurs racines sont

fasciculées, leurs feuilles radicales linéaires ou quelquefois un peu elliptiques; et elles possèdent des fleurs blanches, disposées en grappes et portées sur des pédicelles articulés dans leur partie moyenne. (G.N.)

**CHLOROPTÈRE.** POIS. (Lacépède.) Espèce du genre *Spartea*. (B.)

\* **CHLOROPUS.** OIS. Nom latin de la Poule d'eau, *Fulica Chloropus*, L. N. POULE D'EAU. (DR..Z.)

**CHLOROSAURA.** REPT. SAUR. Syn. de Lézard vert chez les Grecs modernes. (B.)

**CHLOROSE.** BOT. PHAN. V. MALADIES DES ARBRES.

\* **CHLOROXICARBONIQUE** (ACIDE). CHIM. On a donné ce nom à la combinaison du Chlore avec le gaz oxyde de Carbone, que Davy, à qui la connaissance en est due, avait nommée Phosgène. Quelques-unes de ses propriétés acides ont été reconnues par différents chimistes. (DR..Z.)

**CHLOROXYLON.** BOT. PHAN. Browne (*Jamait.*, 187, t. 7, f. 1) a décrit et figuré sous ce nom une Plante que Linné a rapportée aux Lauriers, en lui donnant pour nom spécifique celui dont Browne s'était d'abord servi pour le faire connaître. (G.N.)

\* **CHLORURES.** CHIM. Combinaisons du Chlore avec différents corps simples ou composés, tels que l'Oxygène, l'Azote, le Soufre, le Phosphore et quelques bases métalliques. Les propriétés de plusieurs Chlorures qui, tous, sont des produits de l'art, commencent à être bien connues. (DR..Z.)

**CHLOVOLOUCH.** BOT. PHAN. Vieux nom teutonique de l'Ail cultivé. (B.)

**CHLUNES.** MAM. L'un des noms grecs du Sanglier.

**CHMEL** ou **CHMIEL.** BOT. PHAN.

Syn. de *Houblon* dans les dialectes slaves. (B.)

\* **CHINEES.** POIS. Nom que portait aux Moluques le Chironecte de Cuvier. V. LOPHIE. (B.)

**CHNOUS.** BOT. PHAN. Syn. égyptien de *Sécolyme*, d'après Adanson. (B.)

**CHO.** OIS. Syn. languedocien de *Chevêche*, *Strix passerina*, L. V. CHOUETTE. (DR..Z.)

**CHOA.** MAM. Syn. d'Éléphant chez les Hottentots. (B.)

**CHO-AA.** MAM. (Kolb.) Syn. Hottentot de Ohat. (B.)

**CHOAGH.** OIS. Et non *Chaug*, qui est autre chose. Syn. anglais de Choucas, *Corvus Moredula*, L. V. CORBEAU. (DR..Z.)

**CHO-AKA-MMA.** ou **CHOAK KAUMA.** MAM. Noms que les Hottentots donnent, suivant Kolb, à une espèce de Babouin que l'on croit être le Babouin noir, *Simia porcaria*. (G.N.)

**CHOANA.** POLYP. Polypier figuré par Gualtieri, tab. 42, *in vers.*, qui semble se rapprocher du *Madrepore infundibuliformis* de Bosc. (LAMB.X)

**CHOASPITES.** MIN. (Valmont de Bomare.) Syn. de Chrysobéryl. V. mot et CYMOPHANE.

**CHOAUNE.** BOT. PHAN. (Prosper Alpin.) Syn. turc de Café. V. ce mot. (B.)

**CHOB.** POIS. Espèce du genre *Cypripedium*. V. ce mot.

**CHOB** ou **CHOVA.** OIS. Syn. espagnol du Choucas, *Corvus Moredula*, L. V. CORBEAU. (DR..Z.)

**CHOBES** ou **CHOBAZ.** BOT. PHAN. Syn. arabe d'*Hibiscus purpureus*. V. KETMIE. (B.)

\* **CHOBAR** ou **CHABAZA.** BOT. PHAN. Syn. arabe de *Sida hirta*. V. SIDA. (B.)

**CHOBBEIZE.** BOT. PHAN. (For

kalh. ) Syn. arabe de *Malva rotundifolia*. (B.)

\* **CHOBS-EL-OKEB.** BOT. PHAN. (Forsk. ) Syn. arabe de *Campanula edulis*. Espèce de Campanule dont la racine, plus grosse que celle de la Ranuncule, est mangeable comme elle. (B.)

\* **CHOCARD.** OIS. (Cuvier. ) *Pyrrhocorax*.

**CHOCAS, CHOUCA ET CHUCAS.** OIS. Syn. de Choucas. *V.* CORBEAU.

\* **CHOCH.** BOT. PHAN. (Forsk. ) Syn. égyptien de Pêcher. *V.* ce mot. (B.)

**CHOCHA.** OIS. Que l'on prononce *Tchotchka*. Syn. espagnol de Bécasse, *Scolopax rusticola*, L. *V.* BÉCASSE. (B.)

**CHOCHA-PERDIZ.** POIS. C'est-à-dire *Bécasse-Perdrix*. Syn. espagnol de Centrisque-Bécasse, qu'on nomme aussi en Galice *Chocha marina*, Bécasse de mer. *V.* CENTRISQUE. (B.)

\* **CHOCHÉ-PIERRE.** OIS. Syn. vulgaire du Gros-Bec, *Loxia Coccythraustes*, L. *V.* GROS-BEC. (DR..Z.)

\* **CHOCHÉ-POULE.** OIS. Syn. vulgaire du Milan, *Falco Milvus*, L. *V.* FAUCON. (DR..Z.)

**CHOCHI.** OIS. Espèce du genre *Coua*, *Coccyzus Chochi*, Vieill. *V.* COUA. (DR..Z.)

**CHOCHINA.** OIS. C'est-à-dire petite Bécasse, et qu'on prononce *Tchotchina*. Syn. espagnol de la Bécassine, *Scolopax Gallinula*, L. *V.* BÉCASSE. (DR..Z.)

**CHOCHO.** BOT. PHAN. (Adanson.) Syn. de *Sechium*. *V.* ce mot.

**CHOCHOL ou CHOCHUT.** MAM. Syn. russes de Desman. (B.)

**CHOCHOPITLI.** OIS. Syn. mexicain de l'Ibis blanc d'Amérique, *Tantalus albus*, Lat. *V.* IBIS. (DR..Z.)

**CHOCOTTE.** OIS. Syn. vulgaire

du Choucas, *Corvus Monedula*, L. *V.* CORBEAU. (DR..Z.)

**CHOCOTUN.** OIS. Syn. russe de la Mouette rieuse, *Larus ridibundus*, L. *V.* MAUVE. (DR..Z.)

\* **CHOCPAD.** BOT. PHAN. Même chose que Champada. *V.* ce mot.

\* **CHODA.** BOT. PHAN. (Forsk. ) Syn. arabe de Mouron à large feuille. Espèce du genre *Anagallide*. *V.* ce mot. (B.)

\* **CHODARA.** BOT. PHAN. L'un des noms arabes de la Valériane grimpante de Forskalh. (B.)

\* **CHODARDAR.** BOT. PHAN. (Forsk. ) Syn. arabe de *Cotyledon orbiculata*. *V.* COTYLET. (B.)

**CHODEIRA.** BOT. PHAN. (Forsk. ) Syn. arabe de *Bunias orientalis*. (B.)

**CHODIE.** BOT. PHAN. Syn. arabe de *Justicia triflora*, espèce de Carmanthine. (B.)

\* **CHODRAB.** BOT. PHAN. (Forsk. ) Syn. arabe de *Senecio hadiensis*. *V.* SÈNEÇON. (B.)

**CHOECHENNIVO.** BOT. PHAN. Syn. lapon de Linaigrette. *V.* cemot. (B.)

**CHOEL.** MOLL. Et non *Joyel*. Nom vulgaire de l'Haliotide sur les côtes océaniques d'Espagne. (B.)

**CHOELOPUS.** MAM. Illiger propose de former sous ce nom un genre de l'Unau. *V.* BRADYPE. (B.)

\* **CHOENOMÈLES.** BOT. PHAN. J. Lindley, dans son travail sur les Pomacées (*Trans. Soc. Lin. Lond.* 13, p. 97), nomme ainsi un genre qu'il propose d'établir pour le *Pyrus japonica* de Thunberg. Le caractère distinctif de ce genre consiste principalement dans son fruit qui s'ouvre naturellement en cinq valves à l'époque de sa maturité. (A. R.)

**CHOERL.** MIN. Pour *Schorl*. *V.* ce mot.

\* GHOERORYNQUE. POISS. F. SPARK.

CHOETODIPTÈRE. POISS. Sous-genre de Choetodon. F. ce mot. (B.)

CHOETODON. *Choetodon*. POISS. Ce nom fut premièrement créé par Seba, à qui Artedi conseilla de l'employer pour caractériser des Poissons dont les dents, allongées en forme de crin, flexibles et serrées, donnaient à une partie de leur bouche l'air d'être garnie d'une étoffe, ce que Cuvier a désigné par *dents en velours*. Linné, ayant moins égard à cette étymologie qu'à l'aspect général d'une famille nombreuse de ses Poissons thoraciques, appliqua le nom de Choetodon à l'un des genres les plus étendus qu'il ait institués, et dont les naturalistes sentirent bientôt la nécessité de reporter les espèces dans divers genres nouveaux. Lacépède, restreignant le nom de Choetodon aux espèces qui ont réellement les dents en velours, les sous-répartit encore dans les genres Acanthinion, Choetodiptère, Pomacentre, Holacanthé et Enoplose. Il renvoya aux genres Glyphisodon, Acanthuré, Apsisure, Acanthopode et Chevalier (F. tous ces mots), les espèces dont les dents ne sont pas soyeuses. Le genre Choetodon, tel qu'il était autrefois, forme presque en entier avec les Zéés la vingt-deuxième famille de Darnévil, que ce savant nomme des Leptosomes, et celle des Squamipéennes de Cuvier, la sixième de l'ordre des Acanthoptérygiens.

Les véritables Choetodons ont, selon l'auteur de l'excellente histoire du Règne Animal, les dents semblables à des crins par leur finesse et par leur longueur, et rassemblées sur plusieurs rangs serrés, comme les poils d'une brosse; le corps très-comprimé, élevé verticalement, et les nageoires dorsale et anale tellement converties d'écaillés pareilles à celles du dos, qu'on a peine à distinguer l'endroit où elles commencent; leurs opercules n'ont ni dentelures ni épines. Ces Poissons, très-nombreux dans les mers des pays chauds, y sont

peints des plus belles couleurs : la texture semble avoir voulu épouser sur leurs écaillés polies tout l'éclat de ses richesses métalliques; le noir mat de l'Anthracite s'y mêle à l'Or, au Bronze, au Lapis-Lazuli, aux reflets de l'Argent poli, ou à la blancheur de l'Argent mat. Des taches et surtout des bandes tranchées, élégamment disposées, mettent ces diverses couleurs dans les rapports qui en peuvent le mieux faire ressortir le luxe : aussi les Choetodons sont-ils fort recherchés dans les collections, où leur forme et la consistance de leurs écaillés permettent de les conserver aisément, sans qu'ils deviennent méconnaissables. Les iconographes se sont plus à en enrichir leurs ouvrages, et les gourmets en recherchent la chair blanche, délicate et savoureuse. Tous habitent les mers des pays chauds, et s'élèvent peu vers les tropiques. Ils ne sont guère connus que depuis la découverte de l'Amérique, ou depuis que les Portugais commencèrent à explorer les côtes de l'Inde, après avoir doublé le cap de Bonne-Espérance. L'antiquité les ignore complètement. Si l'on considère la bizarrerie de leur forme et le luxe de leur parure, on est tenté de considérer les Choetodons comme occupant parmi les habitants des eaux le rang que les Perroquets occupent parmi les hôtes de l'air. Ils vivent au voisinage des côtes, se plaisent entre les rochers où, s'élevant à la surface des eaux, en réfléchissant les feux du jour, ils ressemblent à des pierres précieuses que les efforts de la vague arracheraient de l'abîme pour les jeter au rivage. Il nous est quelquefois arrivé d'en tuer à coups de fusil au milieu de l'écume des flots. Les intestins des Choetodons sont longs et amples; leurs cœcums grêles et nombreux; ils ont une grande et forte vessie aérienne.

Tout restreint qu'il est, le genre Choetodon est encore l'un des plus nombreux de l'ichtyologie; Cuvier, qui n'a pas cru devoir adopter comme genres toutes les coupures qu'on y a faites, y conserve néanmoins la plu-



part de ces coupures comme sous-genres, ainsi qu'il suit :

† CHÆTODONS PROPREMENT DITS.

*Corps ovale ayant des épines dorsales qui se suivent longitudinalement sans trop se dépasser.*

La plupart des espèces de ce sous-genre sont des mers d'Orient ; les principales sont :

Le ZÉRRE, qu'il ne faut pas confondre avec l'Acanthurus qui porte le même nom spécifique, *Chætodon striatus*, L., Gmel., *Syst. Nat.*, t. I, p. II, p. 1249; Bloch, pl. 205, f. 1. Il a la tête et les opercules couverts d'écaillés semblables à celles du dos ; deux orifices à chaque narine ; l'anus plus près de la tête que de la caudale ; celle-ci est arrondie ; sa couleur générale est d'un beau jaune, avec quatre ou cinq bandes transverses brunes. Les pectorales sont noirâtres. Ce Poisson, l'un des plus grands de ce genre, habite l'Inde où sa chair est fort estimée. D. 10732, P. 14—19, V. 176, A. 5722, C. 17—18.

La TACHE NOIRE, *Chætodon unimaculatus*, L., Gmel., *loc. cit.*, 1258; Bloch, pl. 201, f. 1; Encyc., Poiss. pl. 94, f. 387. Cette espèce, dont la queue est en croissant, est remarquable par une large bande noire qui passe de la nuque à la base des opercules, en comprenant les yeux, et par la grande tache qu'il porte de chaque côté du dos. Il habite les mers du Japon. D. 12715, P. 14, V. 6, A. 1733, C. 16.

Le BRIDÉ, *Chætodon ophiatus*, L., Gmel., *loc. cit.*, 1250; Bloch, pl. 205, f. 2; Encyc., Poiss., pl. 47, f. 163; Séba, III, tab. 35, f. 16. Il diffère du précédent, avec lequel il présente plus d'un rapport, par sa caudale arrondie, par la ligne noire transversale qu'il porte sur la tête, qui est bien plus étroite. Sa tache noire entourée de blanc est située sur les deux côtes de l'origine de la queue, au lieu d'être sur le dos. D. 12753, P. 14, V. 6, A. 1733, C. 16.

Les Chætodons Collier, *C. Collare*,

L., Gmel., *loc. cit.*, p. 1265; Bloch, pl. 216, f. 1. — A huit bandes, *C. octofasciatus*, L., Gmel., 1269, Bloch., 215, f. 1. — Vagabond, *C. vagabundus*, L., Gmel., 1261; Bloch., 204, f. 2. — Ocellé, *C. ocellatus*, L., Gmel., 1260; Bloch., 211, f. 3. — Bimaculé, *C. bimaculatus*, Bloch., pl. 219, f. 1. — Fauçille, *C. Fasciata*, Bloch, p. 246, f. 2. — De Klein, *C. Kleinii*, Bloch, pl. 218, f. 2, et peut-être le Baro de Renard, pl. 20, f. 109, sont les autres espèces communes du sous-genre qui vient de nous occuper.

†† SÉTONS.

*Les rayons mous de la dorsale prolongés dans les mâles en longs filaments.*

Le SÉTON, *Chætodon setifer*, Bloch, pl. 426, f. 1; Pomacentre filament, Lac., Poiss. p. 512. Des dentelures, mal à propos marquées à l'opercule dans la figure de Bloch, ont fait rapporter cette espèce par Lacépède à un genre auquel elle n'appartient pas. Sa caudale est arrondie. Une tache noire bordée de blanc se voit sur la dorsale avec un bandeau pareil sur les yeux, et des raies rangées sur le corps, dont le fond est jaunâtre.

Le COCHER, *Chætodon Auriga*, Foršk., *Faun. Arab*, n° 81, Gmel., *loc. cit.*, 1266. Poisson presque rhomboidal, long de cinq pouces environ, d'un bleu pâle, avec seize fascies brunes parallèles sur le corps. La caudale est tronquée, et l'anale variée de lignes de diverses couleurs. D. 13736, P. 16, V. 176, A. 5724, C. 17.

††† CHÆMONS.

*Museau saillant, s'allongeant au point de former un bec étroit qui donne au Poisson la figure d'un soufflet.*

Le BEC ALLONGÉ, *Chætodon rostratus*, L., Gmel., *loc. cit.*, 1264; Bloch, pl. 203, f. 1; Encyc., Poiss., pl. 45, f. 170; Séba, III, pl. 25, f. 17. Ce Poisson, l'un des plus remarquables du genre par sa forme étrange et la variété de ses couleurs, porte une tache noirâtre entourée de blanc à l'angle qui forme sa dorsale. L'Or et l'Argent

brillent sur sa robe avec quatre fascies transversales et une vingtaine de raies longitudinales de la même couleur dans sa partie postérieure. Le Bec-Allongé se nourrit d'Insectes ; comme les Poissons du genre *Toxote*, il connaît l'art de faire la chasse à ceux-ci en leur lançant de l'eau qui les noie et les fait tomber à la mer : de-là l'usage indien d'en nourrir dans des vases comme nous entretenons des Dorades de la Chine dans nos appartemens. D. 3740 , P. 12—15 , V. 176 , A. 3724 , C. 14—15.

Le SOUFFLET, *Chaetodon longirostris*, Broussonet, *Icht. Dec.*, pl. 7 ; *Encycl.*, Pois., pl. 47, f. 176. Ce Poisson vient de la mer du sud, et Broussonet, qui l'a fait connaître, ne l'a pas trouvé dans les eaux du grand Océan. Sa couleur générale est celle du Citron, avec une tache noire ronde à l'anale, vers la caudale. D. 11735 , P. 15 , V. 176 , A. 3732 , C. 3723.

#### ++++ PLATAX.

Le corps beaucoup plus haut que long, le museau obtus, les épines dorsales cachées dans les bords de la nageoire.

##### A. Les Platax rhomboïdaux.

Le TEIRA, *Chaetodon Teira*, Gmel., *loc. cit.*, 1265 ; Bloch, pl. 199, f. 1 ; *Encycl.*, pl. 43, fig. 167. *Chaetodon pinnatus*, L., Gmel., *loc. cit.*, 1241. C'est le *Daakar* des Arabes qui en recherchent la chair savoureuse. Cependant la figure de l'Encyclopédie (pl. 96, f. 389) paraît fort différente de celle que le même ouvrage donne du Teira. Il habite indifféremment la mer Rouge, les Indes-Orientales, et même l'Amérique. D. 5754, P. 11—17, V. 176, A. 3726, C. 17.

Le VESPERTILION, *Chaetodon Vespertilio*, Gmel., *loc. cit.* ; Bloch, pl. 199, f. 2 ; *Chaetodon* à larges nageoires, *Encycl.*, Pois., pl. 95, f. 388. Cette espèce, des mers de l'Inde, se singularise parmi ses brillantes congénères par la teinte sombre de sa robe. Ses écailles sont fort petites. D. 5741, P. 18, V. 6, A. 3733, C. 17.

#### B. Les Platax orbiculaires.

Le PENTACANTHE, Lac., *Pois.* p. 476, pl. 11, f. 2, dont la Galline du même auteur paraît être un double emploi. Cette espèce n'est connue que par le dessin de Commerson qu'a reproduit Lacépède, et par une description très-insuffisante. Elle est des mers de l'Inde.

L'ORBICULAIRE, *Chaetodon orbicularis*, Forskalh, *Faun. Arab.*, n° 73, Gmel., *loc. cit.*, 1265, dont le *Chaetodon arthriticus* de Schneider paraît être tout au plus une variété. Cette espèce, qui atteint à un pied de longueur, rappelle un peu la forme des Pleuronectes. Il habite les rescifs de la côte arabique.

#### ++++ HENIOCHUS.

Les premières épines dorsales très-prolongées et formant comme un fouet, derrière lesquelles viennent des épines courtes.

La GRANDE ÉCAILLE, *Chaetodon macrolepidotus*, L., Gmel., *loc. cit.*, 1247 ; Bloch, p. 200, f. 1 ; *Encycl.*, Pois., pl. 46, f. 175. La brièveté des descriptions de Lacépède, le peu de rapport qui existe entre le texte et les planches de son grand ouvrage sur les Poissons, ne permettent pas de décider si les deux figures qu'il donne (T. IV, pl. 11, f. 3, et pl. 12, fig. 1) comme seconde et troisième variétés de la Grande Ecaille, sont réellement des variétés ou des espèces distinctes. Nous voyons trop de différences pour pouvoir prononcer, outre que ces figures représentent les objets disproportionnés avec ce qui les environne, et doués de caractères fort différents de ceux qui semblent appartenir au *Chaetodon* qui nous occupe. Celui-ci acquiert jusqu'à vingt-cinq livres de pesanteur. Sa chair est délicieuse, sa couleur est argentée et resplendissante, avec deux fascies brunes transverses sur le corps. D. 11737, P. 2718, V. 176, A. 3723, C. 17.

Le CORNU, *Chaetodon cornutus*, *loc. cit.*, 1241, Bloch, t. 200, f. 2, *Encycl.* pl. 44, fig. 168. La figure

donnée par Lacépède, T. IV, pl. 11, nous laisse encore dans l'incertitude; il est difficile qu'elle puisse convenir au Poisson de Bloch et de Bonnaterre. La disposition de ses bandes noires, les lignes blanches qui s'y mêlent, la tache caudale, la forme générale, semblent indiquer un Animal fort différent. Le *Chaetodon canescens* de Séba, T. III, t. 25, f. 7, nous jette dans les mêmes doutes, et quoique Gmelin (*loc. cit.*, 1240) l'ait pris pour une espèce, il est possible que ce ne soit que la figure d'un individu dont les couleurs avaient été altérées. D. 7/46, P. 18, V. 1/6, A. 3/36, c. 16.

#### ++++ EPHIPPUS.

*Une échancrure entre la partie épineuse et la partie molle de la nageoire.*

L'ARGUS, *Chaetodon Argus*, L., Gmel., *loc. cit.*, 1248, Bloch, pl. 204, f. 1, Encycl., pl. 94, f. 386. Ce Poisson est presque gravé, violâtre en dessus, blanc en dessous, décoré de taches brunes, avec l'iris couleur d'or; il vit d'insectes et habite non-seulement les rivages de la mer, mais encore les marais voisins où il passe pour rechercher les excréments humains. Sa chair est savoureuse. D. 11/28, P. 18, V. 1/6, A. 4/18, c. 14.

L'ORBE, *Chaetodon Orbis*, Gmel., *loc. cit.*, 1244, Bloch, t. 102, f. 2, Encycl., pl. 95, f. 390. Cette espèce, de forme orbiculaire et de couleur bleâtre, a l'iris couleur d'Or, et se trouve dans les mers de l'Inde. D. 9/28, P. 18, V. 1/6, A. 3/19, c. 16.

Le Forgeron, *Chaetodon Faber*, Bloch, p. 215, f. 2. — Le Tétracanthé, *C. Tetracanthus*, Lac., T. III, p. 25, f. 2. — Le Chaetodon en faux, *C. falcatus*, Lac., *penotatus*, Gmel., *loc. cit.*, p. 1240. — Et le Bicorne, *C. bicornis*, Cuv., sont les autres espèces de ce sous-genre.

#### ++++ CHAETODIPTÈRES.

*Deux dorsales.*

Le Plumierien, *Chaetodon Plumierii*, Gmel., *loc. cit.*, 1260, Bloch,

pl. 211, f. 1; Chaetodiptère de Plumier, Lac., Poiss. T. IV, p. 504. Cette espèce est de forme oblongue, recouverte de très-petites écailles, brunâtre en dessus, de couleur cendrée sur les flancs, blanche en dessous et décorée de six fascies ou bandes verdâtres. Elle habite les rescifs des Antilles où sa chair est fort estimée. D. 5/35, P. 14, V. 1/5, A. 2/25, c. 12.

Le TERLA de la côte de Coromandel (Russ. *Corom.* T. I, p. 81) appartient au sous-genre des Chaetodiptères.

Nous ne réunirons pas aux Chaetodons, avec l'illustre Cuvier, les Holacanthes et les Pomacanthes (écrit mal à propos *Pocacanthes*) de Lacépède, les dentelures ou les piquans des opercules qui caractérisent ces genres autorisant à les tenir séparés.

Les Chaetodons, quoique restreints aujourd'hui dans les mers équinoxiales, ont été autrefois répandus sur d'autres parties de la surface du globe; plusieurs de leurs espèces, le Teïra et le Vespertilion particulièrement, sont parfaitement reconnaissables dans les empreintes du mont Belca et prouvent que, parmi ce grand nombre d'Animaux fossiles contemporains d'un vieux monde, s'il est des races qui aient disparu, il en est qui se sont perpétuées jusqu'à nous. (B.)

\* CHOFAR-ERROBAD. BOT. PHAN. (Forsk. alb.) Syn. arabe d'*Ornitogallum flavum*. V. ORNITOGALLÉ. (B.)

CHOFTI. OIS. (Belon.) Syn. vulgaire du Pouillot, *Motacilla Trichilus*, L. V. BEO-FIN. (BR. 24)

CHOIN. *Schœnus*. BOT. PHAN. Genre de la famille des Cypéracées et de la Triandrie Monogynie de Linné, fondé par ce savant naturaliste et présentant les caractères suivans : fleurs glumacées, peu nombreuses, disposées en épis; écailles ou paillettes fasciculées, conniventes et se recouvrant mutuellement; les inférieures vides; les supérieures renfermant

trois étamines à filets capillaires et un ovaire surmonté d'un style caduc, à stigmate trifide, auquel succède une caryopse lenticulaire ou trigone, luisante, n'ayant aucune soie à sa base. C'est par l'absence de soies hypogynes seulement que ce genre diffère des *Chaetospora* de Brown. Ce caractère serait néanmoins de peu de valeur, si l'on admettait avec le professeur DeCandolle (Fl. fr. 3<sup>e</sup> édit.) que les *Schœnus nigricans*, *Sch. ferrugineus*, *Sch. albus* et *Sch. fuscus*, ont leurs fruits munis de trois soies hypogynes.

Tous les *Schœnus* de Linné ne présentent pas les notes distinctives que nous venons de tracer. Il en est dont le port particulier indique aussi des différences dans les organes de la fructification; cependant ces différences se sont trouvées si faibles, quand les Plantes ont été bien examinées, que beaucoup d'auteurs n'ont pas admis leur distinction générique. R. Brown a défini le genre *Schœnus* à peu près comme nous l'avons exposé; il a principalement insisté sur l'absence des soies hypogynes par opposition des caractères qu'il a assignés aux *Chaetospores*; Kunth (*in Humboldt et Bonpland Nova Genera et Spec. Pl. Americ. æquinoct.*) a caractérisé aussi à peu près de même le genre *Schœnus*; cependant il a réuni aux *Chaetospora* de Brown plusieurs *Schœnus* de Linné et les *Rhynchospora* de Vahl. V. ces divers mots. Sous le nom générique de *Cladium* proposé autrefois par Browne (*Jamaïc.* p. 114), l'auteur du Prodrome de la Flore de la Nouvelle-Hollande a décrit une quinzaine d'espèces dont quelques-unes appartenaient aux *Schœnus* de Linné et de Labillardière. Tels sont les *Schœnus mariscus*, L., *Schœnus filum* et *Sch. abutus*, Labill. Au reste, le genre Choïn est très-voisin des Scirpes dont il ne diffère réellement que par la vacuité ou la stérilité de ses fleurs inférieures. La faible importance de ce caractère avait été bien sentie par De Candolle qui, dans la 3<sup>e</sup> édit. de la Flore française, incline vers l'opinion de Hafler; lequel a placé parmi les

Scirpes tous les *Schœnus* dont les fruits sont munis à leur base de ces poils qu'il faut se garder de confondre avec les débris des filets des étamines. Cette affinité des genres *Schœnus* et *Scirpus* a occasionné de la confusion dans les espèces décrites par les auteurs. Ainsi les *Schœnus junceus*, Willd., *Sch. radiatus*, L., etc., sont rapportés aux *Scirpus* par Vahl qui a fait un travail particulier sur ces Plantes, et réciproquement ce botaniste place dans les *Schœnus* le *Scirpus trigynus* de Linné. Ce serait outrepasser les bornes de ce Dictionnaire que de vouloir faire connaître les erreurs et doubles emplois commis par les auteurs relativement aux *Schœnus*. Nous ne parlerons pas non plus des nouveaux genres formés avec les démembrements de celui-ci, tels que les *Dichromena*, *Mariscus*, *Melancranis*, *Rhynchospora* et *Machærina*. Sous chacun de ces mots il sera parlé des Choïns qui ont servi à les établir.

Les Choïns sont des Plantes herbacées marécageuses, répandues sur tous les points de l'ancien et du nouvel hémisphère, plus nombreuses néanmoins dans les régions équinoxiales. On en compte plus de cinquante, dont un petit nombre habite la France. Car si on retire de ce genre le *Sch. Mariscus* qui, comme nous l'avons dit plus haut, est une espèce de *Cladium*, on ne rencontre chez nous que les *Sch. nigricans*, *Sch. ferrugineus*, *Sch. albus*, *Sch. fuscus* et *Sch. mucronatus*. Ce sont des Herbes fort peu importantes à connaître sous le rapport de l'utilité et de l'agrément. Nous n'en donnerons donc pas de description détaillée. (G. N.)

Les Kalmoucks donnent le nom de CHOÏN à la Fraïse. (B.)

CHOÏN (PIERRE DE). MIN. Nom vulgaire sous lequel on désigne un calcaire coquillier de transition qui se trouve aux environs de Lyon, et avec lequel sont bâties plusieurs constructions importantes de cette ville. (G.)

**CHOIN JALMA.** NAM. Syn. kal-mouch de *Mus jaculus*, Pall. *V. GENBOISE.* (B.)

**CHOINA ou CHOYKA.** BOT. PHAN. Syn. polonais de *Pinus sylvestris*. *V. PIN.* (B.)

**CHOINE.** BOT. PHAN. (L'Ecluse.) Syn. présumé d'*Anona muricata*, L. *V. ANONE.* (B.)

**CHOIRADOLETRON.** BOT. PHAN. (Dioscoride.) Syn. de *Xantium*. *V. LAMPOURDE.* (B.)

\* **CHOISYE.** *Cholsya*. BOT. PHAN. Kunth, dans le sixième volume des *Nova Genera et Spec. Pl. Am. æquin.*, vient de proposer ce nouveau genre de Plantes, qu'il range dans la famille des Diosmées ou Rutacées de Jussieu. Il lui assigne pour caractères : des fleurs hermaphrodites, ayant un calice formé de cinq sépales caducs ; une corolle de cinq pétales hypogynes, ongiculés à leur base, également caducs. Les étamines, au nombre de dix, dont cinq alternes avec les pétales sont plus longues, s'insèrent sous l'ovaire. Les filets sont libres et non soudés ; les anthères cordiformes, à deux loges qui s'ouvrent par une fente longitudinale. L'ovaire est sessile, à cinq loges contenant chacune deux ovules superposés et fixés à l'axe central. Il n'y a pas de disque. Le style se termine par un stigmate capitulé et à cinq lobes. Le fruit est une capsule ovoïde, à cinq côtes et à cinq cornes à son sommet. Elle offre cinq loges.

Ce genre est voisin du *Zanthoxylum*, mais en diffère par ses fleurs hermaphrodites, par son calice grand et caduc, par ses étamines au nombre de dix, par son ovaire simple, son style unique et la structure de son fruit.

Le *Cholsya ternata*, Kunth (*loc. cit.*, p. 6, t. 513), est un Arbuste très-rameux, portant des feuilles opposées, composées de trois folioles très-entières, ponctuées et glanduleuses. Ses fleurs sont blanches, pédicellées,

réunies à l'aisselle des feuilles supérieures. On le cultive à Mexico.

Kunth pense que le *Fagara capensis* de Thunberg appartient probablement à ce genre, dont il forme une seconde espèce. (A. R.)

\* **CHOLEOS.** ois. (Belon.) Syn. ancien du Geai, *Corvus glandarius*, L. *V. CORBEAU.* (DR. Z.)

\* **CHOLESTERINE.** CHIM. Substance particulière que l'on obtient des calculs biliaires humains en les traitant par l'Alcool bouillant et en abandonnant à la cristallisation la liqueur suffisamment filtrée et évaporée. La matière cristalline qui en résulte est blanche, brillante, insipide, fusible à une température de cent trente-sept degrés. Passé cette élévation, elle se décompose en laissant un résidu charbonneux. (DR. Z.)

**CHOLÈVE.** *Choleva*. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, établi par Latreille (*Gener. Crust. et Insect.*, T. II, p. 26) et ayant pour caractères ; palpes maxillaires terminés brusquement en alène ; les deux premiers articles des antennes peu différens des suivans en grosseur et par la forme. Les Cholèves, qui appartiennent (Règn. Anim. de Cuv.) à la grande famille des Clavicornes, ont, de même que les Nitidules et les Scaphidiées, des mandibules comprimées et échancrées au bout ; mais elles diffèrent de ces deux genres par leurs palpes maxillaires et par leurs antennes qui grossissent insensiblement, ou forment peu à peu une massue très-allongée et composée d'articles lenticulaires ou en forme de toupie. Ces Insectes ont le corps ovale, élevé, convexe en dessus avec la tête penchée ; ils sont très-agiles et vivent sous les écorces des vieux Arbres, dans les Champignons pourris. Nous ne connaissons rien de leurs mœurs.

Ce genre comprend les Catops de Fabricius et de Paykull. Il correspond à celui des Plomaphages de Knoch et d'Illiger, on pourrait aussi lui réunir les Miscoques de Latreille.

Le genre *Choliva* renferme un assez grand nombre d'espèces; Spence (*Linn. Societ. Trans.* T. XI, p. 123) en a donné une très-bonne monographie. Il en décrit jusqu'à dix-huit, qu'il range dans trois sections basées sur la forme des antennes et du thorax. Parmi ces espèces, nous en citerons quelques-unes pour la synonymie, et nous les choisirons dans chaque section.

**LA CHOLÈVE OBLONGUE**, *Ch. oblonga*, Latr., Spence, ou le *Catops elongatus* de Paykull (*Fauna Suecica*, T. 1, p. 345, 3), et de Gyllenhal (*Ins. Suec.*, T. 1<sup>er</sup>, p. 281, 6), qui est la même espèce que la *Cistela augustata* de Fabricius, le *Carabus rufescens* d'Herbst (*Archiv.* V, 139, 40?) et le *Luperus cisteloïdes* de Erölich (*Natur. Forsch.* T. XXVII, p. 25, 3, t. 1, fig. 15).

**LA CHOLÈVE TRISTE**, *Chol. tristis*, Latr., Spence, ou le *Dermeates fornicatus* de Rossi (*Fauna Etrusca*, 352, 31?), qui ne diffère pas de la *Cistela ovata* d'Olivier, de l'*Helops tristis* de Panzer (*Faun. Ins. Germ.*, T. VIII, 1) et du *Tritoma Morio* de Fabr. (*Entom. Syst.*) ou de son *Catops Morio* (*Syst. Eleuther.*).

**LA CHOLÈVE VELOUTÉE**, *Ch. villosa*, Latr., Spence, ou le *Bouclier brun velouté* de Geoffroy (*Hist. des Ins.* T. 1<sup>er</sup>, p. 123), qui est la même que le *Peltis villosa* de Fourcroy (*Hist. Ins. Par.*), ou le *Catops truncatus* de Gyllenhal (*loc. cit.* T. 1<sup>er</sup>, p. 279, 3). Cette espèce se rencontre aux environs de Paris.

Spence (*loc. cit.* p. 158) place dans ce genre, sous le nom de *Cholève brune*, *Ch. brunnea*, le *Myllæchus brunneus* de Latreille (*Gener. Crust. et Ins.*, t. 8, fig. 11) ou l'*Hallominus testaceus* de Panzer (*Faun. Ins. Germ. fasc.* XVII, 23). (AUD.)

**CHOLIBA**. ORS. Espèce du genre *Chouette*, *Strix Chotiba*, Vieill. *V. CHOUETTE*. (DR..Z.)

**CHOLODOK**. BOT. PHAN. Syn. russe de *Rubus fruticosus*. *V. RONCE*. (B.)

**CHOLSA**. BOT. PHAN. Syn. persan

de *Persea odorata*, *La. V. PERSIERA*. (B.)

\* **CHOMAESCH**. BOT. PHAN. (Forsk. kalh.) Nom arabe d'une variété d'Oranger. (B.)

\* **CHOMAH**. BOT. PHAN. (Forsk. kalh.) Syn. arabe de *Ruellia hispida*. *V. RUELLIE*. (B.)

**CHOMAK**. MAM. Syn. russe de Hamster. *V. ce mot*. (B.)

**CHOMEITAH**. OIS. (Savigny.) Syn. égyptien de l'Orfraie, *Falco Ossifragus*, L. *V. AIGLE*. (DR..Z.)

**CHOMÉLIE**. *Chomelia*. BOT. PHAN. Genre de la famille des Rubiacées et de la Tétrandrie Monogynie de Linné, établi par Jacquin et adopté par Jussieu, qui le caractérise ainsi : calice turbiné, court, à quatre divisions; corolle dont le tube long et étroit est terminé par un limbe aussi à quatre divisions. Fruit drupacé, soudé avec le calice, contenant une noix biloculaire et disperme.

Une seule espèce, *Chomelia spinosa* (Jacq. *Plant. Amer.* 18, t. 13) compose ce genre. C'est un petit Arbuste indigène des forêts de Carthagène en Amérique, très-rameux et armé d'épines nombreuses placées dans les aisselles des ramuscules; ses feuilles sont terminales au sommet des branches, et ses pédoncules sont axillaires et solitaires. Chacun de ceux-ci porte ordinairement trois fleurs.

Lamarck (*Encycl. méth.*) prétend que ce genre est identique avec l'*Isora*. Swartz (*Flor. Amer. Occid.*) y réunit encore une espèce, le *Chomelia fasciculata*, qui, selon Willdenow, appartient également aux *Isora*. Le *Chomelia* de Linné (Genera, 2<sup>e</sup> édit.) doit être distingué du genre dont nous traitons ici. Linné lui-même l'a placé depuis parmi les *Rondeletia*, et A. de Jussieu (*Mém. sur les Rubiacées*, *Mém. du Mus. d'Hist. Nat.*, vol. VI, année 1830) doute s'il doit rester dans ce dernier genre. Cat. Arbust. appelé *Cupi* par Rhéda et Adanson, ou le *Canthium* de Lamarck ou le *Wobera*

de Willdenow. S'il a pour fruit une baie polysperme, comme l'assurent Rhéede et Gaertner fils, on doit le distinguer généralement du *Canthium*, et alors en reconstituer le genre *Webera*. V. ce mot. Au surplus, le nombre cinq de ses étamines ne permet aucunement de le confondre avec le genre *Chomelia* de Jacquin. Par la simple citation des noms imposés à ces Plantes, on peut juger combien leur connaissance, pour être parfaite, laisse encore à désirer. (G. N.)

CHOMET. OIS. V. CHAUMERET.

CHOMET. REPT. OPH. Syn. hêtre d'*Anguis fragilis*. V. ORVET. (B.)

CHOMEYTAH-EL-KEBYR. OIS. Syn. arabe du grand Vautour barbu, *Phene gigantea*, Savig. V. VAUTOUR. (DR. Z.)

CHON. OIS. Syn. du Coucou gris, *Cuculus canorus*, L., chez les Tartares. V. COUCOU. (DR. Z.)

\* CHON-AMBASA. MAM. (Salt.) Syn. abyssinien de Garacal. Espèce du genre Chat. V. ce mot. (B.)

CHONDODENDRON. BOT. PHAN. Ruiz et Pavon, dans leur Flore du Pérou, ont institué ce genre nouveau de la famille des Ménispermées et de la Diœcie Hexandrie pour une Plante sarmenteuse, grimpante, ayant les feuilles cordiformes, acuminées, crénelées et tomenteuses à leur face inférieure. Cette espèce, dont l'écorce est très-amère, et dont on ne connaît que les fleurs mâles, a été rapportée par Persoon (*Synops. Plant.*) au genre *Epibatium* de Forster, et plus récemment, le professeur De Candolle (*Syst. Nat. Végét.*) en a fait une espèce de son genre *Cocculus* sous le nom de *Cocculus Chondodendron*. V. COCCULUS. (A. R.)

CHONDRACANTHE. *Chondracanthus*, genre de la famille des Epinoïdes de Lamarck. L'Abbé sans vert. T. III, p. 255, établi par De-

laroche (Nouv. Bull. des sciences, T. II, p. 240, pl. 2, fig. 27). Les caractères qu'il lui a assignés sont : corps ovale, inarticulé, couvert d'épines cornées, dirigées en arrière; tête armée de deux pincées cornées et de deux tentacules courts; col court et aplati; ovaire externe, ovale, recourbé entre les épines postérieures.

Delaroche a caractérisé ce genre d'après une espèce qu'il a observée sur les branchies du Poisson Saint-Pierre (*Zeus Faber*, L.) Depuis, Blainville lui a donné les caractères suivants : corps symétrique pair, sub-articulé, recouvert d'une peau comme cartilagineuse, assez dure, partagée en thorax et abdomen; le premier formant une sorte de tête bien distincte, avec la bouche armée d'espèces de palpes; le second pourvu de chaque côté d'un certain nombre d'appendices pairs, divisés en plusieurs lobules; rudimens de membres et branchies terminés en arrière par deux ovaires de forme un peu variable.

Ce genre se rapproche beaucoup des Lernées et des Caliges par sa manière de vivre; mais il se distingue des premiers par ses tentacules non en forme de bras, par son corps court, ovale et chargé d'épines cartilagineuses, et des seconds, par l'absence des pieds.

Ces Animaux sont parasites et vivent sur les branchies des Poissons. La seule espèce bien connue est le Chondracanthus du Poisson Saint-Pierre, *Chondracanthus Zei* (Delar.) Il est le même que celui décrit par Blainville sur un individu envoyé par Leach et trouvé sur un Thon. La description de Blainville étant plus étendue, nous en donnerons l'extrait : ce que Delaroche a nommé la tête lui semble devoir être regardé comme le thorax; il est convexe en dessus et concave en dessous; de chaque côté de la ligne médiane et au bord antérieur du thorax est un tubercule ovulaire placé de champ. Sa base est en dedans, et il est séparé de celui qui lui est opposé par une rainure assez

profonde qui se prolonge en dehors par un petit tentacule conique collé contre le bord antérieur du thorax. Cette espèce de thorax a sa partie supérieure occupée par une sorte de bouclier corné sous la peau; de chaque côté est un bourgeon charnu qui donne à ce thorax l'apparence d'une ventouse. Dans son milieu et antérieurement, est une paire d'organes légèrement cornés, recourbés en dedans; au-dessus, est évidemment la bouche qui paraît oblique. Le rétrécissement qui suit le thorax a de l'analogie avec l'espace qui, dans le Cyame, porte les fausses pattes; on y distingue trois articulations dont la première plus courte sans appendice, et les deux autres portant chacune une paire latérale à trois rameaux.

L'abdomen, beaucoup plus large en avant, se rétrécit vers l'arrière; on n'y distingue que deux anneaux; l'antérieur, qui est le plus large, porte une paire d'appendices divisés en trois rameaux coniques recourbés en dedans. Le dernier anneau offre également une paire d'appendices, mais les trois branches sont subdivisées.

On doit peut-être encore regarder comme un anneau une espèce de queue qui termine le corps, recouvre la base des ovaires, et est composée de deux cornes. Enfin, l'abdomen est terminé par une bande transverse au-delà de laquelle on voit deux tubercules d'où dépendent les sacs des ovaires, et une autre paire de petits corps cylindriques renflés à leur extrémité au milieu desquels est l'anneau.

Il serait possible que plusieurs Lernées appartenissent à ce genre. Cuvier (Regn. Anim., pl. 15, fig. 3, 4 et 6) en rapproche trois espèces qui lui paraissent avoir quelques caractères propres à ce genre; mais comme il n'a pas accompagné ses figures de descriptions, il est difficile de

les reconnaître. (6.)

CHONDRACHNE. Chondrachne.

BOT. PHAN. Le *Restio articulatus* Retz (Obs. 4, p. 15) est devenu le type de ce nouveau genre que L. Brown a proposé d'établir et qui place dans la famille des Cypéracées. Il lui donne pour caractères : des fleurs disposées en épi, dont les écailles sont cartilagineuses et imbriquées de tous côtés; à la base de chaque écaille existe un épillet multiflore au drogyne, formé de paillettes fasciculées, dont les extérieures constituent autant de fleurs mâles et monandres au centre desquelles existe un ovaire comprimé surmonté d'un style bifide. Il n'y a point de soies hypogynes.

Le célèbre auteur du *Prodromi Floræ Novæ-Hollandiæ* dit que ce genre, qui a le port des *Charizandras* pourrait bien être le même que le professeur Richard avait précédemment établi dans le *Synopsis* de Persoon, sous le nom de *Lepironia*. Mais tout en convenant de l'affinité de ces deux genres, nous ne partageons point entièrement l'opinion de R. Brown. En effet, dans le *Lepironia*, à la base de chaque écaille on trouve un épillet hermaphrodite et uniflore, formé d'un grand nombre d'écailles, dont les deux plus externes, qui sont plus carénées, constituent une sorte de glume bivalve. On trouve à leur intérieur quinze ou seize écailles plus étroites et comme lancéolées, et quatre à six étamines, dont les anthères sont linéaires, et un pistil surmonté d'un style bipartit. V. LÉPIRONIE. (A. R.)

CHONDRE. *Chondrus*. BOT. CRYPT. (*Hydrophytes*.) Genre de la famille des Floridées; il offre pour caractères des tubercules hémisphériques ou ovales, situés sur la surface des feuilles ou des frondes, jamais sur les bords ni aux extrémités, et ne formant saillie que d'un seul côté; feuilles planes et rameuses. Stackhouse dans son ouvrage sur les Fucus, intitulé *Fucus britannica*, etc., a proposé ce genre que nous adoptons, mais en changeant les caractères,



cause des nouvelles espèces que nous avons ajoutées. Ce savant botaniste le définit ainsi : *pericarpium ovatum, immersum, utrinque proeminens; seminulis intus in muco pellucido*. Les espèces ou les individus dans lesquels le même tubercule est saillant des deux côtés, sont si rares que nous n'en avons pas encore vu. Ces tubercules, assez nombreux, hémisphériques ou ovales, plus ou moins allongés, ont dans certaines espèces deux à trois millimètres de largeur; ordinairement ils sont plus petits. Nous n'avons jamais trouvé de double fructification sur les Plantes de ce genre. L'organisation paraît formée d'un tissu cellulaire plus égal et beaucoup plus solide que celui des Delesseries; elle résiste plus long-temps aux fluides atmosphériques, et semble braver la fureur des vagues. Les feuilles diffèrent entièrement de celles des Delesseries de la première section, et un peu moins des feuilles des espèces du même genre, classées dans la troisième section; de même que ces dernières, elles sont dépourvues de nervures. On pourrait les considérer comme une dilatation de la tige qui se divise en de nombreuses dichotomies: ces feuilles sont quelquefois mamillaires ou prolifères. La couleur ne présente point les brillantes nuances des Plantes du genre Delesserie; il semble que le violet et le pourpre foncé soient l'apanage de celui-ci, tandis que le rouge décore les feuilles des Delesseries: quelquefois une légère teinte de vert se mêle à ces couleurs. Les *Chondrus* périssent à l'époque de la maturité des graines; quelques espèces, des régions tempérées ou équatoriales, paraissent bisannuelles.

Les *Chondrus* sont rarement parasites, et se plaisent davantage sur les rochers calcaires, argileux ou schisteux, que sur les Granits et les Quarz. Ce genre est composé de plusieurs espèces sujettes à beaucoup de variations; nous avons nommé la première *Chondrus polymorphus*, à cause de ses innombrables variétés;

le *Ch. norvegicus* se trouve également sur les côtes de France et d'Angleterre; le *Ch. Agathicus* est consacré à Bonnemaison, notre ami, botaniste distingué par ses travaux sur les Hydrophytes. Il en existe encore plusieurs espèces qu'il serait trop long de mentionner. (LAM., X.)

**CHONDRIE.** *Chondria*, BOT. CRYPT. (*Hydrophytes*.) Agardh, dans son *Synopsis Algarum Scandinaviae*, propose sous ce nom un genre d'Hydrophytes dans lequel se trouvent réunis nos genres Choudrus, Acanthophores, Bryopsis, Furcellaria, ainsi que plusieurs espèces de Laurencies et de Gigartines; ces rapprochemens nous empêchent d'adopter le genre Chondrie. (LAM., X.)

**CHONDRILLE.** *Chondrilla*, BOT. PHAN. Genre de la famille des Synanthérées, tribu des Chicoracées et de la Syngénésie égale de Linné.

Il ne diffère du *Prenanthes* que par ses aigrettes pédicellées, tandis qu'elles sont sessiles dans ce dernier genre: aussi Lamarck (Encyc. méthod.) n'hésite-t-il pas à les réunir, trouvant ce caractère insuffisant pour en autoriser la distinction. Néanmoins, quelque peu tranchées que soit leur différence, la plupart des auteurs ont continué de les distinguer. Gaertner, analysant les fruits de deux espèces qui croissent en Europe, les a comprises dans son genre *Chondrilla*, qui ensuite a été adopté sans changements par les auteurs de la Flore française, 5<sup>e</sup> édition. A.-L. de Jussieu avait aussi distingué, dans son *Genera Plantarum*, le *Chondrilla* du *Prenanthes*, en observant toutefois leur faible distinction; quand on considère, en effet, l'intimité des rapports du *Chondrilla muralis*, D. C., avec les *Prenanthes*, on est bien tenté de faire abstraction du petit pédicelle de son aigrette et de le faire rentrer dans ce genre. Alors le *Chondrilla juncea* resterait seul dans le genre, si celui-ci devait continuer à être séparé. Quoiqu'il en soit, voici les caracté-

res qu'on lui a généralement assignés : involucre cylindrique, resserré au sommet après la fécondation, composé de folioles disposées sur deux rangs, huit antérieures conniventes, et les extérieures formant une sorte de calicule à l'involucre; demi-fleurs au nombre de dix à douze dans la Calathide; akènes surmontés d'aigrettes capillaires stipitées.

La *CHONDRILLE EFFILÉE*, *Chondrilla juncea*, L., croît sur le bord des champs et des vignes dans toute la France méridionale et jusqu'aux environs de Paris; sa tige, qui s'élève à huit décimètres, est rameuse, dure et hispide inférieurement; elle porte des feuilles radicales, longues et demi-pinnatifides, et des feuilles caulinaires tellement étroites, que la tige semble nue et prend l'apparence de celle de certains Juncus, ce qui lui a valu son nom spécifique. Quant aux autres Chondrilles, c'est-à-dire aux Chicoracées que l'on a associées avec la précédente, nous avons exprimé notre manière de voir sur les rapports plus marqués qu'elles offrent avec les *Prenanthes*, et quoique le nom de *Chondrilla* soit plus ancien et qu'il ait été uniquement employé par Lamarck, c'est sous le nom de *Prenanthes* que nous mentionnerons les espèces remarquables appelées Chondrilles par quelques auteurs. *V. PRÉNANTHES*. (G. N.)

\* *CHONDRIS*. BOT. PHAN. (Pline.) Syn. présumé de *Marrubium Pseudo-dictamnus*. *V. MARRUBE*. (B.)

*CHONDROPETALUM*. BOT. PHAN. (Rottbott.) Syn. de *Restio*. *V. ce mot*. (B.)

*CHONDROPTÉRYGIENS* ou *CARTILAGINEUX*. *Chondropterygii*. POIS. Artedi le premier, distinguant avec sagacité la différence qu'établissait entre les Poissons la nature du squelette, forma l'ordre des Chondroptérygiens. Induit en erreur par une observation superficielle des organes respiratoires, Linné, dans les premières éditions de son immortel

*Systema Naturæ*, transporta, pour former un ordre, les Chondroptérygiens dans la troisième classe du Règne Animal sous le nom de Reptiles nageans. Il est inexact de dire que, depuis, Lacépède particulièrement a détruit cet ordre; Linné lui-même avait reconnu son erreur, et l'on trouve dans Gmelin les Chondroptérygiens replacés à la suite des Poissons dont ils sont le sixième et dernier ordre. Les genres *Acipenser*, *Chimæra*, *Squalus*, *Raia* et *Petromyzon* l'y constituent.

Etendant outre mesure le nom de Cartilagineux, H. Cloquet, dans un très-savant article du Dictionnaire de Levrault, y joint, à l'exemple de Du ménil, ce que Linné, d'après Artedi, appelait les Branchiostéges. Nous les en séparons avec Cuvier, parce que ces Branchiostéges, qui sont devenus en partie les Plectognathes du Règne Animal (T. II, p. 144), et qui, pour avoir quelques rapports avec les Chondroptérygiens par l'imperfection de leurs mâchoires ou l'endurcissement tardif de leur squelette, ne finissent pas moins par l'état fibreux de ce même squelette, présentent en général toute la structure des Poissons osseux. Rentré dans ses anciennes limites, soit qu'on les place à la tête ou à la fin de la classe des Poissons, l'ordre des Chondroptérygiens est fort naturel, il se fait remarquer par une singulière combinaison d'organisation. Le squelette demeure toujours mou, cartilagineux, sans qu'il s'y développe jamais de fibre osseuse; le peu de matière calcaire, quand il s'en dépose en quelques parties, s'y dispose par grains épars sans ordre : de-là vient que le crâne tout d'une pièce, ne présente pas de sutures, quoiqu'on y distingue imparfaitement les parties qui constituent le crâne des autres Poissons. Les articulations de la colonne vertébrale disparaissent même dans certains genres, et cette disparition est graduelle, car elle n'est pas complète chez les Raies, tandis que dans Lamproie il reste à peine des traces

analogues qui indiquent l'état rudimentaire des vertèbres, de sorte que, par ce passage, on arrive insensiblement des Poissons aux Invertébrés. Cependant le système nerveux et tout ce qui appartient à la nutrition, est aussi complet dans les Chondroptérygiens que dans les autres Poissons, et l'appareil générateur, s'y trouvant en général plus perfectionné, rapproche entièrement ces Animaux des Reptiles les mieux pourvus sous ce rapport. Cuvier remarque comme le caractère le plus positif des Chondroptérygiens, l'absence des os maxillaires et intermaxillaires qui portent ordinairement les dents, et dont les fonctions sont ici remplies par les analogues des palatins et quelquefois du vomer.

Deux sous-ordres sont fort naturellement établis parmi les Chondroptérygiens. Le premier comprend ceux qui ont les branchies fixes, le second ceux qui les ont libres.

Les Chondroptérygiens à branchies fixes, au lieu que ces organes ouvrent tous leurs intervalles dans une large fosse commune, comme la chose arrive généralement, les ont au contraire adhérens à la peau par le bord externe, en sorte que les branchies, ainsi disposées, laissent échapper l'eau par autant de trous percés dans cette peau qu'il y a d'intervalles entre elles. Ce premier sous-ordre renferme deux familles, celle des Cyclostomes ou Suceurs qui contient les genres Lamproie, Ammocète et Myxine, et celle des Sélaciens qui contient les genres Squal, Squatina, Scie, Raie, Chimère et Callorynque.

Les Chondroptérygiens à branchies libres ont celles-ci très-fendues, garnies d'un opercule, mais sans rayons à la membrane. Une seule famille, celle des Sturioniens, compose ce sous-ordre et renferme les deux genres Esturgeon et Polyodon. *V.* tous ces mots. (B.)

**CHONDROSION.** BOT. PHAN. Pour *Chondrosium*. *V.* ce mot.

**CHONDROSUM.** BOT. PHAN. Genre de la famille des Graminées, proposé

par Desvaux, adopté par Beauvois dans son *Agrostographie* et par Kunth dans les *Nova Genera et Species Americ.* de Humboldt. Il se compose de quatre à cinq petites Plantes ayant les chaumes simples ou rameux à la base et réunis en touffe; les feuilles planes et linéaires; les épis terminaux, solitaires ou géminés. Leurs épillets sont unilatéraux et contiennent deux fleurs, l'une hermaphrodite, l'autre stérile, portant trois arêtes; la lépicène est bivalve: la glume de la fleur hermaphrodite est également à deux valves, l'inférieure à cinq dents, dont trois se terminent en pointe aristée à leur sommet. Les étamines sont au nombre de trois; l'ovaire est surmonté de deux styles et de deux stigmates en forme de pinceau. Le fruit est nu.

Toutes les espèces de ce genre sont originaires du continent de l'Amérique méridionale. (A. R.)

**CHONDRUS.** BOT. CRYPT. *V.* CHONDRE.

**CHONGOR-GALU.** OIS. Syn. indien du Cygne de Guinée, *Anas cygnoides*, L. *V.* CANARD. (DE. S.)

\* **CHONIDETROS.** BOT. PHAN. (Daléchamp.) Sorte de gomme peu connue de Bernéo, employée, dit-on, pour la sophistication du Succin. (B.)

**CHONIN.** BOT. PHAN. Dans les dialectes tartares ce mot désigne les Genevriers, et l'on nomme CHONIN-ATZA le *Juniperus lycia*, et CHONIN-ARTCHAN la Sabine. *V.* GENEVRIER. (B.)

**CHON-KUI.** OIS. Il paraît que c'est un Oiseau de proie dressé pour la chasse, que certaines hordes tartares sont dans l'usage d'offrir en hommage aux souverains, qui ont bien soin d'exiger que ces Oiseaux soient ornés de colliers en pierres précieuses. L'espèce n'en est pas déterminée. Quelques-uns ont cru que les Chon-kuis étaient des Butors. (B.)

\* **CHONTA.** BOT. PHAN. Syn. péruvien du *Martineria* de la Flore du Pérou. *V.* ce mot. (B.)

\* **CHO-O.** BOT. PHAN. (Gaimard.)  
Syn. de *Coco* aux îles Carolines. (G.)

\* **CHOOMPACO.** BOT. PHAN. Syn.  
malais de *Michelia*. *V.* ce mot. (B.)

**CHOOPADA.** BOT. PHAN. Même  
chose à Sumatra que le *Champadaha*  
des Malais. *V.* ce mot. (B.)

**CHOPA.** ROIS. Même chose que  
*Chepa*. *V.* ce mot.

**CHOPART** ou **CHOPPARD.** OIS.  
(Salerne.) Syn. de *Bouvrenil* en Pi-  
cardie. (B.)

**CHOPERA.** BOT. PHAN. Syn. es-  
pagnol de *Bourdaïne*. (B.)

**CHOPI.** OIS. Espèce du genre *Trou-  
piale* du Paraguay. *V.* **TROUPIALE.**  
(DR. Z.)

**CHOQEART.** OIS. Même chose que  
*Choard*. *V.* **PYRRHOCORAX.**

\* **CHORAGUE.** *Choragus.* INS.  
Genre de l'ordre des Coléoptères, sec-  
tion des Tétramères, établi par Kirby  
(*Linn. Societ. Trans.* T. XII, p. 447),  
et ayant, suivant lui, pour caractères:  
palpes presque soyeux, avec le dernier  
article aigu; antennes de onze arti-  
cles, les deux de la base plus gros et  
les trois derniers en massue; corps  
cylindrique; tête fléchie en dessous,  
avec un chaperon allongé. L'espèce  
qui a servi à l'établissement de ce  
nouveau genre, a tout au plus une  
demi-ligne de longueur. Elle se rap-  
proche des *Cis* et des *Gribouris*; Kirby  
la désigne sous le nom de *Chorague*  
de *Sheppard*, *Chor. Scheppardi*, en  
l'honneur d'un ami de ce nom qui a  
trouvé cet insecte rare en Angleterre  
près d'Osion. Il saute très-vivement.  
Kirby (*loc. cit.* pl. 22, fig. 14) l'a re-  
présenté avec beaucoup de soin.  
(AUD.)

\* **CHORAM.** ROIS. *V.* **SCOMBRE-  
SOCE.**

**CHORAS.** NAM. Syn. de *Mandril*.

**CHORBA.** ROIS. Syn. de *Amouck*  
d'*Acipenser* *Uro*. *V.* **ESTURGEON.** (B.)

**CHORDE.** *Chorda.* BOT. CRYPT. (*Hy-*

*drophytes.*) Genre de la famille des Fu-  
cacées, ayant pour caractères d'avoir  
une tige simple, cylindrique, cloi-  
sonnée intérieurement. Stackhouse a  
donné le nom de *Chorda* que nous  
avons adopté à un groupe de Tha-  
lassiophytes dans lequel il réunit les  
*Fucus filum*, *flagelliformis* et *thrix*. Ce  
dernier est évidemment le premier  
dans son enfance, et le second ap-  
partient au genre *Gigartina*, jusqu'à  
ce que sa fructification soit connue.  
L'auteur de la Néréide britannique ne  
l'avait placé qu'avec doute à côté du  
*F. filum*. Son caractère générique  
est fondé sur la fructification; il dit:  
*Granula seminifera suborbicularia*,  
*adnata vel immersa, sessilia vel po-  
dunculata*. Cette phrase est trop gé-  
nérale, surtout pour une Plante dont  
la fructification n'a pas été bien ob-  
servée. Roth la place dans une cap-  
sule en forme de glande, solitaire, si-  
tuée à l'extrémité de la Plante. Stack-  
house prétend que cette fructification  
est ordinairement renfermée dans la  
tige, sous forme de petits grains nus  
et adhérens aux parois. Nous avons  
examiné une grande quantité de *F.  
filum*; jamais nous n'y avons trouvé  
la glande terminale de Roth, et nous  
n'osons regarder les petits grains de  
Stackhouse comme des corpuscules re-  
productifs. La fructification ne se-  
rait-elle pas plutôt, sous forme d'ex-  
croissances tuberculeuses que l'on ob-  
serve quelquefois sur la partie infé-  
rieure de la tige tout près de la ra-  
cine?

La tige des *Chorda* est constam-  
ment simple, sans feuilles et sans ra-  
meaux. L'intérieur est partagé par  
des cloisons horizontales, entières ou  
perforées au centre, et qui paraissent  
former une spirale lorsque la Plante  
se tord, ce qui lui arrive en vieillis-  
sant. — La couleur est olive foncée,  
prenant les nuances des autres Fuca-  
cées par l'exposition à l'air et à la lu-  
mière. — La durée de la vie de ces  
Plantes varie suivant les espèces et  
peut être suivant la latitude, où on  
les trouve.

Nous avons placé le genre *Chorda*

avec les Fucacées, parce qu'il s'éloigne de toutes les autres familles de Thalassiphytes par ses caractères, et qu'il se rapproche de celles-ci par la couleur, les changemens que l'action de l'air et de la lumière lui font éprouver, et les poils que l'on observe sur sa surface à certaines époques de l'année. Le genre *Chorda* ne serait-il pas sur autres Fucacées ce que sont peut-être les Conferves marines colorées en rouge aux Thalassiphytes de l'ordre des Floridées? — Il n'est encore composé que de trois à quatre espèces, une seule est connue des botanistes sous le nom de *Fucus filum*. (LAM. X.)

\* **CHORDARIE**. *Chordaria*. BOT. CRYPT. (*Hydrophytes*.) Agardh; dans le *Synopsis Algarum Scandinavica*, a établi, d'après Link, un genre d'Hydrophytes inarticulées sous le nom de *Chordia*. Nous ne croyons pas devoir l'adopter, parce qu'il comprend des espèces qui n'ont entre elles aucun rapport d'organisation et de reproduction, telles sont par exemple les *Fuc. rotundus* et *filum* de Gmelin, les *Fuc. flagelliformis* et *Cabrera* de Turner. (LAM. X.)

**CHORDONES**. BOT. PHAN. Syn. espagnol de Framboisier. F. RONCE. (B.)

**CHORDOSTYLUM**. BOT. CRYPT. (*Champignons*.) Gmelin a proposé de faire un genre distinct des *Clavaria*, sous le nom de *Chordostylum*, mais ce genre n'a pas été adopté. F. CLAVIERE. (A. B.)

**CHORECHOBI**. ARABEN. Desma-est donne ce nom Kalmouck comme synonyme de Gâtéodé. (G.)

**CHORETRE**. *Choretrum*. BOT. PHAN. Ce genre dont R. Brown est l'auteur fait partie de la nouvelle famille des Santalacées. Très-voisin de son autre genre *Leptomeria*, il est reconnaissable aux caractères suivans, lesquels sont très-difficiles à vérifier vu l'exiguïté des parties de la fructi-

fication : périanthe à cinq divisions profondes, coloré et persistant; les divisions concaves et en forme de cavité. A la base du périanthe est une sorte de calicule extrêmement petit et muni de cinq dents; étamines incluses; anthères à quatre loges et à quatre valves; stigmaté étoilé. On ignore la structure de l'ovaire et la consistance du fruit.

Malgré l'existence d'un calicule au périanthe, R. Brown ne regarde pas celui-ci comme une corolle. Cette distinction lui a semblé importante, parce qu'ayant divisé la famille des Elmagnées de Jussieu en deux autres, dont l'une (celle des Combretacées) va se placer parmi les Polypétales, il a laissé dans les Apétales, le *Thesium*, le *Fusanus* et tous les genres où la corolle manque. Le *Choretrum* fait donc partie de ce dernier groupe; il se compose d'Arbustes dont les tiges sont élancées et très-rameuses, couvertes de feuilles éparses, petites et placées seulement près des ramuscules et des fleurs. Celles-ci sont aussi petites, blanches, axillaires ou terminales, solitaires ou agrégées et accompagnées de quatre bractées. Les deux espèces de Choretre, *Choretrum lateriflorum* et *Choretrum glomeratum*, ont été trouvées par R. Brown sur les côtes méridionales de la Nouvelle-Hollande. (G. N.)

\* **CHORI-BORI**. BOT. PHAN. Syn. indon de *Celtis orientalis*, selon feu L.-C. Richard. (B.)

\* **CHORION**. ZOOL. L'une des membranes qui entourent le fœtus. F. ARRIÈRE-FAIX.

On donne également ce nom à la couche profonde de la peau. F. DERM. (B.)

\* **CHORISOLEPIDE**. BOT. PHAN. H. Cassini appelle ainsi l'involucre des Synanthérées, lorsqu'il est composé d'écailles distinctes les unes des autres. Cette expression s'emploie par opposition à celle de *Plécolepide* qu'il donne à cet organe, quand il est formé d'écailles soudées à leur base, et

semblant former un involucre monophylle. *V. INVOLUCRE*. (A. R.)

\* **CHORISPERME.** *Chorispermum*. BOT. PHAN. Le genre de la famille des Crucifères que Brown a ainsi nommé dans la seconde édition du Jardin de Kew, a été appelé *Chorispora* par De Candolle, à cause de sa trop grande ressemblance avec celui de *Corispermum* qui désigne un genre de la famille des Chenopodées. *V. CHORISPORE*. (A. R.)

\* **CHORISPORE.** *Chorispora*. BOT. PHAN. R. Brown, dans la seconde édition du Jardin de Kew, a séparé du genre Raifort (*Raphanus*) quelques espèces, et entre autres le *Raphanus tenellus* de Pallas, dont il a fait un genre nouveau sous le nom de *Chorispermum*. Mais ce nom rappelant trop celui d'un autre genre qui fait partie de la famille des Chenopodées, De Candolle lui a substitué celui de *Chorispora*. Voici les caractères de ce nouveau genre de la famille des Crucifères et de la Tétradynamie siliquieuse : ses sépales sont dressés et égaux. Ses étamines ont leurs filets dépourvus de dents. La silique est allongée, indéchiscente, à deux loges, et se sépare en plusieurs segmens monospermes. Le style est long et persistant ; les graines sont comprimées, pendantes ; les cotylédons sont planes et la radicule accombante.

Ce genre se compose de quatre espèces originaires d'Asie. Ce sont des Plantes grêles et annuelles, ayant la tige rameuse, les feuilles entières ou pinnatifides, les fleurs violettes ou jaunes, formant de longs épis opposés aux feuilles. Il diffère surtout des Raiforts par ses cotylédons accombans, des *Cheiranthus* et des *Malcomia* par son calice égal, son stigmate simple et sa silique qui se rompt en plusieurs segmens. (A. R.)

**CHORISTÉE.** *Choristea*. BOT. PHAN. Selon Jussieu, Solander avait donné ce nom, resté inédit, au genre *Favonium* de Gaertner, qui appartient à

la famille des Symplocarées. Thunberg nommait ainsi la Plante publiée par L'Héritier sous le nom de *Didelta*. *V. ce mot*. (A. R.)

**CHORIZANDRE.** *Chorizandra*. BOT. PHAN. Deux petites Plantes de la famille des Cypéracées, trouvées sur les côtes de la Nouvelle-Hollande par R. Brown, forment ce genre qui est très-voisin des *Chrysitrix* et des *Chondrachne*. Elles ont le port du Jonc congloméré, et croissent comme lui dans les lieux humides et inondés. Leur chaume est simple, cylindrique et marqué de nodosités intérieures nues supérieurement, portant à leur base quelques feuilles engainantes canaliculées et presque cylindriques. Les fleurs forment un capitule sessil naissant latéralement au-dessous du sommet du chaume et composé d'un grand nombre d'épillets agglomérés.

Ceux-ci sont nus et multiflores. Entre chacune des écailles qui sont fasciculées, on trouve une seule étamine. Le pistil naît du centre l'assemblage des écailles. Il est terminée par un style bifide, et n'est point accompagné de soies hypogynes. (A. R.)

**CHORIZÈME.** *Chorizema*. BOT. PHAN. Dans son Voyage à la recherche de La Peyrouse, Labillardière décrit et figure sous le nom de *Chorizema ilicifolia*, t. 21, une Plante qu'il a observée sur les côtes de la Nouvelle-Hollande, et qui se remarque par ses feuilles ternes allongées, munies d'épines le long de leur contour et semblables à ce du Houx, mais beaucoup plus petites. Ses fleurs sont disposées en petites grappes axillaires ou terminales de couleur jaune.

Ce genre de la famille naturelle Légumineuses et de la Décandrie monogynie a beaucoup de rapports avec le genre *Podalyra*, à côté duquel il vient se placer. Il s'en distingue par son calice à cinq divisions bilabées, par sa corolle papilionacée, dont la racine est renflée et plus courte que



quelquefois à sa base une graine. Cette silique, qui est biloculaire, s'ouvre en deux valves légèrement carénées sur leur face externe, et contient un assez grand nombre de graines globuleuses ayant la radicule reçue dans une gouttière qu'offrent les deux cotylédons sur l'une de leurs faces.

On connaît aujourd'hui environ une trentaine d'espèces de Choux, qui sont des Végétaux herbacés, bi-annuels ou vivaces, rarement sous-fruticacés à leur base. Dans l'état sauvage, leur racine est grêle et sèche, elle devient souvent épaisse et charnue par suite de la culture. Leurs feuilles radicales sont quelquefois très-nombreuses et très-serrées, lyrées ou plus ou moins profondément pinnatifides; celles qui naissent sur la tige sont sessiles et souvent amplexicaules. Les fleurs sont jaunes ou blanches, disposées en longues grappes dressées et rameuses.

Dans le second volume de son *Systema Vegetabilium*, De Candolle a retiré du genre *Brassica* plusieurs espèces qu'il a placées dans les genres *Moricandia*, *Diploaxis*, *Eruca*, etc. Il a groupé les vingt-neuf espèces qu'il décrit en trois sections qu'il nomme : 1° *Brassica*; silique sessile, point de bec au sommet; 2° *Erucastrum*; silique sessile terminée par un bec contenant une graine; 3° *Micropodium*; silique légèrement stipitée.

Le genre *Brassica* a les plus grands rapports avec les *Sinapis*, dont il diffère seulement par son calice connivent et dressé et par sa silique presque cylindrique. Du reste, les espèces de ces deux genres ont entre elles une grande affinité.

Plusieurs espèces de Choux sont cultivées dans les jardins potagers ou dans les champs, soit pour la nourriture de l'Homme et des bestiaux, soit pour récolter leurs graines qui contiennent une quantité considérable d'huile grasse, employée surtout pour l'usage des lampes. Ces espèces sont particulièrement le Colza, *Brassica campestris*, le Chou commun, *Brassica oleracea*, le Chou-Rave,

*Brassica-Rapa*, le Navet, *Brassica Napus*, et le Chou précède, *Brassica præcox*. Ce sont ces cinq espèces leurs nombreuses variétés, que nous allons rapidement décrire dans cet article. On doit à Duchesne de Villeneuve, et plus récemment au professeur De Candolle, d'excellents mémoires sur les espèces et variétés de Choux cultivés en Europe. C'est le travail de ce dernier qui nous servira spécialement de guide.

**CHOU-COLZA**, *Brassica campestris*, L. Cette espèce offre une tige dure et fusiforme, une tige dressée, rameuse, cylindrique, glabre et glauque, haute d'un pied à un pied et demi. Ses feuilles radicales sont lyrées un peu hispides ou ciliées, glauques légèrement charnues; les caulinales sont glabres, cordiformes et amplecaules. Elle se distingue du Chou cultivé et du Navet par ses feuilles inférieures hispides, de la Rave par ses feuilles glauques et par celles de sa tige qui sont glabres. Le Colza est fort rare à l'état sauvage. On l'indique en Angleterre, en Ecosse, en Espagne, en Transylvanie, etc.

De Candolle distingue trois variétés particulières dans cette espèce, savoir : le Chou oléifère ou vrai Colza, le Chou à faucher et le Chou-Navet.

1°. Le Colza ou Chou oléifère, *Brassica campestris oleifera*. C'est cette espèce que l'on cultive en abondance en Belgique, en Alsace et dans plusieurs autres parties de la France pour extraire l'huile grasse que contiennent ses graines. Il paraît qu'on sous ce rapport, c'est l'espèce qui toutes les Crucifères mérite la préférence. On confond quelquefois avec elle une variété de Navet, qui a pour effet beaucoup de rapports, et qui est cultivée en grand pour recueillir ses graines. Mais cette dernière qui est la Navette, s'en distingue par ses feuilles radicales inférieures entièrement glabres. La distinction entre ces deux espèces est importante à faire, parce que, selon les expériences de Gauquier, un hectare de terrain cultivé en Colza rapporte neuf fois cinquante



cinq kilogrammes d'huile, tandis que le même espace cultivé en Navette n'en rapporte que sept cents.

Le Colza demande une terre substantielle, convenablement préparée par des labours et du fumier. On en distingue deux variétés : l'une, hâtive, se sème au printemps et se récolte en automne ; la seconde se sème ordinairement à la mi-juin en pépinière, passe l'hiver sans fleurir et se récolte à la fin du printemps suivant. On doit le repiquer dans les champs qui lui sont destinés. Cette opération se fait communément vers le mois d'octobre. Cependant dans beaucoup de cantons on le sème à la volée.

3°. Le Chou à faucher, *Brassica campestris pabularia*, vulgairement Chou à Vache. Il tient le milieu entre le Colza et le Chou-Navet, dont il semble être un hybride. Sa racine est extrêmement longue, fusiforme et perpendiculaire ; sa tige courte comme dans le Chou-Navet, mais moins épaisse ; ses feuilles sont larges, épaisses, légèrement hérissées à leur face inférieure. On peut couper ces feuilles plusieurs fois dans l'année pour la nourriture des bestiaux.

5°. Le Chou-Navet, *Brassica campestris napo-brassica*. Plusieurs auteurs rapportent cette variété au Chou cultivé, mais elle appartient certainement au Colza, par ses feuilles inférieures qui sont rudes et hérissées, caractère qui la distingue surtout du Chou-Rave avec lequel on la confond communément. Le Chou-Navet offre une racine épaisse, renflée près de son collet en un gros tubercule irrégulièrement arrondi. Il offre deux variétés principales : le vrai Chou-Navet dont le tubercule est irrégulier, de couleur blanche ou rouge, mais jamais jaune, et le *Rutabaga*, Chou de Laponie ou Chou de Suède, dont la racine est arrondie, toujours de couleur jaune à l'extérieur comme à l'intérieur. Le Chou-Navet et le Rutabaga sont deux Plantes potagères fort utiles. On mange leurs feuilles et leurs racines, qui forment aussi un fourrage excellent pour les bestiaux.

Il est bisannuel et doit être semé dans des champs convenablement préparés.

CHOU CULTIVÉ, *Brassica oleracea*, L. Cette espèce, la plus intéressante du genre, se distingue à sa tige herbacée et bisannuelle, à ses feuilles entièrement glabres, glauques et jamais découpées jusqu'à la nervure médiane. Il offre six races principales qui sont :

1°. Le Chou sauvage, *Brassica oleracea sylvestris*. Indigène du nord de l'Europe, ce Chou a été trouvé à l'état sauvage dans différentes contrées, particulièrement au voisinage de la mer, en France, en Angleterre, etc. Cette espèce est certainement la souche des nombreuses variétés que la culture a développées dans le Chou ordinaire.

2°. Le Chou-Cavalier, *Brassica oleracea acephala*, ou Chou vert, est remarquable par la hauteur de sa tige, qui dure quelquefois deux ou trois ans et acquiert une hauteur de quatre à cinq pieds, et par ses feuilles écartées ne se réunissant pas en tête, comme dans les Choux cabus. Cette race présente cinq variétés principales que nous allons énumérer rapidement. La première est le Chou en Arbre ou Cavalier branchu qui se distingue par la hauteur de sa tige et le nombre de ses ramifications. La seconde est le Chou-Cavalier ordinaire, dont la tige, aussi haute, reste presque constamment simple. On le cultive surtout dans la partie occidentale de l'Europe tempérée, soit pour la nourriture de l'Homme, soit pour celle des bestiaux. Sa tige tend sans cesse à s'accroître, à mesure qu'on retranche ses feuilles inférieures. C'est à cette variété que l'on donne les noms de Chou vivace, grand Chou vert de Tournai, etc. Le Chou à feuilles de Chêne constitue la troisième variété du Chou-Cavalier, et se reconnaît à ses feuilles vertes et pâles, découpées en lobes profonds, planes, entiers, larges et oblongs. Dans le Chou frangé, qui forme la quatrième variété, les lobes sont sinués, dé-

ebiquetés à leur contour : les feuilles sont tantôt vertes, tantôt pourpres et variées de blanc, ce qui leur donne un aspect extrêmement agréable, et les place, en automne, au rang des Plantes d'ornement. On mange les feuilles du Chou frangé, qui forment aussi un très-bon fourrage. Ses graines contiennent une telle quantité d'huile, qu'on le cultive fréquemment en grand, comme Plante oléifère. Enfin on appelle Chou-Palmier la cinquième variété du Chou-Cavalier, dont les feuilles sont allongées, peu découpées, irrégulièrement bullées et réunies à la partie supérieure de la tige.

De Candolle rapproche des Choux-Cavaliers le Chou à grosses côtes, *Brassica costata*, que l'on cultive dans plusieurs provinces de la France sous les noms de Chou de Beauvais, Chou à grosses ou à larges côtes, etc. Il se fait remarquer par sa tige qui est courte et par l'épaisseur et la largeur considérables de ses côtes.

5°. Les Choux de Milan ou Choux bullés, *Brassica oleracea bullata*, sont faciles à reconnaître à leurs feuilles bullées, c'est-à-dire irrégulièrement bosselées et sinueuses, réunies en tête, surtout dans les jeunes individus. On en distingue plusieurs sous-variétés : telles sont le Choux de Milan hâtif, le doré, le nain, etc.

4°. Chou cabu ou pommé, *Brassica oleracea capitata*. Cette race est une de celles que l'on cultive le plus pour la nourriture de l'Homme. Elle se distingue facilement à ses feuilles non bullées, ni crépues, réunies en tête fort grosse et très-compacte, de manière que les plus intérieures sont pâles et étiolées, ce qui rend leur saveur plus douce et plus sucrée. Les variétés principales sont fondées sur la forme de la tête et sur la couleur des feuilles : de-là les noms de Chou déprimé ou aplati, de Chou sphérique, de Chou ové, de Chou ellipsoïde, de Chou conique, etc. Ces diverses variétés peuvent conserver leur couleur verte ; elles peuvent être blanches ou enfin rouges ; cette dernière

couleur appartient plus particulièrement au Chou sphérique.

5°. Chou-Rave, *Brassica oleracea caulorapa*. Dans cette race, la tige se renfle au-dessus du collet de la racine, et forme un tubercule arrondi d'où naissent les feuilles. C'est ce tubercule qui sert à la nourriture de l'Homme ; les feuilles sont abandonnées aux bestiaux. Linné donnait à cette variété le nom de *Brassica gangyloides*. On distingue deux sous-variétés dans le Chou-Rave, celle à feuilles planes, et celle à feuilles crépues. Il ne faut pas confondre le Chou-Rave, dont il est ici question, et la Rave ou Chou-Rave qui est une autre espèce du même genre (*Brassica asperifolia*), et qui en diffère surtout par ses feuilles hérissées. La tige renflée du Chou-Rave a une saveur agréable, qui tient le milieu entre celle du Navet et celle des Choux-Fleurs.

6°. Pour terminer l'examen des six races du Chou cultivé, il nous reste encore à parler du Chou Botrytis, *Brassica oleracea Botrytis*. Dans les cinq races précédentes ce sont les feuilles, les racines ou les tiges renflées, quel'on emploie comme aliment ; ici ce sont les pédoncules développés et chargés de fleurs avortées. Ces pédoncules se soudent, s'entregreffent et forment dans leur ensemble une sorte de corymbe assez régulier, dont les diverses parties sont tantôt rapprochées, tantôt plus ou moins écartées, ce qui constitue deux variétés principales, savoir : le Chou-Fleur et le Broccoli.

1°. Le Chou-Fleur, *Brassica cauliflora*, porte sur une tige courte des feuilles oblongues, ayant les côtes blanches et très-prononcées. Ses pédoncules floraux, réunis en corymbe serré à la partie supérieure de la tige, sont épais, charnus, blancs et entregreffés. Les fleurs qui les terminent sont blanches, petites et en général avortées. On distingue trois sortes principales de Choux-Fleurs, que l'on nomme Choux-Fleurs tendres ou hâtifs, demi-durs et durs. Ces trois

variétés, semées à la même époque, se succéderont dans leurs produits. Cette variété est une des meilleures et une des plus recherchées.

2°. Le Broccoli, *Brassica asparagoides*, diffère du Chou-Fleur par ses pédoncules moins épais, plus allongés et plus écartés, de manière à ne pas former de tête convexe, comme dans le Chou-Fleur, et que chacun d'eux ressemble en quelque sorte à un gros turion d'Asperge. Il est aussi fort recherché comme aliment.

La RAVE, *Brassica Rapa*, L., *Br. asperifolia*, Lamck., se distingue facilement de l'espèce précédente par ses feuilles non glauques, hérissées de poils nombreux, et par son calice étalé, caractère qui la rapproche singulièrement du genre *Sinapis*, dans lequel Lamarck l'avait ensuite placée sous le nom de *Sinapis tuberosa*. La Rave ne diffère du Navet que par ses feuilles hérissées et son calice étalé. Du reste, elle offre comme lui une racine tubéreuse renflée au-dessous du collet, qui acquiert parfois une grosseur extraordinaire. Mathiote en cite une qui pesait trente livres. Sa forme et sa couleur varient suivant les variétés. Il y en a d'aplaties ou de déprimées, d'autres sont oblongues. Les unes sont blanches, celles-ci jaunâtres, etc.

On cultive la Rave comme Plante potagère et comme fourrage. Sa saveur et ses autres propriétés sont les mêmes que celles du Navet. La Rave sauvage ou Ravette, qui paraît être le type de l'espèce sauvage, a sa racine grêle et non charnue. On la cultive dans plusieurs provinces pour extraire l'huile de ses graines.

Le NAVET, *Brassica Napus*, L. Des feuilles glauques et entièrement glabres, en général découpées jusqu'à leur côte moyenne, une racine épaisse, un calice et des siliques étalés, forment les caractères distinctifs de cette espèce connue et abondamment cultivée sous le nom de Navet. Elle offre beaucoup d'analogie avec le Chou cultivé par ses feuilles glau-

ques et glabres, et avec la Rave par son calice étalé et sa racine tubéreuse.

Nous distinguerons deux races dans le Navet, savoir : le Navet ordinaire ou comestible et la Navette.

1°. Le Navet comestible, *Brassica Napus esculenta*, se reconnaît à sa racine épaisse, charnue, globuleuse, ovoïde ou allongée. On le cultive dans les champs ou les jardins potagers. Les espèces les plus recherchées sont celles qui viennent dans des terrains légers et sablonneux : telles sont la Française, qui est petit et presque conique, le Navet de Meaux, qui est très-allongé et en forme de Carotte, le Saulieu, qui est noirâtre, etc.

On sème les Navets depuis la fin de juin jusqu'à la moitié d'août. On les récolte à la fin de l'automne.

2°. La Navette, *Brassica Napus oleifera*, ou Navet oléifère, se distingue par une racine grêle et non charnue. Ses graines se sement en général après la moisson, et l'on récolte les graines mûres au printemps suivant. Quelques cultivateurs font leurs semis au printemps, afin d'avoir leurs graines mûres en automne. Ces graines fournissent beaucoup d'huile grasse, mais cependant moins que le véritable Colza.

Enfin l'on cultive dans l'est de la France, sous le nom de Navette d'été, la *Brassica præcox* de Waldstein et Kitaibel. Elle est annuelle, se sème au printemps et mûrit ses graines avant la fin de l'automne. On la distingue du Navet oléifère à ses siliques dressées contre la tige et non étalées. Comme ses graines sont beaucoup plus petites, elle n'est pas aussi productive que la Navette d'hiver ou Navet oléifère.

Dans le langage vulgaire, on a étendu le nom de Chou à plusieurs Plantes de genres et de familles différents ; tels sont :

CHOU BATARD. On nomme ainsi l'*Arabis turrita*, V. ARABETTE.

CHOU CARAÏBE. Dans les Antilles, ce nom s'applique à l'*Arum esculentum*, et *Arum sagittifolium*, de Linné, dont on mange quelquefois les

feuilles comme celles du Chou, mais plus, ordinairement, les racines. Ces deux espèces font partie du genre *Calladium* de Ventenat.

**CHOU DE CHIEN.** On désigne quelquefois sous ce nom la Mercuriale.

**CHOU DE CHINE.** V. BRÈDES.

**CHOU DE MER.** Nom vulgaire du Liseron Soldaueille. V. LISERON.

**CHOU MARIN.** C'est le *Crambe maritima*. V. CRAMBE.

**CHOU PALMISTE.** Dans l'Inde et en Amérique, on appelle ainsi le bourgeon qui termine le stipe des Palmiers et que l'on mange cru ou apprêté de diverses manières. V. AREC.

**CHOU POIVRE.** Nom du Gouet commun. (A. R.)

**CHOU-FLEUR.** BOT. PHAN. V. CHOU.

\* **CHOU-FLEUR DE MER.** POLYP. Nom marchand du Pocillopore corne de Daim. V. ce mot. (LAM. X.)

**CHOUAN.** POIS. Syn. de Chevanne, espèce d'Able. V. ce mot.

**CHOUAN.** BOT. PHAN. Plante du Levant employée dans la teinture. C'est, selon Bosc, le Fenu-grec, et, suivant Desvaux, un *Anabasis*.

**CHOUANA - MANDARA.** BOT. PHAN. (Rumph.) Syn. de *Bauhinia* pourprée. (B.)

**CHOUANT.** OIS. Syn. vulgaire du Moyen Duc, *Strix Otus*, L. V. CHOUETTE. (DR. Z.)

**CHOUART.** OIS. Syn. vulgaire de l'Épave, *Strix flammea*, L. V. CHOUETTE. (DR. Z.)

**CHOU ET CHOUCA.** OIS. Syn. de Choucas, *Corvus Monedula*, L. V. CORBEAU. (DR. Z.)

**CHOUCADOR.** OIS. Espèce du genre Merle, *Sturnus ornatus*, Daud. V. MERLE; Oiseaux d'Afrique, pl. 86. V. MERLE. (DR. Z.)

**CHOUCALE.** BOT. PHAN. Syn. de *Calla palustris*, dont on mange les racines dans le Nord au guise de Chou. (B.)

**CHOUCARIS.** OIS. Nom d'un sous-

genre des Pie-Grièches de Cuvier dans lequel ce naturaliste a groupé autour du Choucari et du Chour de la Nouvelle-Guinée, de Buffon quelques espèces qui font partie d'Echenilleurs de Temminck. V. ECHENILLEUR. (DR. Z.)

**CHOUCAS.** OIS. (Buffon.) Espèce du genre Corbeau, *Corvus Monedula*, L. V. CORBEAU.

On a étendu ce nom de Choucas avec quelque épithète à d'autres Oiseaux, tels que les suivans :

**CHOUCAS DES ALPES.** (Buffon.) Syn. du Pyrrhocorax-Choquard. V. PYRRHOCORAX.

**CHOUCAS A BEC ET PIEDS ROUGE.** Syn. de Coracias, *Corvus Graculus*, L. V. PYRRHOCORAX.

**CHOUCAS CHAUBE.** (Buffon.) Syn. de Coracine chauve ou gymnocéphale, *Corvus calvus*, L. V. CORACINE.

**CHOUCAS DE LA JAMAÏQUE.** Syn. de Quiscale, *Gracula Quiscalis*, L. V. TROUPIALE.

**CHOUCAS DE LA MER DU SUD.** Syn. de Coracine à front blanc, *Corvus pacificus*, L. V. CORACINE.

**CHOUCAS DE LA NOUVELLE-GUINÉE.** (Buffon.) Syn. d'Echenilleur à ventre rayé, *Corvus Nova-Guinea* Lath. V. ECHENILLEUR.

**CHOUCAS D'OWIÈRE.** Syn. de Cassican noir, *Corvus tropicus*, Lath. V. CASSICAN.

**CHOUCAS DES PHILIPPINES.** (Buffon) Syn. de Drongo Balicasse, *Corvus Balicassius*, L. V. DRONGO. (DR. Z.)

**CHOUCE.** OIS. Syn. indien de l'Épave, *Falco Tinnunculus*, L. V. FAUCON. (DR. Z.)

**CHOUCHETTE.** OIS. Syn. vulgaire du Choucas, *Corvus Monedula*, L. V. CORBEAU. (DR. Z.)

**CHOUCHOU.** OIS. (Levaillant.) Oiseau d'Afrique, pl. 38.) Syn. de la Chouette-Épave Caparacoch, *Strix Assonica*, L. V. CHOUETTE. (DR. Z.)

**CHOUCHOUKOU.** OIS. (Garnaud.) Syn. de Héron dans les

Mariages en langue chamorro, d'où :

CHOUCHOUKOU AFAKA, c'est-à-dire Héron blanc, l'*Ardea aquinaxialis*, L.

CHOUCHOUKOU ATOULOU, c'est-à-dire Héron noir, l'*Ardea Carolina*. (G.)

CHOUCHUÉ ou CHOUROUCOU-LIHUÉ. BOT. PHAN. (Surian.) Syn. caraïbe de Rocou, *Bixa Orellana*. (B.)

CHOUCOU. OIS. Espèce du genre Chouette, *Strix Choucou*, Lath. V. CHOUETTE.

CHOUCOUHOU. OIS. Espèce du genre Chouette, *Strix Niduella*, Levaillant, Ois. d'Afrique, pl. 39. V. CHOUETTE. (DR.Z.)

CHOUCCOUROU. BOT. PHAN. (Surian.) Syn. caraïbe d'*Hibiscus tiliaceus*. V. KETMIE. (B.)

CHOUDET. OIS. L'un des noms vulgaires du Hibou commun, *Strix Otus*, L. V. CHOUETTE. (DR.Z.)

CHOUE. OIS. Désignation vulgaire des Chouettes. V. ce mot. (DR.Z.)

CHOUETTE. *Strix*. OIS. Genre de l'ordre des Rapaces. Caractères : bec courbé, comprimé avec la base entourée d'une cire que couvrent des poils rudes ou des plumes sétacées dirigées en avant; narines percées latéralement sur le bord intérieur de la cire, arrondies, ouvertes, cachées en tout ou en partie sous les poils; tête volumineuse; yeux très-grands, placés dans de larges orbites garnies de plumes rudes; une membrane clignotante; oreilles grandes; bouche très-fendue; col fort court; pieds simplement couverts de plumes, souvent jusqu'aux ongles; trois doigts devant et un derrière, entièrement divisés; l'extérieur renversable; ailes un peu pointues avec les rémiges primaires dentelées sur leur bord extérieur; première rémige la plus courte; deuxième atteignant point l'extrémité de la troisième qui est la plus longue.

Ce grand genre se compose d'es-

pèces qui toutes ont un air de famille si bien caractérisé, que, malgré les tentatives souvent renouvelées pour le diviser, on n'y a encore réussi qu'imparfaitement; l'on a même dû se borner à l'indication de quelques sections ou sous-genres que chaque auteur a plus ou moins multipliés. Savigny et Cuvier en ont porté le nombre à huit, et ils ont pris pour bases principales de leurs coupes la présence ou l'absence des aigrettes dont la tête, chez quelques espèces, se trouve ornée, l'étendue et la position de ces aigrettes ainsi que des oreilles, le diamètre du cercle radié qui entoure l'œil, etc. On sent qu'il est difficile d'établir nettement des limites aussi nombreuses, lorsqu'elles reposent sur des caractères aussi variables, et peut-être serait-il préférable de n'admettre qu'une seule division qui ne ferait que séparer les espèces à aigrettes de celles qui en sont dépourvues. La nature n'a point établi parmi les Chouettes seulement une analogie de formes et de couleurs; elle étend cette analogie aux mœurs et aux habitudes de ces Oiseaux : à tous elle a rendu l'organe de la vue extrêmement sensible; ils ne sauraient supporter impunément la vive clarté du jour, puisque tous en sont offusqués, et la fuient retirés dans d'obscurs réduits. C'est dans des trous caverneux, au sein des ruines ou des édifices isolés, à côté de la cloche funéraire ou dans le tronçonné d'un Arbre plus que centenaire, qu'ils passent les heures que d'autres consacrent à l'activité, au plaisir; ils y attendent tristement que le crépuscule, ne frappant que d'une lumière expirante leur énorme pupille, leur permette de distinguer parfaitement les objets que les autres Animaux ne pourraient plus apercevoir. Alors, moins hardis, mais moins sanguinaires que les Oiseaux de proie diurnes, profitant du demi-jour propice qui livre à leurs regards sinistres de petits Oiseaux endormis, et surtout la confiante couvresse, ils les enlèvent silencieusement, leur

brisent la tête d'un coup de bec, et les engloutissent entiers, à l'aide de la mobilité de leurs mandibules, dans leur ample jabot. Si, par une circonstance imprévue, ils sont forcés de quitter en plein jour leur réduit, ils errent incertains, d'un vol court et déconcerté, en poussant des cris de détresse; aussitôt les timides habitans des bocages dont les Chouettes sont la terreur vers les deux extrémités du jour, connaissant les avantages passagers que leur procure l'éclat du soleil, se rassemblent autour d'elles, les harcèlent, les poursuivent en les frappant à coups de bec accompagnés de huées. Les petits Oiseaux ne sont pas uniquement la nourriture de ces rapaces lucifuges; les Rats, les Souris, les Mulots, les Taupes sont par eux recherchés aussi ardemment et chassés avec plus d'adresse que ne le font les Chats. C'est probablement de cette habitude assez extraordinaire, autant que de la ressemblance physique que l'on trouve dans leur tête ronde aplatie sur le sommet, qu'est venu le surnom de Chat-Volant ou Chat-Huant, donné dans les campagnes à ces Oiseaux que, dans certains cantons, l'on élève en remplacement des Chats, et auxquels ils sont préférés dans les soins de purger les greniers et le potager des petits Quadrupèdes rongeurs. Les momens que les Chouettes ont à donner à la recherche de leur nourriture sont assez courts; l'on n'a jamais observé qu'elles chassassent encore lorsque l'obscurité dominait complètement. Il est probable que la délicatesse de leur organe n'est pas assez grande pour percer les profondes ténèbres, et que, si elles persistent à veiller, c'est dans le repos, et parce que déjà le jour est pour elles une nuit assez longue. L'habitude d'accumuler promptement les proies est favorisée par l'extrême dilatabilité de l'estomac; c'est dans ce foyer que, par un mécanisme particulier à l'organisation de ces Oiseaux, les parties dures des Animaux qu'ils ont avalés sont séparées des parties digestives, enveloppées

et roulées dans la queue pour être jetées sans efforts sous forme de petites pelottes. Il est cependant quelques espèces, mais en petit nombre, qui jouissent de la faculté de chasser en plein jour. Celles-ci, surnommées Chouettes Accipitres, se rapprochent davantage des Oiseaux de proie diurnes par une taille plus svelte et par une plus grande étendue des ailes et de la queue.

Par la consommation considérable que ces Oiseaux font de Mulots et de Souris, ils rendent réellement des services essentiels à l'agriculture; cependant ils sont assez généralement un sujet d'effroi pour le campagnard ignorant et superstitieux, et l'on peut aisément se rendre raison de l'impression que la présence des Oiseaux de nuit peut produire sur le vulgaire. En effet, qui pourrait affirmer n'avoir jamais éprouvé quelque atteinte de frayeur, lorsque, au milieu des nuits, dans le voisinage de lieux susceptibles de réveiller des affections douloureuses, dans le silence, tout-à-coup une voix aigre, entrecoupée d'un bruissement réitéré, se fait entendre? Ce n'est cependant que le cri habituel et peut-être amoureux du paisible Oiseau des nuits; mais l'imagination frappée a rendu ce cri redoutable; elle l'a présenté au vulgaire comme un présage malheureux, et sans doute ce préjugé, dont l'origine est fort ancienne, a donné lieu au nom d'Effraie dérivé d'Effroi, donné à l'espèce la plus commune et la plus bizarre par sa physionomie. Outre ces cris qui leur sont particuliers, les Chouettes font encore entendre un claquement de mâchoires occasionné par un échappement de leurs mandibules qui sont mobiles. C'est surtout dans les instans de crainte ou de colère qu'elles redoublent ce claquement; alors aussi leurs plumes en général douces, épaisses et duveteuses, se hérissent, et leurs ailes s'étendent, comme pour leur donner un aspect plus singulier. Les soins de l'incubation paraissent occuper peu les Chouettes; la plupart d'entre elles déposent leurs œufs ar-

rondin, dont le nombre, suivant les espèces, est de deux à cinq, dans la poussière qui garnit les trous de murailles, les anfractuosités des rochers, les vieilles poutres, les entablemens des colonnades, les clochers, les troncs cariés des grands Arbres, enfin dans quelques nids abandonnés dont elles s'emparant. En revanche, elles ont la tendresse la plus grande pour leurs petits; elles ne les quittent que lorsqu'elles les croient à l'abri de tout danger. Ceux-ci, dans leur premier âge et de la physionomie la plus effrayante ou la plus ridicule, sont enveloppés d'un duvet épais qui ne disparaît que lorsque l'unique mue à laquelle ils soient assujettis leur donne ce plumage fin, léger et soyeux, au moyen duquel ils exécutent leur vol sans aucun bruit, et cessent de ressembler à des spectres pour prendre la figure d'Oiseaux.

Nous diviserons les Chouettes en plusieurs sous-genres.

#### † CHOUETTES-HIBOUX.

Deux petits bouquets de plumes ou aigrettes sur le front.

CHOUETTE-HIBOU AFRICAINE, *Strix africana*, Temm., pl. color. 50. Parties supérieures brunes variées de noir; front et sommet de la tête bruns, avec l'extrémité de chaque plume tachée de blanc; aigrettes terminées de noir à l'extérieur; face grisâtre, entourée d'un double cercle blanc et noirâtre; sabot d'un fauve foncé, rayé transversalement de noirâtre, et terminé par un hausse-col blanc; parties inférieures brunes, rayées transversalement de noirâtre avec des taches de cette couleur sur les côtés de la poitrine et du ventre; quelques taches blanches au poignet; rectrices rayées de gris fauve et de noir, terminées inférieurement par des petits traits noirs; jambes emplumées avec des zig-zags noirs; bec noirâtre; iris orange. Longueur, quatorze pouces six lignes. Du cap de Bonne-Espérance.

CHOUETTE-HIBOU A AIGRETTES COURTES, *Strix griseola*, Lath., Chouette à aigrette blanche, Levaill.,

Ois. d'Afr. pl. 45. Parties supérieures roussâtres, finement rayées de brun et tachetées de blanc; aigrettes composées de plumes longues, flexibles, insérées près de la base du bec, et qui retombent de chaque côté de la tête; parties inférieures d'un blanc roussâtre avec des stries brunes, très-fines sur la poitrine; bec jaune; pieds emplumés jusqu'aux premières phalanges. Longueur, treize pouces. De la Guinée.

CHOUETTE-HIBOU A AIGRETTES COURTES. V. CHOUETTE-HIBOU BRACHYOTE.

CHOUETTE-HIBOU A JOUES BLANCHES, *Strix leucotis*, Temm., pl. color. 16. Parties supérieures d'un gris fauve, avec la tige des plumes et de fines stries transversales noires; rémiges et rectrices rayées transversalement de noir; sommet de la tête fauve, strié de brun foncé; aigrettes striées et bordées de noirâtre à l'extérieur; cercle radié des joues, blanc, entouré de noir; parties inférieures fauves, striées comme les supérieures; abdomen blanchâtre; pieds emplumés jusqu'aux ongles, grisâtres, tachetés de noir; bec jaune, caché dans des soies blanches, dirigées en avant. Taille, neuf pouces. Du Sénégal.

CHOUETTE-HIBOU D'AMÉRIQUE, *Strix americana*, Gmel., *Asio americanus*, *Asio mexicanus*, Briss., Ois. de l'Amérique sept. pl. 3. Parties supérieures rousses, tachetées longitudinalement et pointillées de noir; face blanchâtre; collerette bordée de roussâtre et de noirâtre; aigrettes noirâtres; gorge variée de blanc et de roux avec la tige des plumes noire; rectrices alaires rayées transversalement et en zig-zag, de noirâtre et de cendré; rectrices rayées irrégulièrement de brun foncé; parties inférieures mêlées de blanc, de roux et de noir; jambes et doigts couverts d'un duvet roussâtre; bec jaune. Longueur, quatorze pouces. La femelle a les taches brunes au lieu d'être noires, et les parties inférieures d'un brun ferrugineux tacheté. C'est alors le Hibou du Mexique.

**CHOUETTE-HIBOU ASCALAPHE**, *Strix Ascalaphus*, Savig., Temm., pl. color. 57. Parties supérieures fauves, marquées de traits vermiculés bruns; aigrettes courtes, formées de beaucoup de plumes; parties inférieures blanchâtres, rayées transversalement de traits bruns; bec noirâtre. Longueur, seize pouces. D'Égypte.

**CHOUETTE-HIBOU ASIO**, *Strix Asio*, Gmel., Lath., Ois. de l'Amér. sept. pl. 21, Temm., pl. color. 80. Parties supérieures rousses, variées de lignes noires; milieu de la face roussâtre, entouré de cercles alternativement blancs, noirs et roux; rectrices mélangées de raies transversales brunes, peu marquées; parties inférieures blanchâtres, avec la poitrine brune, rayée et tachetée de blanc; pieds et doigts emplumés, roux en devant, et blancs derrière; bec noirâtre. Longueur, neuf pouces. La femelle a les couleurs moins vives. De la Caroline.

**CHOUETTE-HIBOU BAKKAMUNA**, Lath., *Strix indica*, Gm. Parties supérieures d'un brun très-foncé, tachetées de roux clair; aigrettes fort touffues, d'un roux foncé; face d'un cendré clair; collerette bordée de noir; rectrices alaires grises, avec quelques traits noirs; rémiges rayées alternativement de noir et de blanc; parties inférieures d'un roux cendré, avec des taches noires en fer de lance sur la poitrine; pieds en partie emplumés; doigts velus; bec noirâtre. Longueur, six pouces. De Ceylan.

**CHOUETTE-HIBOU BLANC**. *Strix*.  
**CHOUETTE-HARFANG**.

**CHOUETTE-HIBOU BLANC D'ISLANDE**. *Strix*. **CHOUETTE-HARFANG**.

**CHOUETTE-HIBOU BRACHYOTE**, *Strix Brachyotos*, Lath., *Strix Ulula*, Gmel., *Strix arctica*, Sparm., *Strix tripennis*, Schrank, *Strix palustris*, Smies, *Strix brachyura*, Nil., grande Chevêche, Buff., pl. enl. 438. Parties supérieures d'un brun noirâtre, avec les plumes bordées de jaune d'Ocre; aigrettes courtes, peu apparentes; face blanchâtre, avec le tour des yeux noirâtre; rectrices roussâtres, rayées trans-

versalement de brun, et terminées d blanc; parties inférieures roussâtres tachetées longitudinalement de brun noirâtre; bec noir; pieds et doigts emplumés; iris jaune. Longueur, treize pouces. La femelle a les couleurs plus ternes. Les jeunes ont la face noirâtre. Du nord des deux continents.

**CHOUETTE-HIBOU DU BRÉSIL ou HIBOU CABURE**, *Strix brasiliana* Gmel., Lath., *Asio brasiliensis*, Bris. Parties supérieures d'un brun clair varié de taches blanches, beaucoup plus grandes sur le dos et les ailes; aigrettes assez longues, se relevant facilement; parties inférieures cendrées, tachetées de brun; rectrice roussâtre rayée de zig-zags blancs; pieds et doigts emplumés, jaunâtres; iris jaune; bec jaunâtre. Longueur sept pouces. De l'Amérique méridionale.

**CHOUETTE-HIBOU BRUYANT**, *Strix streptopus*, Temm., pl. color. 174. Parties supérieures d'un brun noirâtre traversé de zig-zags roux; aigrette partant de l'angle postérieur des yeux étalée de côté et retournées vers le haut, composées de longues plumes noires, recouvertes de plus courtes rayées de blanc et de brun; face blanchâtre, rayée de noirâtre; rémiges et rectrices brunes, traversées par de bandes plus pâles, les dernières terminées et bordées extérieurement d blanc; parties inférieures blanches rayées transversalement de brun; poitrine et flancs roussâtres; bec et ongles d'un blanc jaunâtre; doigts jaunes. Taille, dix-neuf pouces. De Sumatra.

**CHOUETTE-HIBOU DE LA CARNIOLE**, *Strix carniolica*, Gmel. **CHOUETTE-HIBOU PETIT-DUC**.

**CHOUETTE-HIBOU DE LA CHINE**, *Strix sinensis*. Parties supérieures brunes, variées de noir et de roussâtre, avec des zig-zags d'un brun très-foncé; quatre bandes transversales d'un roux clair, tacheté de brunâtre et de blanchâtre sur les rémiges; plumes des aigrettes assez courtes; face blanchâtre; bec et ongles rousses, avec des traits noirs, en forme de triangle



parties inférieures rousses, avec une bande noire longitudinale, qui est coupée transversalement par d'autres bandes blanches; bec et pieds noirs. Longueur, treize pouces.

**CHOUETTE - HIBOU CHAPERONNÉ**, *Strix atricapilla*, Natt., Temm., pl. color. 145. Parties supérieures mélangées de jaunâtre, de brun et de noir; sommet de la tête noir, de même qu'un trait derrière chaque œil; occiput blanchâtre, parsemé de zig-zags noirs; aigrettes noires, avec des traits jaunâtres en avant; un demi-collier roussâtre, varié de noir; plumes de la face grisâtres, encadrées et striées de noir; quelques maculatures blanches sur les ailes; parties inférieures blanches et grisâtres avec des traits lancéolés noirs; rectrices tachetées de brun, de fauve et de noir; iris, bec et pieds jaunes. Taille, neuf pouces trois lignes. Du Brésil.

**CHOUETTE-HIBOU CHOLIBA**, *Strix choliba*, Vieill. Toute la robe d'un brun clair, avec le centre des plumes noir, et l'extrémité pointillée de la même couleur; une grande tache noire en croissant, qui s'étend depuis la base des aigrettes jusqu'au bas de l'angle de jonction des mandibules; une rangée de plumes blanches, terminées de noir sur les scapulaires; bec bleuâtre à sa base, jaunâtre vers l'extrémité. Longueur, huit pouces. De l'Amérique méridionale.

**CHOUETTE-HIBOU DE CLOCHER**. *V.*  
**CHOUETTE-ÉPRAIE**.

**CHOUETTE-HIBOU COMMUN**, *Strix Otus*, L., le moyen Duc, Buff., pl. enl. 29. Parties supérieures d'un roux clair, parsemées de taches brunes et de gris cendré; aigrettes composées de six à huit plumes étagées, noirâtres, bordées de brunâtre et de blanchâtre; parties inférieures roussâtres, avec des taches oblongues brunes; bec noir; iris d'un jaune rougeâtre; yeux entourés d'un cercle de plumes friées, blanchâtres, bordées de noir; pieds et doigts couverts d'un duvet roux. Longueur, treize pouces. La femelle a la gorge blanche, et tout le plumage brant sur le grisâtre; les

jeunes sont d'un roux blanchâtre, marqués de lignes transversales noirâtres; ils ont les ailes et la queue grises; pointillées de brun; toute la face d'un brun noirâtre, et l'iris jaune. D'Europe et d'Afrique.

**CHOUETTE-HIBOU DE COROMANDEL**, *Strix coromanda*, Lath. Parties supérieures fauves, tachetées de blanc et de roux; grandes rémiges brunes, avec des taches rondes, blanchâtres sur leur bord extérieur; trois bandes transversales sur les intermédiaires, ainsi que sur les rectrices; parties inférieures d'un fauve rougeâtre, traversées de bandes demi-circulaires noires; pieds et doigts emplumés, rougeâtres; bec noir. Longueur, neuf pouces.

**CHOUETTE-HIBOU CORNU D'ATHÈNES**, *Strix atheniensis*. *V.* **GRAND-DUC**.

**CHOUETTE - HIBOU COURONNÉ**, *Strix virginiana*, Lath., Ois. de l'Amérique sept. pl. 2. Parties supérieures variées de roux et de brun, tachetées et pointillées de noirâtre; face mélangée de blanc, de roux et de noir; plumes de la collerette noires, rousses à leur base; cou varié de roux et de blanc, avec la gorge blanche; les deux premières rémiges crenelées à leur bord extérieur; rectrices latérales rayées de noir; parties inférieures mélangées de blanc, de roussâtre, rayées transversalement de noirâtre, et pointillées vers la poitrine; pieds et doigts emplumés, d'un blanc roussâtre; bec brun; iris jaune orangé. Longueur, dix-huit pouces. Des forêts de Sapins de l'Amérique septentrionale où il niche.

**CHOUETTE - HIBOU A CRAVATE BLANCHE**, *Strix albicollis*; variété de la Chouette-Hibou commun.

**CHOUETTE - HIBOU: CHARIÉ**. *V.*  
**CHOUETTE-HIBOU D'AMÉRIQUE**.

**CHOUETTE-HIBOU DUC A COURTES OREILLES**. *V.* **CHOUETTE-HIBOU GRACHYOTE**.

**CHOUETTE-HIBOU D'ÉGYPTÉ**. *V.*  
**CHOUETTE - HIBOU ASSABATHE**.

**CHOUETTE-HIBOU A FRONT BLANC**, *Strix albigula*; Lath.; Shaw, Nat.

Misc., pl. 171. Parties supérieures noirâtres, avec le front blanc; les inférieures d'un jaune fauve, avec la poitrine traversée par des bandes brunes; quelques taches blanches sur les ailes; bec noir. Longueur, sept pouces. La femelle est un peu plus grande; elle a les aigrettes, déjà très-courtes chez le mâle, à peine visibles; les plumes de la face frangées de blanc, et les parties supérieures brunes. De l'Amérique septentrionale.

CHOUETTE-HIBOU GENTIL, *Strix pulchella*, L. Parties supérieures cendrées, tachetées de brun et pointillées de blanc, avec de grandes taches de cette couleur sur les ailes; rectrices fauves, rayées et pointillées de brun; parties inférieures blanchâtres, tachetées de noirâtre; jambes couvertes d'un duvet marqueté. Longueur, neuf pouces. De Sibérie. On le regarde comme une variété du petit Duc.

CHOUETTE-HIBOU GRAND-DUC, *Strix Bubo*, L., Buff., pl. enl. 435. Parties supérieures variées de noir et de jaune roussâtre; plumes de la face mélangées de cendré, de roux et de noir; gorge blanchâtre; devant du cou et poitrine variés de noirâtre et de roux; ventre rayé longitudinalement et traversé de noirâtre; pieds et doigts couverts de plumes rousses, rayés de zig-zags bruns. Longueur, vingt-deux pouces. La femelle est plus grande, elle a le plumage d'une teinte plus claire, et n'a point de blanc à la gorge. Des grandes forêts d'Europe, d'Afrique et d'Amérique, où il joint à sa nourriture habituelle les Lapins, les Lièvres, et même les jeunes Chevreuils qu'il peut surprendre.

CHOUETTE-HIBOU GRAND-DUC BLANC SANS AIGRETTES. *Strix* CHOUETTE HARFANG.

CHOUETTE-HIBOU GRAND-DUC DE CEYLAN, *Strix ceylanensis*, Lath., *Strix zellensis*, Gmel., Brown, *Must.*, pl. 4; Temm., pl. color. 74. Parties supérieures d'un fauve roussâtre, rayé de noir; aigrettes courtes, droites et pointues; rectrices et

rectrices rayées de blanc, de noir et de rougeâtre; pieds nus jusqu'aux genoux. Longueur, vingt-trois pouces.

CHOUETTE-HIBOU GRAND-DUC A HUPPES COURTES. *Strix* CHOUETTE-HIBOU ASCALAPHIE.

CHOUETTE-HIBOU GRANDE CHEVÈCHE. *Strix* CHOUETTE-HIBOU BRACHYOTE.

CHOUETTE-HIBOU A GROS BEC, *Strix crassirostris*, Vieill., *Strix Machtorynchus*, Temm., pl. color. 62. Parties supérieures blanchâtres, rayées transversalement de brun; les inférieures blanchâtres, avec quelques bandelettes transversales brunes; aigrettes noires; collerette grise, bordée de noir; bec gros, fort et brun; pieds et doigts garnis de duvet. Longueur, dix-huit pouces. Patrie inconnue.

CHOUETTE-HIBOU D'ITALIE. *Strix* CHOUETTE-HIBOU COMMUN.

CHOUETTE-HIBOU JACUTURU. *Strix* CHOUETTE-HIBOU NACUTURU.

CHOUETTE-HIBOU KETUPA. *Strix* CHOUETTE-HIBOU GRAND-DUC DE CEYLAN.

CHOUETTE-HIBOU LACTÉ, *Strix lactea*, Temm., pl. color. 4. Parties supérieures d'un roux fauve, finement striées et pointillées de noir; aigrettes petites; un trait demi-circulaire, noir au-dessus de l'œil; face d'un gris blanchâtre, finement striée de noir, et bordée de cette couleur; rectrices inférieures d'un cendré rougeâtre, rayées de noirâtre; parties inférieures d'un cendré jaunâtre, finement striées de noirâtre, qui est aussi la couleur des tiges des plumes; pieds emplumés jusqu'aux doigts, blanchâtres; doigts bleuâtres; bec noirâtre; iris orangé. Taille, vingt-cinq pouces. Du Sénégal.

CHOUETTE-HIBOU DE LAPONIE, *Strix scandiaca*, Gmel. Variété accidentelle et presque blanche du Grand-Duc, selon quelques auteurs, et de la Chouette Harfang dont on aurait redressé quelques plumes, selon d'autres.

CHOUETTE-HIBOU LESCHENAU, *Strix Leschenaulti*, Temminck, pl.

col. 30. Parties supérieures d'un brun fauve, avec le milieu des plumes noirâtre; tête, aigrettes, cou et parties inférieures d'un fauve brunâtre, avec la tige des plumes noire et des stries transversales brunes; moyennes rectrices alaires striées de noir, les grandes d'un fauve cendré, frangées de brun; rémiges et rectrices brunes, rayées de fauve; face roussâtre; aréole des yeux blanchâtre; gorge blanche, rayée longitudinalement de noir; rectrices caudales inférieures cendrées, avec des traits lancéolés noirs; bec d'un jaune verdâtre entouré de soies à sa base; iris orangé; pieds d'un gris bleuâtre. Taille, dix-neuf pouces. De l'Inde.

**CHOUETTE-HIBOU DE LA LOUISIANE**, *Strix ludovicianus*, Daud. Ne diffère du Grand-Duc que par une taille un peu moins grande.

**CHOUETTE-HIBOU DU MEXIQUE**. *V.*  
**CHOUETTE-HIBOU D'AMÉRIQUE**.

**CHOUETTE-HIBOU MOUCHETÉ**, *Strix maculosa*, Vieill. Parties supérieures mouchetées de brun et de blanc; tête rayée transversalement de brun; aigrettes larges; rectrices traversées de sept bandes alternativement brunes et blanches; parties inférieures blanches rayées transversalement de brun; abdomen entièrement blanc, ainsi que les pieds. Longueur, quinze pouces. Du cap de Bonne-Espérance.

**CHOUETTE-HIBOU MOYEN DUC**. *V.*  
**CHOUETTE-HIBOU COMMUN**.

**CHOUETTE-HIBOU NACUTURU**, *Strix Nacuturu*, Vieill., *Strix magellanica*, Gmel., Buff., pl. enl. 385. Parties supérieures noirâtres, rayées de fauve et pointillées de brun et de noir; aigrettes très-longues; la plume antérieure noire, bordée de roux; un croissant noir qui part du derrière de l'œil et entoure la face; un trait noir sur le sourcil; collerette brune, bordée de roux; rémiges et rectrices fauves, traversées de bandes brunes, tachetées de roux et pointillées de noir; parties inférieures rayées de brun et de blanc; bec noirâtre. Long-

ueur, dix-sept pouces. De l'Amérique méridionale.

**CHOUETTE-HIBOU NAIN**, *Strix minuta*. Cette espèce, que Pallas a vue aux monts Oural, est très en petit l'image du Grand-Duc. Il serait possible que ce fût le Scops.

**CHOUETTE-HIBOU NOCTULE**, *Strix Noctula*, Rheinwardt, Temm., pl. color. 99. Parties supérieures fauves, variées de teintes plus claires et de noirâtre; rémiges et rectrices rayées de fauve clair; petites plumes de l'aigrette brunes, bordées de fauve, les grandes fauves, striées de brun; cercle radié des yeux finement strié de noirâtre; parties inférieures d'un fauve clair avec des stries noirâtres; quelques taches longitudinales doublement traversées ornent ces parties; bec jaune; iris orangé; pieds gris tachetés, emplumés jusqu'aux doigts qui sont jaunes. Taille, six pouces aux lignes. De Java.

**CHOUETTE-HIBOU NUDIPÈDE**, *Strix psilopoda*, Vieill., Oiseaux de l'Amérique septentrionale, pl. 22. Parties supérieures variées de taches blanchâtres et de raies noirâtres; rémiges et rectrices tachetées de blanc roussâtre; parties inférieures rayées de noirâtre; devant du cou et poitrine d'un brun foncé, pointillés de roux; pieds, et doigts dénués de plumes jaunâtres; bec noirâtre. Longueur, huit pouces. Des Antilles.

**CHOUETTE-HIBOU OUROUCOUOU**, (Stedeman.) Espèce douteuse.

**CHOUETTE-HIBOU (PETITE) DE LA CÔTE DE COROMANDEL**. *V.* **CHOUETTE-HIBOU DE COROMANDEL**.

**CHOUETTE-HIBOU PETIT-DUC**, *Strix Scops*, L., *Strix Zorca*, *Strix Carniatica*, Gmel., Buff., pl. enl. 456. Parties supérieures d'un cendré roussâtre, marquées d'ondulations et de taches irrégulières noires et brunes; avec des raies longitudinales noires, traversées par de petits traits de même couleur; aigrettes composées de six à huit petites plumes qui se relèvent en faisceaux; parties inférieures semblables aux supérieures, mais d'une teinte plus claire; pieds couverts de

plumes roussâtres, striées de noir; doigts nus; bec noir; iris jaune. Longueur, sept pouces. D'Europe et d'Afrique.

CHOUETTE-HIBOU DES PAYS. *V.*  
CHOUETTE-HIBOU COURONNÉ.

CHOUETTE-HIBOU RAYÉ, *Strix lineata*, Vieill. Parties supérieures traversées de bandes étroites, blanchâtres, jaunâtres et noires; aigrettes courtes; face rousse, variée de points noirs; rémiges brunes; parties inférieures d'un blanc roussâtre, rayé transversalement de noir et de roux; pieds emplumés, roux; bec blanchâtre. Longueur, huit pouces. De l'Amérique septentrionale.

CHOUETTE-HIBOU SANS CORNES. *V.*  
CHOUETTE-HULOTTE.

CHOUETTE-HIBOU SCOTS. *V.*  
CHOUETTE-HIBOU PETIT-DUC.

CHOUETTE-HIBOU TACHETÉ, *Strix maculata*, Vieill., Nacuturu tacheté, Azzara. Parties supérieures d'un blanc jaunâtre, avec les plumes zonées et pointillées de noirâtre; celles du sommet de la tête sont noires, bordées de fauve; aigrettes noires en dedans et blanches en dehors; un trait noirâtre veinulé de chaque côté de la tête, se rejoignant par derrière; menton blanc; parties inférieures d'un blanc jaunâtre, marquées de taches fibres, allongées; bec noir; pieds emplumés, roussâtres. Longueur, quatorze pouces. De l'Amérique méridionale.

CHOUETTE-HIBOU DES TERRES MAGELLANIQUES. *V.* CHOUETTE-HIBOU NACUTURU.

CHOUETTE-HIBOU ZORCA. *V.*  
CHOUETTE-HIBOU PETIT-DUC.

CHOUETTES PROPREMENT DITES.

*Point d'aigrette sur le front.*

CHOUETTE D'ACADIE. *V.* CHOUETTE-CHÉVÈCHETTE.

CHOUETTE A ALLES ET QUEUE FASCIEES, *Strix fasciata*, Vieill. Parties supérieures, gorge et poitrine brunes, rayées en zig-zags de rouge jaunâtre; tectrices alaires brunes; rémiges rayées de brun et de blanc; rectrices d'un brun zone.

centré; parties inférieures roussâtres, tachetées longitudinalement brun roussâtre; jambes duvetées; rousses; doigts nus et jaunes. Longueur, quatorze pouces. Des Antilles.

CHOUETTE ANCTIQUE, *Strix arctica*, Sparrm. *V.* CHOUETTE-HIBOU BÉCHYOTE.

CHOUETTE BARIOLÉE. *V.* CHOUETTE CENDRÉE.

CHOUETTE BLANCHE, Levaill., Oiseau d'Afrique, pl. 45. *V.* CHOUETTE HAFANG.

CHOUETTE BLANCHE A AIGRETTES. *V.* CHOUETTE-HIBOU A AIGRETTES COUCHÉES.

CHOUETTE BLANCHE TACHETÉE, *Strix alba*, L. *V.* CHOUETTE HAFANG.

CHOUETTE BOOBOOK, *Strix Boobook*, Lath. Parties supérieures d'un cendré brunâtre, tachetées de jaune avec la tête rayée de la même couleur; parties inférieures brunes, irrégulièrement tachetées de fauve; gorge jaune, rayée et tachetée de jaune; petit, brun; pieds emplumés, brun variés de noir. Longueur, neuf pouces. De la Nouvelle-Hollande.

CHOUETTE BRAME, *Strix Brama*, Temm., pl. color. 68. Parties supérieures brunes, régulièrement tachetées de cendré; rémiges et rectrices rayées de la même couleur; large collier formé de plumes blanches bordées de brun; joues garnies de plumes brunes; bordées de blanc; aréole de l'œil brunâtre; gorge haute du cou blanches; parties inférieures blanchâtres, parsemées de taches rhomboïdales brunes; bec jaune, avec la base entourée de longues soies noirâtres; iris jaune; ongles jusqu'aux ongles d'un duvet blanc. Taille, sept pouces. Des Indes.

CHOUETTE BRUNE, *Strix fuscata*, Vieill. Parties supérieures brun tachetées de blanchâtre sur les ailes; colerette d'un gris blanchâtre; rectrices brunes; les tectrices tachetées de blanc en dehors, et blanches en dedans; bandes transversales de blanc en dedans; parties inférieures

anches, tachetées de brun; bec noir; pieds et doigts velus, brunâtres. Longueur, huit pouces. Des Antilles.

CHOUETTE CABOURÉE, *Strix pumila*, Illig. V. CHOUETTE FÉROCE.

CHOUETTE DU CANADA, Buffon. V. CHOUETTE CAPARACCH.

CHOUETTE DU CANADA, Cuvier. V. CHOUETTE NÉBULEUSE.

CHOUETTE CAPARACCH, *Strix fucerea*, Gmel., Lath., *Strix canadensis*, Briss., *Strix hudsonia*, Gmel., *Strix Ufula*, L., *Strix nisoris*, Meyer, Chouette Épervière, Chouette à longue queue de Sibérie, Buff., pl. enl. 63. Parties supérieures obscures, tachetées irrégulièrement de blanc et de brun; front pointillé de blanc et de brun; une bande noire de chaque côté, partant de l'œil, descendant sur le cou; une grande tache brune, noirâtre à la naissance des ailes; rectrices cendrées avec des bandes brunes en zig-zags, distantes les unes des autres; parties inférieures blanches, rayées transversalement de brun cendré, avec la gorge blanchâtre; bec jaune, ordinairement tacheté de noir; pieds et doigts emplumés, blanchâtres, rayés de brun. Longueur, quatorze pouces; la queue en a six et demi. Du nord des deux continents.

CHOUETTE DE CAYENNE, *Strix cayanaensis*, Math., Buff., pl. enl. 442. Parties supérieures rousses avec des lignes transversales brunes, étroites; parties inférieures semblables, mais d'une teinte un peu plus claire; plumes de la collerette blanchâtres, avec la tige noire; bec rougeâtre; pieds et doigts duvetoux. Longueur, quatorze pouces.

CHOUETTE CATHARINE, *Strix Ufula*, Lath. V. CHOUETTE HINDOU. BRACHYOTIS.

CHOUETTE CENDRÉE, *Strix cinerea*, Lath. Parties supérieures d'un cendré brun, mélange de noir; collerette blanchâtre, entourée de jaunâtre, avec les cercles des yeux alternativement noirs et roussâtres; parties inférieures cendrées, variées de noir; une bande privée de plumes,

depuis la gorge jusqu'à la queue. Longueur, dix-huit pouces. De l'Amérique septentrionale.

CHOUETTE CHAT-HUANT, *Strix Stridula*, Lath. Parties supérieures rousses, variées de noirâtre, de teintes brunâtres, en zig-zags transversaux, tachetées de blanc sur la tête, les scapulaires et l'extrémité des grandes tectrices blaires; rectrices et rémiges rayées alternativement de brun et de roux; parties inférieures variées de blanc, de noirâtre et de roux, avec des lignes en zig-zags; pieds et doigts emplumés, blanchâtres; bec jaunâtre. Longueur, quatorze pouces. D'Europe. On regarde cette espèce comme la femelle de la Chouette-Hulotte.

CHOUETTE CHEVACHE, *Strix Passerina*, L., Gmel., Lath., *Strix Noctua*, Retz, *Strix nudipes*, Nilst., Buff., pl. enl. 439. Parties supérieures d'un gris brun, marquées de grandes taches irrégulières blanches; tête brune, avec une bande longitudinale blanche sur chaque plume; poitrine blanche; parties inférieures d'un blanc roussâtre, tacheté d'un brun olivâtre; iris jaune; pieds et doigts clairement emplumés, blanchâtres. Longueur, neuf pouces. La femelle a les couleurs moins vives, et des taches roussâtres sur le cou. Commune en Europe.

CHOUETTE CHEVÊCHETTE, *Strix acadica*, L., *Strix acadensis*, Lath., *Strix Passerina*, Retz, *Strix Teugalmi*, Var., Lath., *Strix pusilla*, Daud., *Strix pygmaea*, Bechst., Levaill., Ois. d'Afr., pl. 46. Parties supérieures brunes, tachetées et pointillées de blanc; côtés du cou et sur la gorge; quatre bandes étroites, blanches sur les rémiges; parties inférieures blanches, tachetées longitudinalement de brun et transversalement sur les flancs; pieds et doigts abondamment emplumés. Longueur, six pouces. La femelle a les teintes plus brunes et les taches blanches variées de jaune.

CHOUETTE CHEVÊCHETTE PERLÉE, *Strix perlata*, Vieill., Levaill., Ois.

d'Afr., pl. 284. Parties supérieures roussâtres, tachetées de blanc longitudinalement sur les ailes et la queue; rémiges noirâtres, terminées par un liséré blanc; parties inférieures blanches, nuancées de roux; joues et gorge blanchâtres avec un collier varié de noir; poitrine roussée, nuancée de brun et de noir. Bec jaunâtre; pieds emplumés, jaunâtres. Longueur, six pouces.

CHOUETTE CHICHICTI, *Strix Chichicti*, Lath. Tout le plumage varié de fauve, de brun et de noir; yeux noirs avec les paupières bleues. Du Mexique.

CHOUETTE CHOUCOU, *Strix Choucou*, Lath., Levaill., Ois. d'Afr., pl. 58. Parties supérieures d'un gris roussâtre avec des taches blanches sur les tectrices alaires et un liséré de la même couleur aux rémiges; les deux rectrices intermédiaires grises, les dix autres blanches avec les barbes extérieures rayées; parties inférieures d'un blanc pur. Bec noir très-court; pieds et doigts emplumés, blancs et très-petits: queue étagée, assez longue. Longueur, douze à treize pouces. Du cap de Bonne-Espérance.

CHOUETTE CHOCOUROU, *Strix Nidua*, Lath., Levaill., Ois. d'Afr., pl. 59. Parties supérieures d'un gris brun, varié de blanc; les inférieures un peu plus pâles; une plaque blanche en forme de collier à la gorge; rectrices rayées de brun noirâtre en dessus et de roussâtre en dessous; bec noir, iris d'un fauve clair; pieds et doigts emplumés, d'un gris blanchâtre, soyeux. Longueur, treize pouces. Du sud de l'Afrique.

CHOUETTE DES OLOCHERS. V. CHOUETTE EFFRAIE.

CHOUETTE A COLLIER, *Strix torquata*, Daud., *Strix perspicillata*, Var., Lath., Levaill., Oiseau d'Afrique, pl. 42. Parties supérieures d'un brun foncé; sommet de la tête et face noirs; sourcils blancs; un large collier noirâtre qui remonte vers la nuque; gorge blanche; parties inférieures d'un blanc roussâtre; rectrices inférieures rayées de blanc et de

brun. Bec noirâtre, trois ou quatre ongles et doigts emplumés, blanchâtres. Longueur, dix-sept pouces. Les jeunes ont les parties supérieures brunes mêlées de noirâtre, les inférieures roussâtres, la tête d'un gris brun avec le front noir; le cercle noir, des yeux entouré d'un autre cercle blanc qui aboutit à une bande qui descend sur le bec. D'Afrique et de l'Amérique méridionale.

CHOUETTE DE COQUIMBO. V. CHOUETTE A TERRIER.

CHOUETTE ÉCHASSE, *Strix grallaria*, Temm., pl. color. 146. Parties supérieures d'un gris brun, marquées de taches arrondies et grisâtres; sommet de la tête brun, tacheté de roux; rémiges brunes, régulièrement tachetées de roux, qui y forment à l'extrémité quatre ou cinq bandes; plumes de la queue d'un fauve roussâtre; un hausse-col grisâtre; rectrices rousses, traversées de quatre bandes plus pâles; parties inférieures d'un gris roussâtre clair, marquées de tache transversales plus foncées; tarses élevés, fauves; bec et iris jaunes. Taille, neuf pouces. Du Brésil.

CHOUETTE EFFRAIE, *Strix flammea* L., Buff., pl. enl. 440. Parties supérieures d'un fauve clair, variées de zig-zag gris et bruns, et pointillées de blanchâtre; face blanche avec l'extrémité des plumes qui sont extrêmement fines et effilées, variées de roux et de brun; formant un grand cercle coloré; parties inférieures blanches avec quelques petits points noirs quelquefois elles sont entièrement blanches et d'autres fois roussâtres ainsi que la face. Bec blanc à la base et noir à l'extrémité; iris jaune; pieds et doigts duveteux, blanchâtres. Longueur, treize pouces. La femelle a les teintes claires et mieux prononcées. Des quatre parties du monde. Très commun en Europe.

CHOUETTE EPERVIER. V. CHOUETTE CAPURACOCHE.

CHOUETTE FAUVE, *Strix fulva*, Lath. Parties supérieures d'un fauve brunâtre, tachetées de blanc; les inférieures d'un fauve clair, avec de

taches très-étalées ainsi que sur la face; bec noirâtre. Longueur, neuf pouces. De l'Afghanistan.

**CHOUEtte PEROU, *Strix pumila*,** Hig., Femm., pl. color. 3g. Parties supérieures brunes; sommet de la tête, nuque et cou supérieur brunâtres; têtes de blanc; quelques taches blanches formant un demi-collier; tectrices alaires supérieures noirâtres, avec une tache blanche à l'extrémité de chaque plume; rémiges et rectrices rayées de jaunâtre; joues d'un blanc jaunâtre, avec deux ou trois demi-cercles de taches noirâtres; gorge brunâtre; milieu de la poitrine, du ventre et de l'abdomen blanchâtres; flancs roussâtres; des lignes longitudinales brunes sur les parties inférieures; bec et iris jaunes, le premier garni à sa base de soies dirigées en avant; pieds emplumés jusqu'aux doigts blanchâtres, tiquetés de brun. Longueur, six pouces. De l'Amérique méridionale.

**CHOUEtte PEROUINEUSE, *Strix rufa*,** Lath. **CHOUEtte HULOTTE.**

**CHOUEtte FRESAIE, Buff. V.**

**CHOUEtte EFFRAIE.**

**CHOUEtte DE GEORGIE, *Strix Georgica*, Lath.** Parties supérieures brunes ondées de jaunâtre, avec les ailes et la queue rayées de blanchâtre; parties inférieures blanchâtres rayées longitudinalement de brun rougeâtre; bec jaune; pieds et doigts emplumés; blancs avec des points noirs; Longueur, quinze pouces. Amérique septentrionale.

**CHOUEtte GRISE, *Strix Littura*, Retz. V.** **CHOUEtte DE L'OURAL.**

**CHOUEtte GRISE DE SUÈDE (grande).**

**V. CHOUEtte LAPONNE.**

**CHOUEtte HANFANO, *Strix nicta*, L., *Strix candida*, Lath., *Strix nivea*, D., Buff., pl. enl. 458.** Parties supérieures blanches avec des taches et des raies transverses brunes, moins nombreuses sur les parties inférieures; tête petite; bec noir, caché dans les poils qui l'entourent; iris jaune; pieds et doigts duveteux. Longueur, deux pieds. Les jeunes ont les taches brunes très-abondantes; les individus

très-vieux sont entièrement blancs. Des parties les plus septentrionales des deux continents.

**CHOUEtte HUHUL, *Strix Fluhula*, Lath., Levaill., Ois. d'Afrique, pl. 41.** Parties supérieures d'un brun foncé, tachetées de blanc; les taches en lunules sont très-positives sur la tête et très-larges aux parties inférieures; tectrices alaires terminées par des lunules blanches; rémiges blanches, bordées de blanc; rectrices étagées, brunes; variées de trois bandes irrégulières blanches; bec noirâtre; pieds duveteux, noirâtres; taches de blanc; doigts nus; iris jaunes. Longueur, treize à quatorze pouces. De l'Amérique méridionale.

**CHOUEtte HULOTTE, *Strix Hullo*, Gmel., Buff., pl. enl. 441.** Parties supérieures d'un brun cendré, variées de grandes taches brunes et de petites rousses et blanches; tête grande, aplatie sur le sommet; rémiges et rectrices rayées alternativement de noirâtre et de roux cendré; parties inférieures d'un blanc roussâtre, avec des raies transversales brunes traversées elles-mêmes par un trait brun qui suit la direction de la tige des plumes; bec brun; iris d'un bleu noirâtre; pieds et doigts emplumés, roussâtres. Longueur, quinze pouces. La femelle, ainsi que les jeunes, ont le plumage en général plus roux, les raies transversales des rémiges et des rectrices alternativement rousses et brunes, etc., etc. On trouve quelquefois des variétés accidentelles blanches, tachetées de noir. Habitent les grandes forêts de l'Europe; elle niche ordinairement dans les nids abandonnés par les Corneilles.

**CHOUEtte DE L'ILE DE LA TRINITÉ, *Strix phalenoïdes*, Lath., Ois. de l'Amérique septentrionale, pl. 9.** Parties supérieures sauves; tachetées de blanc sur les tectrices alaires; face et parties inférieures variées de roux et de blanc; bec noir; pieds et doigts emplumés, roussâtres. Longueur, six pouces.

**CHOUEtte A LONGUE QUEUE DE SIBÉRIE. V. CHOUEtte DE L'OURAL.**

**CHOUETTE DE JAVA**, *Strix javanica*, Lath. Parties supérieures cendrées, nuancées de roussâtre, tachetées de blanc et de noir; parties inférieures d'un blanc jaunâtre, tachetées de noir avec les flancs d'une teinte plus obscure.

**CHOUETTE JOUGAU**, *Strix sinensis*, Lath. Parties supérieures d'un roux brun avec des taches blanches sur la tête et le cou, et des raies transversales de la même couleur sur le dos et les ailes; rémiges et rectrices brunes; face rousse; parties inférieures blanchâtres avec chaque plume marquée transversalement de quatre traits noirs; bec noir; pieds duveteux, roux; moitié des doigts nue et jaune. Longueur, seize pouces. Des Moluques.

**CHOUETTE LAPIN**. *V. CHOUETTE A TERRIER*.

**CHOUETTE LAPONNE**, *Strix laponica*, Retz. Parties supérieures grises, couvertes de taches et de zig-zags bruns; tête très-grande; face large, formée d'un disque radié, gris, avec des rayons bruns; un large cercle de plumes contournées noires et blanches, entoure le disque; rémiges et rectrices brunes, ornées de bandes en zig-zags, noirâtres; parties inférieures blanchâtres, parsemées de taches allongées, brunes; rectrices caudales, blanches; pieds et doigts rayés de zig-zags blancs et bruns; bec jaune, caché dans les plumes et les soies qui l'entourent; pieds très-emplumés. Longueur, deux pieds. La femelle est un tiers plus grande. Des parties les plus septentrionales de l'Europe où elle paraît être fort rare.

**CHOUETTE A LUNETTE**, *Strix perspicillata*, Lath., Syn., pl. 57. Parties supérieures rousses, brunâtres, avec le sommet de la tête et le dessus du cou blancs et cotonneux; face noirâtre; rémiges et rectrices brunes, rayées transversalement de fauve et terminées de blanc; parties inférieures d'un blanc roussâtre avec une bande marquée sur la poitrine; bec jaune entouré de soies noires; pieds et doigts emplumés, jaunâtres. Longueur, dix-neuf

pouces. De l'Amérique méridionale.

**La CHOUETTE A MASQUE NOIR** Levaill., Ois. d'Afrique, pl. 44, est considérée par Latham comme une variété de la précédente; elle a le plumage blanc, à l'exception des plumes de la face qui sont noires, et des scapulaires qui sont tachetés de noir; les ailes et la queue ont une teinte brune assez foncée; les pieds sont emplumés et noirâtres.

**CHOUETTE MAUGÉ**, *Strix Maugei* Tem., pl. color. 46. Parties supérieures d'un brun fauve, avec une tache blanche à l'extrémité des tectrices alaires; plumes de la face roussâtres variées de blanc; rémiges d'un brun noirâtre, rayées à d'assez grandes distances de lignes transversales fauves; rectrices brunes, ondulées de brun clair; parties inférieures variées de cendré et de fauve avec des taches brunes allongées sur la poitrine, et des taches blanches arrondies sur les flancs; bec jaune, entouré de poil noirs; iris jaune; pieds et doigts emplumés, variés de blanchâtre et de fauve. Longueur, dix pouces. De Antilles.

**CHOUETTE DE LA MER CASPIENNE** *Strix accipitrina*, Pall. *V. CHOUETTE-HIBOU BRACHYOTE*.

**CHOUETTE DU MEXIQUE**, *Strix Tolchiquatl*, Lath. Plumage extrêmement épais, varié de blanc, de fauve et de noir; le fauve domine sur le dos; les ailes sont noirâtres; parties inférieures blanches; bec noirâtre; iris jaune; pieds emplumés d'un blanc roussâtre. Longueur, quatorze pouces.

**CHOUETTE MONTAGNARDE**, *Strix barbata*, Lath. Plumage généralement cendré, avec la face et la gorge noires; bec et iris jaunes. De la Sibérie.

**CHOUETTE NÉBULEUSE**, *Strix nebulosa*, L., Chouette du Canada, Cuv. Parties supérieures d'un brun cendré rayées transversalement de blanchâtre et de jaunâtre avec un grand nombre de taches blanches sur les tectrices alaires; face cendrée; devant du cou et poitrine blanchâtres, rayées transversalement de brun clair; par



ties inférieures blanchâtres avec des taches allongées brunes, qui suivent la direction de la tige des plumes; pieds et moitié des doigts emplumés, le reste couvert d'écailles jusqu'aux ongles; bec jaune; iris brun. Longueur, vingt pouces. La femelle est un peu plus grande, et l'on remarque plus de taches blanches sur les parties supérieures. Les jeunes ont au contraire des teintes plus foncées. Du nord des deux continents.

**CHOUETTE NOCTUELLE**, *Strix Noctua*, Lath., Var. *V.* **CHOUETTE HULLOTTE**.

**CHOUETTE DE LA NOUVELLE-ZÉLANDE**. *V.* **CHOUETTE FAUVE**.

**CHOUETTE NUDIPÈDE**, *Strix nudipes*, Lath., Ois. de l'Amérique septentrionale, pl. 16. Parties supérieures brunâtres, avec le front et les petites tectrices alaires tachetées de blanc; parties inférieures d'un blanc sale, parsemées de taches brunes en forme de lyres; gorge grise; pieds nus et bruns; bec noirâtre. Longueur, sept pouces six lignes. Des Antilles.

**CHOUETTE OCCIPITALE**, *Strix occipitalis*, Temm., pl. color. 34. Parties supérieures d'un brun fauve, parsemées de petites taches rondes et de grandes taches ovalaires d'un blanc cendré; sommet de la tête d'un roux brunâtre, tacheté de blanc; une grande plaque blanche tachetée de brun, de chaque côté à l'occiput; rémiges et rectrices brunes, rayées de jaune d'ocre; joues cendrées; parties inférieures blanchâtres, avec de larges traits longitudinaux, d'un brun roussâtre; une double rangée de taches semblables, mais plus arrondies sous le cou; bec jaune; quelques poils courts à sa base; iris orangé; pieds blanchâtres, variés de roux, couverts de duvet jusqu'aux ongles. Longueur, sept à huit pouces. Du Sénégal.

**CHOUETTE ONDULÉE**, *Strix undulata*, Lath. Parties supérieures d'un brun noirâtre, avec le bord des plumes fauve; tectrices alaires tachetées de blanc à leur extrémité; tête, gorge et parties inférieures ondulées de blanc; bec cendré; pieds emplu-

més, jaunâtres; doigts nus. Longueur, douze pouces. De l'île de Norfolk.

**CHOUETTE DE L'OURAL**, *Strix uralensis*, Pallas, *Strix Litata*, Reiz, Temm., pl. color. 27. Parties supérieures blanchâtres, marquées de grandes taches longitudinales brunes; tête grande; face large, très-emplumée, d'un gris blanchâtre, garnie de poils noirs et entourée d'un cercle noir et blanc; rémiges et rectrices rayées alternativement de bandes brunes et blanchâtres; parties inférieures blanchâtres, avec le milieu de chaque plume marqué d'une raie longitudinale brune; queue étagée, beaucoup plus longue que les ailes; bec jaune, caché dans les poils; iris brun; pieds et doigts emplumés, blancs, tachetés; ongles longs, jaunâtres. Longueur, deux pieds. Les jeunes ont les parties supérieures tachées irrégulièrement de brun, de roux et de blanc, les ailes et la queue rayées transversalement de gris; c'est alors : *Strix Macroura*, Meyer, Chouette des monts Oural, Seau.

**CHOUETTE PETITE**. *V.* **CHOUETTE CHEVÈCHE**.

**CHOUETTE PETITE CHEVÈCHE D'UPLANDE**. *V.* **CHOUETTE TENGMALM**.

**CHOUETTE PHALÉNOÏDE**. *V.* **CHOUETTE DE L'ÎLE DE LA TRINITÉ**.

**CHOUETTE DE PORTO-RICCO**. *V.* **CHOUETTE NUDIPÈDE**.

**CHOUETTE RAYÉE DE LA CHINE**. *V.* **CHOUETTE JOUGOU**.

**CHOUETTE ROUGE-BRUN**. *V.* **CHOUETTE CHEVÈCHETTE**.

**CHOUETTE DE SAINT-DOMINGUE**, *Strix Dominicensis*, Lath. *V.* **CHOUETTE SUINDA**.

**CHOUETTE DE SOLOGNE**, *Strix soloniensis*, Lath. *V.* **CHOUETTE HULLOTTE**.

**CHOUETTE SONNERAT**, *Strix Sonnerati*, Temm., pl. color. 21. Parties supérieures d'un brun roux, avec des points blancs sur la tête et les scapulaires; des taches blanchâtres sur l'extrémité des tectrices alaires; rémiges bordées de brunâtre, tachetées régulièrement de cendré; face composée de plumes radiales blanchâtres,

compèdes de roux et entremêlées de soies noires; parties inférieures d'un blanc sale, rayées transversalement de traits bruns bordés de noirâtre, avec la tige des plumes noires; bec jaune; iris verdâtre; pieds et doigts emplumés, fauves; ongles jaunes. Longueur; dix à onze pouces. De l'Inde.

**CHOUETTE A SOURCILS BLANCS**, *Strix supercilialis*; Vieill. La description que donne Vieillot de cet Oiseau, se rapporte entièrement à celle du précédent, et comme il ne parle pas de la patrie de la Chouette à sourcils blancs, qu'il se borne à dire qu'elle existe au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, il est probable que Vieillot aura décrit sous ce nom l'espèce figurée sous un autre par Laugier et Temminck.

**CHOUETTE SPADICÉE**, *Strix spadicea*; Rheinwardt, pl. color. 98. Parties supérieures d'un roux foncé; tête, nuque, cou, poitrine et joues d'un brun noirâtre, finement striés en travers de fauve; petites et grandes tectrices alaires terminées de blanc, ce qui forme sur les ailes deux bandes de cette couleur; rémiges et rectrices rayées de jaune ochracé; gorge blanche; parties inférieures blanchâtres, variées de brun rougeâtre; bec d'un gris jaunâtre, entouré à sa base de poils dirigés en avant; iris jaune; pieds emplumés, gris et bruns, avec les doigts couverts de poils. Longueur, sept pouces. De Java.

**CHOUETTE SUINDA**, *Strix Suinda*, Vieill. Parties supérieures noirâtres, variées de brun et tachetées de roussâtre; collerette noirâtre variée de brun, de roussâtre et de gris, avec l'angle antérieur de l'œil blanc; gorge brune, avec le bord des plumes roussâtre; poitrine fauve, rayée longitudinalement de brun; ventre et abdomen d'un gris roussâtre. Longueur, quatorze à quinze pouces. De l'Amérique méridionale.

**CHOUETTE TENGMALE**, *Strix Tengmalmi*, L., *Strix Dasypus*, Bechst., *Strix Noctua*, Tengm. Parties supérieures noirâtres variées de roussâtre, avec des petites taches blanches sur la

tête et la nuque; les parties inférieures sont d'une teinte un peu moins foncée; bec et iris jaunes; pieds et doigts duveteux; blanchâtres. Longueur, huit pouces quatre lignes. La femelle est un peu plus grande; elle a les taches blanches plus nombreuses, et elles s'étendent jusque sur les tectrices alaires; les parties inférieures sont variées de blanc. Du nord de l'Europe.

**CHOUETTE A TERRIER**, *Strix cucularia*, Vieill. Parties supérieures variées de gris fauve et de brun, tachetées de brun; un double cercle blanc et gris forme la face; une bande blanche au-dessus des yeux; parties inférieures blanchâtres, roussâtres vers les flancs, et tachetées de brun; bec verdâtre, noir sur les côtés; iris jaune; pieds et doigts duveteux, gris. Longueur, neuf à dix pouces. De l'Amérique méridionale dont elle habite les savannes; elle y creuse à quelques pieds sous terre, son nid où elle dépose une douzaine d'œufs blancs presque ronds.

**CHOUETTE TOLCHICUATLI**. ✓.

**CHOUETTE DU MEXIQUE**.

**CHOUETTE URECURU**, Azzara. ✓.

**CHOUETTE A TERRIER**.

**CHOUETTE WAPACUTHU**, *Strix Wapacuthu*, Lath. Parties supérieures blanches, rayées transversalement et tachetées de brun rougeâtre; rémiges et rectrices rayées de noir et de rougeâtre; extrémité des plumes de la tête, noire; face, joues et gorge blanches; parties inférieures blanches; bec noir; iris jaune; pieds et doigts emplumés, blanchâtres. Longueur, dix-huit pouces. Des rives de la baie d'Hudson.

**CHOUETTE AUX YEUX VERTS**, *Strix sylvestris*, Lath. Espèce douteuse que l'on présume être une variété de la Chouette Hulotte. (M. N.)

**CHOUETTE**. INS. Nom vulgaire d'un Lépidoptère, *Noctua sponsa*, Latr., et de la Chenille du Seneçon, décrite par Godart. (A. P.)

**CHOUETTE DE MER**, voir Syn. de Lump. ✓. *Ocyrops*.

**CHOSETTE ROUGE.** ois. Nom vulgaire du Choquard. *V. PYRHO-CORAX.* (DR..Z.)

**CHOUGH.** ois. Syn. anglais du Coraïas, *Corvus Graculus*, L. *V. PYRHO-CORAX.* (DR..Z.)

\* **CHOUGOU NIDJIOU.** BOT. PHAN. Syn. d'Eau de Coco, aux îles Marianes, suivant Gaimard. (B.)

**CHOUHAK.** BOT. PHAN. (Delille.) Nom de pays du *Spartium thebaicum*, décrit dans le grand ouvrage sur l'Egypte. (B.)

**CHOUK.** BOT. PHAN. Ce nom arabe qui, selon Delille, signifie épine, a été donné à diverses Plantes piquantes, telles que l'*Asparagus horridus* et le *Carduus syriacus*, tels sont encore :

**CHOUK-AAGOU,** l'*Asparagus aphyllus*.

**CHOUK-EL-GEMEL,** c'est-à-dire Epine ou Chardon du Chameau, l'*Echinops spinosus*, etc. (B.)

**CHOULAN, KHOULAN** ou **KOULAN.** MAM. Syn. kalmoucks d'Onagre. *V. CHEVAL.* (B.)

\* **CHOUPA.** POIS. *V. CHEPA.*

**CHOUQUETTE.** ois. Syn. vulgaire du Choucas, *Corvus Monedula*, L. *V. CORBEAU.* (DR..Z.)

**CHOURLES** ou **CHURLES.** BOT. PHAN. Vieux noms français des Ornithogales, particulièrement de celle qu'on nomme vulgairement *Dame de onze heures*. (B.)

**CHOVA.** ois. *V. CHOB.*

**CHOVANNA-MAUDARU.** BOT. PHAN. Syn. malabare de Bauhinie. *V. ce mot.* (B.)

**CHOYKA.** BOT. PHAN. *V. CHOINA.*

**CHOYNE.** BOT. PHAN. (J. Bauhin.) Syn. présumé de *Crescentia*. (B.)

\* **CHOZAM.** BOT. PHAN. (Forsk.) Syn. arabe de *Cleome ornithopodioides*, L. (B.)

**CHRACHOLEK.** ois. Syn. polonois du Cormoran, *Pelecanus Carbo*, L. *V. CORMORAN.* (DR..Z.)

**CHRESI.** BOT. PHAN. Syn. arabe de *Zygophyllum album*, L., et, selon Forsk., de *Salicornie*. (B.)

\* **CHREEK-WILL'S-WIDOW.** ois. Syn. américain de l'Engoulevent roux. *V. ENCOULEVENT.* (DR..Z.)

\* **CHREMIS.** POIS. Nom grec d'un Poisson qu'on ne saurait reconnaître sur le peu qu'on en a dit. (B.)

**CHRISAORE.** ACAL. et MOLL. *V. CHRYSAORE.*

**CHRISTE-MARINE.** BOT. PHAN. Selon les différens pays maritimes de la France, on donne ce nom à la *Salicornie* herbacée, à l'*Inule* et au *Chrithme* maritimes, dont les feuilles se confisent au vinaigre ou à la saumure, comme les Cornichons, et se mangent sur les meilleures tables. (B.)

**CHRISTIE.** *Christia.* BOT. PHAN. Mœnch appelle ainsi le genre *Lourea* de Necker, que ce dernier a établi pour l'*Hedysarum vespertilionis*, L.; le nom de Necker étant plus ancien, doit être conservé. *V. LOUREA.* (A. R.)

**CHRISTOKN.** BOT. PHAN. Le Houx dans les langues du Nord. (B.)

**CHRISTOPHORIANA.** BOT. PHAN. Nom de l'*Actæa spicata* chez les anciens botanistes, donné aussi à des Aralies et à l'*Adonis* du Cap. (B.)

\* **CHRISTOPHON.** POIS. Syn. de *Zeus Faber*, chez les Grecs modernes. *V. ZÉE.* (B.)

\* **CHRITHARI.** BOT. PHAN. Syn. d'Orge chez les Candiotes. (B.)

**CHRITHMON.** BOT. PHAN. Syn. de *Salicornie* chez les Grecs modernes. (B.)

**CHROKIEL.** ois. Syn. polonois de la Caille, *Perdix Colturnix*, L. *V. PERDRIX*, division des Cailles. (DR..Z.)

**CHROMATES.** MIN. Résultats de la combinaison de l'Acide chromique avec les bases salifiables. Jusqu'ici on n'a encore rencontré à l'état natif que deux de ces combinaisons. *V. FER* et *PLOMB CHROMATÉS.* (DR..Z.)

**CHROMIQUE.** MIN. *V. ACIDE CHROMIQUE.*

**CHROME. MIN.** Nom donné par Haüy au Métal découvert par Vauquelin dans le Plomb rouge de Sibérie, et qui fait allusion aux propriétés éminemment colorantes de ce Métal, dont l'Acide est d'une belle couleur rouge, et dont l'Oxide est d'un vert d'Émeraude très-pur : aussi cette précieuse substance est-elle aujourd'hui d'un grand usage dans la peinture sur Porcelaine et dans l'art de colorer le verre. Les Minéraux qui la renferment peuvent être divisés en deux classes : la première est composée de ceux dans lesquels le Chrome entre essentiellement, tels que le Plomb chromaté, le Plomb chromé ou la Vauquelinite, et le Fer chromaté. La seconde classe est composée des substances qui n'offrent le Chrome que comme principe accidentel ou comme principe colorant. Elles sont au nombre de six. La première, qui est le Spinelle, doit sa belle couleur rouge à l'Acide chromique. Les cinq autres empruntent leur couleur verte de l'Oxide de Chrome. Ce sont l'Émeraude du Pérou, la Diallage verte, l'Amphibole dite Actinote, le Pyroxène (Coccolite et Therrolite), et l'Anagénite ou Brèche ancienne, qui forme le sommet de la montagne des Écouchets, entre le Creusot et Couches, département de Saône-et-Loire. L'Oxide de Chrome existe en veines minces dans cette Brèche composée de fragmens de Feldspath rougeâtre et de Quartz gris, avec quelques parcelles de Mica noir. La substance nommée Calcédoine du Creusot, que Leschevin a retrouvée dans le même endroit, n'est, suivant lui, qu'un Quartz hyalin translucide pénétré d'Oxide de Chrome. Enfin, ce Métal existe aussi, mais d'une manière invisible, dans les Aréolithes où il a été découvert par Laugier. (G. DEL.)

**CHROMIS.** *Chromis*. POIS. Genre formé par Cuvier (Règn. An., p. 266) aux dépens des Labres, des Sparres et même des Choetodons, dans l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Labroïdes. Ses caractères sont : os intermaxillaires protractiles, une seule

dorsale avec des filamens ; dentelours aux mâchoires et au pignone latéral interrompue, les veines prolongées en longs filets ; de molaires ; l'estomac en cul de sac et sans cœcum. Les Chromis ont la figure des Labres. On en connaît plusieurs espèces.

Le CASTAGNEAU ou PETIT CASTAGNEAU, Rond., liv. v, p. 152, *Chromis mediterranea*, Cuv. ; *Syll. Chromis*, L., Gmel., *Syst. Nat.* XIII, t. 1, part. 2, p. 1274 ; le Liron, Encycl. Pois., quidonne, pl. f. 187, un dessin qui ne convient à la description, puisqu'on n'y voit pas le prolongement en forme de ment du second rayon des ventrales. On pêche ce Poisson par mail dans la Méditerranée.

Le BOLT ou BOLTY, Sonnini 28, f. 1, *Chromis nilotica*, Cuv., *brus niloticus*, L., Gmel., *loc.* 4290. C'est d'après Hasselquitz qu'un Poisson a été premièrement décrit comme se trouvant en Egypte, dans les eaux douces. Il s'y nourrit de insectes et de Vers ; sa chair est exquise.

Les autres espèces connues du genre qui nous occupe sont : le Sparille, *Sparus saxatilis*, L., Gmel., *loc. cit.*, 1271, *Perca saxatilis* Bloch, pl. 309 ; — le Ponctué, *brus punctatus*, Bloch, pl. 295, lequel on doit rapporter le Poisson que Lacépède, T. IV, pl. 2, f. 1, garde comme une variété du Sparillon ; — le Filamenteux, Lacép., III, pl. 28, f. 2 ; — le Labre à queues épinées, Lac., T. III, pl. 25, f. 1 ; — *Sparus surinamensis*, Bloch, pl. 2, f. 2, et le *Choetodon suratensis*, Bloch, pl. 217.

Cuvier propose de former dans le genre Chromis, un sous-genre pour renfermer les espèces dont la tête est très-comprimée, les yeux fort rapprochés, et dont les ventrales sont longues. Cette division serait désignée par le nom de PLESIOIRS.

**CHROSCIÉL.** OIS. Syn. polon. de la Gallinule de Genêt, *Rall. Crax*, L. *V. GALLINULE*. (DR.)

\* **CHRYPHIOSPERME.** *Cryphiospermum*. BOT. PHAN. Sous le nom de *Cryphiospermum repens*, Palisot de Beauvois a décrit et figuré (*Fl. Ow. et Ben.*, T. II, p. 25, t. 74) une Plante rampante de la famille des Synanthérées, à laquelle il donne pour caractères : un involucre triphylle, des demi-fleurons portés sur un réceptacle paléacé, une corolle cuculliforme tubuleuse à cinq dents, des fruits triangulaires, couronnés par une membrane quinquécide, et cachés dans deux écailles intimement rapprochées.

Cette Plante dont la tige est rampante, les feuilles opposées lancéolées, un peu dentées, les capitules axillaires, croît sur les bords du fleuve Formose. C'est une de celles dont les naturels du pays font usage pour la guérison des plaies. (A. R.)

**CHRYSA.** BOT. PHAN. Dans le Journal de Botanique pour 1808, vol. 2, p. 170, Rafinesque Schmaltz a donné ce nom au genre déjà connu sous celui de *Coptis* que lui a imposé Salisbury, et qui a pour type l'*Hel-leborus trifolius*, L. Le *Chrysa borealis*, Raf., doit donc être rapporté au *Coptis trifolia*, Salisb. et D. C. *V. COPTIS.* (G. N.)

\* **CHRYSEÆ.** BOT. PHAN. (Dalcamp.) Syn. d'*Impatiens Noli-metangere*, L. *M. BALSAMINE.* (B.)

**CHRYSAETOS.** OIS. (Linné.) Syn. de l'Aigle royal, *Falco fulvus*, L. *V. AIGLE.* (DALL. Z.)

**CHRYSAÏDE.** INS. On désigne généralement sous ce nom, et plus improprement encore sous celui de *Fève durcie*, la nymphe des Lépidoptères. Cet état intermédiaire de la métamorphose perdrait beaucoup de l'intérêt qu'il offre, si on ne l'envisageait pas en même temps dans toutes les classes : c'est pour ce motif que nous renvoyons l'étude des Chrysaïdes au mot NYMPHE. (AUD.)

**CHRYSAÏTE.** FOSS. Sous ce nom Mercator (*Métal.*, p. 311) a désigné une espèce d'Ammonite dont la sur-

face ressemble à celle d'une Chrysaïde. *V. AMMONITE.* (DALL.)

**CHRYSAMMONITE.** FOSS. Les anciens oryctographes, comparant l'éclat de certaines chrysalides de Papillons diurnes au brillant métallique qui se remarque sur la plupart des Ammonites dont le test est conservé, avaient consacré ce rapprochement dans la coloration par cette dénomination qui n'est plus usitée.

(D. II.)

**CHRYSANTHELLE.** *Chrysanthellum*. BOT. PHAN. Dans le *Synopsis* de Persoon, le professeur Richard père a établi ce genre de la famille des Synanthérées et de la Syngénésie superflue de Linné. Il lui a donné les caractères suivans : involucre cylindrique, d'une longueur presque égale à celle des fleurons, muni d'écailles à la base, réceptacle couvert de paillettes planes, fleurs de la circonférence très-nombreuses, à corolles linéaires, courtes et bidentées; celles du centre en petit nombre et dont la plupart sont stériles : akènes légèrement sillonnés et cylindriques, entremêlés d'autres plus comprimés, à bord entier.

La seule espèce dont se compose ce genre, faisait autrefois partie du genre *Verbesina* de Linné, et ne présente pas de caractères différentiels fort notables; il a donc fallu que son auteur, qui en a bien apprécié la distinction, suppléât à ce défaut de notes caractéristiques bien tranchées par un ensemble de caractères plus détaillés. Les Verbesines néanmoins s'en distinguent assez par la présence d'une aigrette aristée, c'est-à-dire formée d'écailles filiformes et scarieuses. — Le *Chrysanthellum procumbens*, Rich., *Verbesina nutica*, L., est une Plante des pâturages humides de l'Amérique, dont les feuilles sont alternes et tripartites, les pédoncules allongés et uniflores, et la tige couchée. Elle est figurée dans Lamarck, *Illustrat.* T. 686, f. 2. (G. N.)

**CHRYSANTHÈME.** *Chrysanthemum*. BOT. PHAN. On nomme ainsi

d'Afr., pl. 280. Parties supérieures roussâtres, tachetées de blanc longitudinalement sur les ailes et la queue; rémiges noirâtres, terminées par un liséré blanc; parties inférieures blanches, nuancées de roux; joues et gorge blanchâtres avec un collier varié de noir; poitrine rousse, nuancée de brun et de noir. Bec jaunâtre; pieds emplumés, jaunâtres. Longueur, six pouces.

**CHOUETTE CHICHICCTI**, *Strix Chichiccti*, Lath. Tout le plumage varié de fauve, de brun et de noir; yeux noirs avec les paupières bleues. Du Mexique.

**CHOUETTE CHOUCOU**, *Strix Choucou*, Lath., Levaill., Ois. d'Afr., pl. 58. Parties supérieures d'un gris roussâtre avec des taches blanches sur les tectrices alaires et un liséré de la même couleur aux rémiges; les deux rectrices intermédiaires grises, les dix autres blanches avec les barbes extérieures rayées; parties inférieures d'un blanc pur. Bec noir très-court; pieds et doigts emplumés, blancs et très-petits; queue étagée, assez longue. Longueur, douze à treize pouces. Du cap de Bonne-Espérance.

**CHOUETTE CHOCOTROU**, *Strix Nidula*, Lath., Levaill., Ois. d'Afr., pl. 59. Parties supérieures d'un gris brun, varié de blanc; les inférieures un peu plus pâles; une plaque blanche en forme de collier à la gorge; rectrices rayées de brun noirâtre en dessus et de roussâtre en dessous; bec noir; iris d'un fauve clair; pieds et doigts emplumés, d'un gris blanchâtre, soyeux. Longueur, treize pouces. Du sud de l'Afrique.

**CHOUETTE DES OLOCHERS**, *Strix Chouette*, Lath.

**CHOUETTE A COLLIER**, *Strix torquata*, Daud., *Strix perspicillata*, Var., Lath., Levaill., Oiseau d'Afrique, pl. 42. Parties supérieures d'un brun foncé; sommet de la tête et face noirs; sourcils blancs; un large collier noirâtre qui remonte vers la nuque; gorge blanche; parties inférieures d'un blanc roussâtre; rectrices inférieures rayées de blanc et de

brun. Bec noirâtre, iris jaunâtre; pieds et doigts emplumés, blanchâtres. Longueur, dix-sept pouces. Les jeunes ont les parties supérieures brun mêlées de noirâtre, les inférieures roussâtres, la tête d'un gris brun à le front noir; le cercle noir, des yeux entouré d'un autre cercle blanc aboutit à une bande qui descend le bec. D'Afrique et de l'Amérique méridionale.

**CHOUETTE DE COQUIMBO**, *Strix Chouette*, Lath.

**CHOUETTE ÉCHASSE**, *Strix grallaria*, Temm., pl. color. 146. Parties supérieures d'un gris brun, marquées de taches arrondies et grisâtres; sommet de la tête brun, tacheté de roux; rémiges brunes, régulièrement tachetées de roux qui y forme vers l'extrémité quatre ou cinq bandes; tectrices de la face d'un fauve roussâtre; un hausse-col grisâtre; rectrices roses, traversées de quatre bandes pâles; parties inférieures d'un gris roussâtre clair, marquées de taches transversales plus foncées; tarses éverés, fauves; bec et iris jaunes. Taille, neuf pouces. Du Brésil.

**CHOUETTE EFFRAIE**, *Strix flammea*, L., Buff., pl. enl. 440. Parties supérieures d'un fauve clair, variées zig-zag de gris et de bruns, et pointillées blanchâtres; face blanche avec l'extrémité des plumes qui sont extrêmement fines et effilées, variées de roux et de brun; formant un grand cercle coloré; parties inférieures blanches avec quelques petits points noirs; quelquefois elles sont entièrement blanches et d'autres fois roussâtres ainsi que la face. Bec blanc à la base et noir à l'extrémité; iris jaunes; pieds et doigts duveteux, blanchâtres. Longueur, treize pouces. La femelle a les teintes claires et mieux prononcées. Des quatre parties du monde. Très commun en Europe.

**CHOUETTE EPERVIER**, *Strix Chouette*, Lath.

**CHOUETTE FAUVE**, *Strix fulva*, Lath. Parties supérieures d'un fauve brunâtre, tachetées de blanc; les inférieures d'un fauve clair, avec de

**CHRYSIDIDES.** *Chrysidides*. INS.  
V. CHRYSIDES.

**CHRYSIDIFORME.** INS. Eugamelle (Pap. d'Europe) a désigné sous ce nom un Insecte lépidoptère de la division des Crépusculaires qui appartient au genre *Sesia*, *Sesia Chrysidiformis* d'Ochsenheimer (*die Schmetterlinge von Europa*). (AUD.)

\* **CHRYSIPEA.** BOT. PHAN. (Plin.) Syn. présumé de *Scrophulaire*. (B.)

**CHRYSIS.** BOT. PHAN. (Rencatume.) Syn. d'*Hélianthe* annuel. (B.)

**CHRYSIS.** *Chrysis*. INS. Genre de l'ordre des Hyménoptères, section des Térébrans, très-anciennement admis, et ne comprenant aujourd'hui, suivant Latreille et le plus grand nombre des entomologistes, que les espèces qui offrent pour caractères : mandibules n'ayant qu'une seule dent ou crénelure au côté interne ; palpes maxillaires sensiblement plus longs que les labiaux, de cinq articles ; languette entière et arrondie. Ce genre, qui appartenait d'abord (Consid. génér., p. 310) à la famille des Chrysidides, a été depuis rangé par Latreille (Règn. An. de Cuv.) dans la famille des Pupivores, tribu des Chrysidés. Plusieurs des caractères assignés à cette tribu conviennent parfaitement aux *Chrysis* proprement dits : aussi ne parlerons-nous que de ce que celles-ci offrent de particulier. Outre la dent unique qu'on voit au côté interne des mandibules, elles ont un abdomen en demi-ovale, assez allongé, tronqué au bout et offrant souvent près de cette extrémité une rangée transverse de gros points enfoncés. Ce genre diffère de celui des *Parnopès* par des mâchoires et des lèvres non prolongées en une sorte de trompe et par le nombre d'articles des palpes maxillaires ; il s'éloigne des *Cleptes* par le nombre des segments visibles à l'abdomen et par la forme de cette partie ; il ne pourra être confondu avec les *Hédichères* et les *Elam-*

dentées. Enfin, quoique très-voisin des *Stilbes* et des *Euchrés*, auxquels Latreille (Règn. Anim. de Cuv.) l'a réuni, il se distinguera du premier de ces genres, parce qu'il n'existe pas de pointe ou prolongement soutelligé à la partie postérieure du thorax, et du second par l'absence d'un cordon élevé ou bourrelet traversant brusquement le segment terminal de l'abdomen.

Les *Chrysis* sont de petits Insectes très-agiles, très-vifs, se roulant en boule lorsqu'on les saisit, et qui d'ailleurs sont très-remarquables par les couleurs brillantes à reflets métalliques de leurs corps. On les trouve quelquefois sur les fleurs, les murailles, les vieux bois, les bords élevés des chemins ; elles fréquentent les lieux exposés au midi, et paraissent en grand nombre lorsque le soleil brille. Elles répandent une odeur assez forte et peu agréable. On ne connaît pas leurs métamorphoses, mais on présume que leurs larves sont parasites et qu'elles se nourrissent aux dépens de celles de plusieurs Hyménoptères. Les femelles sont remarquables par les anneaux rentrants de l'abdomen au bout desquels on voit un petit aiguillon. Degér (Mém. sur les Ins., T. II, p. 854, pl. 28) a décrit avec soin les détails curieux de ces parties. Pelletier de Saint-Fargeau a donné (Ann. du Mus. d'Hist. Nat., T. VII, p. 115) une Monographie de la tribu des *Chrysidés* ; elle est accompagnée de bonnes figures. Cet auteur décrit vingt-neuf espèces appartenant au genre *Chrysis* de Latreille ; nous n'en citerons qu'une seule qui peut être considérée comme le type du genre, le *Chrysis enflammé*, *Chr. ignita*, L., Fabr., Latr., ou la Guêpe dorée à ventre cramoisi de Degér (*loc. cit.*), qui est la même que la Guêpe dorée à corselet vert et derniers anneaux du ventre épineux ; de Geoffroy (Hist. des Ins., T. II, p. 382, n. 20). Elle a été représentée par Panzer (*Faun. Ins. Germ.*, fasc. 5, tab. 25), et se trouve très-communément aux environs de Paris. V., pour les

autres espèces de *Chrysis*, Linné et Fabricius, dans leurs différents ouvrages; Latreille (*Genera Crust. et Ins.* T. IV, p. 50), Panzer (*loc. cit.*), Jurine (*Classif. des Hyménopt.*, p. 293), et Pelletier de Saint-Fargeau (*loc. cit.*). (AUD.)

**CHRYSITE.** MIN. L'un des noms de la Pierre de touche chez les anciens. (LUC.)

• **CHRYSITIS.** BOT. PHAN. Chez les anciens, ce nom désignait quelques espèces de *Gnaphalium*; particulièrement le *Stachas*. (L.)

**CHRYSITRIX.** BOT. PHAN. Ce genre, de la famille des Cypéracées et de la Polygamie Monœcie de Linné, a été établi par cet illustre naturaliste sur une Plante du Cap, qui offre les caractères suivans : fleurs disposées en épi très-dense ovale et cylindrique, composé d'écaillés spathacées coriaces et concaves, renfermant un faisceau de paillettes lancéolées cartilagineuses, entre chacune desquelles est située une étamine de même longueur à filets capillaires et à anthères adnées; un seul ovaire placé au centre du faisceau de paillettes, oblong et obtus, supportant un style de la longueur des étamines et divisé en trois stigmates, saillans et hérissés de papilles. Les auteurs, et Lamarck lui-même (*Encycl. méth.*), décrivent ce stigmate comme simple; cependant la figure donnée par ce dernier botaniste (*Illustr.*, 842, f. 4) le représente tel que nous l'avons décrit. On a voulu rapporter à ce genre le *Chondrachne* de R. Brown qui présente des caractères très-analogues; cependant le style bifide de ce dernier genre, et la différence que cet auteur mentionne entre le *Chorizandra* (genre voisin du *Chondrachne*), et le *Chrysitrix*, ne permettent pas de supposer que Brown se soit mépris à cet égard.

Le *Chrysitrix capensis*, L., unique espèce du genre, est une Plante qui, par ses feuilles nasiformes et engainantes, a le port des graminées. Elle

croît au cap de Bonne-Espérance (G.N.)

**CHRYSOBALANE.** *Chrysobalanus*. BOT. PHAN. Ce genre, que l'on désigne également sous le nom de caquier, fait partie de la section de Drupacées dans la famille des Rosacées. Il se compose de deux ou trois espèces américaines qui sont des Arbres à feuilles alternes et entières, dépourvues de stipules, ayant les fleurs assez petites, hermaphrodites, disposées en grappes courtes pédonculées, à l'aisselle des feuilles supérieures; leur calice est tuberculeux, campanulé, persistant, à cinq divisions égales; les pétales, au nombre de cinq, sont insérés à la partie supérieure du calice, ainsi que les étamines dont le nombre est d'une quinzaine à peu près. L'ovaire est globuleux, sessile au fond du calice; sa base part latéralement un style allongé qui se termine par un stigmate évasé et simple. Le fruit est une drupe ovoïde environnée à sa base par le calice qui est persistant, et contenant un noyau uniloculaire à deux graines.

L'espèce la plus intéressante de genre est le *Chrysobalanus Icaco*, L., Arbrisseau de dix à douze pieds d'élévation, croissant aux Antilles, à Saint-Domingue à Cayenne; j'en possède également un échantillon recueilli en Afrique. Ses feuilles sont alternes, à peine pectinées, obovales, arrondies, entières glabres, luisantes et un peu coriaces. Les fleurs forment de petites grappes à l'aisselle des feuilles supérieures au sommet des ramifications de tige. Elles sont portées sur des pédoncules courts, articulaires, di ou trichotomes; ces pédoncules, ainsi que le calice, sont recouverts d'un duvet court, soyeux et très-abondant. Les fruits sont ovoïdes; de la grosseur d'une moyenne Prune; leur couleur est fort variable; ils sont jaunes ou rougeâtres; leur chair est pulpeuse d'une saveur douce et légèrement âpre; mais agréable; on les man-



dans les contrées où cet Arbre croît naturellement, et on les appelle Icaques ou Prunes-Colon.

Une seconde espèce de ce genre est le *Chrysobalanus* à feuilles longues, *Chrysobalanus oblongifolius*, Michaux. Elle croît dans les lieux sablonneux et boisés de la Géorgie et de la Caroline. Ses feuilles, presque lancéolées, aiguës, ses fruits en forme d'olive, la distinguent nettement de l'espèce précédente. (A. R.)

**CHRYSOBALANOS.** BOT. PHAN. La Muscade chez les anciens. D'où *Chrysobalanus*, syn. d'Icaquier chez les modernes. V. CHRYSOBALANE. (B.)

**CHRYSOBATE.** MIN. C'est-à-dire Buisson d'or. Végétation d'or artificielle et opérée par le feu. (B.)

**CHRYSO-BÉRYL.** MIN. V. CYMOPHANE.

**CHRYSOCALIS.** BOT. PHAN. (Dioscoride.) Syn. présumé de Matricaire. (B.)

**CHRYSOCANTHARUS.** INS. Syn. de Catoine dorée chez les anciens. (B.)

**CHRYSOCARPOS.** BOT. PHAN. Syn. présumé de Lierre à feuilles lobées. (B.)

**CHRYSOCHLORE.** *Chrysochloris*. MAX. (Lacépède.) Genre de Carnassiers insectivores, caractérisé par vingt dents à chaque mâchoire, disposées comme il suit : en haut deux grandes incisives, droites et verticales comme à la Taupe, suivies de chaque côté de neuf molaires, dont les quatre premières à simple triangle sont suivies de cinq autres comprimées d'avant en arrière, et présentant de front trois pointes dont l'intermédiaire est la plus haute; en bas quatre incisives dont les deux intermédiaires sont rudimentaires comme dans plusieurs Chauve-Souris, suivies de huit molaires de chaque côté, dont les trois premières à simple triangle, et les cinq autres comprimées comme celles d'en haut, ne présentent de front que deux pointes en arrière, de l'intermédiaire. Il en résulte que la série de

ces molaires présente inférieurement une et supérieure ment deux rainures. Ces rainures et les rangs de pointes collatérales s'engrènent réciproquement. Il n'y a que trois doigts aux pieds de devant et cinq de grandeur à peu près uniforme à ceux de derrière. Au pied de devant, l'ongle externe est triple du séviant, l'interne est le plus petit; ces trois doigts et surtout leurs ongles sont courbés en dedans. Il y a un petit ergot corné sessile sur le carpe et sans phalanges, en dessous du doigt externe.

La mécanique osseuse de la Chrysochlore est précisément inverse de la Taupe à qui on l'a tant comparée. La première côte y est presque carvée; elle est au contraire aussi grêle que les suivantes dans la Taupe, dont la clavicle est au contraire cubique, tandis que la clavicle de la Chrysochlore est aussi mince et arquée qu'une côte dorsale et presque aussi longue. Elle y surpasse l'humérus qui est trois fois plus long qu'elle dans la Taupe. Le scapulum de la Taupe aussi peu développé à proportion que dans les Ruminans, c'est-à-dire là où les mouvements de l'épaule sont moins nombreux et plus bornés, est au contraire plus compliqué dans la Chrysochlore que chez tous les autres Mammifères. L'acromion y est énorme, et surtout l'épine qui forme au-dessus de la moitié inférieure du scapulum une longue et large voûte terminée en avant par une apophyse très-saillante. Il en résulte que les muscles surépineux et surtout les sous-épineux y sont plus développés que partout ailleurs. Le cubitus, presque aussi fort que dans la Taupe, a un énorme olécrane qui marque à celle-ci, et se dirige en dehors. En dedans une tubérosité radiale considérable aussi arquée forme, dans le prolongement de la courbe de l'olécrane, une grande arcade osseuse, qui sert de point fixe aux muscles adducteurs de la main et des doigts, comme l'olécrane est le point mobile des muscles huméro-scapulaires postérieurs. Nous ajouterons que l'épistoe-

nal carené inférieurement et excavé ~~supérieurement~~ à ~~peine~~ le tiers du développement qu'il a dans la Taupe. Il en résulte que dans la Chrysochlore, les mouvements du bras ont leurs points d'appui sur le scapulum, tandis qu'au contraire le point d'appui des mouvements dans la Taupe est sur le sternum par les clavicules cubiques qui servent d'arcs-boutans. Enfin la Chrysochlore a dix-neuf paires de côtes; la Taupe n'en a que douze. D'ailleurs le bassin et le pubis, écartés comme dans la Taupe, s'y ressemblent ainsi que les membres postérieurs.

Le volume proportionnel du cerveau est très-grand. Le diamètre bipariétal est un septième de la longueur du corps. L'aire de la fosse ethmoïdale peu profonde n'est guère moins que le tiers de celle du crâne dans le plan passant verticalement par le diamètre indiqué. Les cornets ethmoïdaux sont développés en proportion; le trou optique est à peine visible; la caisse est fort petite; l'odorat est évidemment le plus actif de ses sens.

L'apophyse coronéide, si proéminente dans la Taupe, est nulle ici où le condyle est au contraire bien plus saillant. L'on voit donc que la Chrysochlore est au moins aussi éloignée de la Taupe par l'organisation que par la contrée qu'elle habite; et ces différences, lorsque le genre est le même, ne peuvent être attribuées à aucune influence éventuelle. Tout est ici primitif.

CHRYSOCHLORE DU CAP ou Taupe dorée. Wosmaer (Description d'un Recueil exquis d'Animaux rares, pl. 20) la représente sous le nom de *Groen Sluiziger*. Déjà figurée et mal coloriée par Séba (Thes. t. 1, pl. 52, n. 4, et 15), sous le nom de Taupe de Sibérie. C'est la *Talpa asiatica* de Linné. Un peu plus petite que notre Taupe, dit Wosmaer qui l'a décrite (loc. cit.), son poil est aussi plus fin et doux au toucher comme du velours. Ses reflets d'un beau vert doré sont chatoyans et métalliques comme ceux des Colibris. Celle décrite par

Wosmaer était femelle. Elle avait deux mamelles inguinales. Le museau couleur de chair et sans poil est tronqué comme dans les Cochons, et déborde la mâchoire inférieure comme un boutoir, au centre duquel s'ouvrent les narines. Le contour du boutoir est festonné par huit découpures bien représentées dans la figure citée; mais Wosmaer indique mal, d'après Sparmann, le nombre des dents. Les yeux et les oreilles sont imperceptibles. On les distingue pourtant, dit Sparmann, quand l'Animal est depouillé. Si cet Animal n'entend pas aussi mal qu'il voit, au moins peut-on conclure que son ouïe doit être bien faible, fait assez contradictoire pour la philosophie des causes finales dans un Animal souterrain. Il n'y a pas de queue visible extérieurement, bien qu'il y ait quatre ou cinq vertèbres coccygiennes.

Wosmaer (loc. cit.) dit que Gordon parle d'une autre espèce beaucoup plus petite et de couleur d'acier, qui vit fort loin dans l'intérieur du Cap.

La Chrysochlore est assez nombreuse dans les jardins du Cap, où elle cause autant de dégât que les Taupes en Europe. Il paraît que leurs beaux reflets ne se manifestent pas aussi bien sur l'Animal vivant que lorsqu'il est dans la liqueur. Le Taupe du Cap de Buffon, Suppl. T. 111, pl. 55, n'est même pas de l'ordre des Insectivores. C'est un Rongeur du genre Oryctère ou Rat-Taupe du Cap. F. ces mots.

Une autre espèce qui porte le nom de Taupe rouge d'Amérique, *Talpa rubra*, Lin., Séba, Thes. t. 1, pl. 52, fig. 1, appartient probablement à ce genre: car des trois doigts des pieds de devant, l'externe est bien plus grand que le second, qui lui-même est supérieur au suivant. Séba ne lui donne que quatre doigts derrière, mais il n'en donne pas non plus davantage à la Chrysochlore du Cap. Il lui attribue une queue, mais ne donne pas sa grandeur. Comme presque toutes les rudications de pays sont fautive dans l'auteur cité, il n'est pas étonnant qu'elle

soit d'Amérique. Seba la dit rouge tirant sur le poudré clair. Si cette espèce était réellement américaine, elle deviendrait un des exemples les plus péremptoirs de ces lois que nous avons exposées dans notre Mémoire sur la distribution géographique des Anim. (Journ. de Phys., février, 1821.)

(A.D., NS.)

CHRYSOCOLLE. MIN. P. AM-  
PHITANE.

CHRYSOCOME. *Chrysocoma*. BOT.  
PHAN. Genre de la famille des Synan-  
thérées, tribu des Corymbifères de  
Jussieu et de la Syngénésie égale de  
Linné. Il offre les caractères suivans :  
involucre conique, imbriqué de folioles  
pointues, plus ou moins rapprochées ;  
capitule composé de fleurons nombreux,  
tous hermaphrodites et fertiles, dont le tube est un peu  
renflé à sa partie supérieure ; et le  
limbe divisé en cinq lobes aigus,  
étroits et égaux ; réceptacle nu ; akènes  
oblongs, comprimés, velus, d'une  
grandeur moindre que celle du tube  
de la corolle, couronnés par une aigrette  
sessile formée de poils courts,  
nombreux, roussâtres, simples ou munis  
de villosités presque imperceptibles  
à l'œil nu. Les Chrysocomes sont des  
plantes herbacées ou arborescentes,  
d'un aspect extrêmement agréable, et  
qui ont de grands rapports avec les  
genres *Coryza*, *Baccharis* et *Erigeron*.  
Dioscoride et Plin. ont donné le beau  
nom de *Chrysocoma* (chevelure dorée)  
à l'espèce européenne qui a servi de  
type au genre. Cette plante, en effet,  
possède, ainsi que ses congénères, des  
capitules très-denses, d'un jaune d'or  
brillant. Son élégance est même re-  
marquable entre toutes les autres  
plantes de la belle tribu des Corym-  
bifères, dont l'inflorescence est si riche  
de formes et de couleurs.

Les Chrysocomes, au nombre de  
vingt environ, ont été partagées en  
deux sections : 1<sup>o</sup> celles dont la tige  
est frutescente ; 2<sup>o</sup> et les C. herbacées.  
La plupart des premières habitent le  
cap de Bonne-Espérance, les secondes  
sont indigènes de l'Europe et de la

Sibérie. Celles-ci peuvent se cultiver  
en pleine terre dans nos jardins où  
elles exigent seulement une terre un  
peu légère et une bonne exposition ;  
les autres sont des Arbustes d'oran-  
gerie qui demandent une exposition  
à la vive lumière et une terre consis-  
tante, pour qu'elles s'effilent moins et  
deviennent plus vigoureuses. Parmi  
celles qui se cultivent le plus habi-  
tuellement, et dont le feuillage tou-  
jours vert contribue à varier l'aspect  
des serres pendant la mauvaise saison,  
on remarque les *Chrysocoma coma qu-  
rea*, L., *C. cernua* et *C. ciliata*. La  
mortuine de leur écorce est assez in-  
tense. On se sert aux Canaries de  
l'une d'elles (*Chrysocoma sericea*)  
pour arrêter le mal de dents ; peut-  
être est-elle sialagogue comme la  
racine de Pyrèthre.

L'Europe tempérée nourrit l'espèce  
la plus intéressante des Chrysocomes  
herbacées. Cette Plante que l'on  
nomme CHRYSOCOME, LINNÉE, *Chry-  
socoma Linosyris*, L., était connue  
autrefois sous les noms de *Chry-  
sosome*, *Osyris*, *Linosyris* et *He-  
liochoyros*, et avait été placée dans  
le genre *Conyza* par Tournefort.  
Elle est haute de quatre à cinq dé-  
cimètres ; ses tiges presque simples,  
effilées et ramifiées au sommet, por-  
tent des feuilles linéaires, pointues,  
glabres, vertes, éparses et très-nom-  
breuses. Ces feuilles garnissent la tige  
dans toute sa longueur jusqu'au capi-  
tule des fleurs où elles se confondent  
avec les folioles de l'involucre.

Labillardière a ajouté aux espèces ci-  
dessus mentionnées trois belles Chry-  
socomes qu'il a décrites et figurées  
(*Novae-Holland. Plant. Specim.* vol. 2,  
tab. 82, 83 et 84). Deux sont arbo-  
rescentes : *Chrysocoma cinerea* et  
*Chrysocoma reticulata*. La troisième,  
*Chrysocoma squamata*, est herbacée.  
La *Chrysocoma reticulata*, dont l'ai-  
grette plumeuse est terminée par une  
houppes de poils, appartient-elle  
réellement à ce genre ? (C.N.)

CHRYSODON. ANNEL. Nom don-  
né par Linné (*Syst. Nat.* éd. 12, T. 1,

part, p. 1369, n° 813) à une espèce qu'il rapportait à son genre *Sa-  
bule*; cette espèce est l'*Amphitrète* du  
Cap, de Bruguière et de Cuvier, ou  
l'*Amphitrète* du Cap, de Savigny.

*N. AMPHITRÈTE.*

(AUD.)

\* *CHRYSODRABA.* BOT. PHAN.

Nom donné par De Candolle à la se-  
conde des sections qu'il établies dans  
le genre *Draba*, section qu'il carac-  
térise ainsi : style très-court; stig-  
mate capité ou filobé; pétales émar-  
ginés; silicule ovale-oblongue. Elle  
comprend onze espèces qui sont des  
Plantes herbacées vivaces, à feuilles  
oblongues et planes, couvertes de  
poils rarement simples, à fleurs jau-  
nes portées sur des hampes ou pé-  
doncules allongés. Ces Plantes ha-  
bitent les montagnes du nord de l'E-  
urope et celles de l'Asie orientale, à  
l'exception des deux espèces que  
Humboldt et Bonpland ont trouvées,  
l'une sur le volcan de Jorullo, et  
l'autre près de la ville de Toluca au  
Mexique.

(G. N.)

\* *CHRYSOGASTRE.* *Chrysogaster.*  
INS. Genre de l'ordre des Diptères  
établi par Weigen aux dépens du gen-  
re *Syrphe*; et que Latreille réunit  
(Règn. Anim. de Cuv.) au genre *Mi-  
lésie*. *N.* ce mot.

(AUD.)

*CHRYSOGONE.*

*Chrysogonum.*  
BOT. PHAN. Famille des Corymbi-  
feres, Syngénésie Polygamie néces-  
saire. Une petite Plante herbacée, qui  
croît dans l'Amérique septentrionale  
et en particulier dans la Virginie,  
forme le type de ce genre, qui ne  
se compose encore que de cette seule  
espèce. Le *Chrysogone* de Virginie,  
*Chrysogonum virginianum*, L., est her-  
bacé vivace; sa tige presque simple  
est lanugineuse, haute de quatre à six  
pouces. Ses feuilles sont pétioles, spa-  
thulées, tantôt obtuses, tantôt ter-  
minées en pointe, très-velues et irrè-  
gulièrement crenelées; celles de la  
tige sont opposées. Les capitules sont  
d'un jaune doré, naissant plusieurs  
ensemble du sommet de la tige qu'ils  
semblent terminer, et de l'aisselle  
des feuilles. Tous sont portés sur des

péduncules d'un à deux pouces  
longueur. Leur involucre est hémis-  
sphérique, composé de dix écailles  
liées, velues, dont cinq extérieu-  
res, un peu plus larges. Le réceptacle  
est légèrement convexe, portant  
petites écailles étroites, obtuses et  
lucides. Les fleurons du centre sa-  
males et stériles; leur corolle est  
longue, à cinq divisions étroites. Les  
étamines sont légèrement saillantes.  
Les demi-fleurons de la circonférence  
au nombre de cinq, sont femelles  
fertiles. Leur ovaire est ovoïde, com-  
primé, surmonté d'un rebord men-  
braneux, unilatéral et denté. La co-  
rolle a un tube court; son limbe est  
très-large et tridenté à son sommet.

Le fruit est ovoïde, allongé, com-  
primé; sa face externe est marquée  
de cinq côtes longitudinales, légè-  
rement saillantes. L'aigrette est men-  
braneuse.

Ce genre offre des rapports avec  
*Parthenium*.

(A. R.)

*CHRYSOLACHANON.* BOT. PHAN.

Syn. présumé d'Arroche, de Bon-  
Henri et de Lampsan.

(B.)

*CHRYSOLAMPE.* *Chrysolampe*

INS. Genre de l'ordre des Hyméno-  
tères, de la section des Tétrabran-  
chies fondé par Maximilien Spinola (An-  
du Mus. d'Hist. Nat.), et ayant po-  
caractères : antennes de douze ar-  
cles; abdomen attaché à l'extrémité  
postérieure et inférieure du métatho-  
rax, de sept anneaux dans les mâles  
et de six dans les femelles; tarié  
de ces dernières horizontale et in-  
érieure; premier article des anten-  
nules logé dans une fossette du front, et  
séré à son milieu; cuisses postérieu-  
res simples; abdomen pétiole. Ce ge-  
re, auquel Spinola rapporte son *Z.  
ptolepis appendiculata* (Insect. Ligur.  
*Species novae*, fasc. 4, pag. 322)  
appartient à la famille des Pupivor-  
es et peut être rangé dans la tribu  
Chalcidies (Règn. Anim. de Cuv.).

(AUD.)

*CHRYSOLAMPIS.* MIN. Les an-  
ciens donnaient ce nom à une Pier-

l'un vert jaunâtre, qui étoit probablement une variété de Périidot.

(G. DEL.)

**CHRYSOLE.** *Chrysolus*. MOLL. Ce genre, de Montfort (T. 1, p. 27), a pour caractères essentiels : coquille nautiliacée sans ombilic, le dernier tour renfermant tous les autres ; bouche triangulaire, fermée par un diaphragme sans siphon, crenelé contre le retour de la spire. Cette petite Coquille, que l'on trouve vivante dans les sables de Livourne, est rose dans l'état frais, brillante et nacrée dans l'état fossile. Elle est figurée, sous le nom de *Nautilus Crepidula*, par von Fichtel (Test. microscop., p. 107, t. 19, fig. g, h, i) et sous le nom de *Nautilus lituitatus* dans Sol-dani (Test. T. 1, p. 64, t. 58, fig. 66).

(D. H.)

**CHRYSOLITHE.** *Chrysolitha*. FOSS. Nom sous lequel Denis de Montfort a désigné des Coquilles fossiles du genre Ammonite. V. ce mot. (G.)

**CHRYSOLITHE.** MIN. Ce nom, dans le langage des lapidaires, a désigné d'abord toute Pierre d'une couleur jaune verdâtre, qui avait un certain éclat, et le terme de Périidot s'appliquait plus particulièrement aux pierres dont la couleur étoit d'un ton plus faible. Romé-de-l'Isle est le premier minéralogiste qui ait donné le nom de **CHRYSOXYMITE ORDINAIRE** à ces Cristaux de la substance nommée *argelstein* par Werner, et trouvés en Espagne, quoiqu'ils fussent assez tendres et rebelles au poli. Vauquelin, par l'analyse qu'il en a faite, et lauy, par l'étude de leurs formes, ont trouvé, presque en même temps, que ces Cristaux n'étoient qu'une variété granulée de Phosphate de Chaux. Romé-de-l'Isle a aussi appliqué le nom de Chrysolithe de Saxe à une variété tendre de Topaze du même pays. Werner a restreint la dénomination de Chrysolithe aux variétés cristallines du Périidot, dont il a séparé la variété granuliforme déjà connue sous le nom de Chrysolithe des volcans.

TOME IV.

**CHRYSOXYMITE D'ESPAGNE.** V.

**CHAUX PHOSPHATÉE.**

**CHRYX. DU BRÉSIL.** V. CYMOPHANE.

**CHRYX. DU CAP.** V. PRÉSENTÉE

**CHRYX. ORDINAIRE.** V. CHAUX PHOSPHATÉE.

**CHRYX. CHATOYANTE.** V. CYMOPHANE.

**CHRYX. ORIENTALE.** V. CONINDON et CYMOPHANE.

**CHRYX. OPALISANTE.** V. CYMOPHANE.

**CHRYX. DE SAXE.** Variété de Topaze verdâtre.

**CHRYX. DE SIBÉRIE.** Variété d'Aigue-Marine.

**CHRYX. DES VOLCANS.** Périidot granuliforme (Olivine de Werner). V. PÉRIDOT.

**CHRYX. DU VÉSUVÉ.** V. IDOCHASE. (G. DEL.)

Le nom de Chrysolithe avait aussi été étendu, par d'anciens oryctographes, aux Ammonites pyritisées et au Fer sulfuré. (B.)

\* **CHRYSOLOPE.** *Chrysolopus*. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères établi par Germar aux dépens des Charançons de Fabricius, et adopté par Dejean (Catal. des Coléoptères, p. 88) qui en possède quatre espèces, parmi lesquelles on remarque le *Curculio spectabilis* et le *Curculio bicristatus* de Fabricius. Nous ne connaissons pas les caractères de ce nouveau genre que nous croyons inédit. (AUD.)

\* **CHRYSOMALLE.** *Chrysomallum*. BOT. PHAN. Genre établi par Aubert Du Petit-Thouars (Génera nova Madagaso.) sur une Plante décrite par Lamarck (Encycl. method.) sous le nom de *Bignonia à grappes*, *Bignonia racemosa*, et qui diffère des Bignonées non seulement par le genre, mais encore par la famille où elle doit être rapportée. Voici les caractères que lui a assignés son auteur : calice monophyllé, urcéolé, à cinq dents ; corolle irrégulière, tubuleuse, courbée, soyeuse, dont le limbe est étalé et à

cinq divisions; quatre étamines plus longues que la corolle; style de la longueur des étamines, terminé par deux stigmates. Le fruit est une drupe ovée, recouverte par le calice persistant. Elle renferme un noyau osseux à quatre loges monospermes. Ce genre, que Du Petit-Thouars place dans la famille des Verbénacées, est composé d'une seule espèce indigène de l'île de Madagascar, à laquelle ce savant botaniste donne pour synonymie la Biguone de Madagascar de Lamarck. C'est un élégant Arbrisseau à feuilles verticillées, ternées ou pinnées, et dont les fleurs sont disposées en corymbes dichotomes et placées dans les aisselles supérieures des feuilles. (G..N.)

**CHRYSOMELA. BOT. FRAN.** (Athénée.) C'est-à-dire *Pomme d'or*. Syn. de *Citron*. (Columelle.) Synonyme de *Coignassier*. (B.)

\* **CHRYSOMELANE. ROM.** (Plumier.) Espèce du genre *Spare*. V. ce mot. (A.)

**CHRYSOMÈLE.** *Chrysomela*. INS; Genre de l'ordre des Coléoptères; section des Tétramères, établi par Linné et subdivisé depuis lui en un grand nombre de genres par Geoffroy, Laichard, Fabricius, Olivier et Latreille. Ce dernier entomologiste ne comprend aujourd'hui, sous le nom générique de Chrysomèle, que les espèces qui ont pour caractères propres : palpes maxillaires terminés par deux articles presque d'égale longueur, avec le terminal en ovoïde tronqué ou presque cylindrique. A l'aide de ces caractères et de quelques autres qui vont suivre, on distinguera facilement les Chrysomèles de tous les autres genres. Ces Insectes ont des antennes moniliformes insérées entre les yeux, près de la bouche, plus longues que le prothorax, plus courtes que le corps, composées de onze articles dont le premier est un peu renflé, et le dernier presque globuleux ou en forme de toupie. Leur bouche présente une lèvre su-

périeure de consistance cornée; des mandibules courtes, obtuses, voûtées, tranchantes; des mâchoires bifides, supportant une paire de palpes de quatre articles; une lèvre intérieure cornée, légèrement échancrée et ciliée antérieurement, munie de deux palpes plus courts que les maxillaires et composés seulement de trois articles insérés à sa partie antérieure. Leur corps est hémisphérique ou en ovale court, avec le prothorax transversal.

Les Chrysomèles ont quelque ressemblance avec les Coccinelles, mais elles s'en éloignent par le nombre des articles des tarses; elles ressemblent encore aux Galéruques, aux Altises, aux Adories, aux Lupères, et en diffèrent cependant par l'insertion de leurs antennes; elles avoisinent aussi singulièrement les genres *Paropsidae* et *Doryphore*, et ne s'en éloignent guère que par la forme et le développement des palpes maxillaires; enfin elles ne laissent pas d'avoir quelques rapports avec les *Prasocures*, les *Colaspes*, les *Eumolpes*, les *Gribouris*, les *Clythres* et les *Clamydes*. Les Chrysomèles sont en général des Insectes petits, à corps lisse, orné le plus souvent de couleurs métalliques très-brillantes, variant entre le bleu, le violet, le rouge d'écarlate et le vert doré. Elles vivent sur diverses Plantes, et font quelquefois des ravages tels que des sociétés savantes ont cru rendre un grand service à l'agriculture en proposant pour prix l'histoire naturelle bien détaillée de ces Insectes, et l'indication des moyens pour prévenir les ravages qu'ils occasionnent dans les champs et les jardins. Lorsqu'on saisit ces Insectes, ils feignent d'être morts, et replient leurs jambes sur leurs cuisses et celles-ci contre le thorax; ils laissent aussi échapper de leurs différentes articulations un liquide coloré et odorant.

Une espèce de ce genre, la *Chrysomèle Ténébrion*, a, suivant Léon Dufour, un tube intestinal sans jabot, trois fois plus long que le corps. L'estomac ne présente pas de papilles sensibles, il est long et se replie une

or lui-même. On y remarque à quelques bandelettes musculaires transversales. Cet estomac est un intestin filiforme, puis d'un m oblong, aboutissant à un rectum assez gros. Dans une autre espèce que notre savant ami a soumise à son scalpel, le canal intestinal est en tout semblable à celui que nous venons de décrire, à la seule exception qu'il a moins de longueur; les six insertions gastriques des vaisseaux biliaires sont simples et isolées; deux des canaux hépatiques, sensiblement moins longs et plus grêles que les quatre autres, s'implantent d'une part à la face supérieure du bourrelet de l'estomac, de l'autre, et toujours isolément, à la face correspondante du cœcum. Cette dernière insertion a lieu pour les autres canaux par deux conduits bifides.

Les femelles de ces Insectes paraissent très-fécondes; souvent leur abdomen est tellement gonflé par les masses d'œufs qu'il contient, que les anneaux s'en distendent outre mesure et dépassent de beaucoup les élytres qui, avant cet état, les recouvraient complètement. Leurs œufs sont déposés sur les feuilles des Plantes dont se nourrit l'Insecte parfait; les larves qui en naissent ont en général six pattes écailleuses, un corps allongé, garni de verrues et de tubercules laissant exhaler une humeur vireuse; postérieurement il est terminé par un mamelon sécrétant une liqueur gluante, et au moyen duquel elles se fixent en marchant ou lorsqu'elles doivent se transformer en nymphes. Cette transformation a lieu ordinairement à l'air libre; dans ce cas, l'enveloppe extérieure se durcit et protège l'Animal. Au bout de quelques semaines ou au commencement de quelques jours, on voit clore l'Insecte parfait. Les espèces rapportées au genre dont il est question sont très-nombreuses. Olivier (Entom. T. v, p. 91) en décrit cent vingt espèces, parmi elles nous citerons quelques-unes assez bien observées.

La CHRYSOMÈLE TENEBRION,

*Chrysomela Tenebricosa*, Fabr., ou la Chrysomèle à un seul épi, de Geoffroy (Hist. des Ins. T. 1, p. 265, n° 19), qui est la même que la *Chrysomela caraboides* de Fourcroy (Entom. Par. T. 1, p. 151, n. 19). Elle a été figurée par Olivier (loc. cit., n° 91, pl. 1, fig. 11, A, B.) et par Panzer (Fauna Ins. Germ. fasc. 44, tab. 1). Cette espèce varie beaucoup pour la grandeur. La larve se métamorphose dans la terre et se nourrit de plusieurs Plantes rubiacées, particulièrement de celle connue vulgairement sous le nom de Caille-Lait, *Galium verum*, L. On la trouve très-communément, ainsi que l'Insecte parfait, sur la terre, dans les gazons.

La CHRYSOMÈLE DU GRAMIN, *Chrysomela Graminis*, Fabr., ou la grande Vertu-Bleue de Geoffroy (loc. cit. T. 1, p. 260, n° 10), figurée par Olivier (loc. cit., pl. 1, fig. 3). Cette jolie espèce, d'un vert doré brillant ou d'un vert bleuâtre, se trouve en Europe sur les Graminées et plusieurs Plantes labiées.

La CHRYSOMÈLE HÉMOPTÈRE, *Chrysomela hæmoptera*, Fabricius et Laich., ou la Chrysomèle violette, de Geoffroy (loc. cit. T. 1, p. 258, n. 5), qui est la même que la *Chrysomela Hyparici* de Degèer (Mém. sur les Ins. T. v, p. 312, n. 20). La larve de cette espèce se trouve, vers le mois de juin, sur le Millepertuis (*Hypericum perforatum*). Elle entre en terre à peu de distance de la surface, et y subit, dans l'espace de quelques jours, ses métamorphoses.

La CHRYSOMÈLE DE PEUPLIER, *Chrysomela Populi*, L. et Fabr., espèce très-connue et très-commune, désignée par Geoffroy (loc. cit. T. 1, p. 257) sous le nom ou plutôt par la phrase descriptive de petite Chrysomèle rouge à corselet bleu. Sa larve vit en très-grand nombre sur les Saules et les Trembles dont elles mangent les feuilles. Pour se métamorphoser en nymphe, elle se colle avec le maine-

lon de derrière, et sa dépouille reste attachée à l'extrémité du corps.

♂, pour les autres espèces, Olivier, *loc. cit.*, et Encyclopédie méthodique; le Catal. de Dejean, p. 100; Kirby (*Linn. Societ. Trans.* T. III, p. 475, pl. 25, fig. 12) qui en décrit et représente une espèce de la Nouvelle-Hollande, sous le nom de *Chrys. Curtisi*, et Schonherr (*Syn. Insect.* T. II, pag. 257.) (AUD.)

• **CHRYSOMÉLINES.** *Chrysomelinae*. INS. Famille de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères, fondée par Latreille (*Gener. Crust. et Ins.* et *Considér. génér.*, p. 154), et ayant, suivant lui, pour caractères propres : lèvre non cordiforme; division extérieure des mâchoires ressemblant à un palpe biarticulé; corps plus ou moins ovoïde ou ovale; corselet transversal, ou du moins n'étant pas plus long que large, ni sensiblement plus étroit à son extrémité postérieure, lorsqu'il n'est pas transversal. — Cette famille correspond au grand genre Chrysomèle de Linné, et Latreille en a fait (Règn. Anim. de Cuv.) une section ou tribu de sa famille des Cycliques, en lui assignant pour caractères : antennes rapprochées ou peu éloignées de la bouche, insérées au devant des yeux ou dans l'espace qui les sépare. La position des antennes éloigne les Chrysomèles de la division des Hispides et de celle des Cycliques.

On peut rapporter à la famille des Chrysomélines ou au genre Chrysomèle de Linné plusieurs genres qui en ont été démembrés et qu'on rangera de la manière suivante :

† Antennes insérées au-devant des yeux.

Genres : CLYTHRE, CHLAMYDE, GRIBOURI, EUMOLFE, COLASPE, PAROSIDE, DORYPHORE, CHRYSOMÈLE, PRASOCURE.

†† Antennes insérées entre les yeux.

Genres : ADORIE, GALLERUQUE, ALTISE. V. ces mots. (AUD.)

\* CHRYSOMÉLON. BOT. PHAN.

L'Abricotier a été quelquefois désigné sous ce nom par les anciens. (B.)

**CHRYSOMITRIS.** OIS. (Aristote.) Syn. présumé de Chardonneret, *Fringilla Carduelis*, L. V. GROS-BEC. (B.)

**CHRYSOPALE.** MIN. V. CYMOPHANE.

\* **CHRYSOPHORE.** *Chrysophora*. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, établi par Dejean (Catal. des Coléopt. p. 60) aux dépens du genre Hanneton de Latreille, et dont nous ignorons les caractères.

Dejean n'en possède qu'une espèce, le Chrysophore Chrysoclôre, *Melolontha Chrysoclora* de Latreille (Zoologie du Voyage de Humboldt et Bonpland). Elle est originaire du Pérou. (AUD.)

**CHRYSOPHRYS.** ROIS. C'est-à-dire Sourcil d'or. Syn. de *Centrophe nêgre*. (B.)

**CHRYSOPHYLLE** ou CAIMITIER. *Chrysophyllum*. BOT. PHAN. Ce genre, de la famille des Sapotées de Jussieu et que Plumier avait nommé *Caimito*, parce que l'espèce la plus généralement répandue porte ce nom dans les Antilles, est facile à reconnaître à son calice quinquéparti; à sa corolle monopétale, régulière, à cinq lobes; à ses étamines au nombre de cinq, insérées à la corolle et opposées à ses lobes dans le plus grand nombre des espèces; à son style terminé par un stigmate à cinq divisions; et enfin à son fruit qui est une baie à dix loges, dans chacune desquelles est une seule graine comprimée latéralement et luisante. On compte aujourd'hui environ quinze ou seize espèces de Caimitiers; car c'est ainsi qu'on désigne vulgairement ce genre. Ce sont des Arbres souvent très-élevés, d'un feuillage élégant, qui croissent généralement dans les contrées chaudes du nouveau continent. Leurs feuilles ont ordinairement la face inférieure couverte



d'un duvet soyeux et d'un jaune doré (de-là le nom de *Chrysophyllum* qui signifie *Feuille dorée*). Cependant une espèce ayant ce duvet d'un blanc d'argent, a reçu de Jacquelin les noms de *Chrysophyllum argenteum*, dénomination ridicule, qui prouve que les noms génériques ne devraient jamais être tirés des modifications accidentelles que présentent les organes accessoires.

L'espèce la plus intéressante est le **CAÏMITIER-POMME** ou *Chrysophyllum Cainito*, L. C'est un grand et bel Arbre qui croît naturellement aux Antilles, et que l'on cultive fréquemment dans nos serres. Ses feuilles sont alternes, entières, elliptiques, acuminées, vertes en dessus, couvertes à leur face inférieure d'un duvet court, doré et luisant. Ses fruits sont globuleux et de la grosseur d'une Pomme de reinette, tantôt verts, tantôt rouges, selon les variétés. Leur pulpe est douce et agréable, et fait rechercher ces fruits par les voyageurs et les habitants des Antilles, où on les mange et préfère quelquefois aux Sapotes.

Une seconde espèce est fort remarquable par son fruit ovoïde, qui ne renferme jamais qu'un seul noyau monosperme par l'avortement constant des autres graines; c'est le *Chrysophyllum monopyrenum* de Swartz ou *Chrysophyllum oliviforme* de Lamarck. Il est plus petit que le précédent. Son fruit, deux fois plus gros qu'une Olive, est d'une belle teinte violette; il renferme un seul noyau irrégulier. Sa pulpe a une saveur vineuse assez agréable. Il croît communément dans les forêts de Saint-Domingue. Son bois, qui est d'un jaune de buis, est employé dans les ouvrages de charpente. (A. R.)

**CHRYSOPHYS.** ROIS. Syn. de Dorade, espèce du genre Sparc. V. ce mot. (B.)

**CHRYSOPHYS.** MIN. (Pline.) Syn. de Topaze. V. ce mot. (B.)

**CHRYSOPIE.** *Chrysopia*. BOT.

**PHAN.** Le genre décrit par Du Petit-Thouars sous le nom de Chrysopie paraît être le même que le *Vismia* de Vandelli qui fait partie de la famille des Hypéricées. V. **VISMIE.** (A. R.)

**CHRYSOPRASE** ou **PRASE.** MIN. Variété du Quarz-Agathe d'un vert pomme ou d'un vert blanchâtre, ordinairement translucide, et qui doit son couleur à l'Oxide de Nickel. V. **QUARZ-AGATHE.** On ne la trouve qu'en fragmens irréguliers et non cristallisés, en quoi elle diffère du Prase des Allemands, qui n'est qu'un Cristal de Quarz coloré par l'Amphibole vert. Son principal gissement est dans un terrain de Serpentine, aux environs de Rosemütz en Silésie. Elle est fort recherchée en bijouterie; malheureusement les plus beaux morceaux de cette Pierre sont toujours d'un très-petit volume.

On donne aussi le nom de **CHRYSOPRASE D'ORIENT** à une variété de Topaze d'un jaune verdâtre. (C. DEL.)

**CHRYSOPS.** *Chrysops*. INS. Genre de l'ordre des Diptères, famille des Tanystomes, tribu des Taoniens (Règn. Anim. de Cuv.), fondé par Meigen aux dépens du genre Taon, et adopté depuis par Fabricius et Latreille; ce dernier entomologiste a réuni (*loc. cit.*) aux Chrysops les genres Hamatopotes et Heptatome de Meigen, qu'il en avait distingués dans ses Considérations générales. Le genre Chrysops ainsi étendu correspond à celui de Chrysopside de Dumeril, et présente pour caractères : antennes sensiblement plus longues que la tête, presque cylindriques, avec les deux premiers articles presque également longs, et le dernier aussi long que les précédens réunis, en forme de cône allongé, et paraissant divisé en cinq anneaux. A l'aide de ces caractères tirés des antennes, on distinguera facilement les Chrysops des Taons. On pourrait aussi à la rigueur les séparer des Hamatopotes et des Heptatomes; mais alors il faudrait restreindre les caractères précédemment cités et les remplacer par ceux-ci : anten-

mes notablement plus longues que la tête; les deux premiers articles presque également longs; le dernier de la longueur des deux précédens, cylindrico-conique. On trouverait alors, dans la longueur relative de ces articles, des différences assez sensibles pour éloigner des Chrysops les deux genres précédemment cités.

Condiectes, à l'état de larve, paraissent vivre dans la terre et y subir leurs métamorphoses; lorsqu'ils sont devenus parfaits, ils se nourrissent du sang des Animaux qu'ils piquent assez fortement, et se posent même quelquefois sur l'Homme. On connaît plusieurs espèces propres à ce genre; parmi elles nous en citerons trois: le *Chrysops* aveuglant, *Chrys. cæcutiens*, Meig., Latr., ou le *Tabanus cæcutiens* de Linné qui est le même que son *Tabanus lugubris* (Fauna suec.). Meigen (Desc. Syst. des Dipt. d'Europe, T. II, tab. 14, fig. 6) a représenté le mâle. — Le *Chrysops* délaissé, *Chrys. relictus*, Meig., ou le *Chrys. viduatus* de Fallén (Dipt. suec.), qui est le même que le *Tabanus cæcutiens* représenté par Panzer (Faun. Ins. Germ. fasc. XII, fig. 24), et que Geoffroy (Hist. des Ins. T. II, p. 463, 8) a décrit sous la dénomination de Taon brun à côtés du ventre jaunes, anneaux tachetés de noir. — Le *Chrysops* marbré, *Chrys. marmoratus* de Rossi, ou le Taon à une seule bande noire ponchée, de Geoffroy (loc. cit. p. 464, 11) V. HÉMATOPOTE et HÉMATOME. (AUD.)

CHRYSOPTIDE. *Chrysopsis*, INS. (Duméril.) Syn. de *Chrysops*. V. ce mot.

\* CHRYSOPTÈRE. OIS. Espèce du genre Gros-Bec, *Fringilla Chrysopara*, Vieill. C'est aussi un synonyme de la Sylvie aux ailes dorées, *Sylvia flavifrons*, Lath. V. GROS-BEC et SURIUS. (OR..Z.)

CHRYSOPTÈRE. POIS. C'est-à-dire nageoire dorée. Espèce du genre Cheiloptère. (B.)

CHRYSOPTÈRE. OO. CHRYSOPTÈRE.

TERON. MIN. Syn. de Chrysoprase. V. ce mot.

CHRYSORRHÆA. INS. Nom spécifique d'un Lépidoptère du genre Arctie. V. ce mot.

CHRYSOSPERMUM. BOT. PHAN. Syn. grec de Chrysocome et Gnaphalie. V. ces mots. (B.)

CHRYSOSPENIUM. BOT. PHAN. V. DORINE.

CHRYSOSTOSE. POIS. Pour Chrysotose. V. ce mot.

CHRYSOSTROME. POIS. (Lacépède.) V. FIATOLE.

\* CHRYSOTHALES. BOT. PHAN. (Daléchamp.) Syn. de *Sedum reflexum*. (B.)

CHRYSOTOSE. POIS. Et non *Chrysostose*. Genre de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Scombréroïdes de Cuvier, l'un des Thoraciques de Linné ou des Leptosomes de Duméril, établi par Lacépède (T. IV, p. 586), et dont les caractères consistent : dans l'absence des dents; une seule nageoire dorsale dépourvue d'aiguillons; la compression du corps, la petitesse des écailles et la disposition latérale des yeux. La place assignée par l'illustre Cuvier au genre qui nous occupe le rapproche de celui des Coryphènes qui sont, avec le Chrysotose, les plus beaux Poissons de la mer. La nature semble avoir, pour cet habitant des eaux, voulu épuiser tous les trésors de sa riche palette. Elle n'a point laissé tomber les couleurs sur quelque objet chétif dont tout le mérite eût consisté dans un vain éclat; elle les a répandues sur un être que sa forme et sa grande taille rendaient déjà remarquable. En effet, le Chrysotose acquiert jusqu'à cinq pieds de longueur; sa figure est presque orbiculaire; sa caudale est fourchue et blanche; la dorsale en forme de faux. Toutes ses autres nageoires sont du plus beau rouge; son dos est d'un bleu foncé,

tacheté d'argent; le reste du corps paraît d'or poli et ressette mille nuances éclatantes. La seule espèce qui nous soit connue habite les côtes de la Manche, surtout vers l'Angleterre; elle y est fort rare. Pennant prétend qu'on n'en avait pas observé dix individus de son temps. On ne se souvient à Dieppe que d'en avoir pris un. Celui-ci fit l'admiration des pêcheurs qui l'appelaient un grand seigneur de la cour de Neptune en habit de gala. Sa chair a, dit-on, le goût de celle du Bonf. C'est le *Zeus Luna*, L.; Gmel., *Syst. Nat.*, XIII, 1, part. 2, p. 1236; Poisson royal de l'Encyclopédie, pl. 39, fig. 155; le Lampris de Retzius, vulgairement l'Ophion Poisson-Lune. Il a été pris pour un Cyprin par Viviani; et pour un Scombre par Gunner et Schneider.

(s.)

### CHRYSOTOXE. *Chrysotoxum*. INS.

Genre de l'ordre des Diptères établi par Meigen, et adopté par Latreille qui le place (Considér. génér. p. 396) dans la famille des Syrphies, et lui assigne pour caractères : antennes notablement plus longues que la tête, presque cylindriques, insérées sur une élévation commune du front, dont le troisième et dernier article porte une soie simple à sa base; une proéminence sur l'avancement antérieur et en forme de museau de la tête; ailes écartées. La longueur des antennes empêche de confondre les Chrysotoxes avec les Peares, les Paragues, les Syrphes, etc. Ce caractère les rapproche au contraire des genres Callitroch et Cérès; mais ils diffèrent de l'un et de l'autre par la forme des antennes: Les Callitroches, les Mérodon et Mésies, dont les antennes sont notablement plus longues que la tête, s'éloignent des Chrysotoxes par l'absence des proéminences sur le nez; Latreille (*Règn. Anim. de Cuv.*) place le genre que nous décrivons dans la famille des Althéidies, et le réunit à celles des Cérès de Fabricius.

Les Chrysotoxes ressemblent à des Guêpes, leur corps est noir, avec des

taches jaunes. Ils ont le vol rapide, et planent sur les fleurs où on les voit se posser souvent pour se nourrir de leur suc miellux.

On peut considérer comme type de ce genre le Chrysotoxe à deux bandes, *Chrys. bicinctum*, *Musca bicincta* de Linné, et *Mukio bicinctus* de Fabricius. Cette espèce est rare aux environs de Paris. On doit rapporter aussi à ce genre la *Musca fasciolata* de Degér (Mém. sur les Ins. T. vi, pl. 7, fig. 14), et la *Musca arcuata* de Linné. Cette espèce est souvent confondue avec la précédente. (AUD.)

### \* CHRYSTALLION. BOT. PHAN.

Un des noms anciens de la Pulicaire. V. ce mot. (A. B.)

### CHRYSTE-MARINE. BOT. PHAN.

Pour *Christa Marina*. V. ce mot.

### CHRYSURE. *Chrysura*. BOT. PHAN.

Ce genre de la famille des Graminées et de la Triandrie Dignité a été proposé par Persoon pour quelques espèces de Cynestres que Mœsch et Koeleren avaient également réunies pour en former un genre sous le nom de *Lamarckia*; mais, comme il existait précédemment un autre genre dans la famille des Solanées, dédié par L.-C. Richard à l'auteur de la Flore Française et du Dictionnaire de Botanique de l'Encyclopédie, le nom de *Chysurus* a été adopté.

Les fleurs, dans ce genre, forment des panicules serrées, spiciformes, unilatérales, composées d'épillets fasciculés et dissimulés. Les uns sont neutres, stériles, plus nombreux, et ont été considérés comme un involucre entourant l'épillet ou les épillets fertiles. Les premiers sont formés d'écaillés disposées symétriquement des deux côtés d'un axe commun; tantôt elles sont subulées, terminées par une longue pointe et toutes semblables, tantôt les deux inférieures sont pointues, tandis que toutes les autres sont obtuses et denticulées à leur sommet. Leur nombre varie de huit à douze. Dans chaque fascicule on trouve un ou deux épillets fertiles, qui sont bi ou triflores. Leur

lépicène est formée de deux valves lancéolées, aiguës, carenées et denticulées. Lorsqu'elle est biflore, l'une des fleurs est hermaphrodite; la seconde est rudimentaire, neutre et pédicellée; si elle renferme trois fleurs, les deux inférieures sont hermaphrodites; la troisième est neutre. Le *Chrysurus aureus* est dans le premier cas, le *Chrysurus echinatus* est dans le second. Dans chaque fleur hermaphrodite on trouve une glume bivalve. La valve externe, un peu plus longue, est carenée et striée longitudinalement. Elle offre une arête dont la position n'est pas la même dans les deux espèces de ce genre que nous venons de mentionner tout-à-l'heure: ainsi elle est terminale dans le *Chrysurus echinatus*, et subapicellaire dans le *Chrysurus aureus*, c'est-à-dire placée manifestement au-dessous du sommet. Les étamines sont au nombre de trois. L'ovaire est surmonté de deux stigmates plumeux et accompagné latéralement à sa base de deux paléoles beaucoup plus courtes que lui. La caryopse est enveloppée par la glume.

Outre les deux espèces dénommées plus haut, et qui l'une et l'autre croissent dans les départemens méridionaux de la France, on peut encore rapporter à ce genre plusieurs autres Cynosures; tels sont le *Cynosurus elegans*, Desf., Fl. atl., I, p. 82, t. 17, et quelques autres. (A. R.)

\* **CHRYSURE.** POIS. (Commerçon.) C'est-à-dire *Quene dorée*. Espèce du genre Coryphène. V. ce mot. (B.)

**CHRYZA.** BOT. PHAN. Pour Chrysa. V. ce mot.

**CHTENI ET KALAGRIOCHTENI.** MOLL. Noms sous lesquels on désigne, sur les côtes de la Grèce, selon Forsk., une Coquille bivalve du genre Peigne, et qui paraît être le Peigne pointillé, *Pecten varius*. (G.)

\* **CHTHONIE.** *Chthonia* BOT. PHAN. Ce nom un peu dur a été imposé par H. Cassini à un genre de la famille des Synanthérées, très-voisin

des *Pectis*, dont il se diffère, de l'aveu même de l'auteur, que par la structure de l'aigrette, celle des *Pectis* étant composée de squamules subtriquètres, subulées, concavées et parfaitement lisses, tandis que dans les *Chthonies*, les squamules ont leur partie inférieure laminée, paléiforme, membraneuse, irrégulièrement dentée ou laciniée, leur partie supérieure filiforme épaisse et barbellulée.

Outre l'espèce nouvelle décrite par l'auteur sous le nom de *Chthonia glaucescens*, il y rapporta aussi le *Pectis humifusa*, *prostrata*, et peut être le *ciliaris*. V. *Pectis*. (A. R.)

**CHU.** BOT. PHAN. Syn. samoïed de Bouleau; les Chinois donnent ce nom à une espèce de Chêne, le *Quercus cornea* de Loureiro. (B.)

**CHUA.** BOT. PHAN. Ce mot paraît signifier Oxalide à la Cochinchine où l'on nomme

**CHUA-ME-BA-CHIR**, l'*Oxalis corniculata*, L.

**CHUA-ME-LA-ME**, l'*Oxalis sensitiva*. (B.)

**CHUB.** POIS. Espèce du genre Able V. ce mot. On donne aussi ce nom au *Perca philadelphica*. V. *PERCHE*. (B.)

**CHUBAS ET CHUBÈSE.** BOT. PHAN. (Daléchamp.) Même chose que Chobbeize. V. ce mot. (B.)

**CHUCAS.** OIS. Syn. vulgaire de Choucas, *Corvus Monedula*, L. V. *CORBEAU*. (DR..Z.)

**CHUCHIE.** MAM. (Oviédo.) Syn. de Pécaré dans l'Amérique méridionale. (B.)

**CHUCHIM.** OIS. Syn. hébreu de Paon, *Pavo cristatus*, L. V. *PAON*.

**CHUCHU.** BOT. PHAN. Suivant le père Feuillée, on donne ce nom au Lupin dans le Pérou. (A. R.)

**CHUCIA OU CHURGA.** MAM. V. *SARIGEE*.

**CHUCK-WILL'S WIDOW.** OIS. Espèce du genre Engoulevent; Ca-

*primulus populus*, Vieill. *V. En-*  
*coulevrent*. (DR..Z.)

\* **CHUCLADIT.** POIS. Qu'on pro-  
nonce *Tchoucladit*. Syn. de *Lepado-*  
*gaster Gouani*, Lac., aux îles Baléa-  
res, *V. LÉPADOGASTRE*, et du *Petro-*  
*myzon maritimum*, selon Delaroché. *V.*  
LAMPROIE. (B.)

\* **CHUGLET.** POIS. (Delaroché.)  
Syn. d'*Atherina Hepsetus*, L., aux  
îles Baléares. *V. ATHÉRINE*. (B.)

**CHUCUTO.** MAM. Qui nous pa-  
rait être une prononciation vicieuse  
du diminutif espagnol *chiquito* (pe-  
tit). Nom du Saki Cacao de Hum-  
boldt dans les Missions du Cassi-  
caire. (B.)

**CHUE.** OIS. *V. CAUE*.

**CHUETTE.** OIS. Syn. vulgaire de  
la Chevéche, *Strix Passerina*, L. *V.*  
*CHOUETTE*. (DR..Z.)

\* **CHUGUETTE.** BOT. PHAN. Syn.  
de Mâche ou Valérianelle à Montpel-  
lier, selon Gouan. (B.)

**CHU-HOA-MU.** BOT. PHAN. Syn.  
chinois de *Pteronia tomentosa* de  
Loureiro. (B.)

**CHULAN.** MAM. Pour Choulant.  
*V. ce mot*.

**CHULDRY.** BOT. PHAN. Syn. tar-  
tare d'Hiéble. *V. SUREAU*. (B.)

**CHULEM.** BOT. PHAN. Syn. présumé  
de *Poa pratensis*, *V. PATURIN*, et,  
selon d'autres, de la racine d'Acore.  
(B.)

**CHULLOT ET HULLET.** BOT.  
PHAN. Syn. arabes de Chêne. (B.)

**CHULON ou GHELASON.** MAM.  
Syn. présumé de Lynx dans les lan-  
gues tartares. (B.)

\* **CHUMAR ou CURMA.** BOT.  
PHAN. (Ruell.) Syn. africain de Rue.  
*V. ce mot*. (B.)

\* **CHUMO.** BOT. PHAN. (L'Ecluse.)  
Nom donné dans l'Amérique méridi-  
onale au pain préparé avec la racine  
de Pomme de terre. (B.)

**CHUMPI.** MIN. Syn. de Platine.

**CHUNCHOA.** BOT. PHAN. Ce gen-  
re établi par Pavon, et dont le nom a  
été changé en celui de *Gimbernatia*,  
dans la Flore du Pérou et du Chili,  
avait été placé d'abord dans la famille  
des Eléagnées de Jussieu. R. Brown,  
reprenant l'examen des genres qui  
constituaient cette famille, en a sé-  
paré tous ceux qu'un calice coloré co-  
rolloïde et d'autres caractères placent  
parmi les Polypétales, et en a consti-  
tué la nouvelle famille des Combreté-  
cées. C'est dans celle-ci qu'il a réuni  
le *Chuncoa* avec le *Bucida*, le *Termin-*  
*alia* et les autres genres dont Jussieu  
avait déjà indiqué les affinités avec le  
*Combretum* et les Myrtacées décan-  
dres. Ce genre est ainsi caractérisé :  
calice à cinq divisions, campanulé,  
supère, à limbe étalé et caduc; dix  
étamines; fruit drupacé, monosper-  
me, non couronné, à cinq angles ai-  
lés dont deux opposés et plus grands  
que les autres. Les deux espèces dé-  
crites dans la Flore du Pérou sont  
des Arbres à feuilles alternes et épar-  
ses, portant des fleurs en épis et axil-  
laires, dont les unes, situées à la partie  
inférieure des épis, sont hermaphro-  
dites, et celles du sommet sont mâles  
par avortement. Le nom de Chun-  
choa a été tiré de celui de *Chunchu*  
du Maragnon que ces Arbres portent  
dans le pays. (G..N.)

**CHUNCHU (ARBOL DEL).** BOT.  
PHAN. *V. CHUNCHOA*.

**CHUNDA ou SCHUNDA.** BOT.  
PHAN. Syn. malabare de *Solanum*  
*undatum*, espèce du genre Morelle.  
(B.)

**CHUNDALI.** BOT. PHAN. Syn. in-  
dien d'*Hedysarum gyrans*, L. *V.*  
SAINFON. (B.)

**CHUNDRA.** BOT. PHAN. Espèce  
du genre Acacie de la côte de Coro-  
mandel. (B.)

**CHUNGAR.** OIS. Nom tartare que  
l'on présume devoir s'appliquer à un  
Ibis. (DR..Z.)

**CHUNNO.** BOT. PHAN. Même chose  
que Chumo en Virginie.

**CHUNSCHUT. ET KUNSCHUT.** BOT. PHAN. Syn. de Sésame oriental. (B.)

**CHUO. ois.** (Azzara.) Espèce du genre Gros-Bec. *V.* ce mot. (B.)

**CHUOI.** BOT. PHAN. Syn. cochinois de Bananier. *V.* ce mot. (B.)

**CHUPALON.** BOT. PHAN. Suivant Jussieu, c'est ainsi qu'on appelle au Pérou un Arbrisseau voisin du Vaccinium et dont le célèbre La Condamine envoya un dessin et une description lors de son séjour dans cette partie de l'Amérique. Jussieu pense que le Chupalon est une espèce du genre *Ceratostema*. (A. R.)

**CHUPALULONES.** BOT. PHAN. Selon Jussieu, ce nom s'applique également au Chupalon. *V.* ce mot. Selon Bosc, ce serait l'*Hibiscus coccineus*. (A. R.)

**CHUPAMEL.** BOT. PHAN. Syn. portugais d'Orobanche. (B.)

\* **CHUPIRI.** BOT. PHAN. Ce nom est cité dans la détestable compilation de voyages publiée sous le nom de L'Asiarpe, comme appartenant à une Plante du Mexique qu'il est impossible de reconnaître sur ce qu'on en rapporte, et qui est emprunté de Hernandez. (B.)

**CHUQUETTES.** BOT. PHAN. Syn. vulgaire de Mâche. *V.* VALÉRIANELLE. (B.)

**CHUQUIRAGA.** BOT. PHAN. Famille des Synanthérées corymbifères de Jussieu, tribu des Carduacées de Kunth, et Syngénésie égale de Linné. Ce genre établi dans le *Genera Plantarum* de Jussieu sur une Plante du Pérou, a été nommé ensuite *Johannina* par Willdenow. Rétabli sous son nom primitif par Humboldt, Bonpland et Kunth, qui lui ont ajouté deux espèces, il a reçu les caractères suivants : involucre turbiné, composé de folioles serrées, imbriquées, non brisées et mucronées, les extérieures sensiblement plus courtes, calathide formée de fleurs nombreuses, tous hermaphrodites; corolle tubuleuse à

cinq dents; filets libres; anthères longues munies de deux soies à la base; aigrette plumée; réceptacle garni de villosités. Les Plantes de genre sont des Arbustes rameux, feuilles coriaces, alternes, dentées roides, piquantes, imbriquées très-rapprochées; celles de l'espèce sur laquelle le genre a été fondé ressemblent aux feuilles des *Ruscus*. Elles croissent dans le royaume de Quito au Pérou. En donnant les descriptions, faites par Bonpland, des deux nouvelles espèces, Kunth exprime son doute sur leur différence réelle d'avec le *Chuquiraga insignis*, Juss., et *Johannina insignis*, Willd., espèce primitive. Le *Chuquiraga* a des affinités très-prononcées avec le Mutisia, et a été placé par Cassini dans la tribu des Mutisiées. (G. N.)

**CHURAH.** ois. Syn. indien de Pi Grièche rousse du Bengale, *Lani cristatus*, Lath. *V.* PIE-GRIÈCHE. (DR. Z.)

**CHURGE.** ois. Espèce du genre Outarde, *Quis bengalensis*, L. D. Bengale. *V.* OFFARDE. (DR. Z.)

**CHURLO.** ois. Syn. du Nandu, *Struthio Rheu*, L., au Paraguay. *V.* RHÉZ. (DR. Z.)

**CHURIGATU.** ois. Syn. d'Engoulevent chez les Burattés. (DR. Z.)

**CHURLEAU.** BOT. PHAN. Syn. de Panais sauvage en quelques lieux de Picardie. (B.)

**CHURLES, CHURLI ET CHURLO.** BOT. PHAN. Même chose qu'Chaurle. *V.* ce mot. (B.)

\* **CHURN-OWL.** ois. Syn. américain de l'Engoulevent, *Caprimulgus europæus*, L. *V.* ENCOUVENT. (DR. Z.)

**CHURBINCHE.** ois. Syn. du Gebe-Mouche huppé de la rivière de Amazonas, *Muscioapa coronatus*, L. (DR. Z.)

\* **CHURTAL.** BOT. PHAN. (Dalcamp.) Syn. arabe d'Avoine. (B.)

\* **CHURUMAYA.** BOT. PHAN. Es

pèce du genre Poivre dans la Flore du Pérou. (B.)

**CHURZETA.** BOT. PHAN. (Ruell.) Syn. africain de Chrysanthème. (B.)

**CHUSITE.** MIN. Nom donné par Saussure à un Minéral d'un jaune verdâtre, disséminé en petits mamelons dans les cavités d'un Basalte porphyrique de la colline de Limbourg. Il est translucide et tendre; sa cassure est lisse, et son éclat un peu gras. Il est insoluble dans les Acides, et se fond au chalumeau en un émail blanc jaunâtre. Cette substance paraît appartenir au Périidot, ainsi que la Limbithe du même auteur. V. PÉRIDOT. (G. DEL.)

\* **CHUSQUE.** *Chusquea*. BOT. PHAN. A l'article BAMBOU (V. T. II de ce Dictionnaire) Kunth a proposé la formation de ce genre nouveau dont le *Nastus Chusque* (Humb. et Bonpl. Pl. équ., 1, p. 281) est le type. Ce genre offre les caractères suivans : épillets cylindriques lancéolés, uniflores, composés de plusieurs écailles imbriquées, distiques, renfermant une fleur hermaphrodite qui a trois étamines et un style biparti.

Ce genre se distingue du *Nastus* de Jussieu, par ses étamines au nombre de trois seulement et non de six, par son style biparti et non triparti. Il se compose de deux espèces seulement, le *Chusquea scandens*, Kunth, Synops., 1, p. 264. Superbe Graminée, grimpante autour du tronc des Arbres voisins, et pouvant ainsi s'élever à une hauteur plus ou moins considérable. Ses fleurs forment des panicules terminales et rameuses.

Kunth rapporte à ce genre comme seconde espèce l'*Arundo Quila* de Poirer, fort différente de l'*Arundo Quila* de Molina, qui appartient à un autre genre ayant les épillets triflores. (A. R.)

**CHUSSA.** BOT. PHAN. Syn. monole de Bambou. (B.)

\* **CHUTASLIUM.** BOT. PHAN. Syn. péruvien de Nunnezharia. V. ce mot. (B.)

**CHUTSCH.** BOT. PHAN. Un des noms tartares du *Pinus Cambro*. V. PIN. (B.)

**CHU-TSÉ.** BOT. PHAN. Nom chinois du bois de Bambou dont on a peut-être emprunté le nom de Chusque. V. ce mot. (B.)

**CHUTUN.** OIS. Syn. kalmouck de la Demoiselle de Nardie, *Ardea Virgo*, L. V. GAV. (DR. Z.)

**CHU-TZAO.** BOT. PHAN. Syn. chinois de Chanvre. (B.)

**CHUYA.** MAM. Nom de pays de l'*Ateles marginatus*, Geoff. V. SAPIJOUS. (B.)

\* **CHUXTAID.** BOT. PHAN. Délé-champ dit qu'on appelle ainsi l'Ananas en Arabie. (A. R.)

**CHUY.** OIS. Syn. brésilien du Gdir-négat, *Emberiza brasiliensis*. V. GROS-BEC. (DR. Z.)

**CHWEDER.** OIS. Syn. vulgaire de l'Alouette, *Alauda arvensis*, L. V. ALOUETTE. (DR. Z.)

**CHWOSTCH.** BOT. CRYPT. Syn. russe de Prêle. (B.)

\* **CHYCALLE.** POIS. (Bonnaterre.) Espèce de Salmon. V. ce mot. (B.)

\* **CHYDORE.** *Chydorus*. CRUST. Genre de l'ordre des Branchiopodes et de la section des Lophyropes de Latreille (Règn. Anim. de Cuv.), établi par Leach (Dict. des Sc. natur. T. XIV, p. 540), et ayant, suivant lui, pour caractères distinctifs : deux yeux; deux antennes capillaires. Ce nouveau genre, sur la valeur duquel il serait bien difficile de prononcer, d'après le peu de mots que l'auteur en dit, paraît être formé aux dépens des Lyncées de Müller, et a pour type son *Lyncus Sphaerius*. Leach ne cite que cette espèce, qu'il nomme Chydore de Müller, *Chydorus Mulleri*. Elle habite les mares d'eau stagnante. (AUD.)

**CHYEH.** BOT. PHAN. Syn. arabe d'*Artemisia jamaica*, L., espèce orientale du genre *Artemisia*. V. ce mot. (B.)

\* **CHYLDN.** BOT. PHAN. (Murray.) Racine que les Chinois mâchent comme le Betel, et qui appartient à quelque Plante encore inconnue des botanistes. (B.)

\* **CHYLE.** ZOOL. L'un des produits immédiats de la digestion. Cette substance, presque toujours unie à d'autres humeurs, est sous forme d'un liquide assez épais, ordinairement blanc, rarement transparent, inodore, légèrement salé. Son siège est le canal thorachique. Abandonné au repos, il se sépare en deux parties dont une coagulée, formée d'un mélange de fibrine et de matière grasse, l'autre liquide, absolument analogue au serum. On obtient, par la distillation du Chyle, de l'Eau, du Carbonate d'Ammoniaque et de l'Huile. Le résidu est composé de Charbon contenant en outre un peu de principes fixes. V. CIRCULATION. (DR..Z.)

\* **CHYLINE.** BOT. PHAN. (Mentzel.) Syn. grec de Cyclamen. (B.)

**CHYM ET CHYMCHYMKA.** MAM. Syn. de Zibeline. V. MARTE.

\* **CHYME.** ZOOL. L'un des produits immédiats de la digestion; il est ordinairement sous forme pulpeuse, d'une couleur brune plus ou moins foncée; d'une odeur particulière; il passe promptement à la fermentation putride, se dissout en entier dans l'Acide nitrique, etc. V. CIRCULATION. (DR..Z.)

\* **CHYPKEFA.** BOT. PHAN. (L'Écluse.) L'un des noms hongrois de la Ronce. (B.)

\* **CHYROUIS.** BOT. PHAN. (Chomel.) Vieux nom français de la Carotte sauvage. (B.)

\* **CHYRRHABUS.** OIS. (Hésygius et Varinus.) Syn. du *Pelecanus Carbo*, L. V. CORMORAN. (DR..Z.)

**CHYSTE ET CHYTE.** MIN. Pour Schiste. V. ce mot.

**CHYTRACULIE.** *Chytraculia*. BOT. PHAN. Le genre ainsi nommé par Browne (*Jamaïc.*) a été placé par

Swartz dans son genre *Calyptanthus*. V. CALYPTRANTHE. (A.)

\* **CHY-WA-LY-GU.** POIS. Espèce indéterminée de Cyprin qui se pé dans certains endroits de la Chine et dont la chair, très-délicate, est fort estimée. (A.)

**CHYYTA.** MAM. Le Loup en bérie. (A.)

**CIA.** OIS. Espèce du genre Bruant. V. ce mot. (A.)

\* **CIACAMPELON.** BOT. PHAN. CHENKAPALONES.

**CIA-CIAC.** OIS. Syn. piémontais du Merle à plastron blanc, *Turdus torquatus*, L. (DR..Z.)

**CIA-CIAT.** OIS. Syn. piémontais de la Mésange à longue queue, *Parus caudatus*, L. V. MÉSANGE. (DR..Z.)

**CIACOL ET CIACOLA.** OIS. Syn. italien de la Corneille mantelée, *Corvus Cornix*, L. V. CORBEAU. (DR..Z.)

**CIAFFEU ET CIAFFO.** OIS. Syn. piémontais du Pégot, *Motacilla alpina*, L. V. ACCENTEUR. (DR..Z.)

**CIAGULA.** OIS. Syn. italien de Choucas, *Corvus Monedula*, L. V. CORBEAU. (DR..Z.)

**CIAMBAU, CODDA-PAIL, CODO-PAIL ET KIAMBEAU.** BOT. PHAN. Syn. de Pistia. V. ce mot. (B.)

**CIAMBETTA.** POIS. (Salvien.) Squalo Marteau sur quelques côtes de la Méditerranée. (B.)

**CIA-MEGLIARINA.** OIS. Syn. italien de Bruant commun, *Emberiza citrinella*, L. V. BRUANT. (DR..Z.)

**CIA-MONTANA ET CIA-SE VATICA.** OIS. Syn. génois du Bruant fou, *Emberiza Cia*, L. V. BRUANT. (DR..Z.)

**CIAMPTAL OU KIAMPTAL.** BOT. PHAN. Espèce de Galéga de la côte Guinée. (B.)

**CIANO.** BOT. PHAN. Du latin *Cyanus*. Le Bluet dans plusieurs dialectes du midi de l'Europe. (B.)

\* **CIARDOUSSE.** BOT. PHAN. CHARDOUSSE.



\* **CIARLOTTO.** ois. Syn. romain du grand Courlis cendré, *Scolopax arguata*, L. V. COURELIS. (DR..Z.)

**CIA-SELVATICA.** ois. V. CIA-MONTANA.

**CIATI** ou **KIATI.** BOT. PHAN. Syn. javan de Tek. V. ce mot. (N.)

**CIAUCIN.** ois. Syn. piémontais du Pouillot, *Motacilla Trochylus*, L. V. SYLVIE. (DR..Z.)

**CIAVA.** ois. Syn piémontais du Coracias, *Corvus Graculus*, L. V. PYRRHOCORAX. (DR..Z.)

\* **CIBAGÈ.** BOT. PHAN. On lit dans Jean Bauhin qu'une graine envoyée sous ce nom du Levant avait donné une Plante qui ressemblait à un Pin. On ne sait à quoi la rapporter. (N.)

\* **CIBAIRES.** INS. Cette expression a été employée par quelques entomologistes pour désigner collectivement les diverses parties de la bouche; elle est une traduction de ce que Fabricius comprend sous le nom d'*Instrumenta cibaria*. V. BOUCHE. (AUD.)

**CIBIBI.** ois. Syn. piémontais de la Mésange charbonnière, *Parus major*, L. V. MÉSANGE. (DR..Z.)

**CIBICIDE.** *Cibicides*. MOLL. Dans ses Polythalamies, Soldani a figuré (tab. 46, vas. 170, n, n, o, o) une Coquille fort singulière avec laquelle Montfort (T. I, pag. 122) a fait un genre particulier, dont les caractères essentiels sont : coquille libre, univalve, cloisonnée, à base aplatie; bouche linéaire, de toute la hauteur de la coquille; cloisons unies, sans siphon apparent. La forme générale de la coquille est pyramidale. On la trouve vivante à Lavourne, et fossile à Sienna. Dans l'état frais elle est irisée et nacrée. On ne connaît qu'une seule espèce de ce genre, le Cibicide glacé, *Cibicides resurgens*, qui n'a pas plus d'un huitième de ligne de diamètre. (D..H.)

\* **CIBLIA.** pois. Syn. suédois de Morue. V. GADE. (B.)

\* **CIBORIUM.** BOT. PHAN. V. CYAMOS.

**CIBOULE.** BOT. PHAN. Espèce du genre Ail, *Allium fistulosum*, L. V. ce mot.

**CIBOULETTE.** BOT. PHAN. Syn. d'*Allium Schœnoprobum*. V. AIL.

\* **CIBU.** ois. (Chezy.) Syn. présumé de *Loxia pensilis*, L. V. TISSERAIN. (DR..Z.)

\* **CIBUS-SATURNI.** BOT. CRYPT. C'est-à-dire *Mangar de Saturne*, Syn. d'*Equisetum*. V. PRÊLE. (N.)

**CICA.** BOT. PHAN. Pour Cicca. V. ce mot.

**CICADA.** INS. V. CIGALE.

**CICADAIRES.** *Cicadariae*. INS. Famille de l'ordre des Hémiptères, section des Homoptères, établie par Latreille (Considér. génér. p. 252, et Règn. Anim. de Cuv.) qui lui assigne pour caractères : antennes ordinairement très-petites, coniques ou en forme d'âlène de trois à six pièces, avec une soie très-fine au bout de la dernière; tarsi à trois articles. Cette famille curieuse comprend les grands genres *Cicada* et *Fulgora* de Linnaë. Tous les Insectes qui la composent ne se nourrissent que du suc des Végétaux. Les femelles ont une tarière écailleuse qui leur sert à déposer dans les Plantes le produit de la fécondation. Les mâles sont quelquefois pourvus d'un organe, au moyen duquel ils produisent un bruit particulier, désigné sous le nom de chant.

Les Cicadaires peuvent être divisés en plusieurs genres de la manière suivante :

† Antennes de six articles distincts; trois petits yeux lisses.

Genre : CIGALE.

Ce genre embrasse la division des Cigales porte-mannes de Linné, et le genre des Tettigonies de Fabricius. Stoll appelle ces Insectes Cigales chanteuses, à cause de l'organe sonore dont est pourvu le mâle.

† Antenne de Cicade, antenne de Cicade  
CIC 1. petite pour le Cicade 1. 1. 1.

On a nommé Cicades, ou Cicades, les  
Insectes appartenant à cette divi-  
sion.

I. Antennes insérées immédiate-  
ment sous les yeux, front souvent pro-  
longé en forme de museau, de fi-  
gure variable, selon les espèces: c'est  
la division des Fulgorelles, *Fulgo-  
rellæ*.

Genres: FULGORE, ASIRAQUE, DEL-  
PHAX, TETTIGOMÈTRE. Latreille réu-  
nit aux Fulgores ses Ixies et les petits  
genres *Lysira*, *Flata*, *Issus*, *Derba*  
de Fabricius.

II. Antennes insérées entre les yeux.  
Cette division a pris le nom de Ci-  
cadelles, *Cicadellæ*, ou les Cigales ra-  
naises de Linné.

Genres: ÉTALION, LÈDRE, MEM-  
BRACE, GÉRCOPE, TETTIGONE; les  
Membraces embrassent les genres  
*Centrotus* et *Darnis* de Fabricius;  
les Tettigones comprennent les gen-  
res *Cicada* et *Jassus* de Fabricius. V.  
ces mots.

Pour peu que l'on jette un coup-  
d'œil sur la famille dont il est ques-  
tion, on est frappé de la diversité très-  
grande des êtres qui s'y trouvent réu-  
nis; tandis qu'ailleurs les distinctions  
génériques sont quelquefois assez  
nuancées pour qu'on puisse passer  
d'un groupe à l'autre sans aucune tran-  
sition sensible. Ici, les caractères sont  
tellement tranchés que les liens na-  
turels qui doivent réunir les genres,  
semblent dans bien des cas, difficiles  
à saisir. Cette observation que tout  
entomologiste est à même de faire,  
conduit assez naturellement à pen-  
ser, qu'il existe dans la famille des  
Cicadaires; et entre certains genres,  
plusieurs branches que de nouvelles  
découvertes nous permettront tôt ou  
tard de remplir; c'est d'ailleurs ce  
qui vient d'être récemment démontré  
par Kirby.

Kirby, savant entomologiste an-  
glais, a découvert récemment (Ann. Soc.  
Trans. 1838) deux nouveaux genres

res voisins de celui des Fulgores, et  
auxquels il a donné les noms d'Oti-  
cère et d'Anotie. Nous traiterons le  
premier à son ordre alphabétique;  
mais la connaissance du second nous  
étant parvenue postérieurement à la  
publication de notre premier volume,  
nous dirons ici ce qu'il offre de plu-  
remarquable.

Les Anoties sont intermédiaires aux  
Otiocères et aux Delphax; mais elle  
en diffèrent par certains caractères.  
Elles se distinguent des premiers par  
le manque d'appendices à la base de  
antennes, par une plus grande briè-  
veté du bec, par des yeux semblés et  
très-proéminens; par le plus grand  
allongement du nez et par la différence  
qui s'observe dans la disposition de  
nervures des élytres, ainsi que par la  
dent angulaire de leur base an-  
térieure. Elles s'éloignent des se-  
conds par une tête comprimée à deux  
carènes, prolongée légèrement en bec  
par la longueur comparative des ar-  
ticles des antennes, le premier étant  
très-court, par l'absence de l'éperon  
très-remarquable qui arme les jam-  
bes postérieures des Delphax, par la  
manière différente dont les élytres  
sont veinées et par leur forme; par  
l'absence des yeux lisses; enfin par  
les appendices de l'anus qui, dans les  
Delphax, ressemblent davantage à  
ceux des Cigales de Latreille. Kirby  
décrit une seule espèce: l'individu  
sur lequel il se fonde est une femelle  
dont les organes copulateurs externes  
ressemblent à ceux des Otiocères.  
L'espèce unique qu'il possède porte  
le nom d'*Anotia Bonnetii*. Elle est de  
Georgie. Kirby en donne une excel-  
lente figure.

Les Anoties et les Otiocères ont  
leurs antennes insérées immédiate-  
ment sous les yeux, et appartiennent  
par conséquent à la division des Ful-  
gorelles; mais ils n'ont pas d'yeux  
lisses, et doivent, à cause de cette par-  
ticularité remarquable, former une  
section nouvelle.

CICADÉES. Cicadellæ. Cicadæ.  
CICADÉES. Cicadellæ. Cicadæ.

mér. Les Cicadaires ont ce nom (Zool. mal.) de genre d'Insectes de l'ordre des Hémiptères, qui correspond aux Cicadellidæ, Cicale et Jasse de Rabinet, ou à celui des Tettigones d'Olivier et de Latreille. Lamarek (Syst. des Insectes sans vert.) avait aussi imposé ce nom à un genre d'Insectes du même ordre, comprenant les Cicales, les Cercopes, et les Membreses de Fabricius; mais depuis (Hist. des Anim. sans vert. t. III, p. 472), il l'a appliqué à une division de la famille des Cicadaires. Latreille (Bégn. Anim. de Cur.) donne aussi le nom de Cicadelle à une section de Cicadaires.

**CICATRICE**. OIS. (Gesper.) Nom d'une Chouette dont on n'a pu déterminer l'espèce. (PR. 37.)

**CICATRICE**. BOT. PHAN. Genre de la famille des Euphorbiacées, dont on trouve sous le nom de Cact. LAMARCK, un de celui de Characella qui porte dans Rostk. Herb. exim. t. VII, p. 133). Ses fleurs sont monoïques ou dioïques; leur calice à quatre divisions; porte l'intérieur quatre petites glandes alternes avec elles, ou un disque glanduleux. Les fleurs mâles ont quatre étamines à filets libres, au sommet desquels sont appliquées les antères qui regardent en dehors. Les femelles offrent quatre ou cinq styles réfléchis, libres, surmontant un ovaire charnu, creusé d'autant de loges, dont chacune contient deux ovules. Le fruit, sous une enveloppe plus ou moins charnue, présente quatre ou cinq cônes dispersés. Ce genre est voisin du Phyllanthus, auquel il avait même été réuni autrefois, notamment des Arbres ou des Arbusteaux dont les feuilles munies de stipules alternes, petites, entières, glabres, sont disposées sur les rameaux de manière à simuler les folioles d'une feuille pennée. Les fleurs forment des racèmes axillaires et accompagnés de bractées nombreuses. Aux trois anciennes espèces originaires d'Asie, on en a joint une quatrième des

Antilles. Dans deux d'entr'elles, l'enveloppe charnue du fruit ou sarcocarpe, d'une saveur légèrement acide, offre une nourriture saine et agréable; ce dont on pourrait s'étonner dans une famille où les propriétés délétères sont si généralement répandues, si l'on ne savait quelle inégalité existe sous ce rapport entre les différentes parties même contiguës du même Végétal.

(A. D. J.)

\* **CICCADA**. OIS. (Gesper.) Nom d'une Chouette dont on n'a pu déterminer l'espèce. (PR. 37.)

\* **CICCABA**. BOT. PHAN. Même chose que Cachi. Pour ce mot.

**CICCLIBOTUS**. BOT. CRYPT. CANCELLAIRE.

\* **CICCUM**. BOT. PHAN. Les cloisons du fruit du Grenadier chez les anciens.

\* **CICCUS**. OIS. (Aldrovande.) Nom d'une Oie qui ne paraît pas bien déterminée. (PR. 7.)

**CICENDIE**. *Cicendia*. BOT. PHAN. Adanson a le premier proposé d'établir un genre distinct sous le nom de *Cicandi* pour la *Gentiana filiformis* de Linné, que plus tard on a nommé *Exacum*. Le nom d'Adanson devrait être adopté par antériorité, si l'usage n'avait consacré celui d'*Exacum*. Pour ce mot. (A. D. J.)

**CICER**. BOT. PHAN. CHICHE.

**CICERA**. BOT. PHAN. Espèce du genre Gesse dont Moench a fait le type de son genre *Cicerula*. Pour ce mot. (S.)

**CICERBITA**. BOT. PHAN. (Plin.) Syn. de *Sochus arvensis*, demeuré en Italie le nom vulgaire de cette Plante. (S.)

**CICERCHIA**. BOT. PHAN. Vieux nom italien de la Gesse.

**CICERCULA**. BOT. PHAN. Moench a proposé de séparer du genre *Lathyrus*, et d'en former un genre nouveau; les espèces dont la suture supérieure a les bords saillans en forme d'ailes :

tels sont les *Lathyrus sativus*, *Lathyr. Cicera*, etc. *V. Gresse.* (A. R.)

**CICÉROLE.** BOT. RHAN. Même chose que *Cicer* et *Chioche*. *V. ce dernier mot.* (B.)

**CICH-CIEH.** ois. Syn. piémontais du Gobe-Mouche gris, *Muscicapa Grisola*, L. *V. Gobe-Mouche.* (DR. Z.)

**CICHE.** BOT. PHAN. *V. CHIOCHE.*

**CICHLÉ.** *Cichla*. POIS. Genre formé par Schneider aux dépens des Labres, adopté par Cuvier qui le place dans la famille des Percoides, ordre des Acanthoptérygiens, et dont les caractères sont : dents en velours; une seule dorsale; opércules mutiques; bouche un peu protractile et bien fendue. Les Cichlées diffèrent des Labres qui ont la lèvre double, et n'ont pas leurs dents en velours; des Canthères qui ont la bouche peu fendue et peu protractile; des Pristipomes qui ont leurs opércules dentés, et des Spares qui ont deux dorsales. Les Cichlées sont des Poissons dont la chair est assez bonne; on en trouve des espèces de mer et d'autres d'eau douce. Lesueur (*Journ. of the acad. of nat. sc. of Phil.* vol. II, n. 7, juin 1822) vient d'ajouter cinq espèces nouvelles à ce genre qui est composé des suivantes : 1° *Cichla ocellaris*, *Cichla ocellaris*, Sch. t. 66. Des mers des Indes-Orientales. — 2° La Fourche, *Labrus Furca*, Lacépède, dont le Caranxomore sacristain du même auteur est un double emploi. — 3° L'Hololépide, *Labrus Hololepidotus*, Lac., découvert par Commerson dans l'océan Équatorial. — 4° Le Chrysoptère, *Parca Chrysoptera*, Catsh. De la Caroline. — 5° *Cichla aenea*, Lesueur. Dulac Érié. — 6° *Cichla fasciata*, Lesueur. Du même lac. — 7° *Cichla ohioensis*, Lesueur. De l'Ohio. — 8° *Cichla floridana*, Lesueur. De la Floride orientale. — 9° *Cichla minima*, Lesueur, très-petite espèce qui n'a guère que neuf lignes de longueur; cette dernière vit dans les effluens du lac Érié. (B.)

**CICHORÉE.** BOT. PHAN. De *Cichorium* ou *Cicorium*. Vieux nom de la Chicorée; *V. ce mot.*

**CICI.** ois. (Moreau de Jonnés.) d'up Bruant ou d'un Gros-Bec des tilles, dont la synonymie n'est encore bien établie. (DR.)

**CICI ou KIKI.** BOT. PHAN. (*Coride*) Syn. de *Ricin*.

\* **CICIDA.** ois. Vieux nom de Mésange charbonnière, *Parus melanocephalus*, L.

**CICIGNA.** REPT. OPH. Même chose que *Cecalla* et que l'Orvet fragile.

**CICINDELE.** *Cicindela*. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section Pentamères, famille des Carabiques, tribu des Cicindelètes (Règn. An. Cuv.), fondé originairement par Linné et appliqué depuis, mais à tort, à des Insectes de genres très-différents. Le grand genre *Cicindela* de Linné a été subdivisé (*V. CICINDELÈTES*); on ne réunit plus aujourd'hui sous ce nom que les espèces offrant les caractères : les trois premiers articles des tarses antérieurs des mâles dilatés presque en forme de triangle renversés bout à bout, point ou gué plus avancés par devant que par derrière; palpes labiaux ordinairement plus courts que les maxillaires extérieurs, avec les deux premiers articles fort courts; l'extrémité supérieure du radical ne dépassant point celle de l'échancrure du menton.

Ce genre se distingue des Tricorydyles et des Collores par la forme du pénultième article des palpes labiaux, qui est long et presque cylindrique, ainsi que par la largeur du corps; partage ce caractère avec les Théracodes, et n'en diffère que par la présence d'une dent au milieu du bord supérieur du menton, dans son échancrure, et par des palpes maxillaires internes très distincts. Enfin, sous tous ces rapports, il ressemble aux Manticores, aux Ctenostomes, au Mégacéphale, mais il diffère du premier et du second de ces genres par la dilatation des trois premiers articles des tarses

antérieurs du mâle, et du troisième par le développement des palpes labiaux.

Les Cicadellides ont le corps orné le plus souvent de couleurs métalliques très-brillantes, tirant en général sur le vert; leur tête est forte, plus large que le prothorax; elle supporte de gros yeux et des antennes presque filiformes; leur bouche présente des mandibules allongées, fortes, terminées par un crochet et munies de quatre dents au côté interne. Les palpes, au nombre de six, sont velus; des élytres coriaces recouvrent des ailes membraneuses existant chez presque tous; les pattes sont grêles et longues avec des tarses très-déliés.

Ces Insectes sont carnassiers et voraces; on les rencontre dans les lieux sablonneux exposés au soleil, où ils cherchent leur proie; leur démarche est vive et précipitée, leur vol est court et rapide; lorsqu'on les saisit, ils exhalent une odeur souvent agréable, musquée et comparable à celle que répand la Rose. Suivant les observations de Dufour, leur canal digestif est assez analogue, pour la forme générale, à celui des Carabiques; sa longueur n'excède que fort peu celle du corps de l'Insecte; le gésier est très-oblong, garni intérieurement de quatre pointes cornées, conniventes, et les papilles de l'estomac qui le suit sont un peu moins prononcées et plus petites que dans les Carabes. Les vaisseaux biliaires et les organes mâles ont aussi la plus grande ressemblance avec les mêmes parties dans les Carabiques.

Desmarest (Ancien Bulletin des Sciences par la Société philomatique; T. III, p. 197, et pl. 24, fig. 2, 3 et 4) nous a transmis, sur la larve d'une espèce que Latreille croit être la Cicadelle hybride, des détails curieux que nous lui emprunterons. Cette larve, déjà décrite imparfaitement par Latreille (Hist. des Ins. T. I, p. 140), est longue de vingt-deux à vingt-sept centimètres lorsqu'elle a pris tout son accroissement. Son corps est allongé, linéaire, formé de douze an-

neaux; il est mou et d'un blanc sale; la tête, le premier anneau du corps ou le prothorax, et les six pattes ont seuls une consistance de corne; la tête est beaucoup plus large que le corps; elle a la forme d'un trapèze dont le côté le plus large est placé en arrière; en dessus les parties latérales et postérieures sont rebordées; en dessous elle est renflée postérieurement et partagée en deux lobes par un sillon longitudinal. Il y a six yeux lisses très-visibles, trois de chaque côté; les quatre plus gros sont situés à la partie supérieure et postérieure; les deux autres, beaucoup plus petits et à peine saillans, sont placés sur la partie latérale; tous ces yeux sont noirs. On voit deux antennes insérées de chaque côté, entre les yeux et la bouche; elles sont très-courtes et composées de quatre articles cylindriques, dont les deux premiers sont les plus gros. La bouche, placée à la partie antérieure de la tête, est formée, 1<sup>o</sup> d'une lèvre supérieure, petite, demi-circulaire, ne couvrant pas la base des mâchoires; 2<sup>o</sup> de deux mandibules très-longues et très-aiguës, dont la base est armée du côté interne d'une très-forte dent; ces mandibules sont recourbées vers le haut; elles servent à l'Animal pour saisir sa proie; 3<sup>o</sup> de deux mâchoires insérées au-dessous des mandibules, et aussi peu courbées par la languette que par la lèvre supérieure. Ces mâchoires consistent en une pièce cornée, un peu comprimée et légèrement fourchue à son extrémité: chacune des branches de cette extrémité donne attache à un petit palpe composé de deux ou trois articles; 4<sup>o</sup> d'une languette très-petite, supportant deux très-petits palpes formés de deux articles.

Les trois premiers anneaux du corps donnent attache aux pattes; ils sont dépourvus de stigmates. Le premier anneau, ou le prothorax, est très-remarquable; sa forme est celle d'un bouclier grec; il est plus large que la tête et légèrement rebordé; sa couleur est d'un vert métallique assez brillant. Le second anneau et le troisième sont

beaucoup plus étroits; ils sont d'un blanc sale comme ceux qui viennent après eux. Les quatre anneaux qui suivent les trois premiers ne sont guère plus larges que le second. On remarque sur chacun, ainsi que sur les cinq qui restent à la partie supérieure, et de chaque côté, une tache lisse et de couleur brunâtre, au milieu de laquelle on aperçoit le stigmate.

Le huitième anneau, en comptant après la tête, est beaucoup plus renflé que les autres. Il présente à sa partie supérieure un organe fort singulier, consistant en deux tubercules charnus, dont le sommet est couvert de poils roides, de couleur roussâtre, au milieu desquels on voit, sur chaque tubercule, un petit crochet corné, dirigé en avant et recourbé légèrement en dehors. C'est à l'aide de ces deux crochets que la larve de la Cicindèle prend du repos, et s'arrête à l'endroit qu'elle désire, dans le long conduit perpendiculaire et souterrain qu'elle habite; ce sont, pour ainsi dire, les ancras dont elle se sert pour se fixer. Cette saillie du huitième anneau donne au corps de cette larve la forme d'un Z, parce qu'elle en relève le milieu, et cette courbure du corps procure à l'Animal la faculté de monter dans son puits avec la plus grande facilité; le dernier segment du corps est très-petit et terminé par un léger prolongement qui présente l'ouverture du canal intestinal. Les pattes sont courtes et faibles; les tarses sont formés de deux articles et terminés par deux petits crochets.

Telle est l'organisation bien remarquable de cette larve non moins curieuse par ses habitudes. En effet, elle pratique des trous verticaux dans le sable et place sa large tête près de l'embouchure, de manière à la masquer. Un Insecte vient-il à passer sur cette sorte de pont, il manque tout-à-coup sous les pattes. La larve de la Cicindèle monte et descend sans peine dans son trou en augmentant et diminuant alternativement le repli que son corps forme vers son milieu, et elle s'arrête en abaissant contre les parois

de son puits les deux crochets de son huitième anneau est mué.

L'organisation et les mœurs diverses larves de Cicindèles sont doute plus ou moins analogues à celle qui vient d'être décrite. Miger a occasion d'observer la larve de la cicindèle champêtre; et ses observations se lient parfaitement à celles de Dejean. La tête, outre l'usage important que nous avons indiqué, sert encore à l'Animal à débayer son trou ce qu'il exécute en chargeant le dessus de particules de sable qui sont rejetées en dehors de l'orifice du trou. Si ces larves sont trop à l'étroit que la nature du terrain ne leur convienne pas, elles abandonnent le demeure pour s'en construire une autre: elles sont très-voraces et ne mangent même pas les larves de leur espèce; lorsque l'époque de la métamorphose en nymphe est arrivée, elle bouchent l'ouverture de leur trou.

Ce genre est assez nombreux en espèces. Latreille et Dejean (*Hist. Nat. et Iconogr. des Coléopt.*) en ont donné une excellente monographie, accompagnée de jolies figures qui représentent toutes les espèces particulières de l'Europe, parmi lesquelles nous citerons:

La *CICINDÈLE CHAMPÊTRE*, *C. campestris* des auteurs, ou le Bupreste velours vert à douze points blancs Geoffroy (*Hist. des Ins. T. 1, p. 11 n° 27*). Elle est commune dans presque toute l'Europe et habite les lieux secs et sablonneux; ses couleurs varient beaucoup. Dejean (*loc. cit.*) a nommé comme une simple variété de cette espèce, la *Cic. Marocana* Fabr., qu'on trouve en Espagne sur la côte de Barbarie.

La *CICINDÈLE SYLVATIQUE*, *C. sylvatica* des auteurs. On la rencontre dans les endroits secs et sablonneux de la France et de l'Allemagne. Elle n'est pas très-rare à Fontainebleau.

*CICINDÈLE HYBRIDE*, *Cic. hybrida* des auteurs ou le Bupreste à broche blanche de Geoffroy (*loc. cit.*, p. 11 n° 28.). On la trouve dans pres-

oute l'Europe; elle varie pour les couleurs.

**CICINDELE LITTORALE**, Cic. *littoralis*, Fabr., qui est la même que la Cic. *neboralis* d'Olivier ou la Cic. *littoralis* de Megerle. Elle se trouve principalement sur les bords de la mer, dans le midi de la France.

V., pour les autres espèces, Latreille et Dejean (*loc. cit.*), Olivier Encycl. méth. et Hist. des Coléopt.), Léon Dufour qui a donné des observations sur quelques Cicindelètes et Carabiques observés en Espagne (Annales génér. des Sc. phys. T. VI), Fischer (Entomogr. de la Russie, T. I<sup>er</sup>), Kirby (Linn. Societ. Trans. T. XII). V. aussi le tome cinq des Mémoires de la Société impériale des naturalistes de Moscou, etc. (AUD.)

#### \* CICINDELES A COCARDES.

INS. Nom que Réaumur et Geoffroy ont donné à des Insectes coléoptères dont le thorax et l'abdomen sont munis latéralement d'appendices colorés qu'ils font sortir à volonté. Ces Insectes appartiennent au genre Malachie. V. ce mot. (AUD.)

#### CICINDELÈTES. *Cicindelæ*. INS.

Famille de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, établie par Latreille, et convertie par lui (Règn. Anim. de Cuv.) en une tribu qui correspond au grand genre *Cicindela* de Linné, et pour caractères : mâchoires terminées par un ongle; languette très-petite, cachée par le menton; palpes à quatre articles distincts, le premier étant dégagé. Suivant Latreille (Hist. Natur. et Iconograph. des Coléopt. d'Europe, T. I, p. 28), les Cicindelètes sont généralement distinguées des autres Coléoptères par leurs mandibules rostrées, armées de fortes dents, et croisées; leurs antennes filiformes ou sétacées et menues; leurs yeux grands et saillans; leur tête large et plus large que le corselet; les palpes labiaux très-poilus et longs, ainsi que les maxillaires externes, par un article en forme de crochets; allongé et comprimé presque triangulaire; leurs pieds

longs et grêles. Le côté interne de leurs jambes antérieures n'offre jamais cette échancrure qui caractérise le plus grand nombre des Insectes de la tribu des Carabiques, et les crochets des tarses ne sont jamais dentés. L'extrémité postérieure des élytres est souvent très-obtuse ou tronquée; leurs couleurs et particulièrement celles du dessous du corps sont métalliques et très-brillantes; des taches, des lignes et des points blancs ou d'un blanc jaunâtre, dont leurs élytres sont souvent parsemées, forment des dessins agréables, et ajoutent à ces ornemens. Le labre est très-souvent dentelé et autrement coloré que la tête; il est ordinairement blanchâtre.

A l'aide de ces caractères, on distingue facilement les Cicindelètes des Carabiques avec lesquels elles ont cependant les plus grands rapports, tant par leurs formes extérieures que par les mœurs et l'organisation. Ces Insectes sont voraces dans tous leurs états; ils aiment les lieux sablonneux exposés au soleil. Quelques espèces habitent les bords des étangs et les rivages de la mer.

Leur larve a été observée dans le genre Cicindèle.

Latreille, dans le dernier ouvrage cité, distribue les genres propres à cette tribu de la manière suivante :

† Pénultième article des palpes labiaux presque cylindrique et long (corps très-rarement étroit et allongé; palpes alors fort longs).

I. Une dent au milieu du bord supérieur du menton, dans son échancrure; palpes maxillaires internes très-distincts et de deux articles, recouvrant, comme de coutume, l'extrémité supérieure des mâchoires.

Genres : MANTICORE, CRÉNOSTOME, MÉGACÉPHALE, CICINDELE.

II. Point de dents au milieu du bord supérieur du menton; palpes maxillaires internes très-petits, peu distincts, et d'un seul article.

Genre : THÉRATE.

†† Pénultième article des palpes labiaux dilaté du côté de la tête, com-

primé, soit presque lunulé, soit en triangle renversé ou en forme de hache (corps toujours étroit et allongé, avec le corselet long, presque globuleux ou conico-cylindrique).

Genres: TRYCONDYLE, COLLIURE.

On pourrait, en prenant pour première base des divisions la forme du corps et celle du corselet ensuite, arriver à une distribution plus simple, mais qui, suivant Latreille, serait moins naturelle. V. tous les mots cités. (AUD.)

CICINNURUS. OIS. V. MANUCODE.

\* CICIOLO. BOT. CRYPT. Probablement l'*Agaricus Eryngii* en Italie. (B.)

CICLA. BOT. PHAN. Syn. de Poirée, espèce du genre Bette. V. ce mot. (B.)

\* CICLE. OIS. (Belon.) Désignation grecque des Grives suivant Aristote. (DR..Z.)

CICLE. POIS. Pour Cichle. V. ce mot.

CYCLOPHORE. MOLL. Pour Cyclophore. V. ce mot.

CICLOSTME. MOLL. Pour Cyclostome. V. ce mot.

\* CICOGNE, CICOIGNE ET CONGNE. OIS. Vieille orthographe française du mot Cigogne, du latin *Ciconia*. (B.)

CICUMA. OIS. Ancien syn. latin de la Chouette Caparacoch, *Strix Ulula*, L. V. CHOUETTE. (DR..Z.)

\* CICUNIA. OIS. (Belon.) Syn. de la Hulotte, *Strix Aluco*, L. V. CHOUETTE. (DR..Z.)

CICUTA. BOT. PHAN. V. CIGUE.

CICUTAIRE. *Cicutaria*. BOT. PHAN. Lamarck et Jussieu appellent ainsi le genre *Cicuta* de Linné qui appartient à la famille naturelle des Ombellifères et à la Pentandrie Digynie. Il est caractérisé par son involucre composé généralement d'une seule foliole, qui manque cependant quelquefois, par

ses involucrelles, de trois à cinq folioles linéaires étalées. Les pétales sont difformes, presque égaux. Le fruit globuleux, presque didyme, est à cinq côtes simples sur chaque moitié et couronné par cinq dents très-crochues. Les fleurs sont blanches. Ce genre a des rapports marqués avec les genres *Conium* et *Ethusa*. Il se distingue du premier par son involucre d'une seule foliole ou nul, par son fruit à cinq côtes simples, unies et crenelées. Quant à l'*Ethusa* ou le Ciguë, ses fruits plus allongés, l'absence d'involucre, ses pétales inégaux la caractérisent suffisamment.

Le genre *Cicutaria* se compose de trois espèces herbacées, vivaces, croissant dans les marécages et les lieux humides, une en Europe et deux dans l'Amérique septentrionale. Ce genre d'Europe, la *CICUTAIRE AQUATIQUE* *Cicutaria aquatica*, Lamk., est plus connue sous le nom de Ciguë vireuse *Cicuta virosa*, L. Elle croît en France particulièrement dans le Nord. Sa racine est charnue, blanche, renflée offrant des cavités irrégulières pleines d'un suc laiteux et jaunâtre, très-âcre. Il en naît une tige cylindrique dressée, rameuse, haute de deux à trois pieds, garnie de feuilles très-grandes, décomposées en un très-grand nombre de folioles lancéolées glabres, dentées en scie; les supérieures sont rapprochées trois par trois inférieurement, de manière à simuler en quelque sorte une feuille profondément tripartite. Le pétiole commun est creux et cylindrique. Les fleurs sont blanches et disposées en ombelles au sommet de chaque ramification de la tige.

Cette plante est fort vénéneuse. Toutes ses parties sont âcres et purgatives; la racine surtout est très-dangereuse à cause de sa ressemblance avec le Panais sauvage, méprise qui a parfois causé les accidents les plus graves. Les moyens d'y remédier étant les mêmes que pour la grande Ciguë, nous renvoyons à ce mot. On l'a aussi employée en médecine particulièrement comme narcotique.



mais aujourd'hui on lui préfère la grande Ciguë.

Une seconde espèce est la *CICUTARIA MACULÉE*, *Cicutaria maculata*, L., qui croît dans l'Amérique septentrionale, et qui a été figurée par Bulliard sous le faux nom de *Cicuta virosa*. Ses folioles sont beaucoup plus larges, cordiformes et moins nombreuses. Elle jouit des mêmes propriétés que la précédente. (A. R.)

\* *CICYMIS*. OIS. Même chose que *Ciccada*. V. ce mot.

\* *CIDARES*. ÉCHIN. Nom donné par Klein à la première section des *Anocytes* dans la famille des Oursins ou *Echinodermes*. (LAM..X.)

\* *CIDARIS*. ÉCHIN. Ce nom a été donné, pour la première fois, par Klein, à un groupe d'Oursins de forme hémisphérique ou sphéroïdale, ayant l'anus dorsal et vertical opposé à la bouche. Il comprend les genres Oursin et *Cidarite* de Lamarck.

(LAM..X.)

*CIDARITE*. *Cidarites*. ÉCHIN. Genre établi par Lamarck dans la deuxième section de ses *Radiaires échinodermes* ou *échinides*. Adopté maintenant par les naturalistes, il offre pour caractères : corps régulier, sphéroïde ou orbiculaire, déprimé, très-hérissé ; à peau interne solide, testacée ou crustacée, garnie de tubercules perforés au sommet, sur lesquels s'articulent des épines mobiles, caduques, dont les plus grandes sont bacilliformes ; cinq ambulacres complets qui s'étendent en rayonnant du sommet jusqu'à la bouche, et bordés chacun de deux bandes multipores, presque parallèles ; bouche inférieure, centrale, armée de cinq pièces osseuses, surcomposées postérieurement ; anus supérieur vertical. Sans doute les *Cidarites* sont très-voisines des Oursins par leurs rapports ; comme eux, elles ont l'anus vertical, cinq ambulacres complets et dix bandelettes multipores qui, deux à deux, bordent chaque ambulacre. Les *Echinides* néan-

moins sont très-distinctes des Oursins, non-seulement par leur aspect particulier, les caractères de leurs ambulacres et de leurs épines ; mais en outre par une particularité très-remarquable de leur organisation. Ici, en effet, la nature emploie un moyen particulier et nouveau pour mouvoir les épines, souvent fort longues, dont ces Animaux sont hérissés. Elle a percé de part en part le test et les gros tubercules solides dont il est chargé, ce qu'elle n'a fait nulle part dans les autres *Echinides* ; et, au moyen d'un cordonnet musculaire traversant le test et le tubercule qui y correspond, elle exécute, avec ou sans l'aide de la peau, les mouvements dont ces épines doivent jouir. Ainsi, les tubercules du test des *Cidarites*, surtout les principaux, étant constamment perforés, ce que l'inspection de leur sommet montre facilement, offrent une distinction tranchée qui les sépare des Oursins et de tous les autres *Echinides*. Les *Cidarites* d'ailleurs se font toutes remarquer par leurs ambulacres plus étroits que ceux des Oursins, plus réguliers, plus semblables à des allées de jardin ; les bandelettes poreuses qui les bordent étant plus rapprochées et moins divergentes. Elles sont aussi remarquables par plusieurs sortes d'épines : les unes grandes, soit bacillaires, tronquées au bout, soit en massue ou digitiformes ; les autres fort petites et nombreuses, d'une forme différente de celle des bacillaires, et qui recouvrent les ambulacres, ou qui souvent entourent la base des grandes épines, leur formant une collerette courte et vaginiforme. Enfin aucune *Cidarite* connue n'a toutes ses épines aciculaires, comme on le voit dans la plupart des Oursins et dans toutes les autres *Echinides*.

Il est difficile de déterminer les espèces du genre Oursin de Linné, à cause de la confusion qui règne dans la nomenclature des parties du test ; on ne sait pas toujours distinguer les ambulacres des bandelettes, les bandelettes des sillons ; et cependant ce

sont les parties qui fournissent ordinairement les caractères des espèces. Sans de bonnes figures, il est impossible de ne pas commettre des erreurs, et de ne pas confondre les unes avec les autres.

On distingue, parmi les Cidarites, deux groupes particuliers qui semblent deux familles assez remarquables : le premier embrasse les vrais Turbans; dans le second sont renfermés les Diadèmes. Les uns et les autres ont les tubercules du test perforés, et néanmoins fournissent dans le genre deux sections bien distinctes.

† TURBANS à test calé, subsphéroïde, à ambulacres ondes.

CIDARITE IMPÉRIALE, *Cidarites imperialis*, Lamk., Anim. sans vert. T. III, p. 54, n. 1. Encycl. méth., pl. 136, fig. 8. Très-belle espèce confondue avec l'*Echinus mamillatus*. Son test est orbiculaire avec les ambulacres d'un violet pourpre ainsi que les petites épines; les grandes sont annelées de blanc, un peu ventrues et striées. Elle habite la mer Rouge et la Méditerranée.

CIDARITE PORC-ÉPIC, *Cidarites Hystrix*, Lamk., p. 55, n. 5. Encycl. méth., pl. 136, fig. 6, 7. Corps orbiculaire un peu comprimé, avec des ambulacres larges, partagés par une ligne flexueuse. Les grandes épines sont très-longues et striées. Habite l'Océan d'Europe et la Méditerranée. Elle a les plus grands rapports avec la précédente.

CIDARITE PORTE-QUILLE, *Cidarites Metullaria*, Lamk., Anim. sans vert. T. III, p. 35, n. 7. Encycl. méth., pl. 134, fig. 8. Corps globuleux un peu déprimé, à grandes épines cylindriques, granulees, avec le sommet tronqué et le bord crenelé. Il en existe une variété plus petite à épines plus courtes. L'une et l'autre habitent la mer des Indes, l'Île-de-France et Saint-Domingue. La dernière localité nous semble un peu hasardée.

A cette section appartiennent encore les Cidarite pistillaire de Lamk., Encycl. méth., pl. 137, fig.

1, 2, A, B. De l'Île-de-France. — Cidarite bâtons rudes, Lamk., Île de Mascareigne. — Cidar. bec de Grue, Lamk., Encycl. méth., pl. 136, fig. 1. Indes-Orientales. — Cidar. tribuloïde de Lamk., Leske. ap. Klein, tab. 57, fig. 3. Mer des Indes. — Cidar. verticillée, Lamk., Encycl. méth., pl. 136, fig. 2, 5. Habitation inconnue. — Cidar. porte-trompette, Lamk., p. 57, n. 9. Mers de l'Australasie. — Cidar. biépineuse, Lamk., p. 57, n. 10. Mers de l'Australasie. — Cidar. annulifère, Lamk., p. 57, n. 11. Île des Kangourous dans l'Australasie.

†† DIADÈMES à test orbiculaire déprimé, avec des ambulacres droits.

CIDARITE PORTE-CHAUME, *Cidarites calamaria*, Lamk., Encycl. méth., pl. 134, fig. 9, 10, 11; *Echinus calamarius*, Gmel., Syst. Nat. p. 5173, n. 27. Cette espèce est une des plus élégantes par ses épines fistuleuses, tronquées, cylindriques, annelées de vert et de blanc, rudes et striées transversalement; elle habite la mer des Indes.

CIDARITE DIADÈME, *Cidarites Diadema*, Lamk., Encycl. méth., p. 133, fig. 10; Cidarite à test hémisphérique, déprimé, offrant cinq ambulacres verruqueux avec des épines longues, soyeuses, presque fistuleuses et rudes; elle habite l'Océan des Grandes-Indes.

CIDARITE RAYONNÉE, *Cidarites radiata*, Lamk., Encycl. méth., pl. 140, fig. 5, 6; *Echinus radiatus* Gmel., Syst. Nat., p. 5174, n. 50. Belle, rare et grande Echinide à test orbiculaire, très-large, comprimé un peu épais, avec les aréoles de ambulacres un peu élevés en côtes; les bandes sont formées de quatre rangs de pores.

Cette section renferme encore le Cidarite grand Hérisson, Lamk., p. 58, n. 12. — Cidarite Subulaire, Lamk., p. 59, n. 14. De l'Île-de-France. — Cidarite crénulaire, Lamk., p. 59, n. 16; Fossile de la Suisse. — Cidarite faux Diadème, Lamk., p. 59, n. 17, Fossile dou

on ignore la localité. — Cidar. pulvinée, Lamk., p. 59, n. 18. Mers de l'Asie. Il existe un grand nombre de Cidarites inédites dans les collections, les unes fossiles, les autres vivantes; il y en a plusieurs de figurées dans l'Encyclopédie méthodique, ainsi que dans quelques autres ouvrages.

(LAM.-X.)

**CIDAROLLE.** *Cidarolus*. MOLL. Sous ce nom générique, Montfort (T. 1, p. 110) a désigné une Coquille polythalamie, figurée dans Soldani (Test. micros. T. 1, part. 1, tab. 36, vas. 160, s.) ; il lui a assigné les caractères suivans : coquille libre, univalve, cloisonnée, en disque, à spire éminente et base aplatie, roulée et cordelée en forme de turban; bouche ouverte; cloisons unies; siphon inconnu. L'espèce qui fait le type du genre est le Cidarolle étoffé, *Cidarolus plicatus*, qui est surtout remarquable par ses loges triangulaires et renflées.

(D.-H.)

**CIDROMELA.** BOT. PHAN. Dans Lobel, c'est le Citronnier; chez les Italiens, une variété de cet Arbre. (B.)

\* **CIEBOUL** ou **KÉBOUL.** BOT. PHAN. (Adanson.) Syn. d'Aristide. V. ce mot. (B.)

**CIECA.** BOT. PHAN. (Adanson.) V. CROTON. Medicus et Moench avaient, sous le même nom qui n'a pas été adopté, formé, aux dépens des Passiflores, un genre correspondant à celui que nous avons proposé (Annales gén. des Sciences phys. T. II, p. 158) sous le nom de *Monoctinerma*. V. PASSIFLORE. (B.)

**CIECÉE-ETE** ou **SCIECÉE-CHETE.** CRUST. On désigne sous ce nom, dans l'Amérique, une espèce de Crabe des rivières salées, dont on fait usage au Brésil, soit comme aliment, soit comme remède. Bosc qui l'a rapportée de la Caroline où elle est très-commune, croit que c'est l'*Ocyropode* combattant. V. OCYROPE. (AUD.)

**CIE-LITSU.** BOT. PHAN. Syn. chinois de *Triphulus lanuginosus*, L., espèce du genre Horse. V. ce mot. (N.)

**CIENFUEGOSIE.** *Cienfuegosia*. BOT. PHAN. Le genre décrit sous ce nom par Cavanilles, a été appelé *Fuengosia* par Jussieu. V. FUENGOSIE.

(A. R.)

**CIEN-KAM-XU.** BOT. PHAN. Syn. chinois du *Sebifera glutinosa* de Loureiro. V. SÉBIFÈRE. (B.)

**CIEN-SEU-SAT.** BOT. PHAN. Syn. chinois du *Cacalia procumbens*, Lour.

(B.)

**CIENTOPIES.** CRUST. Syn. espagnol de Cloporte. (B.)

**CIERGE** ou **CACTIER.** *Cactus*. BOT. PHAN. Parmi les Végétaux dicotylédons, il est peu de genres dont le port soit aussi singulier, aussi remarquable que celui des Cactiers, et dont les espèces offrent des formes aussi bizarres et aussi variées. En général leur tige est charnue, tantôt globuleuse et simple, relevée de côtes et en forme de Melon, tantôt allongée, cylindrique, cannelée, ramuseuse, dépourvue de feuilles qui sont remplacées par des épines courtes et disposées en faisceaux, du milieu desquelles naissent les fleurs, tantôt elle se compose de pièces épaisses, ovales et articulées, que l'on considèrerait autrefois comme les feuilles. Les Cactiers sont tous exotiques et croissent dans les contrées chaudes de l'ancien et du nouveau continent. Les uns peuplent les solitudes des déserts de l'Afrique où leurs fruits pulpeux et aigrelets offrent au voyageur un rafraîchissement salutaire et inespéré. Les autres couvrent de leurs tiges irrégulières et épineuses les rochers nus du Nouveau-Monde; ceux-ci enfin vivent en parasites, et s'enlaçant autour des Arbres voisins, parviennent avec eux à une hauteur considérable.

Les fleurs de ces Végétaux ne sont pas moins dignes d'admiration. Elles sont, dans la plupart des espèces, d'une grandeur étonnante, peintes de couleurs riches et brillantes, et répandent souvent une odeur des plus suaves. On est frappé d'étonnement en voyant des fleurs aussi gran-

des roses belles, sortir de Végétaux d'un aspect aussi ingrat. Mais leur éclat est passager. Quelques heures suffisent pour ternir ces couleurs brillantes, et les fleurs des Cactiers ne tardent pas à se flétrir.

L'organisation des fleurs, dans ce genre, présente quelques particularités remarquables. Elles sont solitaires et naissent communément du centre des faisceaux d'épines. Leur calice est adhérent par sa base avec l'ovaire qui est infère. Tantôt il forme un tube quelquefois fort long, tantôt son limbe commence immédiatement au-dessus de l'ovaire. Dans tous les cas, il est épais et charnu; le limbe se compose d'un nombre variable de segments inégaux, épais, disposés sur plusieurs rangées dont les plus intérieures sont colorées; minces, pétaloïdes et se confondent insensiblement avec les pétales. L'ovaire, qui est en général, fort nombreux, inégaux, disposés sur plusieurs rangs, en dedans des divisions corollaires. Le nombre des étamines est communément très-considérable. Dans le *Cactus pandulus* de Swartz, qui forme le genre *Rhipsalis* de Griseb., on ne compte qu'environ une vingtaine d'étamines. Leurs filets sont longs et grêles; leurs anthères sont à deux loges. Ces étamines sont attachées à la paroi interne du tube du calice, qui est tapissée d'une substance glanduleuse et jaunâtre.

L'ovaire, ainsi que nous l'avons dit, est constamment infère et à une seule loge. Il contient un nombre très-considérable d'ovules attachés à des prothépères pariétaux, dont le nombre est généralement égal à celui des divisions du stigmate. Un seul style surmonte l'ovaire; il est épais et renflé dans sa partie inférieure, à peu près de la même longueur que les étamines. Le stigmate est terminal, et offre de trois à vingt et même trente divisions glanduleuses et rayonnantes.

Le fruit est une baie uniloculaire, dont la forme et la grosseur sont fort variables. Tantôt elle est lisse, tantôt

elle est comme écaillée ou couverte de petits faisceaux d'épines. Elle est toujours déprimée et ombiliquée à son sommet qui offre une cicatrice provenant des organes floraux qui s'en sont détachés. Sa cavité contient un grand nombre de graines sessiles sur les parois de la loge ou supportées par des pedospermes filiformes plus ou moins longs. Les graines sont placées au milieu d'une pulpe épaisse, qui remplit toute la loge et paraît être fournie à la fois par la paroi interne de l'ovaire, la surface de la graine et même les pedospermes. Elles offrent deux tégumens, l'un extérieur, épais et comme charnu, l'autre intérieur, plus mince. Sous ces tégumens on trouve un embryon nu, dressé cylindrique, quelquefois légèrement recourbé, offrant deux cotylédons épais.

Le nombre des espèces de Cierges est fort considérable. Beaucoup d'entre elles sont cultivées dans nos serres, où elles se font remarquer par l'originalité de leurs formes ou l'éclat et la suavité de leurs fleurs. Ces espèces présentent, dans leurs formes et la structure de leurs fleurs, des différences assez tranchées pour que plusieurs auteurs y aient formé des groupes que quelques-uns considèrent comme des genres distincts. Ainsi Planchon, dans son Traité des Plantes grasses, divise les *Cactus* de Linné en sept genres, qui sont :

1°. *CACTUS*. Il comprend les espèces globuleuses et imbriquées; privées d'axe ligneux et de feuilles, portant des épines disposées en faisceaux sur les angles saillans, dont leur tige est relevée. Les fleurs naissent d'un renflement tomenteux qui termine la tige; leur calice est à six divisions minces et colorées; leur corolle formée de six pétales. Leur stigmate a cinq divisions rayonnantes. Tels sont : *Cactus*, *Melocactus*, *C. depressus*, *C. gibbosus*, *Melobolus*, etc.

2°. *STENOCLADUS*. Les espèces de ce genre ont la même forme que les précédentes, mais elles sont lactescentes et recouvertes d'un grand nom-

bre de petite mammelon épineux. Le *Cactus mammillaris* et ses variétés ne viennent s'y ranger.

50. *CACERUS*. Ce sont les Cierges proprement dits, Arbustes ou Arbrisseaux à tige cylindrique ou anguleuse relevée de côtes longitudinales portant des épines fasciculées, d'où naissent les fleurs. Leur calice et leur corolle se composent d'un très-grand nombre de folioles colorées, disposées sur plusieurs rangs. Le stigmate présente vingt à trente divisions rayonnantes. Ici se rapportent les *Cactus hexagonus*, *peruvianus*, *triangularis*, *grandiflorus*, *singuliformis*, etc., etc.

51. *RHUSALIS*. Ce genre, établi par Gaertner, a pour type le *Cactus pendulus* de Swartz. Son calice et sa corolle ont chacun qu'une seule ramée; ses étamines sont au nombre de vingt environ; son stigmate est triparti; ses fleurs sont petites. Deux ou trois espèces parasites composent ce genre; leur tige est cylindrique, rameuse.

52. *OPUNTIA*. Les espèces de ce genre portent le nom vulgaire de *Raquettes*. Leur tige est charnue; composée de pièces articulées, comprimées, d'une forme variable; ayant un axe central ligneux. La corolle est cailloux, sans tube; la corolle est polyptéale. Les fleurs sont généralement grandes. A ce genre se rapportent les *Cactus Opuntia*, *cochenillifer*, etc.

53. *EPHYPHYLLUM*. Ce genre, qui a le port des *Opuntia*, s'en distingue par la longueur excessive de son tube, qui est de près d'un pied. On y rapporte le *Cactus phyllanthus* de Linné et le *Cactus alatus* de Swartz.

54. *PHYLANTHUS*. Les espèces réunies ici sont faciles à distinguer à leurs racines cylindriques portant des semelles charnues, et à leurs fleurs disposées en panicule; tels sont les *Cactus Phyllanthus*, L., *Cactus portulacaeifolius*, etc.

Après avoir fait connaître d'une manière générale la structure des Cactées, avoir indiqué les caractères des groupes principaux qui ont été établis dans ce genre, nous allons décrire quelques unes des espèces les plus re-

marquables par leur beauté ou leurs usages.

**CACTIER MYLONIFORME**, *Cactus Melocactus*, L., De Candolle, Plant. gr., t. 114. Originaire des contrées les plus chaudes de l'Amérique méridionale, cette espèce est globuleuse, relevée de quatorze côtes saillantes, armées d'épines disposées en faisceaux. Ses fleurs sont d'un beau rouge, et naissent d'un renflement tuberculeux qui termine la Plante à son sommet.

**CACTIER OU CIERGE A GRANDES FLEURS**, *C. grandiflorus*, L., D. C., Plant. gr., t. 52. L'une des espèces les plus belles du genre, par la grandeur de ses fleurs et l'odeur suave qu'elles répandent. Les tiges sont cylindriques, à cinq angles obtus, armées de petites épines. Ses fleurs sont très-grandes. Les divisions extérieures de leur périanthe sont jaunes et les intérieures sont blanches. Ces fleurs, dans les individus cultivés à Paris, commencent à s'ouvrir sur les cinq ou six heures de l'après-midi, sont entièrement épanouies sur les neuf heures, et vers onze heures ou minuit, elles se ferment pour ne plus se rouvrir. Elles exhalent une odeur suave d'Acide benzoïque et de Vanille. Leur longueur totale est d'environ neuf à dix pouces, et leur largeur, quand elles sont bien ouvertes, est d'environ six pouces. Cette espèce n'est pas rare dans les serres; elle vient de la Jamaïque et des côtes du Mexique. Elle est en fleurs vers les mois de juillet et d'août.

**CACTIER OU CIERGE DU PÉROU**, *Cactus peruvianus*, L., D. C., Pl. gr., t. 58. Ses tiges sont de la grosseur de la cuisse; ramifiées, ordinairement à huit angles obtus, chargées d'aiguillons; elles peuvent acquies une longueur de quarante à cinquante pieds. Ses fleurs sont fort grandes, naissent des faisceaux d'épines; leur couleur est blanchâtre et peu brillante. Il en existe au Jardin du Roi à Paris un individu colossal, qui y fut planté en 1700. Il a poussé avec tant de vigueur, que l'on a élevé une par-

tie de la serre, en forme de cage vitrée, dans laquelle on le conserve ; il fleurit tous les ans. Cet Arbrisseau présente un phénomène de végétation extrêmement remarquable, et qui s'applique également à toutes les Plantes grasses en général ; ses racines sont courtes, fibreuses et enfermées dans une caisse contenant à peine deux ou trois pieds cubes d'une terre que l'on ne renouvelle et n'arrose presque jamais. Ce fait prouve d'une manière incontestable que les Plantes grasses ne tirent presque aucune nourriture de leurs racines, et que c'est par la surface de leurs tiges qu'elles absorbent dans l'atmosphère les fluides qui doivent servir à leur nutrition et à leur accroissement.

**CACTIER FLAGELLIFORME**, *Cactus flagelliformis*, L. Vulgairement Serpentin, Queue-de-Souris. Ses tiges sont cylindriques, rampantes, rameuses, de la grosseur du doigt, ordinairement à dix côtes épineuses. Ses fleurs sont nombreuses et d'une belle couleur rose. Cette espèce, qui vient de l'Amérique méridionale, et, selon quelques auteurs, de l'Arabie déserte, est fort commune dans les jardins. Elle ne craint pas le froid autant que les autres espèces, et elle peut très-facilement passer l'hiver dans la serre tempérée.

**CACTIER OPONTIE**, *Cactus Opuntia*, L. Le port de cette espèce, que l'on désigne sous les noms vulgaires de *Haquette*, de *Semelle du pape*, etc., est fort différent de celui des autres espèces dont nous venons de parler. Sa tige, dont la hauteur est de quatre à six pieds, se compose d'un grand nombre de pièces ovales, articulées, portant des épines sétacées et grêles, disposées par petits bouquets. Les fleurs sont jaunes, sessiles, solitaires, et naissent sur le bord des articulations supérieures. Le calice n'a pas de tube. Le fruit est ovoïde, orbiculaire, offrant quelques faisceaux de poils épineux ; sa grosseur est à peu près celle d'une Figue ordinaire. Il est charnu et rempli d'une pulpe aqueuse et rouge. Les graines sont nom-

breuses et reniformes. Ces fruits ont une saveur aigrelette et rafraîchissante. On prétend que leur usage communiqué aux urines une teinte rouge de sang, sans cependant être aucunement nuisible.

Ce Cactier croît sur les rochers dans l'Amérique méridionale et dans les sables arides de la Barbane ainsi qu'aux Canaries. On le trouve même sauvage dans l'Europe méridionale, en Espagne et jusqu'en France sur les bords de la Méditerranée. Nous l'avons vu sur les rochers des environs de Villefranche près Nice avec le *Chamerope humilis* et l'*Agave americana*. On s'en sert pour former autour des habitations des haies impénétrables à cause des épines nombreuses dont elles sont armées. Les jeunes rameaux servent de nourriture pour les bestiaux, et les vieux troncs desséchés sont employés pour chauffer les foyers.

**CACTIER ÉLÉGANT**, *Cactus speciosus*. Bonpland a décrit et figuré sous ce nom, dans le Jardin de la Malmaison, planche 3, une belle espèce qu'il avait trouvée avec l'illustre de Humboldt près du petit village de Turbaco, à quelques lieues au sud de Carthagène. Elle a fleuri, pour la première fois, dans les serres de la Malmaison, en l'année 1811. Depuis cette époque, elle est devenue assez commune et elle n'est pas rare en fleur. Dans son état sauvage, elle vit en parasite sur le tronc des vieux Arbres. Sa tige se compose d'articulations très-comprimées, allongées, obtuses, denses latéralement, glabres et dépourvues d'épines. Les fleurs sont d'un beau rose, plus grandes que celles du Cactier flagelliforme. Elles naissent seule à seule des angles rentrants qui occupent le bord supérieur des articulations de la tige.

**CACTIER À FLEURS POURPRES**, *Cactus speciosissimus*. C'est le professeur Desfontaines qui a, le premier, décrit et figuré cette magnifique espèce, dans le troisième volume des Mémoires du Muséum de Paris, planche 9. Ses tiges sont dressées, triangulaires

es, charnus; les trois angles sont allans; les faces légèrement creusées en gouttière; les faisceaux d'épines assent sur les angles, ainsi que les ours quisonat très-grandes, solitaires, un beau rouge pourpre, avec des reets violets en dedans. Ce qui donne l'usd intérêt à cette magnifique espèce est que ses fleurs restent épanouies pendant plusieurs jours avant de se ner; mais elles sont inodores. On ne it pas positivement la patrie de ce actier, qu'on croit généralement rignaire du Mexique. Il est assez omun aujourd'hui; on le cultive ans la serre chaude.

**CACTIER COCHENILLIFÈRE**, *Cactus cochenillifer*, L. Cette espèce assemble beaucoup à l'Opuntia; mais ses articulations sont plus allongées et presque entièrement dépourues d'épines. Sa hauteur est d'environ six à huit pieds. Ses fleurs sont eges et remplacées par des fruits de même couleur. C'est au Mexique et à Jamaïque que croît naturellement e Cactier auquel on donne plus spécialement le nom de Nopal. Sa culture été introduite dans plusieurs des Antilles, et en particulier à Saint-Domingue, par les soins de l'infatigable Thierry de Ménonville, qui le premier alla chercher le Nopal à Guatamala dans le Mexique, pour le transporter à Saint-Domingue. On appelle Popaleries les plantations de Cactiers egaux, sur lesquels on élève la Cochenille, *Coccus Cacti*, Insecte de ordre des Hémiptères et de la famille des Gallinsectes. *V. COCHENILLE.* C'est dans l'ouvrage que Thierry de Ménonville a publié sous le titre de *Manuel de la culture du Nopal et de l'éducation de la Cochenille dans les colonies françaises de l'Amérique*, qu'il faut puiser les détails sur cette partie importante de l'agriculture coloniale.

Il paraît, d'après l'ouvrage que nous venons de citer, que plusieurs autres espèces peuvent également servir à l'éducation de la Cochenille; mais sont le Cactier splendide, *Cactus*

*splendidus*, le Cactier de Campêche; *Cactus campechianus*, etc.

*De la culture et des moyens de multiplication des Cactiers en général.*

A l'exception du Cactier à raquettes (*Cactus Opuntia*, L.), toutes les autres espèces étant exotiques et croissant dans des régions plus ou moins voisines des tropiques, ne peuvent être cultivées en pleine terre sous le climat de Paris. On peut laisser dans la serre tempérée les *Cactus Opuntia*, *C. flagelliformis* et *C. peruvianus*; mais les autres espèces demandent à être placées dans une serre très-chaude et bien éclairée; autrement elles ne fleurissent pas.

Rien de plus facile à multiplier que les Cactiers, et en général que toutes les Plantes grasses. Le premier moyen consiste à semer leurs graines, quand on peut les obtenir bien mûres. Dans le second, qui est le plus fréquemment employé, on sépare un rejet ou une des articulations dans la section des Oponties; on le laisse sécher pendant une quinzaine de jours, après quoi on le plante dans une terre légèrement humide, un peu sablonneuse, et la jeune bouture n'exige plus aucun soin; elle prend racine avec la plus grande facilité.

Les Plantes grasses, ainsi que nous l'avons dit, vivant au moyen des fluides qu'elles absorbent dans l'atmosphère, ne demandent ni qu'on renouvelle leur terre, ni qu'on les arrose. On peut les laisser pendant plusieurs années sans leur donner aucun soin; pourvu qu'on les garantisse du vent et du froid et qu'on les place dans une bonne serre, on les verra infailliblement fleurir. (A. R.)

Ce nom de Cierge a été étendu à d'autres Plantes, ainsi l'on a nommé :

**CIERGE LAITEUX OU AMER**, les *Euphorbia candriensis* et *antiquorum*. *V. EUPHORBIE.*

**CIERGE MAUDIT**, le *Verbascum nigrum*, L.

**CIERGE DE NOTRE-DAME**, le *Verbascum Thapsus*. *V. MOUTON.* (B.)

**CIERGE. POEY.** Espèce du genre Callaire. *V. ce mot.* (B.)

**CIERGE PASCAL. MOLL.** Nom vulgaire et marchand du *Conus Virgo*, espèce du genre Cône. *V. ce mot.* (B.)

**CIERGES. Cacti. BOT. PHAN.** On désigne quelquefois sous ce nom vulgaire la famille des Nopalées, dont le genre *Cactus* forme le type. *V. CACTÉES et NOPALÉES.* (A. B.)

**CIERGES FOSSILES. BOT. ROS.** Knorr et quelques autres auteurs ont donné ce nom à des tiges fossiles trouvées dans les terrains houilliers, qu'ils ont comparées à celles des Cactes, opinion que nous sommes loin d'adopter. Ces tiges, dont on peut voir des exemples dans Knorr, tab. 10, A B C, appartiennent au genre *Syringodendron* de Sternberg. *V. ce mot et VÉGÉTAUX FOSSILES.* (A. B.)

**CIETRZEW. OIS. Syn. polonais** du petit Tétraz, *Tetrao Tetrix*, L. *V. TÉTRAS.* (DR. Z.)

\* **CIEU-CO. BOT. PHAN. (Boym.)** Syn. chinois de *Paidium piriferum*. *V. GOUKAVIER.* (B.)

\* **CIFÉ. BOT. PHAN. V. CYFÉ.**

**CIFOLOTTO. OIS. (Olin.)** Syn. italien du Bouvreuil commun, *Loxia Pyrrhula*, L. *V. BOUVREUIL. (DR. Z.)*

**CIFOULOT. OIS. Syn. piémontais** du Bouvreuil, *Loxia Pyrrhula*, L. *V. BOUVREUIL. (DR. Z.)*

**CIGALÉ. Cicada. INS.** Genre de l'ordre des Hémiptères, section des Homoptères, famille des Cicadaires, établi par Linné, et subdivisé depuis par Olivier, Fabricius et Latreille en un assez grand nombre de genres très-naturels. Ce dernier entomologiste lui assigne pour caractères essentiels : antennes de six articles distincts ; trois petits yeux lisses. Ainsi caractérisé, le genre Cigale se distingue très-aisément de tous ceux de la même famille, et il comprend la division des Cigales porte-manne, *Manifera* de Linné, ou les Cigales chanteuses de Stoll. Ces

Insectes sont encore remarquables sous plusieurs rapports : leur tête est courte, large ou très-étendue transversalement, et terminée dans ce sens par des yeux globuleux et saillans. Le vertex présente trois yeux lisses disposés en triangle ; les antennes sont sétacées, ordinairement plus courtes que la tête, insérées à sa partie antérieure entre les yeux ; le front est convexe et ordinairement ridé en travers ; le bec est allongé et appliqué contre la poitrine lorsque l'insecte n'en fait pas usage ; il a une composition analogue à celle du bec des autres Hémiptères ; on peut y reconnaître une lèvre supérieure ou la bre, une langue, deux soies latérales extérieures ou les mandibules de Savigny ; deux autres soies intermédiaires ou les mâchoires, suivant le même auteur ; enfin une gaine tubuleuse recelant les soies, et qui correspond la lèvre inférieure. Le prothorax est large, sa face supérieure offre plusieurs impressions ; il reçoit la tête, embrasse postérieurement le bord antérieur du mésothorax ; celui-ci présente un écu, *scutum*, très-développé et un écusson, *scutellum*, très-petit mais saillant et relevé à son milieu les ailes antérieures, qui sont les analogues des élytres, ne diffèrent de postérieures que par un plus grand développement ; elles sont plus longues que l'abdomen, inclinées en manière de toit, et présentent un grand nombre de nervures formant des cellules complètes qui n'atteignent pas le bord postérieur de l'aile, et sont toutes fermées vers ce point ; le mésothorax est supérieurement caché et partie par le mésothorax ; il donne insertion à la seconde paire d'ailes, est uni intimement avec l'abdomen les pattes, fixées à chaque segment du thorax, ont une longueur moyenne les antérieures sont remarquables par des cuisses plus grosses et dentées dans un assez grand nombre d'espèces ; l'abdomen est renflé, conique et remarquable par son premier anneau qui contient un appareil souvent très-développé dans le mâle, et de



ous donnerons ici la description d'après Réaumur.

Quand on observe du côté du ventre un mâle de Cigale, on y remarque bientôt deux assez grandes plaques écailleuses; leur figure arrondie approche de celle d'un demi-ovale coupé sur son petit axe, c'est-à-dire que chaque plaque a un côté qui est en ligne droite, et que le reste de son contour est arrondi. C'est par le côté qui est en ligne droite que chaque plaque est arrêtée fixement sans aucune articulation sur le métathorax dont elles ne sont qu'un prolongement. La largeur de chacune de ces pièces est plus grande que celle de la moitié du ventre. Posées à côté l'une de l'autre comme elles le sont, non-seulement elles cachent en entier la partie qui leur correspond, mais elles sont encore un peu en recouvrement l'une sur l'autre, un peu plus longues que larges; elles atteignent presque le troisième anneau par leur bout arrondi. Lorsqu'on soulève ces plaques, on découvre une cavité pratiquée dans le ventre; cette cavité est partagée en deux loges principales par une pièce triangulaire cornée; dont la base est du côté du corselet; sur ce même triangle s'élève une arête qui est une sorte de cloison divisant la cavité en deux jusqu'au niveau des anneaux ou à peu près. Au fond de chacune des loges est une membrane, transparente comme du verre, que Réaumur compare à des miroirs, et que plusieurs auteurs ont considérée comme des tambours principalement destinés à produire les sons. Cependant aucune de parties qui vient d'être décrite ne paraît être essentiellement propre au chant, et le véritable appareil existe ailleurs. Dans la grande cavité dont il vient d'être question, on en trouve une autre de chaque côté qui est formée par une cloison solide et écailleuse. C'est dans ces deux cavités que sont les organes sonores: en ouvrant l'une d'elles, on trouve une membrane plissée en forme de timbale, et, au-dessus, deux muscles compo-

sés d'un nombre prodigieux de fibres droites: ces fibres se réunissent à une plaque presque circulaire, d'où partent plusieurs filets, qu'on s'aperçoit s'attachent à la surface concave de la timbale; par ce moyen les muscles, en se contractant ou en se relâchant alternativement avec rapidité, rendent convexe la partie concave de la timbale, et lui laissent ensuite reprendre sa convexité. C'est ce qui donne lieu, suivant Réaumur, au chant, ou plutôt au bruit que font entendre les Cigales. Tel est l'appareil du chant ou de la voix des Cigales, considéré d'une manière générale. La description qui vient d'en être donnée est exacte, mais on peut y ajouter quelques détails pour la compléter. C'est ainsi que Chabrier a fait connaître un stigmate inaperçu par Réaumur à la jonction inférieure du mésothorax et du métathorax, et que Latreille a reconnu à la partie postérieure des timbales un trou bien distinct qui a pareillement échappé aux investigations de Réaumur, et qu'il présume servir à la sortie de l'air. Chabrier pense au contraire que l'air s'échappe par les deux stigmates situés à la base des opercules. Quoi qu'il en soit, on peut étudier l'appareil sonore sous un autre point de vue non moins important, c'est-à-dire le comparer avec ce qui existe de plus ou moins analogue dans les autres Insectes, et arriver ainsi à cette conséquence bien remarquable, qu'il n'est pas tellement propre aux Cigales qu'on n'en distingue aucune trace ailleurs. Latreille a entrepris des recherches de ce genre, et il a retrouvé, d'abord dans les Cigales femelles et ensuite dans les Criquets et les Truxales, tous les analogues des pièces principales. Ne pouvant entrer, à cet égard, dans aucun détail, nous renvoyons au travail de notre savant professeur. Nous nous contenterons d'ajouter que les volets ne sont autre chose que les épimères du métathorax prolongés outre mesure, et qu'en dernière analyse, l'étude approfondie de toutes les parties contenues dans

**CIERGE**. *ROSTR.* Espèce du genre Callaire. *V.* ce mot. (B.)

**CIERGE PASCAL**. *MOLL.* Nom vulgaire et marchand du *Conus Virgo*, espèce du genre Cône. *V.* ce mot. (B.)

**CIERGES**. *Cacti*. *BOT. FRAN.* On désigne quelquefois sous ce nom vulgaire la famille des Nopales, dont le genre *Cactus* forme le type; *V.* CACTÉES et NOPALÉES. (A. R.)

**CIERGES FOSSILES**. *BOT. ROS.* Knorr et quelques autres auteurs ont donné ce nom à des tiges fossiles trouvées dans les terrains houilliers, qu'ils ont comparées à celles des Cactés, opinion que nous sommes loin d'adopter. Ces tiges, dont on peut voir des exemples dans Knorr, tab. 10, A B C, appartiennent au genre *Syringodendron* de Sternberg. *V.* ce mot et VÉGÉTAUX FOSSILES.

(AD. B.)

**CIETRZEW**. *OIS.* Syn. polonais du petit Tétraz, *Tetrao Tetrix*, L. *V.* TÉTRAS. (DR. Z.)

\* **CIEU-CO**. *BOT. FRAN.* (Boym.) Syn. chinois de *Psidium piriferum*. *V.* GOUYAVIER. (B.)

\* **CIFÉ**. *BOT. FRAN.* *V.* CYFÉ.

**CIFOLOTTO**. *OIS.* (Olin.) Syn. italien du Bouvreuil commun, *Loxia Pyrrhula*, L. *V.* BOUVREUIL. (DR. Z.)

**CIFOULOT**. *OIS.* Syn. piémont du Bouvreuil, *Loxia Pyrrhula*, L. BOUVREUIL. (DR. Z.)

**CIGALE**. *Cicada*. *INS.* Genre l'ordre des Hémiptères, section Homoptères, famille des Cicada, établi par Linné, et subdivisé d'après Olivier, Fabricius et Latreille en assez grand nombre de très-naturels. Ce dernier entomologiste lui assigne pour caractères essentiels : antennes de six articles distincts; trois petits yeux. Ainsi caractérisé, le genre se distingue très-aisément de tous ceux de la même famille. On comprend la division des Cigales en mâles et femelles de la même manière que les Cigales chanteuses de

Insectes, se

sous plusieurs

courte, la

versalement

sens par

lans. Le

lisses dis

nes sont

courtes

tie anté

est con

travers

qué c

secte

comp

des a

con

bre

exte

vig

res

au

ce

la

l

Insectes, se sous plusieurs courte, la versalement sens par lans. Le lisses dis nes sont courtes tie anté est con travers qué c secte comp des a con bre exte vig res au ce la l

notone et fatigat entendre une pac ctes se tiennent s, et sucent, à l'a sève des Arbres et On en connaît un gr éces qui presque tou éres à l'Europe. Stol monographie de ce gen née d'un grand nombre Olivier Encycl. méth. T en décrit soixante-six; par nous citerons :

**CIGALE PLÉBÉTIENNE**, *Cic. p. l.*, ou la Cigale à bordure ja Geoffroy (Hist. des Ins. T. 19, n° 1), qui est la même que la Cigale européenne de St Cicad., pl. 24, fig. 15, femelle; pl. 25, fig. 159, mâle). C'est cette espèce que Réaumur a fait to ses observations; il l'a figurée, *cic. z.*, pl. 16, fig. 1-6). Elle est plus grande des espèces d'Europe peut être considérée comme le ty du genre. On la trouve commun ment, dans les provinces méridiona de la France, sur les Arbres. S chant est fort et très-aigu.

**LA CIGALE HÉMATODE**, *Cic. h.*

res, placées près de la base du bec; aux environs d'un espace nu qui quelquefois sur la face, sans communiquer avec le bec; le doigt, trois de une membrane jusqu'à l'articulation, un der à terre sur plusieurs angles courts, déprimés, res; ailes médiocres; la émigration plus longue que la et plus courte que les trois quatrième et cinquième qui plus longues.

Cigognes que Linné a considérées comme congénères des Grues et des Hérons, sont des Oiseaux de grand vol, susceptibles d'entreprendre des voyages de long cours; aussi en rencontre-t-on dans toutes les contrées où les Reptiles peuvent leur offrir une nourriture abondante. Le besoin de cette nourriture les transporte à deux époques de l'année vers des lieux opposés; par ces é migrations périodiques, ils se font une température presque constamment égale, afin d'éviter la saison où les Reptiles, frappés de léthargie, demeurent engourdis et cachés une partie de l'année. C'est aussi cette nourriture et la grande consommation qu'ils en font, qui leur a valu chez tous les peuples, non-seulement une simple affection, mais une protection religieuse. Les nations les plus égoïstes comme les plus généreuses, les plus sauvages comme les plus civilisées, obéissant à la voix de l'intérêt, ou à celle de la reconnaissance, ont sanctionné par l'usage, souvent même par des articles de leurs codes, l'accueil protecteur fait à des Oiseaux auxquels elles sont redevables du service de purger leur sol de cette immense quantité de Reptiles qui menaçait de le couvrir entièrement par leur facile reproduction et leur longévité. La bienveillance que l'on accorde généralement aux Cigognes, jointe à la douceur naturelle de leur caractère, ont rendu ces Oiseaux presque familiers; l'instinct qui dans leurs voyages, le

grac du Bé-  
tropus, l. V.  
(DR..Z.)

ur Cygne. F. CA-

INI. qis. Espèce du  
c, *Fringilla Serinus*,  
A.C. (DR..Z.)

NE. *Ciconia*. ois. Genre de  
Gralles de la seconde di-  
actères: bec long, droit, cy-  
conique, pointu, tranchant,  
né latéralement, d'égale hau-  
de la tête, quelquefois un peu  
en haut; mandibule supérieure  
rête arrondie, à sillons obli-  
naires longitudinales, linéai-

dans leurs voyages, le

ridiquement au gîte dont on leur a en quelque sorte favorisé l'usurpation ; souvent même ce gîte est rendu plus commode, est embelli par la main des hommes ; en Hollande surtout, on provoque l'établissement des Cigognes en construisant à l'avance, en planches ou en maçonnerie, des aires au-dessus des cheminées, sur les parties élevées des édifices. Dans certaines villes, ainsi que dans les campagnes, on rencontre, presque à chaque pas, de ces aires spacieuses où, de temps immémorial, des couples fidèles viennent, à chaque printemps, renouveler de douces démonstrations d'amour conjugal et de tendresse maternelle. Loin des villes et des habitations, et pour les espèces moins sociables, de grands Arbres élevés souvent au sein des forêts, reposent dans la bifurcation des plus fortes branches, le nid que les époux érigent avec beaucoup d'activité au moyen de buchettes entrelacées et liées par des brins de Juncs et de Graméens. La ponte consiste en deux, trois ou quatre œufs jaunâtres ou verdâtres, quelquefois légèrement tachetés de brun, que la femelle couve avec une constance à toute épreuve ; car, selon les chroniques du temps, on a vu, dans l'incendie de Deft, un de ces Oiseaux se laisser dévorer par les flammes, plutôt que d'abandonner le nid où reposait sa famille nouvellement éclosée. A cette constance dans l'incubation, succèdent des soins infinis pour l'éducation des petits ; jusqu'à ce qu'ils puissent faire usage de leurs ailes, jamais ils n'échappent à l'œil attentif des parens ; et tandis que l'un de ces derniers est à la recherche de la nourriture, l'autre, aux aguets, veille pour écarter tout danger et opposer une résistance salutaire aux attaques de l'Oiseau de proie. Sont-ils prêts à sortir du nid, le père et la mère semblent unir leurs efforts pour les aider, les soutenir même, et l'inquiétude des parens ne cesse que lorsqu'ils ont vu leur progéniture s'essayer d'un vol assuré. La famille continue à vi-

vre en communauté jusqu'au départ. Il paraît qu'à l'époque où les frimas glaçant les mois de décembre et de janvier, les Cigognes habitent les régions orientales ; c'est alors qu'on les trouve en troupes innombrables sur les rives du Nil, les bords de la mer Rouge, etc. Les Cigognes sont rigoureusement silencieuses ; le seul bruit qu'elles fassent entendre est celui qui résulte d'un battement des mandibules l'une contre l'autre ; ce battement est plus fort à mesure que l'Oiseau étend davantage le cou sur le dos, qui souvent indique chez lui un mouvement de colère et d'agitation. Dans le vol, elles tiennent le cou tendu avant et les jambes roides en arrière. En réunissant les Cigognes, les Grues et aux Hérons, Linné en a éloigné les Myctéries ou Jabirus, ne différenciant les premiers que par ce qu'ils ont le bec légèrement recourbé en haut ; mais la Cigogne Magnifique, par une courbure presque semblable, le passage d'un genre à l'autre, et dès lors la réunion des Cigognes et des Jabirus, qui fut présentée par Illiger dans son *Prodromus Systematis Avium*, devient convenable.

CIGOGNE ARGALA, *Ardea Argala* L., *Mycteria Argala*, Vieill. Part supérieure cendrée ; les plumes les garnissent sont roides et dur ; les parties inférieures blanches, à plumes longues ; tête et cou nus, parsemés de poils sur une peau rouge et couverte d'une longue membrane coriace, couverte d'un léger duvet, pendant le milieu du cou ; couzou rectiligne, sans que les remiges ; les coudes inférieures duvetueuses ; bec central très épais à sa base ; ouverture de la bouche très-large ; corps très-gros. Longueur, de sept pieds. De l'Afrique ou de l'Inde où il fait une très-grande consommation de Reptiles, d'Oiseaux, et même de Quadrupèdes. Facile à amener à l'état de domesticité.

CIGOGNE BLANCHE, *Ciconia alba* Belon, Briss. ; *Ardea Ciconia*, Buff., pl. enl. 866. Cette espèce

plus répandue et la plus généralement connue en Europe, est blanche à l'exception des scapulaires et des ailes qui sont noires; le bec est parfaitement droit, rouge ainsi que les pieds; l'espace nu des joues est très-petit et rouge; l'iris brun. Longueur, trois pieds six pouces. Les jeunes ont les ailes d'un noir brun, le bec noirâtre.

**CIGOGNE BRUNE.** *V. CIGOGNE NOIRE.*

**CIGOGNE DES INDES,** *Mycteria asiatica*, Lath. Blanche avec une bande de chaque côté de la tête, le croupion, les ailes et la queue noirs; bec corné avec une espèce de protubérance en dessus et un renflement en dessous; pieds rouges.

**CIGOGNE JAUNE,** *Mycteria americana*, Lath., Buff., pl. enl. 817. Entièrement blanche, avec le cou nu et noir; la peau qui recouvre cette partie est flasque et ridée, garnie sur le front de quelques barbes; une tache près de l'occiput et un large collier rouges; pieds noirs. Longueur, de cinq à six pieds. Les jeunes ont le plumage d'abord d'un gris clair, qui passe au rosé, et n'est entièrement blanc qu'à la troisième année; ils ont aussi une plus grande partie du cou emplumée et le bec presque droit. De l'Amérique méridionale.

**CIGOGNE MAGUARI,** *Ciconia americana*, Briss., *Ardea Maguari*, Gmel. Blanche à l'exception des ailes et des rectrices caudales supérieures qui sont noirâtres, irisées; partie inférieure du cou garnie de plumes longues et pendantes; un grand espace nu, rouge et susceptible de dilatation au-dessous de la gorge; bec bleuâtre, verdâtre à sa base; iris blanc; pieds rouges. Longueur, trois pieds. D'Amérique. Paraît rarement en Europe.

**CIGOGNE NOIRE,** *Ciconia nigra*, Belon, *Ardea nigra*, L., *Ciconia fusca*, Briss., Buff., pl. enl. 399. Parties supérieures noirâtres, irisées; partie inférieure de la poitrine et ventre blancs; bec, espace nu des yeux et de la gorge d'un rouge écarlate; pieds d'un rouge foncé. Longueur, trois pieds. Les jeunes ont les parties

supérieures d'un brun noirâtre, irisé; des plumes brunes bordées de roussâtre à la tête et au cou; le bec, l'espace nu des yeux et de la gorge ainsi que les pieds d'un vert olivâtre. D'Europe.

**CIGOGNE DE LA NOUVELLE-HOLLANDE,** *Mycteria australis*, Lath., Gen. syn., pl. 128. Parties supérieures noires; tête et cou garnis de plumes d'un vert noirâtre; partie de la gorge nue et rouge; parties inférieures blanches; bec noir; pieds rouges. Longueur, cinq pieds. Les jeunes ont le plumage varié de blanc, de brun et de noirâtre; ils n'ont pas d'espace nu à la gorge.

**CIGOGNE A SAG,** *Ardea dubia*, Cuv., Gmel. Même chose que *Cigogne Argala*. *V. ce mot.*

**CIGOGNE DU SÉNÉGAL,** *Mycteria senegalensis*, Lath. Blanche avec les scapulaires, le cou et les rectrices; pieds noirs; bec blanchâtre à sa base; une bande noire; puis l'extrémité rouge. Longueur, six pieds. Les jeunes ont toutes les parties supérieures d'un cendré noirâtre, avec un large collier un peu plus clair. (DRAP.)

**CIGUE.** *Cicuta* BOU. FRAN. Le genre d'Ombellifères, nommé *Cicuta* par Tournefort, Lamarck, Jusseu et Gaertner, a reçu de Linné le nom de *Copium*. Il se distingue par ses fleurs blanches et ses pétales cordiformes et un peu inégaux, par son fruit globuleux, didyme, relevé de côtes cannelées en forme de petits tubercules. Son involucre se compose de plusieurs folioles linéaires étalées en tous sens; ses involuclles sont formés de deux folioles étalées du côté extérieur. Les Cigues sont en général des Plantes herbacées annuelles ou vivaces.

La plus remarquable est sans contredit la Grande Cigue, *Cicuta major* de Lamarck ou *Copium majus* de Linné; qui est bisannuelle et croît dans les terrains pierreux, près des rivières, habitations, dans les eaux, sur le bord des chemins et des étangs. Sa racine est blanche et perpendicu-

laire, fusiforme; la tige qui en naît s'élève à une hauteur de trois à quatre pieds; elle est cylindrique, striée longitudinalement, rameuse, creuse intérieurement, marquée dans sa partie inférieure de taches irrégulières d'une teinte pourpre livide, que l'on observe également sur les feuilles. Celles-ci sont très-grandes, pétiolées, trois fois ailées, d'un vert très-foncé et un peu luisantes; leurs folioles sont ovales, aiguës, incisées profondément et, comme pinnatifides. Les fleurs sont blanches, et forment de vastes ombelles étalées au sommet des ramifications de la tige. La grande Ciguë fleurit aux mois de juin et de juillet dans les environs de Paris où elle est fort commune.

La Ciguë est une Plante que la mort de Socrate et de Phocion a rendue célèbre dans l'antiquité; car presque tous les botanistes modernes s'accordent à considérer notre grande Ciguë comme le *Coneron* des Grecs et le *Cicuta* des Latins. La Plante que nous avons décrite s'accorde en effet parfaitement avec la Ciguë des anciens sous le rapport de l'intensité de ses propriétés délétères. Toutes ses parties, surtout ses feuilles, froissées entre les doigts, répandent une odeur vireuse et désagréable. C'est à l'époque où les fruits approchent de leur maturité que la grande Ciguë jouit des propriétés les plus énergiques et les plus délétères. Les symptômes principaux de l'empoisonnement par cette substance, sont : une douleur à l'épigastre, des vomissemens, des spasmes, un état de narcotisme plus ou moins violent. Pour y remédier, on doit, si le poison n'a pas encore été vomé, administrer l'émétique à la dose de trois à quatre grains; s'il y a déjà long-temps que le poison a été avalé, on fera usage des purgatifs, et en particulier des sels neutres, tels que le sulfate de Soude, le phosphate de Magnésie, etc. Si, après avoir évacué par haut et par bas, le malade paraissait fortement assoupi, et comme dans un état voisin de l'apoplexie, on pratiquerait une saignée au bras,

ou de préférence à la veine jugulaire. On pourrait alors administrer l'eau étendue de vinaigre; mais ce remède serait essentiellement nuisible, s'il était donné avant que le poison n'ait été expulsé par l'émétique ou les purgatifs. On appliquerait au contraire douze sangsues au ventre, si les douleurs d'entrailles étaient vives. Dans ce cas on ferait usage de l'eau sucrée et des boissons émollientes. Ces sages préceptes sont extraits des ouvrages du professeur Orfila.

Malgré cette action délétère de la grande Ciguë, plusieurs médecins en ont recommandé l'usage contre un grand nombre de maladies. C'est surtout Stoërck qui lui a prodigué les éloges les plus fastueux. La maladie contre laquelle il a le plus vanté les bons effets de la Ciguë est le cancer. Selon lui, cette redoutable affection qui exerce tant de ravages chez l'Homme où elle n'épargne aucune de ses organes, pouvait toujours être guérie par l'usage de cette Plante administrée soit en poudre, soit sous la forme d'extraits. Malheureusement pour l'humanité, les essais multipliés tentés par les modernes n'ont pas justifié les éloges prodigués par le médecin de Vienne à la grande Ciguë, et l'on a reconnu qu'elle échouait toutes les fois que le cancer était réellement déclaré. Cependant elle peut être utile pour résoudre les indurations glanduleuses qui, souvent négligées, pourraient plus tard se charger en cancers.

Dans les *Nova Genera et Species* de Humboldt et Bonpland, on trouve une nouvelle espèce de Ciguë que Kunth décrit et figure, vol. V, p. 111, t. 420, sous le nom de *Conium maculatum*; cette belle Plante qui croît auprès de Teindala, dans la province de Los Pastos de l'Amérique méridionale, ne nous paraît pas devoir faire partie du genre Ciguë, étant privée de ces crénelures qui existent sur le fruit de toutes les autres espèces. Peut-être serait-elle mieux placée parmi les *Apium*.

Gaertner a fait du *Conium africanum*

son genre *Cepnophyllum*. *V.* ce  
t.  
On a improprement appelé *Cicou*  
*JATQUE* l'*Ananthe crocata* et le  
*Ullandrium aquaticum*, et étendu  
nom à plusieurs autres Ombelli-  
fes des Marais. (A. R.)

**CHUATOTOLIN.** OIS. *V.* CHI-  
TOTOLIN.

**CIJEU A.** POIS. Syn. espagnol de  
nale Marteau. *V.* SQUALE. (B.)

\* **CILIAIRE.** *Blepharis*. POIS.  
us-genre de Gastérostées. *V.* ce  
ot. (B.)

**CILIARE.** BOT. CRYPT. (Palisot-  
eauvois.) Et non *Ciliaire*. Syn. de  
*Trichostomum*, mal à propos écrit  
*Trichosemum* dans Dérerville. *V.* TRI-  
HOSTOME. (AD. B.)

\* **CILICÉE.** *Cilicæa*. CRUST. Genre  
de la famille des Cymothoadées, établi  
par le docteur Leach (Dict. des Sc.  
nat. T. XII, p. 342), et pouvant être  
classé dans l'ordre des Isopodes et  
dans la section des Pterygibranches  
de Latreille (Règn. An. de Cuv.) en  
le réunissant aux Sphéromes de cet  
auteur. Le genre *Cilicée* a pour caracté-  
res : abdomen ayant les premier et  
deuxième articles très-courts, sou-  
dés au troisième qui est grand ; le der-  
nier échancré à son extrémité, ayant  
une petite saillie à son échancrure.  
Le docteur Leach en cite une seule es-  
pèce, le *Cilicée* de Latreille, *Cil. La-  
treillii*, dont le dernier article de l'ab-  
domen a deux élévations en bosse :  
la première (dans le mâle) prolongée  
et pointue ; la petite lame caudale ex-  
térieure ayant ses extrémités échan-  
crées postérieurement. La localité de  
cette espèce est inconnue, et les caracté-  
res donnés par Leach sont si vagues,  
qu'on ne peut guère se prononcer sur  
la valeur de ce nouveau genre qu'on  
devra sans doute réunir aux Sphéro-  
mes. (AUD.)

\* **CILIE.** *Ciliatus*. BOT. PHAN. Cette  
expression s'emploie en botanique  
pour désigner un organe quelcon-  
que offrant des poils disposés régu-

lièrement par rangées, et comme les  
cils des yeux dans les Animaux.

(A. R.)

**CILIE, CILIÉE et CILIBR.** POIS.  
Espèces des genres *Holocentre*, *Cen-  
tronote* et *Holacanthé*. *V.* ces mots.  
(B.)

**CILINDRE.** MOLL. *V.* CYLINDRE.

\* **GILLACH - VONDOH.** MAM.  
(Dapper.) Probablement quelque An-  
tilope. (B.)

**CILLERCOA.** BOT. CRYPT. Des-  
marest donne ce nom comme un sy-  
nonyme espagnol de *Mousseron*, es-  
pèce du genre *Agaric*. *V.* ce mot, (B.)

\* **CILS.** ZOO. Ce nom a été donné  
aux poils qui garnissent les yeux de  
tous les Mammifères et qui contri-  
buent à les garantir des petits corps  
qui voltigent dans l'air.

Dans les Oiseaux, plusieurs es-  
pèces ont les paupières bordées de  
Cils ; ils sont très-longs dans certaines  
espèces, telles que l'Auruche, le Ca-  
lao d'Abyssinie, etc. ; dans d'autres,  
ils sont élargis à la base et creusés en  
gouttière concave en dessous et con-  
vexe en dessus. On remarque cette  
forme dans le *Messager secrétaire*. On  
voit, dans la partie moyenne de la  
paupière supérieure du *Casoar*, un  
rang de petits Cils noirs qui s'arrou-  
dissent en forme de sourcils. Dans la  
*Pintade*, les Cils sont relevés en haut.

Dans les Insectes, ce nom désigne  
les poils roides qui garnissent les  
bords de certains organes, tels que les  
ailes, les pattes, les mâchoires, le la-  
bre, etc. C'est ainsi qu'on a dit : pa-  
tes ciliées, mâchoires ciliées. Plusieurs  
espèces tirent aussi de-là leur nom.  
(G.)

Dans les Animaux rayonnés l'on  
donne ce nom à tous les appendi-  
ces analogues par leur forme aux  
poils qui bordent les paupières de  
la plupart des Mammifères ; ils sont  
situés sur le bord du corps, ou des  
parties du corps, ou des organes  
particuliers de ces Animaux. Ils sont  
rares dans les *Echinodermes*, prin-  
cipalement parmi les *Pédicellés*. Les

Vers intestinaux on offrent, mais en très-petite quantité; ils mériteraient le nom de crochets plutôt que celui de Cils: les uns sont placés sur la tête, les autres sur les différentes parties du corps. Dans les Acalèphes, ces appendices se confondent avec les tentacules dont ils ne diffèrent souvent que par leur longueur. Les Cils des Polypes et des Polypiers varient prodigieusement dans leur situation et dans leur forme; il en existe sur le Polypier, sur les cellules et sur leur bord, sur les ovaires, à leur ouverture et souvent autour des anneaux que certains possèdent. Les tentacules des Animaux, le tour de leur bouche, leur corps, etc., en sont quelquefois ornés; dans tous ces organes, ces Cils ne diffèrent presque jamais des dentelures qu'ils présentent si souvent. Quelquefois, principalement dans le Polype, ils sont destinés à des fonctions particulières en raison de leur situation. Ce que nous disons des Polypes peut s'appliquer aux Infusoires. Donnerait-on des noms différens à chacun de ces appendices, suivant leurs situations diverses, ou leurs fonctions? Ce serait plus exact sans doute; mais de combien de noms nouveaux la science déjà si vaste ne serait-elle pas embarrassée! Le temps se passerait à étudier cette langue nouvelle, employons-le plutôt à connaître les choses.

(LAM..X.)

**CILS. BOT. CRYPT. (Mousses.)** On nomme ainsi, dans les Mousses, les dents plus ou moins nombreuses et de figure très-variées qui forment le péristome intérieur. V. PÉRISTOME.

(A. R.)

**CIMBALAIRE OU CYMBALAIRE.** *Cymbalaria.* BOT. PHAN. Espèce du genre *Antirrhinum*. V. ce mot. (B.)

\* **CIMBALO. BOT. CRYPT.** On ne sait quelles espèces d'Agarics on nomme ainsi aux environs de Florence.

(AD. B.)

**CIMBÈCE. INS. V. CIMBEX.**

**CIMBER. MOLL.** Nom latin que Montfort (T. II, p. 82) donne à son genre *Cambry*. V. ce mot. (P., B.)

**CIMBEX. Cimber.** INS. Genre de l'ordre des Hyménoptères, section des Térébrans, fondé par Olivier au dépend du genre Tenthrede de Linné ayant, suivant lui, pour caractères: antennes courtes, terminées en massue ovale, composées de sept articles, le premier un peu gros, le second très-allongé; bouche composée d'une lèvre supérieure, cornée; de deux mandibules cornées, arquées, dentées d'une trompe très-courte, trifide, et de quatre antennules filiformes; antennules antérieures plus longues composées de six articles presque égaux, les trois premiers cylindriques les trois derniers amincis à leur base les postérieures composées de quatre articles cylindriques, égaux; abdomen uni au corselet; aiguillon court dentelé.

Ce genre, adopté par Fabricius Latreille, Pelletier de Saint-Fargeau et un grand nombre d'entomologistes correspond à celui de Frelon, *Crabro* de Geoffroy et Schœffer, ou au genre Tenthrede de Jurine. Il appartient (Règn. An. de Cuv.) à la famille de Porte-Scies, *Securifera*, à la tribu des Tenthredines, et on peut y réunir les genres *Trichostoma*, *Clavallaria*, *Zarza*, *Abia* et *Amasis* établis récemment par Leach (*Zool. Miscell.* T. III). Les Cimber, outre les caractères indiqués, ont, suivant Latreille et Jurine, des antennes composées de cinq, six et sept articles terminées en une masse épaisse et presque ovoïde; le labre saillant et très-apparent; les mandibules fortes, pointues, avec deux dents aiguës au côté interne. Jurine (*Class. des Hyménoptères*, p. 45) dit qu'elles sont tridentées, parce qu'il confond à tort comme une dent le sommet aigu et terminal de la mandibule. Les palpes maxillaires sont filiformes et guère plus longs que les labiaux. Les ailes ont deux cellules radiées, allongées, presque égales, et trois cellules cubitales; dans un cas, la première cellule, qui est renforcée, reçoit deux nervures récurrentes; et la troisième atteint le bout de l'aile; et



l'autre cas, la première cellule reçoit la première nervure récurrente, et la deuxième cellule la seconde nervure. Cette différence, jointe à quelques autres, fournit à Jurine le type de deux divisions. Plusieurs espèces de Cimex ont les cuisses postérieures renflées dans les mâles; l'abdomen est assez court et large.

Les Cimex diffèrent des genres *Mégalo-dontes*, *Pamphilie*, *Céphas*, *Xiphodrie*, par leur labre apparent et par la tête qui, vue en dessous, paraît plus large que longue, ou transverse; ils partagent ces caractères avec les autres genres de la tribu, mais ils se distinguent de tous par le nombre des articles des antennes et par la forme de ces appendices. Ces Insectes ont quelque ressemblance, pour les *facies*, avec les Abeilles; ils font entendre un léger bourdonnement. On les rencontre sur les fleurs, près des murs, dans les chemins. La femelle est pourvue d'une tarière dont les pièces, très-développées, ont été décrites avec assez de soin par Olivier (*Encycl. méthod. T. v, p. 761*).

À l'aide de cet appareil, elle entaille l'écorce ou le bois des Arbres et y dépose ses œufs; les larves qui naissent de ceux-ci appartiennent à la nombreuse division des fausses Chenilles. Elles ont vingt-deux pattes dont les six premières sont écailleuses. Leur corps est ras et présente des lignes ou bandes longitudinales. On les trouve sur les feuilles du Saule, de l'Osier, du Bouleau, de l'Aulne et de quelques autres Arbres; dans l'état de repos, elles sont roulées en spirale; plusieurs d'entre elles jouissent de la faculté de lancer par un jet continu, et lorsqu'on les inquiète, un liquide transparent de couleur verdâtre. Cette humeur sort de chaque côté du corps et par des ouvertures situées au-dessous de chaque stigmate. Lorsque la larve a acquis tout son accroissement, elle se file une coque qu'elle attache aux feuilles, aux branches ou à quelque baie. D'autres fois, et c'est le cas le plus commun, elle s'enfonce dans le terrain qu'elle se forme au pied des

vieux Arbres, se construit aussi une coque d'une soie grossière et imperméable à l'humidité; elle reste ainsi à l'état de larve une partie de la saison rigoureuse, se métamorphose en nymphe à l'approche du printemps ou de l'été, et ne tarde pas ensuite à devenir Insecte parfait.

Les espèces propres à ce genre sont assez nombreuses; Olivier (*loc. cit.*) en décrit seize; mais ce nombre est porté au-delà de trente dans la Monographie des Tenthredinées de Pelletier de Saint-Fargeau. Parmi celles nous citerons, à cause de la synonymie: le Cimex femoral, *Cimb. femorata*, Oliv., ou le *Tenthredo femorata* de Linné, qui est le même que le Frelon noir à échancrure de Geoffroy (*Hist. des Ins. T. II, p. 263, 3*). On trouve cette espèce dans toute l'Europe; sa larve se nourrit indistinctement des feuilles de l'Aulne et du Saule. C'est principalement à elle que se rapportent les habitudes singulières dont il a été question plus haut.

Le Cimex du Saule, *Cimb. Amerina*, ou la *Clavellaria Amerina* de Leach, ou bien encore la Mouche à scie, *Frelon russe* de Degér (Mém. sur les Ins. T. II, p. 948, et pl. 33, fig. 17-23). *V.*, pour les autres espèces, Olivier (*loc. cit.*), Jurine (*loc. cit.*) et Pelletier de Saint-Fargeau (*Monogr. Tenthredinetarum Synonymia extracta*, p. 25). (AUD.)

\* CIMBRARERA. BOT. PHAN. (Jacquin.) Syn. espagnol en Amérique d'*Eugenia carthaginensis*. (A.)

CIMBRE. POIS. Espèce du genre Gade. *V.* ce mot. (B.)

CIME. BOT. PHAN. *V.* CYME.

\* CIMENT. GÉOL. On appelle ainsi tout mélange ou combinaison servant à unir les masses entre elles et à intercepter le passage des matières gazeuses ou liquides. Il en est de naturel, celui qui unit les parties des brèches et de certains agglomérats, et d'artificiel dont l'Homme a trouvé l'idée dans les rochers. (DELL.)

**CIMEX.** INS. Ce nom latin, qui signifie Punaise; formait, dans la méthode de Linné, de Geoffroy et de Scopoli, un très-grand genre qui correspond à la famille des Géocoris de Latreille. Ce genre a été considérablement subdivisé. *V. PUNAISE.* (AUD.)

**CIMICAIRE.** *Cimicifuga.* BOT. PHAN. Linné (*Amœnitates Acad.*, vol. VII, t. 6, f. 1) a séparé du genre *Actæa* les espèces qui présentent plusieurs ovaires débiscans par leur angle interne, et en a constitué le genre *Cimicifuga*. Ce changement a été adopté par Lamarck (*Encycl. méth.*), Gaertner, Willdenow, etc. Mais, d'après les observations de feu le professeur Richard, dans la Flore de Michaux, De Candolle (*Syst. Veget. Nat.* T. 1, p. 285) est revenu au premier sentiment de Linné qui d'abord n'avait pas séparé les *Cimicifuga* des *Actæa*; il se fonde principalement sur ce que les *Actæa racemosa* et *japonica* ont un seul ovaire en tout parfaitement semblable à ceux des *Cimicifuga*; de sorte qu'il ne serait pas plus conséquent d'éloigner ces Plantes qu'il ne l'aurait été de séparer le *Delphinium Consolida* où l'ovaire est simple, des autres *Delphinium* où il est multiple.

Le genre *Cimicifuga* de Linné ne forme donc plus qu'une section dans les *Actæa*. Elle comprend quatre espèces, dont trois sont indigènes de l'Amérique septentrionale et une habite aussi le nord de l'Europe et la Sibérie orientale. Cette dernière est l'*Actæa Cimicifuga*, D. C., ou *Cimicifuga foetida*, L., que son odeur insupportable fait employer avec succès en Sibérie pour chasser les Punaises. Sous le nom de *Cimicifuga americana*, est décrite, dans la Flore de l'Amérique du nord de Michaux, une belle Plante des montagnes de la Caroline, nommée *Actæa podocarpa* par De Candolle, et figurée dans le premier volume, tab. 66, des *Icones selectæ* de Benjamin Delessert. (G..N.)

**CIMICIDES.** *Cimicides.* INS. Famille de l'ordre des Hémiptères, section des Hétéroptères, établie par La-

treille (*Gener. Crust. et Ins.* et *Consid. génér.*, p. 251) aux dépens du grand genre *Cimex* de Linné, et présentant pour caractères : antennes découvertes ou apparentes, insérées devant les yeux; bec n'ayant que trois ou deux articles distincts et apparens, à partir de l'extrémité de la saillie recevant le labre; labre court, point ou peu prolongé au-delà du museau ou de l'origine de la partie saillante du bec; tarse du plus grand nombre ayant le premier ou les deux premiers articles très-courts.

La famille des Cimicides correspond (Règn. An. de Cuv.) à la seconde division de la famille des Géocorises. *V. ce mot.* (AUD.)

**CIMICIOTTUM.** BOT. PHAN. (C. salpin.) Syn. de *Ballota nigra.* *V. BALLOTE.* (B.)

**CIMINALIS.** BOT. PHAN. Genre formé par Adanson et renouvelé par Borckhausen, aux dépens des Gentianées pour les espèces qui, telles que l'*Acaulis*, le *Pneumonanthe*, etc. ont leurs anthères réunies. (B.)

**CIMOLITHE.** MIN. Espèce d'Argile. *V. ce mot.*

**CINABRE.** *Cinabaris.* MIN. Les anciens donnaient ce nom au suc de sang Dragon ou autres Végétaux dont les femmes se servaient pour embellir leur teint. Il est exclusivement passé depuis dans la minéralogie où il désigne le Sulfure de Mercure. *V. MERCURE.* (B.)

**CINÆDIA.** MIN. *V. CINÆDUS.*

**CINÆDUS.** POIS. Espèce du genre Labre. On croit que c'est ce Poisson mentionné par Pline qui rapporté qu'on trouvait dans sa cervelle une pierre appelée, par cette raison, *Cinædia*. (B.)

\* **CINAMITE.** MIN. *V. KANNELLEIN.*

**CINARE** ou **CYNARE.** *Cinara.* BOT. PHAN. Ce genre de la famille des Synanthérées et de la Syngénésie égale de Linné, est un des plus remarquables de la tribu des Cinarocéphales à laquelle il a donné son nom. C

ni qui le premier a su décrire avec précision les genres, c'est-à-dire grouper et circonscrire les espèces dans leurs limites naturelles, Tournefort lui a conservé le nom de *Cinara*, sous lequel Lobel et les anciens botanistes avaient fait connaître les principales espèces; Linné et ses disciples ont autrement orthographié ce mot, qui a été rétabli par Jussieu et les botanistes nos contemporains, tel qu'il était écrit autrefois. Ses caractères sont : involucre très-grand, renflé et creux, formé d'écaillés imbriquées, harnues à la base, terminées supérieurement par une pointe épineuse; sous les fleurons réguliers et hermaphrodites; réceptacle large, charnu et garni de paillettes en forme de soies; stikènes couronnés de longues aigrettes plumeuses.

Le feuillage des Cinaires, vulgairement nommés Artichauts et Cardons, est en rapport avec les dimensions gigantesques des capitules de leurs fleurs et de leurs organes accessoires. De même que ceux-ci, elles sont d'une grandeur prodigieuse, pinnatifides et épineuses, ce qui leur donne de la ressemblance avec celles de l'Acanthe, si célèbres par l'imitation que les architectes en ont faite dans les ornements des colonnes.

Les espèces d'Artichauts sont peu nombreuses, surtout si, comme l'indique Jussieu dans le *Genera Plantarum*, on en sépare le *Cinara humilis*, dont les fleurs sont radicales et les caillies de l'involucre inermes et ciliées sur leurs bords près du sommet, le même que dans plusieurs Centaurees. Personne n'en mentionne que huit, parmi lesquelles il en est même quelques-unes présentées comme douces. Celles qui méritent toute notre attention, tant à cause de leur utilité comme substances alimentaires, que parce qu'elles sont les types du genre, sont les suivantes :

L'ARTICHAUT CARDON, *Cinara Cardunculus*, L., a une tige qui s'élève à plus d'un mètre; ses feuilles, grandes, vertes-blanchâtres en dessus, cotonneuses en dessous, sont dé-

currentes, pinnatifides, à lobes étroits et formant des ailes sur le pétiole où elles sont hérissées de fortes épines; il porte des fleurs d'un bleu violet, grandes et terminales, entourées d'un involucre composé de folioles lancéolées, très-larges à la base et terminées par une pointe qui dégénère en épine. L'Artichaut Cardon croît naturellement en France, près de Montpellier; c'est cette Plante à l'état sauvage que Lamarck (Dictionn. encycl.) nomme *Cinara sylvestris*. Cultivée dans les jardins, ses formes se modifient, et elle devient une variété que les auteurs ont fait connaître sous le nom de *Cinara Cardunculus hortensis*. On en mange les pétioles et les côtes longitudinales après les avoir fait étiooler, soit en les enveloppant de paille, soit en les couvrant de terre, soit enfin en les liant ensemble comme les feuilles de Chicorée Endive. Ce mode de culture leur fait acquérir une saveur plus douce et une consistance moins coriace; alors on donne à la Plante les noms de *Carde* et de *Cardon d'Espagne*.

L'ARTICHAUT COMMUN, *Cinara Scolymus*, L., pourrait n'être considéré, selon DeCandolle, que comme une variété de la précédente espèce, si l'on s'en rapportait à l'expérience de J. Baubin, qui a fait naître des pieds de Cardon par des semis de graines d'Artichaut. L'auteur de la Flore Française ajoute que l'absence de cette Plante à l'état sauvage confirme assez une pareille opinion. La culture de chacune de ces deux Cinarocéphales étant essentiellement différente, puisque l'une a pour but de développer considérablement les organes de la végétation, et que par l'autre on se propose de faire porter l'accroissement sur les fleurs, il pourrait se faire que l'identité d'espèce nous fût masquée par cette seule cause. Il n'y a point en effet de caractères bien tranchés qui puissent les distinguer; l'Artichaut commun est moins épineux dans toutes ses parties, et ses feuilles sont moins découpées. Cependant plusieurs auteurs lui assignent pour patrie les contrées

méditerranéennes de l'Europe, l'Italie, le Portugal, etc., et dans l'aperçu de son Voyage en Brésil; Auguste de Saint-Hilaire nous a tout récemment appris que l'Artichaut, importé d'Europe à Monte-Video, y a tellement multiplié, qu'il infeste maintenant les environs de cette ville, surtout depuis que l'on a donné la chasse aux grands Animaux qui en faisaient leur pâture. Tout le monde sait que c'est seulement le réceptacle des fleurs d'Artichaut que l'on mange, soit cru avec de l'huile et du vinaigre, soit cuit et préparé de diverses manières. (G.N.)

**CINAROCÉPHALES.** *Cinaroccephala.* BOT. PHAN. La famille appelée ainsi par Jussieu, et qui correspond aux Flosculeuses de Tournefort, est plus généralement connue aujourd'hui sous le nom de Carduacées. *V. ce mot.* (A.R.)

**CINAROIDES.** BOT. PHAN. (Plumet.) Espèce du genre *Protea*. *V. ce mot.* (B.)

**CINOCAMPALON.** BOT. PHAN. (Scapiger.) Même chose que Chinkapalotes. *V. ce mot.* (B.)

**CINCHONA.** BOT. PHAN. *V. QUINA.*

**CINCINNALIS.** BOT. CRYPT. (Fougères.) Desvaux a repris ce nom déjà employé par Gleditsh, pour désigner le genre de Fougères nommé *Notholaena* par R. Brown. Comme ce dernier nom est généralement adopté, et que le genre de Gleditsh, quoique plus ancien, était vaguement indiqué et n'avait été conservé par aucun auteur postérieur, nous renverrons au mot *Notholana*; Desvaux a décrit, sous le nom de *Cincinnati* (Berl. Mag., 1811, p. 314), douze espèces de ce genre; dont plusieurs nouvelles. *V. NOTHOLANA.* (AD. B.)

**CINCINPOTOLA.** ois. Syn. tascan de la Mésange charbonnière, *Parus major.* *V. MÉSANGE.* (DR. Z.)

**CINCIRROUS.** pers. Nom vulgaire

donné à l'Île de France au Cirrhé tacheté. *V. CIRRHÉ.* (B.)

\* **CINCLE.** *Cinclus.* ois. Genre de l'ordre des Insectivores. Caractères: bec médiocre, droit, comprimé, tranchant et arrondi vers l'extrémité; mandibule supérieure élevée avec la point recourbée sur l'inférieure; narines placées à la base du bec et sur les côtés, dans une fente longitudinale recouvertes par une membrane; tête petite, étroite au sommet, avec le front allongé et venant aboutir aux narines; quatre doigts, trois en avant l'intérieur plus grand que les latéraux qui sont égaux, et soudé à l'extérieur vers la base; un oiseau par derrière libre; tarses plus long que le doigt intermédiaire; première rémige très courte, les troisième et quatrième les plus longues.

Les Cincles que certains auteurs ont associés à différents genres d'Échassiers, qu'à d'autres ont placés parmi les Merles, ont été particulièrement étudiés par Bechstein, qui leur a trouvé des caractères assez particuliers pour constituer un genre qui fut ensuite adopté par Cuvier et Temminck. Sans pouvoir être spécialement qualifiés d'Oiseaux aquatiques, les Cincles ne se plaisent bien que sur les bords des ruisseaux c'est là qu'ils cherchent leur pâture consistant dans les petits Insectes aquatiques qui se trouvent particulièrement sur le gravier des sources vives ou dans le lit sur lequel roulent des filets d'eau courante; l'eau n'est pas pour eux un obstacle à la poursuite de ces petites proies; l'Oiseau y entre s'en laisse même submerger sans paraître nullement changer sa contenance; on a observé que, seules, ne faisait à l'instant même qu'il déploie un peu les ailes, et qu'il les tenait dans cette position pendant tout le temps qu'il restait sous l'eau: or, comme l'on sait que les ailes enduites d'une matière huileuse, sont alors imperméables à l'air comme à l'eau, il est à présumer que le Cincle établit par cette manœuvre un petit réservoir d'air sous la partie concave de chaque aile, et que c'est dans des réservoirs

oires qu'il puise de quoi alimenter la respiration. Le Cincle vit solitaire et c'est dans les montagnes ; il s'apprête dans la saison des amours ; il construit un nid formé et entièrement recouvert de brins d'herbe et de mousses entrelacés d'une manière admirable. La femelle y pond de quatre à six œufs parfaitement blancs. Lorsque les petits sont en état de voler, chacun se sépare, et sans doute pour ne se reconnaître jamais.

**CINCLE LONGUEUR**, *Cinclus aquaticus*, Bechst., *Sturnus Cinclus*, Gmel., *Turdus Cinclus*, L., Merle d'eau, Buff. l. enl. 852. Parties supérieures brunes, noirâtres, nuancées de cendré ; gorge, devant du cou et poitrine blanches ; ventre roux ; bec noirâtre ; iris gris. Longueur, sept pouces. La femelle a les teintes plus pâles, le sommet de la tête et la partie postérieure du cou d'un cendré foncé. Les jeunes ont les plumes frangées de noirâtre, l'extrémité des ailes et le milieu du ventre blanchâtres, mais les bords des plumes bordées de roussâtre. Europe.

**CINCLE FAUCON**, *Cinclus Pallasi*, Temm. Entièrement d'un brun roussâtre très-foncé, semblable du reste, pour la forme et la taille, au Cincle longueur. De Crimée. (BR. Z.)

**CINCLIDIUM**. BOT. OXYPT. (*Mousses*.) Ce genre découvert par Swartz dans les marais des environs d'Upsal, a été établi par lui dans le Journal de botanique de Schrader (1801) et adopté par la plupart des auteurs. Il est très-voisin des *Meesta*, auxquelles Bridel l'avait d'abord réuni. Il est ainsi caractérisé : péristome double ; l'extérieur composé de seize dents libres, aiguës, recourbées en dedans ; l'intérieur formé par une membrane convexe, fermée au sommet, présentant seize stries rayonnantes, et percée de seize trous opposés aux dents du péristome externe ; les fleurs ont terminales et la coiffe se fend latéralement.

La seule espèce connue de ce genre, *Cinclidium virginicum*, Swartz (Sch-

wenrichen, Suppl. 1, page 2, p. 86, tab. 67), découverte d'abord en Suède, a été retrouvée depuis dans quelques parties de l'Allemagne. On ne l'a pas observée en France, ni en Angleterre. Elle a le port des *Briza ligulatum* et *cuspidatum*, et, comme la plupart des Mousses qui croissent dans les marais, sa tige qui est droite et rameuse est enveloppée d'une sorte de bourre laineuse brune, qui cache en partie les feuilles. Celles-ci sont arrondies, entières, plus épaisses sur les bords, traversées par une nervure moyenne, qui forme une petite pointe au sommet de la feuille. Les fleurs sont en disques terminaux et hermaphrodites, suivant le système d'Hedwig. Les capsules isolées ou quelquefois au nombre de deux à l'extrémité de la même tige sont portées sur un long pédicelle rouge orangé, recourbé au sommet. La capsule est pendante, oblongue et renflée, lisse ; l'opercule est convexe, avec un léger mamelon au sommet ; la coiffe presque égale à la capsule se fend latéralement.

Ce genre diffère des *Meesta* par son péristome interne formé d'une membrane entière et non de cils réunis simplement par des filamens latéraux. (AD. B.)

**CINCLUS**. OIS. Nom appliqué par Aristote, Aldrovande, etc., à des petits Oiseaux de rivages, tels que le Tourne-Pierre, la Bécassine, les Bécasseaux, etc., restreint aujourd'hui comme générique au Merle d'eau. *V. CINCLE*. (BR. Z.)

**CINCO-CHAGOS**. BOT. PHAN. Syn. portugais de *Tropaeolum minus*. *V. CAPUCINE*. (B.)

**CINDERS NATUREL**. MIN. Bronzgiart rapporte ce nom à l'Anthracite trouvée dans les environs de Roanne. (B.)

**CINE OU LINE**. BOT. PHAN. (Dioscoride.) Syn. de Fragon. *V. de moë*. (B.)

**CINÉRAIRE**. *Cineraria*, BOT. PHAN. Famille des Synanthérées, tribu des Corymbifères de Jussieu, Syngénésie

superflue de Linné: Ce genre établi par ce dernier naturaliste faisait partie du *Jacobaea* de Tournefort. La plupart des espèces de celui-ci constituant la section des *Senecions* à fleurs radiées, il doit y avoir beaucoup d'analogie entre les Cinéraires et cette section. On ne trouve en effet entre les deux genres d'autre différence bien prononcée que l'absence du calicule à la base de l'involucre chez les Cinéraires, et encore a-t-on placé parmi celles-ci des Plantes qui étaient munies de deux ou trois écailles, organisation qui se rapproche beaucoup de celle d'un calicule ou d'une rangée isopérimétrique de folioles. Quoi qu'il en soit, voici les caractères du genre *Cineraria*: involucre composé de plusieurs folioles égales et disposées sur un même rang, soudées à leur partie inférieure; réceptacle nu; calathides radiées; les fleurons du disque tubuleux et hermaphrodites; ceux de la circonférence ligulés, femelles et fertiles; anthères nues à la base; aigrettes poilues, simples et sessiles.

Les Cinéraires dont il faut retrancher toutes les espèces sans rayons, telles que, par exemple, la première section de ce genre établie dans le *Synopsis* de Persoon, qui constituait le genre *Doria* de Thunberg, les Cinéraires sont des Plantes répandues par toute la terre, néanmoins plus abondantes dans les climats tropiques, ainsi qu'on l'observe sur la plus grande partie des Synanthérées. Un grand nombre d'entre elles sont des Plantes herbacées; quelques-unes ont des tiges ligneuses, et sont ainsi des sous-Arbrisseaux dont les feuilles opposées ou alternes affectent une grande variété de formes. On en cultive plusieurs dans les jardins comme Plantes d'ornement. De ce nombre sont les *Cineraria aurita* et *amelloïdes*, L.; mais cette dernière espèce, d'après les indications du *Genera Plantarum* de Jussieu, a été séparée des Cinéraires par Cassini qui en a fait le type de son genre *Agathaea*. V. ce mot.

Huit espèces de Cinéraires sont in-

digènes de la France; une seule croît naturellement aux environs de la capitale, dans la forêt de Montmorency. Cette Plante qui fleurit au mois de mai est la CINÉRAIRE DES CHAMPS *Cineraria campestris*, Retz. Dans plusieurs Flores des environs de Paris on l'a confondue avec la *Cineraria integrifolia*, qui est une Plante de Alpes et des Pyrénées, et dont elle diffère beaucoup. Sa tige droite, simple et cannelée, s'élève à cinq décimètres; elle porte des feuilles entières, sessiles, lancéolées, pointues et couvertes d'un duvet cotonneux. A bas de la tige est une touffe de feuilles radicales pétiolées, ovales et crénelées. Les fleurs d'un beau jaune sont disposées en corymbe.

Les autres Cinéraires françaises, à l'exception de la *Cineraria maritima* L., dont nous donnerons plus bas une courte description, habitent les Alpes et les pâturages élevés des pays montagneux de l'intérieur. La plus belle et la plus rare est la CINÉRAIRE ORANGÉE, *Cineraria aurantiaca*, Autour des chalets des Hautes-Alpes on rencontre fréquemment la CINÉRAIRE À FEUILLES CORDÉES, *Cineraria cordifolia*, L.

La CINÉRAIRE MARITIME, *Cineraria maritima*, L.; a servi de type au genre entier. Cette belle Plante est couverte sur toutes ses parties d'un duvet cotonneux très-serré et si court qu'elle a un aspect blanchâtre et cendré. Sa tige d'un demi-mètre environ de hauteur est un peu ligneuse à base, cylindrique, branchue. Elle porte des feuilles pinnatifides, dont les lobes sont obtus et terminés par trois sinuosités. Les fleurs en corymbes d'une fort belle couleur jaune sont à peu près hémisphériques, entourées d'un involucre cotonneux; les rayons sont notablement plus gros que ceux des autres Cinéraires. Elle abonde sur les rochers exposés au soleil dans les départements baignés par la Méditerranée. On ne la cultive guère que dans les jardins de botanique, et cependant la beauté de cette Plante mériterait qu'on en ornât

arteries où sa culture ne serait pas très-difficile. (G.N.)

\* **CINERAS**. MOLL. C'est un genre d'Anatife membraneuse dont les caractères sont : Animal semblable à celui des Cirrhopodes, enveloppé par un manteau pédonculé, se terminant graduellement en massue, sans appendices auriformes, et dans les pa-  
ois duquel se développent cinq pe-  
tites pièces calcaires. Leach, dans le  
supplément à l'Encyclopédie d'Édim-  
bourg, propose de le séparer du gen-  
re Otion du professeur Ocken, dans le-  
quel cet auteur l'a confondu; il en con-  
naît trois espèces dont l'une est figurée  
dans l'ouvrage cité plus haut, sous le  
nom de Cineras à bandes, *Cineras*  
 *vittatus*. (G.)

\* **CINERIDES**. *Cineridea*. MOLL.  
Nom d'une famille établie par Leach  
dans la classe des Mollusques cirrho-  
podes, comprenant les Anatifes mem-  
braneuses, et correspondant au genre  
Otion d'Ocken. Cette famille appar-  
tient, dans la nouvelle classification  
du zoologiste anglais, à la famille  
des Campylosomates, et ses caractères  
sont : d'avoir des pièces calcaires fort  
petites, et le corps assez comprimé  
supérieurement. Elle comprend les  
genres Otion et Cineras. *V.* ces mots.  
(G.)

**CINETE**. *Cinetus*. INS. Genre de  
l'ordre des Hyménoptères, section  
des Térébrans, fondé par Jurine  
Class. des Hyménopt., p. 310; et ayant  
suivant lui pour caractères : une cel-  
lule radiale, petite et pointue; point  
le cellule cubitale; mandibules légè-  
rement bidentées; antennes filiformes  
composées de quinze anneaux dans  
les femelles, dont le premier long, et  
le quatorze dans les mâles avec le  
troisième arqué. Les Cinètes appar-  
tiennent ( Règn. Anim. de Cuv. T. I,  
p. 658 ) à la famille des Pupivo-  
res et à la tribu des Oxyures; ils ont  
des antennes coudées, le premier ar-  
cicle étant fort long; ce qui les dis-  
tingue des Codres et des Hélores. Ce  
caractère les rapproche au contraire  
des Belytes et des Diaprésés de La-

treille; mais ils diffèrent des premiers  
par leurs antennes filiformes, et des  
seconds par les nervures de leurs  
ailes. Jurine observe que la cellule  
radiale des Cinètes forme un petit  
triangle scalène, dont le sommet est  
tourné vers le bout de l'aile, et que  
la nervure qui le dessine se contourne  
dans le disque de l'aile, comme chez  
les Codres. Il fait remarquer aussi  
que le point de l'aile est à peine visi-  
ble, n'étant formé que par un léger  
renflement de la nervure. Le thorax  
des Cinètes n'est pas prolongé posté-  
rieurement, comme celui des Codres,  
et il est armé de deux petites épines.  
Leur ventre est un peu aplati, mais  
moins que celui des Belytes, et il est  
porté par un long pétiole sillonné en  
dessus, velu et quelquefois arqué.  
Ce genre, établi sur l'inspection  
d'une femelle et de deux mâles, est  
composé de petites espèces très-né-  
gligées jusqu'à présent par les natu-  
ralistes. Jurine aurait pu les faire sor-  
tir de cet oubli, mais malheureuse-  
ment il n'a décrit ou figuré aucune  
espèce, et le genre Cinète, malgré les  
caractères détaillés que nous nous  
sommes fait un scrupule de transcrire  
exactement, reste encore très-incér-  
tain. (AUD.)

\* **CINGALÈGRE**. OIS. (Cettif.)  
Syn. sarde de la Mésange bleue, *Pa-  
rus caeruleus*, L. *V.* MÉSANGE. (DR. Z.)

**CINGLE**. POIS. (*Zingel*.) Sous-  
genre de Sciènes. *V.* ce mot. (B.)

**CINGULARIA**. BOT. CRYPT. (*Le-  
mery*.) Syn. polonais de Lycopode.  
(B.)

**CINGULATA**. MAM. (Illiger.) Syn.  
de Tatou. *V.* ce mot. (B.)

\* **CINIANEL**. INS. (Gaimard.)  
Syn. de Cigale, *Cicada*, L., à l'île  
de Guébé, dans l'archipel des Mo-  
luques. (G.)

**CINIPS**. INS. Pour Cynips. *V.* ce  
mot.

**CINIPSÈRES**. INS. *V.* GYNIPÈRES.

**CINNA**. BOT. PHAN. Ce genre, de  
la famille des Graminées et de la Mo-

**mandrie.** Digne de Linné, présente les caractères suivans : fleurs en panicules, composées; chaque fleur soutenue par un pédicelle, et renfermée dans une lépécène à deux valves inégales plus courtes que celles de la glume; celles-ci, au nombre de deux, dont l'inférieure plus grande, bifide à son sommet et munie d'une soie courte dorsale, la supérieure entière; deux petites écailles à la base de l'ovaire, lanéolées, entières, glabres, ovales et resserrées au-dessous de leur milieu; étamine solitaire; style court bipartite; stigmates velus; caryopse non strié et libre.

L'unité d'étamine que l'on observe constamment dans le Cinna ainsi que dans quelques autres Graminées, est une de ces aberrations qui ont le plus contrarié Linné pour l'arrangement des genres selon son système sexuel. Il était tellement frappé des rapports naturels qui lient toutes les Graminées entr'elles, qu'il lui répugnait d'en disséminer les genres dans les diverses classes de sa méthode. Ainsi, quoique plusieurs *Agrostis*, *Festuca*, etc., eussent un nombre anormal d'étamines, il a préféré les laisser avec les autres dans la Triandrie; mais lorsque tout le genre présentait constamment ce nombre anormal, il lui a bien été nécessaire de l'éloigner et de le placer où le nombre l'indiquait. C'est ce qu'il a fait ici pour le Cinna, c'est ce qu'il a encore fait pour l'*Oryza*; l'*Anthoxanthum*, le *Pharus*; etc.

Le mot de Cinna ou Kinna était employé par Dioscoride pour désigner une Graminée dont il n'est pas facile de donner la synonymie. Linné l'a appliqué au genre qui nous occupe, et qu'Adanson, de son côté, a nommé *Abala*. Il se compose d'une espèce, le *Cinna arundinacea*, L., indigène du Canada. On y a joint l'*Agrostis mexicana* de Willdenow.

(G.N.)  
**CINNABARIS.** BOT. PHAN. (Dioscoride.) Peut-être la Garance. V. CINABRE.

(B.)  
\* **CINNAMOLOGUS, CINNAMO-**

**MUS ou CINNAMOG-LUS.** ORN. De les anciens, ces noms désignent l'Oiseau qu'il est difficile de reconnaître malgré ce qu'en ont dit Gesner Aldrovande.

(B.)  
**CINNAMOME.** *Cinnamomum.* BOT. PHAN. Ancien nom de divers Laurus de l'Inde, devenu spécifique pour désigner le Cannelier. V. mot.

(B.)  
**CINNAMON.** ORN. Espèce du genre Grimpeur ou *Certhia Cinnamome* Gmel., qui n'est probablement pas le *Cinnamomus* des anciens, malgré le rapport des noms. V. CINNAMOG-LUS.

\* **CINNAMUM.** BOT. PHAN. Avant même l'époque où vivait Pline, un parfum qui venait du pays des Troglodites ou d'Éthiopie était célèbre sous ce nom chez les anciens. On ne sait s'il était le produit de quelque espèce du genre *Amyris* ou du Cannelier dont il est difficile de supposer que les Éthiopiens aient eu connaissance, et qui s'appelle encore Cinnamome. On nommait aussi Caryopse l'Arbre qui produisait le Cinnamum ou Cinnamon.

(B.)  
**GINNANA.** ORN. Syn. arabe du Cygne, *Anas Cygnus*. V. CANARD.

(DR.Z.)  
\* **CINNYRIS.** ORN. Nom grec d'un petit Oiseau inconnu; et que Cuvier a appliqué à une division de son genre Soui-Manga.

(DR.Z.)  
**CINOGLASSE.** BOT. PHAN. Pour Cynoglosse. V. ce mot.

**CINOIRAS.** BOT. PHAN. Divers ouvrages d'Histoire Naturelle donnent ce nom, qu'ils écrivent aussi *Cenoira*, *Cinoura*, *Senouira* et *Senoura*, pour synonyme portugais de Carotte.

(B.)  
\* **CINTE.** BOT. PHAN. (Commerçon.) Syn. de *Rhamnus circumcissus*, espèce de Nerprun.

(B.)  
**CIOCOQUE.** *Chiococca.* BOT. PHAN. V. CHIOCOQUE.

\* **GIOJA.** ORN. Syn. piémontais du CHOQUARD, *Corvus Pyrrhocorax*, L. V. PYRRHOCORAX.

(DR.Z.)  
\* **CION.** ORN. Syn. italien du Mau-



is, *Turdus iliacus*, L. V. MEXEZ.  
(DR..Z.)

CIONE. *Cionus*. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des étamères, fondé par Clairville (Entomol. helvétique) aux dépens des charançons. Il appartient (Régim. anim. de Cuv.) à la famille des Rhinophores ou Porte-Becs, et a pour caractères : antennes insérées près du milieu d'une trompe ordinairement longue et menue, coudées, de dix articles, et dont les quatre derniers sont massues; cuisses postérieures inpropres au saut. Les Insectes appartenant à ce genre ont le corps très-court, presque globuleux, avec la trompe longue et courbée. Ils vivent, ainsi que leurs larves, sur les Scrophulaires et les Verbascum. L'espèce la plus commune et servant de type, est le Cione de la Scrophulaire, *C. scrophulariae* ou le *Rhynchæus scrophulariae* de Fabricius (*Syst. Eleuth.*) qui, suivant Latreille, a décrit sous le nom de *Rhynch. Verbasci* (*loc. cit.*) une variété de la même espèce; c'est encore le Charançon à losange de la scrophulaire de Geoffroy (*Hist. des ins. T. 1, p. 296*). V. Dejean (*Catal. des Coléopt.*, p. 85) qui en mentionne six espèces. (AUD.)

\* CIONUM. BOT. CRYPT. (*Lycoperidaceæ*.) Ce genre, établi par Link dans sa première dissertation sur les Champignons (*Berl. Mag.*, 1809, p. 8), a été réuni depuis par lui aux *Didymium*. V. ce mot. Il était ainsi caractérisé : peridium globuleux ou trigulnier, simple, membraneux, s'ouvrant supérieurement, et se déhaisant presque entièrement sous forme d'écaillés; filaments insérés vers la base; columelle renfermée dans le peridium; sporules agglomérées.

Link rapporte à ce genre les espèces suivantes : *Didymium complanatum*, *farinaceum* et *tigrinum* de Schrader. Le *Physarum farinaceum* d'Albertini et Schweinitz ne doit pas être confondu avec l'espèce du même nom que nous venons de citer : c'est un véritable *Physarum* dépourvu de columelle. Deux espèces nouvelles

de ce genre ont été parfaitement figurées par Dittmar dans la Flore d'Allemagne de Sturm sous les noms de *Cionium Iridis* (Dittmar, *Fung. Germ. fasc. 2, p. 114*); *Cionium muscopolis*, Dittmar (*loc. cit.*, fasc. 3, p. 145). Ces deux espèces nous paraissent extrêmement voisines, et ne sont très-probablement que des variétés l'une de l'autre. (AB. E.)

CIOTA ET CIOUTA. BOT. PHAN. Variété de Raisin.

\* CIOTOLONE. BOT. CRYPT. Syn. de *Peziza capsularis* aux environs de Florence, si tant est que le vulgaire ait distingué cette espèce de ses congénères. (B.)

\* CIOTTOLARA. BOT. CRYPT. (*Lichens*.) On présume que le Lichen désigné sous ce nom et comme une Mousse dans Imperato, est le *Physcia ciliaris*, qui, au temps de ce botaniste, était employé dans la parfumerie pour donner du corps aux poudres de senteur. (B.)

CIOUC. OIS. Syn. piémontais du Scops, *Strix Scops*, L. V. CHOUETTE.  
(DR..Z.)

CIPA, CIPE, CIPEL. BOT. PHAN. Évidemment dérivés du latin *Cepa*. Noms de l'Oignon dans les langues d'origine saxonne, telles que l'anglais et le frison. (B.)

\* CIPARISOFIQUE. *Ciparisoficus*. BOT. CRYPT. (Donati.) Syn. présumé des *Fucus discors* ou *sedoidea*, avec lesquels les pêcheurs de Naples environnent le Poisson pour le conserver. (B.)

\* CIPERINA. OIS. Syn. italien du Cochevis, *Alauda cristata*, L. V. ALOUETTE.  
(DR..Z.)

CIPIA. BOT. PHAN. Aublet dit qu'on appelle ainsi la fécule amygdacée qu'on retire de la racine de Manioc, et à laquelle on donne également le nom de *Tapioca*. V. MANIOC et TAPIOKA. (DR..Z.)

CIPO DE CQBRA. BOT. PHAN. Même chose que *Casahuate*. (B.)

CIPOLIN. MIN. AL. MARBRE CIPOLIN.

CIPOLLA, CIPOLLETTA ET CIPOLLINO. BOT. PHAN. La Ciboule

dans les langues méridionales, d'où l'on nomme *Cipolla canina* (Ciboule de Chien) l'*Hyacinthus comosus* dans quelques cantons de l'Italie. (B.)

**CIPONE ou CIPONIME.** *Ciponima*.

**BOT. PHAN.** Aublet a décrit sous ce nom (Plantes de la Guiane, 1<sup>er</sup> vol., p. 567, et t. 226) un genre qui appartient à la Polyandrie Monogynie de Linné, et qui a pour caractères : un calice monosépale, velu, à cinq dents; une corolle hypogyne, monopétale, tubuleuse, à limbe étalé, divisé en cinq lobes oblongs et concaves; des étamines en nombre indéfini (trente et plus) insérées sur l'entrée du tube de la corolle et disposées sur deux rangs, à filets inégaux légèrement réunis à leur base, et à anthères arrondies. L'ovaire est libre et surmonté d'un style velu que termine un stigmate capité. Il lui succède une baie noire pisiforme, saillante hors du calice persistant, renfermant un noyau dur et ligneux à cinq loges et à cinq graines selon Jussieu, à quatre loges d'après Aublet. Chaque loge contient plusieurs graines, dont une seule subsiste; leur embryon filiforme, à radicule très-longue, est renfermé dans le centre d'un albumen charnu, d'après l'observation du professeur Richard père, faite à Cayenne sur la Plante vivante. On ne connaît qu'une seule espèce de ce genre, le *Ciponima guianensis*, Aublet, Arbre dont le tronc, couvert d'une écorce grise et composé d'un bois blanc assez compacte, s'élève à environ deux mètres et demi. Les branches qui naissent au sommet se partagent en rameaux nombreux, velus, alternes et divariqués; Les jeunes feuilles sont velues; plus tard elles deviennent lisses, vertes; ovales, mucronées et alternes sur les rameaux; dans les aisselles de ces feuilles; les fleurs naissent par bouquets garnis à leur base de quatre ou cinq petites écailles bordées de poils roses.

Ce genre a été placé par Jussieu dans la deuxième section de la famille des Plaqueminiers ou Ébénacées; mais cet illustre botaniste a en

même temps indiqué les rapports de cette seconde section offre avec familles polypétales très-éloignées comme par exemple les Méliacées. De son côté, Lamarck (Encycl. method.) lui a trouvé de l'affinité avec le genre *Ternstroemia*. Il l'a réunie au genre *Symplocos* (Illustr. t. 255); mais cette association ne range en rien les rapports que nous recherchons en ce moment, puisque le *Symplocos* faisait comme lui partie de la famille des Ébénacées.

Dans un travail subséquent (Art du Mus. d'Hist. Nat. vol. v, p. 42) Jussieu croit que la seconde section des Ébénacées doit former une nouvelle famille qui a du rapport avec les Myrtacées à feuilles alternes, soit avec la dernière section des Hespéridées, mais dont elle se distingue facilement.

Le professeur Richard père a formé, en réunissant le *Ciponima*, *Symplocos*, le *Styrax* et l'*Halesia* une petite famille à laquelle il donne le nom de Styracinéées et que Kunth a adoptée dans son grand ouvrage sur les Plantes équinoxiales d'Amérique. Ce savant botaniste réunit au *Symplocos*, le *Ciponima*, ainsi que les genres *Hopea*, L., et *Astonia* de Mutis. **V. SYMPLOQUE.** (C.N.)

\* **CIPPER.** orn. (Buffon.) Syn. italien de Mauvis, *Turdus iliacus*. (B.)

**CIPRE.** BOT. PHAN. (Duhamel.) Pin indéterminé du Canada, qui n'est peut-être qu'une variété du *Pinus Tæda*. On donne ce nom au cône du Cyprés dans le Midi. (B.)

**CIPRÈS.** BOT. PHAN. Pour Cyprés **V.** ce mot.

**CIPRESSENMOS.** BOT. CRYPT. Syn. teuton de Lycopode des Alpes. (B.)

**CIPSELUS.** ois. **V.** **CYPSELUS.**

**CIPULAZZA.** pois. Syn. maltais de Scorpène. (B.)

**CIPURE.** *Cipura*. BOT. PHAN. Genre de la famille des Iridées et de la Triandrie Monogynie de Linné, fondé par Aublet qui lui donne les caractères suivans : spathe membraneuse, oblongue et aiguë, envelop-

ant la fleur; périanthe tubuleux à la base et adhérent à l'ovaire, divisé supérieurement en six parties, dont trois intérieures trois fois plus petites que les extérieures avec lesquelles elles s'alternent; trois étamines à filets très-courts insérées sur le tube de la corolle; style épaissi, charnu, triangulaire, terminé par un stigmate partagé en trois feuillets bleuâtres.

La Plante sur laquelle ce genre a été établi, fleurit au mois d'août, dans les savannes humides qui sont au pied de la montagne de Courou dans la Guiane. Elle a une tige herbacée, et sa racine est un bulbe charnu, ouvert de plusieurs tuniques comme celui du Safran. Aublet lui a donné le nom de *Cipura des Marais*, *Cipura caludusa*, et l'a figuré (Plantes de la Guiane, T. XIII).

Le nom de *Cipura* a été changé, on ne sait trop pourquoi, par Schreber et Willdenow, en celui de *Martica*; les caractères que ces auteurs ont donnés étant copiés sur ceux du *Cipura* d'Aublet. (G.N.)

CIQUE. BOT. PHAN. Nom de pays du Laurier vulgairement nommé bois Amande. (B.)

CIRCA-DAVETHA. BOT. PHAN. Nom que les Portugais de l'Inde donnent au Tali de Rhéede, *V.* ce mot. (B.)

CIRCAËTE. OIS. (Vieillot.) Genre de la méthode de Vieillot, qui a pour type l'Aigle Jean-le-Blanc, *Falco gallicus*, L. *V.* AIGLE. (DR..Z.)

\*CIRCANEAE. OIS. Syn. présumé de la Soubuse (Busard Saint-Martin emelle), *Falco Pygargus*, L. *V.* FAUCON, division des Busards. (DR..Z.)

CIRCEE. *Circea*. BOT. PHAN. Famille des Onagracées, Diandrie Monogynie de Linné. Ce genre, fondé par Tournefort et admis par tous les auteurs qui l'ont suivi, est ainsi caractérisé: calice adhérent à l'ovaire, présentant un limbe court, caduc et diphyllé; pétales et étamines aussi au nombre de deux; stigmate émarginé; capsule pyriforme, bérissée de poils écailleux à deux loges

dispermes et indéhiscentes. Les *Circeas* sont des Plantes herbacées, voisines du genre *Lopezia* de Cavanilles; elles habitent les forêts et les lieux ombragés et montagneux de l'hémisphère boréal. Les deux ou trois espèces connues jusqu'à présent se trouvent en Europe. La plus remarquable et la plus commune est la: CIRCEE DE PARIS, *Circea lutetiana*, L., nommée ainsi parce que les premiers auteurs qui l'ont décrite, tels que Lobel et les Bauhins, l'ont rencontrée près de la capitale de la France. Cette Plante néanmoins abonde presque partout, et n'aurait par conséquent pas dû recevoir pour nom spécifique celui d'une localité spéciale. Elle a une tige droite, rametuse supérieurement, et haute de cinq décimètres; ses feuilles sont opposées, pétiolées, ovales, pointues et à peine dentées sur leurs bords. Elle porte au sommet de la tige et des ramuscules de petites fleurs, tantôt blanches, tantôt légèrement rouges, disposées en grappes simples et allongées. On la nomme vulgairement en France Herbe de Saint-Etienne. Dans les Alpes on rencontre la *Circee alpine*, *Circea alpina*, L., qui diffère de la précédente, surtout par ses feuilles cordiformes et dentées. La *Circee intermédiaire*, *Circea intermedia*, Persoon, est regardée par De Candolle comme une variété de celle-ci. Le nom de *Circee* qui rappelle celui de la plus fameuse enchanteresse de la mythologie, indique que cette Plante était autrefois employée à des usages superstitieux. Elle est aussi vulgairement nommée Herbe aux Magiciens. Les anciens botanistes l'appelaient également *Solanifolia* et *Ocy-mastrum*. (G.N.)

CIRCELLE. OIS. Syn. vulgaire de Sarcelle. *V.* CANARD.

CIRCIA. OIS. Syn. latin de la Sarcelle d'été, *Anas Circia*, L. *V.* CANARD. (DR..Z.)

\*CIRCINARIA. BOT. CRYPT. (*Lichens*.) Link et Achar ont, chacun de leur côté, constitué sous ce

nom un genre dans la famille des Lichens. Celui du premier a pour type l'*Urceolaria Hoffmanni* Ach., et présente pour caractères principaux : un conceptacle globuleux pellucide, et un thallus crustacé vésiculeux. Le groupe de Lichens institué par Acharius, est une division de son genre *PARMÉLIE*. *V.* ce mot. (AD. B.)

\* **CIRCINÉ** ou **CIRCINAL**. *Circinalis*. BOT. On dit des feuilles qu'elles sont circinées, circinales ou roulées en crosse, quand elles sont roulées sur elles-mêmes de haut en bas. Cette circonstance s'observe dans toutes les Plantes de la famille des Fougères, et en forme un des caractères les plus tranchés. On trouve aussi des exemples de feuilles circinées dans les *Drosera* cées. (A. B.)

\* **CIRCINOTRICHUM**. BOT. CRYPT. (*Macédonées*.) Ce genre, fondé par Nées (*Syst. der Schw.*, pars 2, p. 18), ne renferme encore qu'une seule espèce de moisissure extrêmement petite, venant sur les feuilles sèches de Chênes. Il nous paraît très-voisin du genre *Fusisporium* du même auteur, avec lequel on doit peut-être le réunir. Il n'en diffère que par ses filaments plus solides, recourbés et entrecroisés. Nées l'a ainsi caractérisé : filaments décumbens, très-fins, recourbés et entrecroisés, opaques ; sporules éparées, très-fugaces, fusiformes, transparentes.

Le *Circinotrichum maculiforme* forme sur les feuilles de Chênes tombées et à demi-pourries de petites taches d'un noir verdâtre. (AD. B.)

**CIRCONSCRIPTION**. *Circumscription*. BOT. En botanique on se sert de cette expression pour exprimer la figure ou la forme générale d'un corps ou d'un organe. La circonscription d'une feuille, par exemple, est la ligne qui passe sur le sommet de tous les points proéminens de son contour, abstraction faite des sinus plus ou moins profonds que les angles de cette feuille laissent entre eux. C'est ainsi que l'on dit de la

feuille du Chêne qu'elle est obovale en négligeant les sinuosités que présente son bord. (A. B.)

**CIRCOS**. ois. Syn. grec du Busa Harpaye, *Falco rufus*, L. *V.* *Falcon*, division des Busards. (DR. Z.)

**CIRCOS**. échin. Quelques orthographes ont donné ce nom, par lequel Pline avait mentionné une pierre impossible à reconnaître, à des pointes ou épines d'Oursins fossiles fait en forme de Poire. On les regardait en général comme appartenant à des espèces du genre *Ecdarites* de Lamarck. (LAM. X.)

**CIRCULATION**. ZOO. On appelle ainsi tout mouvement progressif imprimé dans un système de vaisseaux circulaires ou non, à tout fluide provenant, soit des produits de la digestion des Animaux, soit de la décomposition de leurs tissus. Le mot *Circulation* ne suppose donc pas que le mouvement des fluides accomplisse nécessairement une révolution complète. On va voir aussi que les fluides ne restent pas identiques sur tous les points des distances qu'ils parcourent. Ce sont ces transmutations subies par les fluides en mouvement qui ont fait distinguer plusieurs *Circulations*. Cette distinction est plausible dans les Mammifères et quelques Reptiles, pourvu qu'on l'applique autrement qu'on ne l'a fait jusqu'ici ; mais, dans les Oiseaux, les Poissons et le reste des Animaux, il n'y a qu'une seule *Circulation*, eu égard soit à la nature des fluides, soit à la continuité circulaire des vaisseaux.

Dans les Mammifères, le système des vaisseaux circulatoires est le plus compliqué. Il se compose de quatre systèmes secondaires : 1° les vaisseaux lactés ou chyleux, 2° les vaisseaux lymphatiques, 3° les veines, 4° les artères. Les deux premiers systèmes considérés sous le rapport de l'origine et de la terminaison du cours de leurs fluides, ont une projection rectiligne et ne sont parcourus qu'une fois par les mêmes molécules. Les deux derniers, continus l'un à l'autre par

leurs deux extrémités , forment réellement un seul système circulaire qu'un mouvement révolutif fait parcourir un nombre de fois indéterminé et nécessairement variable , par les fluides qui y sont contenus. Ce mouvement révolutif constitue réellement et uniquement la Circulation : car les molécules , parties d'un point donné , y reviennent nécessairement par l'effet du mouvement imprimé aux fluides dont elles font partie. Or , ce qu'on appelait autrefois grande et petite Circulation n'était qu'une division idéale de ce mouvement révolutif en deux arcs inégaux, l'un répondant au poumon , l'autre à tout le corps.

A l'exemple de Magendie qui va nous servir de guide dans cet article, nous reconnaissons, eu égard à la différence des fluides et de leur origine , des vaisseaux où ces fluides circulent , et des forces motrices qui les animent, trois Circulations : celle du chyle, celle de la lymphe et celle du sang.

#### 1. De la Circulation ou mouvement progressif du chyle.

Tout le long des surfaces intestinales, naissent, par des orifices imperceptibles, des vaisseaux très-nombreux et très-déliés, transparents dès qu'on peut les reconnaître, communiquant fréquemment entre eux , en formant des réseaux à mailles assez fines, grossissant et diminuant de nombre, en s'éloignant de l'intestin , finissant par constituer des troncs isolés , contigus aux artères , et quelquefois projetés dans les intervalles qui les séparent. Ces vaisseaux parviennent ainsi aux glandes mésentériques, petits corps lenticulaires d'autant moins volumineux et plus nombreux qu'ils sont situés plus près de l'intestin , entre les feuillets du péritoine constituant les mésentères. La structure de ces glandes est peu connue; elles reçoivent beaucoup de vaisseaux sanguins eu égard à leur volume, et sont douées d'une assez vive sensibilité. Leur parenchyme, peu consistant, paraît ré-

sulter de l'entrelacement des vaisseaux sanguins et chyleux qui y pénètrent dans un état de ténuité extrême. Tout ce que l'on sait de cet entrelacement, c'est qu'il n'empêche pas les injections poussées dans les uns comme dans les autres de traverser facilement la glande. Il sort de ces glandes des vaisseaux plus gros que ceux qui y arrivent des intestins, mais qui semblent de même structure. Ces vaisseaux, dirigés vers la colonne vertébrale , fréquemment anastomosés et accolés aux artères et aux veines, se terminent tous au canal thorachique qui, étendu du bassin jusqu'à la veine sous-clavière, passe entre les piliers du diaphragme à côté de l'aorte. On y observe des valvules disposées de manière à s'opposer au mouvement rétrograde du fluide. Tous ces canaux sont formés de deux membranes dont l'extérieure semble fibreuse, et est douée d'une résistance bien disproportionnée à son épaisseur.

Quoi qu'il en soit du mécanisme par lequel le chyle passe de l'intestin dans les vaisseaux chyleux, il est certain que ce mécanisme continue encore d'agir après la mort , comme l'a observé Magendie. Une fois dans les vaisseaux chyleux, les causes de son mouvement progressif sont : 1° l'effet préparé de la cause qui l'a introduit dans les vaisseaux, 2° la contractilité des parois qui tendent à revenir sur l'axe des vaisseaux, 3° la pression des muscles abdominaux et du diaphragme, et celle des artères dilatés dans leur diastole. On reconnaît l'effet de ces dernières causes en voyant la cours du chyle s'accélérer dans le canal thorachique ouvert lors de l'expiration de l'Animal, ou lorsqu'on lui comprime le ventre avec la main. On voit en même temps que la vitesse du courant est bien moindre que celle du sang des veines. Magendie a observé que cette vitesse croît en proportion de la quantité de chyle qui se forme dans l'intestin pour un temps donné. Il a vu sur un Chien d'une taille ordinaire, durant une digestion de

matières animales prises à discrétion, l'incision du canal thorachique verser une demi-once de liquide en cinq minutes; or cet écoulement continue tant que dure la formation du chyle, c'est-à-dire pendant plusieurs heures: il entre donc six onces de chyle par heure dans le système veineux d'un Chien de moyenne taille.

La quantité de chyle et sa vitesse doivent donc croître en raison de la vitesse de la digestion et de la grandeur de l'Animal.

On ignore l'influence des glandes mésentériques sur le cours du chyle. Nous croyons inutile d'énoncer ici toutes les questions, toutes les suppositions que les physiologistes spéculatifs ont accumulées au sujet de la Circulation du chyle. Néanmoins il paraît, d'après des expériences de Tiedmann et Gmelin, qu'au-delà des glandes mésentériques le chyle offre une couleur rougeâtre, se coagule entièrement, et laisse déposer un cruor d'un rouge écarlate, tandis qu'en-deçà il ne rougissait pas, ne se congelait pas, et ne laissait déposer qu'une petite pellicule jaunâtre.

Le canal thorachique est la seule route par laquelle le chyle pénètre dans les veines; mais ce canal s'y ouvre souvent par plusieurs branches; ce qui explique comment des Animaux ont pu survivre à la ligature du canal thorachique présumé unique. Dupuytren a vu en effet, que dans les Chevaux qui avaient survécu à cette expérience, le canal thorachique subissait une ou plusieurs divisions au-dessus de la ligature.

Magendie a prouvé que les vaisseaux chylifères transportaient uniquement le chyle, et que les boissons et autres matières passaient directement par les veines.

## 2°. Du mouvement progressif de la lymphe.

Tout ce qu'on sait de l'origine des vaisseaux lymphatiques, c'est qu'ils naissent par des racines très-déliées dans l'épaisseur des membranes et du

tissu cellulaire, ainsi que dans le parenchyme des organes où on peut supposer qu'ils se continuent avec l'extrémité des artères; car il arrive quelquefois qu'une injection pousse par une artère passante dans les lymphatiques de la partie où elle se distribue. Ces vaisseaux sont garnis de valvules ou soupapes qui font obstacle au mouvement rétrograde du courant de leurs fluides, comme nous l'avons déjà observé dans les vaisseaux chyleux dont ils ont aussi la structure. Ils existent dans presque tous les organes, excepté dans le système cérébro-spinal et ses enveloppes. On n'en a pu découvrir non plus dans l'œil ni dans l'oreille interne.

Aux membres ces vaisseaux forment deux plans, l'un superficiel, l'autre profond. Celui-ci règne surtout entre les muscles autour des nerfs et des gros vaisseaux. Tous se dirigent vers la partie supérieure des membres, en diminuant de nombre, augmentant de volume, et s'engagent dans les glandes axillaires et inguinales, avant de pénétrer, soit dans la poitrine, soit dans l'abdomen. Tous les vaisseaux lymphatiques du tronc et des membres aboutissent au canal thorachique; il n'y a que ceux de l'extérieur de la tête et du cou qui se terminent, chacun de leur côté, par un vaisseau assez volumineux, dans la veine sous-clavière correspondante. Les glandes ou ganglions qui interceptent les vaisseaux lymphatiques sur leur longueur ont la même structure que les glandes mésentériques.

Avant la découverte des vaisseaux lymphatiques, on croyait que les veines étaient partout les organes de l'absorption. G. Hunter, l'un des anatomistes qui a le plus découvert de ces vaisseaux, a surtout contribué à établir la doctrine que les lymphatiques étaient les organes de l'absorption; et cette doctrine a été admise jusqu'à Magendie. Voici comment celui-ci en a démontré la fausseté: on d'abord, quant aux vaisseaux chyleux, il a prouvé qu'aucune parcelle de

matières colorantes, odorantes ou vénéneuses, ne pouvait être retrouvée dans le canal thorachique des Animaux à qui l'on avait fait avaler de ces substances, tandis qu'elles existaient dans le sang ou même dans les fluides formés par le sang; que les poisons agissaient aussi bien quand le canal thorachique était lié que quand il ne l'était pas; qu'une anse d'intestin ne tenant plus au corps que par une artère et une veine dont on avait même, par surcroît de précaution, enlevé la tunique celluleuse, l'absorption d'un poison qu'on y avait introduit y était aussi rapide qu'à l'ordinaire; que les matières colorantes injectées dans le péritoine ne passaient pas non plus par les vaisseaux lymphatiques. Or, déjà l'on aurait pu en conclure que les vaisseaux lymphatiques ne sont pas les organes de l'absorption, puisque ce phénomène s'opère dans le système cérébro-spinal et les membranes où ces vaisseaux n'existent pas. Voici comment il a prouvé que les lymphatiques des membres n'étaient pas non plus les organes de l'absorption. Il a séparé sur un Chien, après des ligatures convenables sur les vaisseaux sanguins, la cuisse d'avec le corps, en ne les laissant communiquer que par l'artère et la veine crurale, dont il avait enlevé la tunique celluleuse pour que l'on ne pût croire, qu'il y subsistât le moindre vaisseau lymphatique. Il a enfoncé dans la patte quelques grains d'Opas-tité; l'Animal est mort aussi vite que si la cuisse avait été dans son intégrité. Il fit plus; il interrompit la continuité des parois artérielle et veineuse par un tube de verre substitué à un tronçon d'artère et de veine qu'il avait coupé, et l'empoisonnement se fit aussi promptement que si toutes les communications vasculaires et nerveuses du membre avec le tronc avaient été dans leur état naturel.

Or, en considérant, 1<sup>o</sup> la nature de la lymphé qui a la plus grande analogie avec le sang; 2<sup>o</sup> la communication que l'anatomie démontre en-

tre la terminaison des artères et les racines des lymphatiques; et 3<sup>o</sup> la prompte et facile pénétration des substances colorantes et salines dans les vaisseaux lymphatiques, il semble très-probable à Magendie que la lymphé est une partie du sang. Il observe enfin que les vaisseaux lymphatiques sont loin de contenir toujours de la lymphé; que ceux de l'abdomen en contiennent plus souvent que les autres; qu'enfin le canal thorachique en contient constamment; qu'à mesure que l'abstinence se prolonge chez un Chien, la lymphé devient de plus en plus rouge; qu'après un jeûne de huit jours, elle a presque la couleur du sang, et qu'alors aussi elle est plus abondante; qu'elle marche très-lentement dans ses vaisseaux; que si en le comprimant, on en a vidé un, il faut quelquefois plus d'une demi-heure avant qu'il se remplisse de nouveau, et que souvent il reste vide; que néanmoins ces vaisseaux sont contractiles; que cette contractilité est cause qu'on les trouve presque toujours vides peu de temps après la mort. Cette contractilité et les pressions qui résultent de la contraction des muscles et du battement des artères, enfin un reste d'impulsion communiquée et par le cœur et par l'élasticité des artères, puisque la communication de celles-ci avec les radicules lymphatiques est démontrée, telles nous paraissent être les causes de la progression de la lymphé. D'après le petit nombre et le peu de certitude de nos connaissances sur l'origine et le cours de la lymphé, on peut juger quel degré de confiance est dû à ces théories médicales qui supposent que la lymphé est épaissie, obstruée, et qui opèrent en conséquence.

Et la lymphé et le chyle ne subsistent donc pas un mouvement révolutif. Parvenus dans la veine sous-clavière, ils se mêlent avec le sang qui seul subit une véritable Circulation parmi les fluides animaux. Dès l'instant de leur pénétration dans le système veineux, il n'y a plus qu'un

seul fluide assujéti dans son cours à deux ordres de causes, les unes purement mécaniques et qui résultent de la construction même des canaux qu'il parcourt, les autres vitales et qui résultent des élaborations imprimées au sang dans les différens organes qu'il traverse. Ce n'est que des premières que nous allons traiter ici : pour les autres, V. NUTRITION et SÉCRÉTIONS.

Le système veineux naît dans tous les organes par des petits tuyaux extrêmement ténus lorsqu'ils deviennent sensibles, et formant de nombreux réseaux. Ces petits tuyaux vont en augmentant de volume et diminuant de nombre, dans un rapport tel que la capacité du système diminue d'autant plus que les tuyaux grossissent. Or, d'après ce principe que, lorsqu'un liquide coule à plein tuyau, la quantité de ce liquide qui dans un instant donné traverse les différentes sections du tuyau, doit être partout la même, et que lorsque le tuyau va en s'élargissant, la vitesse diminue, qu'elle s'accroît quand le tuyau va en se rétrécissant, il suit que la vitesse du courant veineux croît d'autant plus que la distance à l'origine du système est plus grande, et comme l'introduction du sang dans les veines se fait d'une manière certaine, il suit que le mouvement circulaire serait très-uniforme, s'il n'y avait d'autre cause du mouvement que la force qui détermine l'introduction du sang, et que celle qui résulte de la diminution d'espace dans les tuyaux parcourus. Voici les causes auxiliaires de la Circulation veineuse :

1°. Les parois des veines sont très-peu élastiques. Elles ne sont pas contractiles comme on l'avait cru ; mais leur élasticité n'est pas assez grande pour qu'elles puissent se vider, et ensuite il y en a dont les parois sont adhérentes, telles que celles des os, de la dure-mère, du testicule, etc. Il est évident que l'élasticité est d'autant plus grande que les parois sont plus épaisses. Or, l'épaisseur est d'autant

plus grande que les veines sont plus superficielles.

2°. Les pressions exercées sur les veines par les diverses membranes, les aponévroses et même par la peau par les muscles, lors de leurs contractions ; par l'aplissement de la poitrine lors de l'inspiration ; par le battant même des artères collatérales et comme il y a presque toujours plus de la moitié des tuyaux veineux dans lesquels le sang doit marcher contre sa propre pesanteur, quel qu'il soit le mode de station des Animaux les veines où cela doit avoir lieu sont munies, de distance en distance, de petites soupapes formées par le plicement de la membrane interne, dont le plan est incliné en bas à partir de leur bord libre. Ces soupapes se nomment valvules et résistent à la gravité de la colonne de liquide superposée qu'elles empêchent de presser sur les colonnes inférieures.

D'après les nombreuses combinaisons des deux ordres de causes variables dont il vient d'être question on voit que la vitesse du cours du sang doit être fort inégale dans les différentes régions du corps ; à quoi il faut ajouter que des organes entiers presque uniquement composés de veines, tels que la rate, les corps caverneux et la glande choroïdienne des Poissons, etc., paraissent calculés pour le plus grand ralentissement possible du sang. Qu'il en soit, le sang provenant de tous les organes se rend par de grandes veines appelées Caves de l'oreillette du cœur pulmonaire et de tous les Animaux vertébrés (le CŒUR). Les mouvemens de cette oreillette, dont les parois ont contractement chez tous les Animaux une épaisseur bien moindre que celle du ventricule, sont inverses de ceux du ventricule. Elle se dilate quand celui-ci se resserre, et réciproquement ; comme cette dilatation est active, se continue long-temps même après l'extraction de l'organe ; et le sang qu'il est tout-à-fait vide, ainsi nous l'avons observé sur des Ve-



és de toutes les classes, il suit que vide formé au moment de la dilatation doit être encore compté parmi les causes auxiliaires du mouvement progressif du sang. Si la dilatation des cavités du cœur est active, la contraction l'est à plus forte raison : ainsi ce double mouvement, dont l'impulsion est tout-à-fait indépendante et du liquide circulant et des chocs du voisinage, forme-t-

la cause initiale de la Circulation. L'oreillette étant contractée, le sang n'y peut pénétrer, et comme on courant dans les veines est continu, l'obstacle de l'oreillette fermée se fait refluer plus ou moins loin dans les veines en surmontant leur élasticité. En outre même que l'oreillette se contracte, une partie du sang qu'elle contient est projetée en arrière, et cette onde rétrograde et le reflux du sang qui arrive après la contraction déterminent, à des distances variables, des ondulations que, dans l'Homme, on appelle poulx veineux. C'est dans les Mammifères plongeurs que ce poulx ou reflux veineux est porté au plus haut degré. Comme, pendant tout le temps que l'Animal est sous l'eau, le sang ne peut passer par le poumon; et par conséquent par l'artère pulmonaire ou le ventricule correspondant, ou, du moins, comme il n'y en passe qu'une très-petite partie, le sang accumulé à l'oreillette actuellement fermée, recule et refoule des ondes de liquide sur une distance rétrograde d'autant plus grande que la respiration est plus long-temps suspendue. Il existe en outre dans les Cétacés, pour suffire à ce refoulement, d'immenses réservoirs veineux tout le long de la cavité du canal vertébral. Ces canaux ou sinus veineux sont pleins d'anastomoses; c'est à eux qu'est réservé l'excès d'amplitude du canal vertébral qui, dans tous ces Animaux, est loin de représenter une mesure proportionnelle du volume de la moelle épinière.

A l'instant où l'oreillette se dilate, le ventricule se contracte et presse

concentriquement le sang qui n'a que deux issues; la postérieure lui est fermée par l'abaissement de trois grandes soupapes appelées valvules trigloclines : l'abaissement de ces soupapes est borné par des cordes tendineuses fixées d'une part à leur sommet, et de l'autre à des piliers charnus, saillans du pourtour du ventricule; mais, en s'abaissant, tout le sang contenu dans l'espace conique, qu'interceptent les trois soupapes, est refoulé dans l'oreillette; tout le sang qui se trouvait adossé, aux surfaces ventriculaires des soupapes est alors chassé directement, ou réfléchi par la surface de ces soupapes dans l'artère pulmonaire, en surmontant trois autres petites soupapes (valvules sigmoïdes) qui servaient d'adossement à la colonne sur laquelle réagissait l'élasticité de cette artère.

Outre qu'une partie du sang contenu au moment de la dilatation, quitte dans l'oreillette, soit dans le ventricule, reflue en arrière, tout l'onde de ce reflux n'est pas, encore projeté en avant; presque jamais la cavité ne se vide entièrement; on voit donc que l'onde projetée par le ventricule est assez petite. Il en résulte que chaque onde sortante, a subi plusieurs fois la contraction de chaque cavité, et que le mélange de ses molécules a pu se faire d'une manière bien plus intime. Il est probable que les piliers charnus qui traversent le ventricule contribuent surtout à ce mélange, à ce battement du sang.

A l'instant où l'onde a été projetée du ventricule dans l'artère pulmonaire, l'élasticité des parois de ce vaisseau réagit vers l'ame, et le sang tend à s'échapper, soit vers le ventricule, soit vers le poumon. L'orifice cardiaque, étant très-large, donnerait passage à la plus grande partie sans l'abaissement des petites soupapes semi-lunaires dites valvules sigmoïdes, qui, en chevachant l'une sur l'autre, forment un obstacle complet au moindre reflux; et comme, tout tenus qu'ils sont, les petits tuyaux qui terminent l'artère pulmonaire, ont

une capacité bien inférieure à celle de cette artère, le sang, y trouvant plus d'espace, coule avec facilité. A la vitesse initiale imprimée par la contraction du ventricule; s'ajoute donc, pour faire passer le sang dans les veines pulmonaires à travers les capillaires du poumon, l'élasticité des parois de l'artère. Ce mouvement initial s'affaiblit en s'éloignant de son point de départ; aussi, lorsqu'on ouvre loin du cœur une petite division de l'artère pulmonaire, le jet de sang est continu; si l'ouverture est faite plus près et sur un plus gros vaisseau, le jet est saccadé, et d'autant plus, que la distance est moindre. Nous avertissons que la réaction des parois artérielles est purement physique, comme celle des veines, et n'a rien de vital ni de comparable à la contractilité musculaire. Tout ce que l'on a dit de l'action des capillaires du poumon est aussi conjectural que ce qu'on a dit de celle des capillaires généraux. Personne n'en a jamais rien vu. Nous n'en parlerons donc pas.

Le mécanisme du passage du sang des extrémités de l'artère pulmonaire jusqu'à l'artère aorte, est le même que celui qui vient d'être exposé pour le sang veineux, depuis les origines des veines jusqu'à l'artère pulmonaire; seulement la vitesse du courant est plus grande dans les veines pulmonaires que dans les veines générales, parce que la distance parcourue par la vitesse initiale est infiniment plus courte, et que les résistances sont beaucoup moindres. Le sang n'est pas non plus autant battu dans le ventricule aortique que dans le pulmonaire; aussi le premier manœuvre-t-il des piliers charnus qui traversent le second. L'excès d'épaisseur de ses parois, ainsi que l'élasticité bien supérieure des artères comparée à l'élasticité de l'artère pulmonaire, répondent aussi à la distance plus grande que le sang artériel doit parcourir.

On peut se faire une idée de la force de pression avec laquelle l'élas-

ticité des artères chasse le sang en mettant à découvert une grosse artère sur un Animal vivant, et y serrant une ligature. L'impulsion du cœur est ainsi supprimée. Or, l'artère finit pourtant par se vider tout-à-fait, et cela assez promptement; c'est le mouvement du cœur qui met en jeu l'élasticité des artères; le cours du sang est continu; le mouvement du cœur est intermittent, et comme le trajet des artères aux différents organes est infiniment varié pour la longueur et pour la direction; comme la direction peut subir des courbures ou des flexions angulaires de toute grandeur, et qu'en conséquence il est impossible que tous les organes reçoivent du sang avec la même vitesse, et conséquemment en proportion uniforme pour un temps donné, ils'ensuit la réalisation, dans la mécanique animale, d'un problème d'hydraulique très-compiqué, savoir la distribution continue et très-variée, pour la quantité et la vitesse, d'un même fluide contenu dans un seul système de tuyaux dont les parties sont de capacité et de longueur très-inégaies, au moyen d'un seul agent d'impulsion alternative. Nous avons déjà cité un exemple remarquable de ces appareils de ralentissement de la vitesse du sang dans la glande choroidienne des Poissons; c'est un pelotonnement, un entrelacement extrêmement fin de terminaisons artérielles et d'origines veineuses. L'objet de ce mécanisme est, comme nous l'avons exposé ailleurs; de mettre une plus grande quantité de sang en contact avec la rétine, et en même temps d'en atténuer, autant que possible, le choc contre cette membrane. Il y en a un autre exemple dans la membrane pie-mère qui enveloppe toutes les surfaces du système cérébro-spinal de tous les Vertébrés et surtout des Mammifères, et parmi ceux-ci, en particulier chez les Ruminans, dans le rete admirabile (réseau admirable) qui forment les artères carotides et vertébrales à leur entrée dans le crâne

**ROMAINS.** L'objet de cette altération si grande du courant sanguin, dû au nombre presque infini de petits filets presque capillaires, recourbés ou fléchis angulairement sur eux-mêmes dans toutes sortes de directions, et, de plus, anastomosés presque à chaque instant, de manière à ce que les vitesses s'usent en se rencontrant l'une contre l'autre; cet objet, disons-nous, est évidemment d'empêcher le choc trop violent que des courans rectilignes et d'un plus gros calibre imprimeraient à des organes aussi délicats et aussi fragiles que les membranes nerveuses de l'œil et du système cérébro-spinal.

Tel est le mécanisme de la Circulation dans les Mammifères où l'on pourrait encore distinguer une Circulation veineuse particulière, savoir celle du sang qui revient de tous les organes digestifs, et qui se fait par les veines affluentes au tronc de la veine-porte; au lieu que le sang de ce système parcourt des espaces progressivement rétrécis, il rentre, au-delà du tronc de la veine-porte proprement dite, dans des ramifications qui reproduisent celles qu'il avait déjà parcourues en-deçà de ce tronc. Le tronc de la veine-porte ainsi placé entre deux ordres de tuyaux ramifiés, et débarrassé d'agent d'impulsion, représente assez bien dans les Mammifères le mécanisme de la Circulation artérielle des Poissons: aussi la vitesse du courant est-elle moindre dans le système de la veine-porte que dans tous les autres. Car ici le fluide passe d'un espace plus petit dans un espace plus grand, mais où les frottemens et les résistances sont plus multipliés. Il paraît que ce ralentissement du cours du sang veineux intestinal a pour objet le mélange plus intime de tous les matériaux que l'absorption veineuse intestinale y a introduits, car l'injection de la bile pousse brusquement dans la veine crurale d'un Chien fait périr l'Animal en peu d'instans. Cette injection ne cause aucune gêne, si elle est poussée dans un tronc de la veine-porte.

Elle est aussi d'autant plus exempte d'inconvéniens qu'est la pousse plus doucement dans la veine crurale. Quoi qu'il en soit, la Circulation de la veine-porte ne diffère mécaniquement de celle des autres veines que par le ralentissement qui résulte de la multiplication des obstacles.

DANS LES OISEAUX, de même que dans les Poissons, il n'y a point de Circulation ni de la lymphe ni du chyle, ni même aucun vestige de systèmes chyleux et lymphatique. Les absorptions chyleuses et lymphatiques sont donc dans ces classes opérées par les extrémités veineuses: en qui était une raison de croire que l'absorption et la Circulation de la lymphe ne sont pas continuelles là où il existe des vaisseaux lymphatiques, et que toutes les absorptions intestinales se font pas par les vaisseaux chyleux là où ces vaisseaux existent, puisque les fonctions dont ils sont supposés être les agens, uniques, ne s'en font pas moins bien là où ces agens n'existent pas.

DANS LES POISSONS, soit osseux, soit cartilagineux, il n'y a pas de cœur aortique; mais le cœur pulmonaire y est doué d'un excès de volume et de contractilité, bien supérieur à ce qui existe dans les Mammifères et les Oiseaux. En outre, l'élasticité de l'artère branchiale ou pulmonaire, dont le jeu entretenu par l'action du cœur rend continu l'impulsion donnée par les contractions alternatives du cœur, acquiert un degré supérieur à ce qui existe dans tous les tissus que nous connaissons. Nous avons, sur des Baudroies et des Tétradons, longtemps après la mort, doublé toutes les dimensions du bulbe de l'artère branchiale, et comme cet appareil d'une pression si énergique est placé tout près des obstacles, la force ne subit d'autres pertes que celles qui résultent de l'insertion angulaire des divisions du tronc branchial. Le sang qui a traversé les branchies du Poisson a donc bien moins perdu de sa vitesse initiale que celui qui a traversé les poumons d'un Mammifère.

ou d'un Oiseau : or, cette vitesse initiale est de beaucoup plus grande dans le Poisson. Cet excès de vitesse est employé à donner au sang une impulsion capable de lui faire parcourir toutes les divisions de l'aorte. A la vérité, la projection rectiligne de ce vaisseau, tout le long du corps du Poisson, évite les ralentissemens ; mais, comme nous l'observons à l'occasion de la veine-porte, le sinus de l'artère aorte des Poissons étant intermédiaire à deux systèmes de ramifications, l'espace que parcourt au-delà du sinus le sang qui vient des branchies, allant toujours en augmentant en même temps que les résistances à son cours, sa vitesse serait peut-être insuffisante sans le supplément d'impulsion qu'il reçoit par la compression des branchies entre l'opercule et la surface de la grande clavicule. Cette compression qui agit sur l'origine et les premières divisions des veines branchiales est une cause d'impulsion dont il nous semble qu'on n'avait pas tenu compte jusqu'ici. Enfin, dans les Poissons, les divers états d'amplitude de la vessie aérienne, et surtout les contractions des muscles abdominaux qui agissent librement sur les veines caves et sur l'aorte, puisque ces vaisseaux n'ont un canal osseux commun que derrière l'abdomen, dans ce qu'on nomme la queue, sont encore des causes accessoires de leur Circulation.

DANS LES REPTILES, il n'y a aussi qu'un seul cœur, mais il est à la fois aortique et pulmonaire. La veine pulmonaire et les veines caves qui rapportent le sang de tout le corps, s'ouvrent dans la même oreillette. Les deux sangs se mélangent dans cette oreillette et dans le ventricule dont la masse est à proportion bien moindre que dans les Poissons. Cuvier a fait voir que le degré d'énergie musculaire des Animaux de cette classe était en raison inverse de la quantité de sang veineux qui passait dans leur aorte pour un temps donné ; et comme l'artère unique qui sort du cœur se divise en deux troncs, l'un pour le

poumon, l'autre pour l'aorte, plus l'aire de la section du tronc pulmonaire grandit, plus la quantité de respiration augmente, de sorte que le rapport des aires de section des deux troncs de l'aorte peut servir de mesure à cette énergie. A quoi il faut ajouter que chez les Sauriens, l'oreillette et le ventricule sont divisés par des cloisons dont l'effet est de diriger plus ou moins isolément le deux sortes de sang, chacun vers le tuyau transcardiaque correspondant. Dans ce cas aussi le tronc unique qui sort du cœur se divise plus près du ventricule, ou même si près qu'il y a pour ainsi dire, deux troncs qui en naissent.

DANS LES MOLLUSQUES pulmonés ou branchifères, il n'y a aussi qu'un cœur ; mais il est aortique et imprime l'impulsion à tout le sang qui revient des branchies ou des poumons. Tous ces Animaux ont des agens d'impulsion supplémentaire dans les contractions de leurs muscles, ou même dans les compressions qu'exerce le rapprochement des valves. Il n'y a que les Céphalopodes qui présentent un mécanisme particulier. Le cœur aortique n'y est pas adossé et adhérent au cœur branchial, et, de plus, il y a deux vrais cœurs branchiaux écartés l'un de l'autre, et dans l'intervalle desquels, mais un peu en avant, se trouve le cœur aortique. Il y a donc réellement dans les Céphalopodes deux cercles artériels et viennent, un pour chaque côté du corps. Le point de tangence de ces deux cercles est au cœur aortique (F. Cuvier, *Mém. sur les Moll. céphal.* pl. 2, 3 et 4).

DANS LES CRUSTACÉS, le mécanisme est à peu près le même que chez les Mollusques non céphalopodes, par la position du cœur entre les ramifications qui apportent le sang de l'organe respiratoire, et les ramifications qui le distribuent au corps.

DANS LES ARACHNIDES ET LES VERS, il n'y a plus de cœur sur aucun point de la longueur des veines ou des artères. Le mouvement progressif est alors beaucoup plus lent, et paraît

l'épandre de la pression des origines apillaires sur les fluides absorbés ; tout comme nous l'avons vu pour la Circulation du chyle dans les Mammifères.

DANS LES INSECTES, il n'y a plus de vaux ramifiés dont les extrémités eules dispensent les molécules nutritives aux organes. Tout le long du los de l'Animal règne un vaisseau usiforme, plein de liquide entretenu ans une oscillation continuelle, mais usceptible d'accélération et de ralentissement, par les contractions de ses arois, suivant l'axe, mais surtout uivant les diamètres du vaisseau. Ce vaisseau paraît être le réservoir du luide nutritif qui n'y arrive peut-être ue par imbibition. L'oscillation coninuelle du fluide, à en juger d'après e qui se passe dans le cœur des Animaux vertébrés, a peut-être pour ob et d'entretenir le mélange des molécules de fluide, et de s'opposer à leur précipitation. Marcel de Séries (Mém. du Muséum) a donné une description fort étendue du grand vaisseau lorsal des Insectes, malgré laquelle on ne connaît pas encore bien les usages de ce vaisseau et du liquide u'il contient (*V. INSECTES et NUTRITION*).

Le sang est rouge dans tous les ertébrés, mais sa température est oin d'être uniforme dans toutes eurs classes. Il est rouge aussi dans i plupart des Annelides, mais sa température n'y est pas supérieure à celle u milieu dans lequel existe l'Animal, on plus que chez les Mollusques u il n'est jamais rouge, où il n'est as non plus blanc, mais d'un blanc assant au blématique, au verdâtre, etc.

**MAMMIFÈRES, OISEAUX, REPTILES, POISSONS, MOLLUSQUES, ANELIDES, RESPIRATION et SANG.**

(A.D.MS.)

DANS LES ANIMAUX RAYONNÉS, n ne peut nier l'existence d'une Circulation ; cependant les fluides ne e bornent pas à aller du centre à e circonférence, ils reviennent au entre pour se porter de nouveau ans toutes les parties du corps. Cette

Circulation peut être prouvée, 1<sup>o</sup> par les mouvemens de contraction et de dilatation que presque tous los Zoophytes possèdent lorsqu'ils s'agitent ; des naturalistes célèbres l'ont considérée comme le produit d'une sorte de respiration ; 2<sup>o</sup> par l'existence d'organes particuliers qui ne sont ni tentaculaires, ni propres à la digestion ou à la reproduction ; 3<sup>o</sup> enfin, par la nécessité absolue de l'absorption de l'Oxigène, soit de l'Eau, soit de l'Air, qui ne peut provenir que de la décomposition de l'un de ces deux fluides ; absorption indispensable à l'entretien de la vie, et qui exige un appareil d'organes particulier. Ainsi, il doit exister, dans les Animaux rayonnés, une Circulation dans les fluides que l'on ne peut comparer à celle des Animaux des classes supérieures, mais qui n'en existe pas moins, que la nature a chargée des mêmes fonctions, et que l'on pourrait nommer, à cause du voile qui en couvre les agens, fausse Circulation, *Pseudo-Circulatio*.

DANS LES HYDROPHYTES. Quelques auteurs ont nommé Circulation les mouvemens des fluides dans les Plantes terrestres ; ces mouvemens sont encore peu connus : il n'y en a que deux qui soient bien déterminés ; celui de la sève ascendante, qui se répand également du centre à la circonférence, et celui du cambium et des sucs propres, qui semble se diriger de haut en bas ; les autres sont plus ou moins hypothétiques. Existe-t-il quelque chose d'analogue dans les Plantes marines ? La réponse sera affirmative pour les Fucacées, les Floridées et les Dictyotées, mais non pour les Ulvacées, ni pour la plupart des Hydrophytes que Linné regardait comme des Conerves. Il ne faut qu'observer la position des fructifications, la végétation des feuilles, et surtout celle des petites feuilles qui poussent à l'extrémité des nervures d'une grande feuille que l'on coupe, pour se convaincre de l'existence d'un système vasculaire dans les

Plantes marines, et d'une sorte de Circulation qui est à celle des Plantes terrestres ce qu'est peut-être celle d'un Polype à celle d'un Mammifère. Ce qu'il y a de certain, c'est la nécessité d'un mouvement particulier des fluides, par une route déterminée, pour expliquer les phénomènes que présentent les organes de la fructification et le développement des feuilles dans un grand nombre d'Hydrophytes. (LAM. X.)

### CIRCUM-AXILLES (NERVULES).

BOT. PHAN. Mirbel applique cette épithète aux vaisseaux du trophosperme, qu'il nomme NERVULES lorsqu'ils sont appliqués contre l'axe du fruit, et qu'ils s'en séparent à l'époque de la déhiscence. On en a des exemples dans l'Epilobe et l'Onagre. (A. R.)

CIRCURI. ois. Syn. sarde de la Caille, *Tetra Coturnix*, L. PARADRIX. (DR. Z.)

CIRCUS. ois. Nom latin donné par Cuvier à un sous-genre qui comprend les Busards. V. cette division au mot FALCON. (DR. Z.)

CIRE. ois. Nom donné à la membrane épaisse et charnue qui entoure la base du bec de certains Oiseaux et particulièrement des Accipitres. (DR. Z.)

CIRE. ZOOL. et BOT. Substance immédiate fournie par les deux règnes, et tellement répandue dans les parties des Végétaux, qu'on a cru pendant long-temps qu'elle était seulement transportée par les organes des Animaux pour être appropriée à leurs divers usages. En effet, la Cire des Plantes est, chimiquement parlant, identique avec celle des Abeilles. Elle forme la principale partie constituante du pollen ou des globules fécondateurs des anthères, la poussière glauque qui recouvre un grand nombre de fruits, celle qui recouvre la surface supérieure des feuilles de plusieurs Arbres, la fécule verte ou le parenchyme des Plantes herbacées, contiennent cette substance qu'il est

facile d'extraire par des lavages successifs à l'Eau et à l'Alcool, par la dissolution de l'Ammoniaque, et par la précipitation qu'un Acide faiblement étendu dans ces liqueurs. Malgré l'abondance de la Cire dans les ordres des Végétaux où les insectes vont sucer toute leur nourriture, abonde qui avait conduit naturellement à penser que la Cire produite par les Animaux était uniquement d'origine végétale, nous préférons nous rapporter aux observations d'Il et de Latreille, lesquelles constatent d'une manière péremptoire que cette substance est une véritable sécrétion animale d'autant plus abondante que les Plantes sur lesquelles les Abeilles butinent sont plus riches en parties sucrées. V. à ce sujet les observations de cette opinion présentées par tant de clarté à l'article ABEILLE. Avant que de parler des différents états sous lesquels cette substance naturelle nous est présentée, et de ses usages dans les arts, il convient d'examiner la composition chimique et les propriétés de la Cire. A l'état de reté, elle est solide, cassante, blanche ou même translucide, insipide et que inodore; sa pesanteur spécifique d'après Bostock, est de 0,96, comparée à celle de l'Eau distillée. Elle se décompose à 68° environ, elle se décompose en degré supérieur, et brûle en donnant une flamme blanche et brillante; son insolubilité dans l'Eau est absolue, l'Alcool et l'Ether n'en dissolvent qu'une légère quantité. Si traités avec des acides, les huiles fixes et volatiles ne sont qu'insolubles, dissolvans ne sont, qu'insolubles. Traitée avec la Soude et la Potasse, elle se saponifie, c'est-à-dire qu'elle est transformée en Margarates de ces bases. (Recherches physico-chimiques de Gay-Lussac qui l'ont analysée ont déterminé ainsi sa composition : Carbone 81,784, Hydrogène 12, Oxygène 5,544. La Cire pure, solide, paraît être formée en grande partie de stéarine ou de la matière consistante, un des élémens principaux des corps gras, découvert par Chevreul.

Le pollen des fleurs, la poussière glauque ou le vernis des fruits et des feuilles, quoique presque entièrement formés de Cire, ne sont point employés à son extraction; ces matières sont toujours en trop petite quantité pour qu'il y ait quelque avantage à les exploiter sous ce rapport; et d'ailleurs, dans nos climats, la Cire des Abeilles est un produit si commun, qu'on ne s'avise pas d'en aller chercher ailleurs. Mais, en Amérique, deux Arbres la fournissent en aussi grande quantité que les Abeilles en Europe. Nous voulons parler du *Myrica cerifera* et du *Ceroxylon andicola*. Le premier, qui est très-abondant aux États-Unis, a ses baies toutes recouvertes par une Cire d'une blancheur éclatante, et en donnant à peu près le quart de leur poids; on les fait bouillir dans l'eau, en ayant soin de les frotter contre les parois de la chaudière. On enlève la Cire qui s'est rassemblée à la surface du bain, on la passe à travers un linge et on la fond de nouveau. Cette Cire est verte, couleur qu'elle doit à une matière étrangère et qu'on peut lui enlever par l'Ether. D'autres *Myrica* produisent également de la Cire, mais en moindre quantité. V. le mot MYRICA, ainsi que le Mémoire de Cadet, publié dans les Annales de Chimie, T. XLIV, p. 140. Nous avons parlé de la Cire fournie par le *Ceroxylon andicola*, Humb. et Bonpl., de sa nature et de ses usages. V. le mot CÉROXYL. Le professeur Delille de Montpellier a lu dernièrement à l'Institut une Note sur le *Benincasa cerifera*, nouveau genre de Cucurbitacées, qui donne aussi une proportion considérable de cette substance.

La Plante dont Humboldt et Bonpland ont parlé dans leur Voyage, sous le nom d'ARBRE DE LA VACHE, *Arbol della Vacca* des indigènes de l'Amérique du sud, contient un suc épais qui paraît être une véritable émulsion cireuse. Sans parler en ce moment des autres matériaux singuliers qui composent ce lait, et dont l'analyse vient d'être faite sur les

lieux par Boussingault et Rivéro, il nous suffira d'annoncer que la Cire est le principe constituant le plus remarquable de ce lait, et qu'on peut l'en extraire par des procédés faciles. Les jeunes naturalistes qui ont transmis ces renseignements à l'Académie des sciences, assurent qu'ils se sont éclairés avec des botgies composées de cette Cire.

Les rayons ou bâtons de Cire, extraits des ruches des Abeilles, sont d'abord coupés par tranches que l'on moule pour en sortir des claires et que l'on a soin de retourner de temps en temps. On la fait chauffer ensuite avec de l'eau; et on la soumet à l'action de la presse dans des sacs de toile. La Cire est de nouveau fondue avec de l'eau, puis coulée dans des terrines de grès. Elle se fige à la surface de l'eau, et prend alors la forme de païas de Cire jaune, sous laquelle elle se vend ordinairement dans le commerce. L'odeur de la Cire brute, ainsi que sa couleur jaune, lui sont étrangères; elle les perd en effet lorsqu'on la blanchit par le procédé suivant: aplatie et mise en rubans au moyen d'un cylindre de bois que l'on fait mouvoir horizontalement sur elle dans une grande cuve d'eau, on l'expose à l'action combinée de l'air humide et de la vive lumière, en prenant les précautions convenables pour que le sol ne puisse la souiller; bientôt ses surfaces acquièrent de la blancheur; on les renouvelle en la fondant et la coulant de nouveau en rubans, et par des répétitions fréquentes de cette manipulation, on arrive à la priver complètement de son odeur et de sa couleur. Ce procédé, encore généralement usité, a l'inconvénient d'apporter de longs détails pour cette importante opération. On lui a substitué avec avantage le blanchiment par le Chlore. L'immersion des rubans dans cette substance en dissolution, ou leur exposition à l'action immédiate du Chlore gazeux, produisent en peu de temps ce que l'exposition sur le pré ne donne qu'à la longue. On pourrait accélérer le blanchiment en pas-

sont les rubans successivement dans une eau alcaline et dans le Ghlore liquide, ou en se servant d'un Chlore de Soude ou de Potasse.

Les usages de la Cire sont très-multiples : l'éclairage le plus brillant, le moins incommode, est donné par cette substance. La lumière des bougies est si belle, qu'elle rivalise avec celle du Gaz hydrogène le plus riche en Carbone; on a perfectionné leur fabrication en ces derniers temps, tellement que, sans perdre de leurs qualités comme combustibles lumineux, elles ont une élégance extérieure qui les fait servir d'ornement dans les salons. D'une translucidité parfaite, elles semblent être fabriquées avec l'Albâtre le plus pur; mais peut-être la Cire n'est-elle pas l'unique élément de ces bougies, d'autres substances grasses et très-blanches, le blanc de Baleine, par exemple, pouvant lui être associées sans lui faire perdre de ses qualités. On se sert de la Cire pour mouler une foule d'objets, pour imiter surtout les diverses pièces d'anatomie; sa facilité à se combiner avec les couleurs et à se teindre de toutes les nuances, sa mollesse et sa ductilité la rendent très-précieuse sous ce rapport. Enfin les pharmaciens en font un usage fort considérable, soit pour durcir leurs masses emplastiques, soit pour la préparation des pommades et cérats. (G.N.)

\* CIRHUELA. BOT. PHAN. Syn. espagnol de Prune, d'où le nom de *Cirhuella de Frayle* (Prune de Moine) donné dans les Antilles espagnoles à un *Malpighia*. (B.)

\* CIRI. BOT. PHAN. (Gaimard.) Synonyme timorien du Poivre Bétel, *Piper Belet*, L. (G.)

\* CIRIAPODA. CRUST. Nom brésilien qu'on a rapporté, sans fondement, au *Cancer Mandai*. (B.)

\* CIRICH. OIS. Syn. piémontais du Frézet, *Fringilla monticola*, L. V. GROS-BEC. (DR.Z.)

\* CIRIER. BOT. PHAN. Nom vulgaire d'un *Myrica*. V. ce mot. (B.)

CIRIER. BOT. CRYPT. Nom vulgaire de diverses espèces de Champignons qui ont la couleur de la Cire tels qu'une *Pezize* et que l'*Agaricus cereaceus* de Jacquin.

\* CIRIGOGNA. BOT. PHAN. (Sanguier.) Syn. de Chélidoine dans certains cantons de l'Italie, particulièrement dans le Véronais. (B.)

\* CIRITA-MARI. BOT. PHAN. (Rhéde.) Syn. indou de *Volkameria inermis*. V. CLÉRODENDRON. (B.)

CIRLO. OIS. Syn. italien du Bruant des haies, *Emberiza Cirlos*, L. BRUANT. (DR.Z.)

CIRLO-MATTO. OIS. Syn. italien du Bruant des prés, *Emberiza Cirlo*, L. V. BRUANT. (DR.Z.)

CIRLURE. OIS. V. ZIZI.

\* CIRMÈTRE. BOT. PHAN. (Dail champ.) Syn. arabe de Poire. (B.)

\* CIROLANE. *Cirolana*. CRUS. Genre de l'ordre des Isopodes, section des Ptérygibranches, établi par le docteur Leach, et ayant pour caractères propres : abdomen composé de six articles; yeux granulés. Ce genre appartient, suivant lui (Dict. des Sciences natur. T. XII, p. 547), à la troisième race de sa famille des Cymothoédés. Il ne comprend qu'une espèce, le *Cirolane* de Cranch, *Cir. Cranchii*. Son corps est lisse, ponctué; le dernier article de l'abdomen est triangulaire, arrondi à son extrémité; il habite les côtes occidentales de la Grande Bretagne, et a été découvert par Cranch. Ce genre, qui est voisin d'Eurydices, pourrait peut-être bien être réuni aux Cymothoés. V. ce mot. (AUD.)

\* CIRON. *Scirus ARACHN*. Genre de l'ordre des Trachéennes, établi par Hermann (Mém. aptérologique, 12, 15, 60), et correspondant au genre désigné par Latreille sous le nom de *Bdelle*. V. ce mot. (B.)

Le mot *Ciron*, appliqué vulgairement à de très-petits insectes du genre *Acarus* de Linné, paraît dériver du mot latin *Siro*, et devrait par consé-



ent s'écrire Siron. Latreille adopte l'orthographe, et il établit, sous nom de Siron, *Siro*, un genre particulier d'Arachnides que nous décrivons à son ordre alphabétique. V. SIRON. (AUD.)

**CIRQUINCHUM ET CIRQUINÇA.**  
AM. V. CIRQUINCHUM.

\* **CIRRATULE.** *Cirratulus*. ANNEL. genre établi par Lamarck (Hist. Nat. des Anim. sans vert. T. V. p. 300) dans sa famille des Echiurées, et tant, suivant lui, pour caractères : corps allongé, cylindrique, annelé, orné, sur les côtés du dos, d'une rangée de cirres sétacés, très-longs, tendus, presque dorsaux, et de deux rangées d'épines courtes, situées au-dessous; deux faisceaux de cirres aussi très-longs, opposés, avancés et insérés au-dessous du segment antérieur; bouche sous l'extrémité antérieure, avec un opercule arrondi; des yeux aux extrémités d'une ligne en croissant, située sur le segment capitiforme. Lamarck rapporte à ce genre, sous le nom de *Cirratule boreal*, *Cir. borealis*, le *Lumbricus cirratus* d'Othon Fabricius (*Fauna Groenland*, p. 281, fig. 5). Cette espèce habite les mers du Nord; on la trouve dans le sable.

Savigny (Syst. des Annelides, p. 102) propose pour cette espèce, à laquelle il en associe plusieurs autres, l'établissement d'un nouveau genre de sa famille des Lombrics, sous le nom de *Cirratula*. V. ce mot. (AUD.)

\* **CIRRE.** *Cirrus*. ANNEL. Nom employé par Savigny (Syst. des Annelides, p. 8) pour désigner des appendices qui accompagnent souvent les rames des pieds dans les Annelides, surtout dans l'ordre des Néréidées. Les Cirres sont des filets tubuleux, subarticulés, communément rétractiles, fort analogues aux antennes. Ce sont, dit Savigny, les antennes du corps. Cette comparaison est pleine de justesse, et nos propres travaux sur la nature des appendices du corps des Animaux articulés la confirment parfaitement (V. quelques-unes des propositions générales

qui font suite à l'article AILE). Les Cirres des rames dorsales ou Cirres supérieurs sont assez constamment plus longs que les Cirres inférieurs. Dans la famille des Aphroditides, les Cirres supérieurs sont nuls à la seconde paire de pieds, à la quatrième et à la cinquième; nuls encore à la septième, la neuvième, la onzième, et ainsi de suite jusqu'à la vingt-troisième ou même la vingt-cinquième inclusivement; au contraire, dans la famille des Néréidées, les Cirres supérieurs existent à tous les pieds sans interruption. Il en est de même dans la famille des Eunices et dans celle des Amphinomes; dans deux genres de cette famille, les Chloés et les Pleiones, il existe des Cirres surnuméraires; chez les premiers, un Cirre surnuméraire se voit aux rames supérieures des quatre à cinq premières paires de pieds, et chez les seconds, chaque rame supérieure en a un.

Dans le second ordre, celui des Serpulées, les Cirres manquent en tout ou en partie; lorsqu'ils existent, on n'en trouve qu'un à chaque pied; c'est ordinairement le Cirre supérieur.

Dans l'ordre des Lombriciens, il n'existe pas de pieds, et par conséquent plus de Cirres. Il en est de même du quatrième ordre ou celui des Hirudinées. (AUD.)

\* **CIRRES. POLYPT.** Et non *Cirrhés*. Péron a nommé ainsi des tentacules très-longs de plusieurs Méduses, ainsi que leurs divisions ou appendices. Bory de Saint-Vincent l'étend aux espèces de cils qu'on suppose garnir les organes rotatoires ou quelques autres parties de certains Infusoires. (LAM. I.)

\* **CIRRHES. ORS.** On donne ce nom à des plumes longues et assez roides, qui, chez quelques Oiseaux, garnissent les paupières et descendent le long du cou. Illiger étend cette qualification à toute tige très-longue, garnie ou non de barbes en forme de crins. (DELL.)

**CIRRHES. CIRRH.** bot. et mak. On désigne sous ce nom ainsi que sous celui

de *Frilles* et de *Mains*, des appendices filamenteux, simples ou rameux, en général tordus en spirale, et qui servent de support à certaines Plantes grimpantes. Les *Cirrhés* ne sont jamais que d'autres organes avortés, dont la position sert en général à reconnaître la nature. Ainsi dans les *Gesces*, les *Ovobes*, ils terminent la feuille et ne sont qu'un prolongement du pétiole commun; dans la *Vigue*, au contraire, ils naissent constamment en face de la feuille et sont les pédoncules d'une grappe dont les fleurs ont avorté. Dans certaines espèces de *Similax*, ils paraissent dus au développement considérable que prennent les stipules. En un mot, les *Cirrhés* ne sont pas un organe particulier, mais proviennent constamment d'un autre organe dégénéré ou accrus. (A. R.)

\* **CIRRHÉUX.** *Cirrhosus.* BOT. PHAN. Comme on emploie pour désigner les organes ou les Végétaux munis de *Cirrhés*. (A. R.)

**CIRRHINE.** rois. (Cuvier.) Sous-genre de *Cyprins*. V. ce mot. Il n'a nul rapport avec les *Esoces*, comme on l'a dit quelque part. (R.)

**CIRRHIPÈDE.** *Cirrhipeda.* MOLL. Les *Cirrhipèdes* dont *Blainville* a fait ses *Molluscarticulés* ou *Malakentozoaires* ont été placés par lui et *Lamarck* comme intermédiaires entre la grande série des Animaux articulés et des Mollusques conchifères (*Acéphales*, Cuv.). De tous les Animaux, ce sont ceux de cette classe qui ont le plus varié et dans la dénomination et dans la place qu'ils ont occupée. Linné, les plaçant avec les *Oscabriocees* et les *Pholades*, en a fait sa famille des *Multivalves* divisée en *Chiton*, *Lepas* et *Photas*. Bruguière sépare le genre *Lepas* de Linné en deux autres, le *Balanus* et l'*Anatifa*, et établit ainsi deux coupes qui sont admises encore aujourd'hui, mais comme ordres. V. *BALANE* et *ANATIFES*.

Pourquoi après Bosc nous a donné la description anatomique des Animaux qui habitent les *Lepas* de Lin-

né, les a placés parmi les *Sèches* leur conservant la dénomination de Bruguière, ayant trouvé les Animaux qui présentaient le même sembl d'organisation. Cuvier (R. Anim. T. II, p. 504) en a fait sixième ordre de Mollusques, les prochant des *Brachiopodes* avec lesquels il leur a trouvés des rapports en effet, le manteau, les bras cirr un pédicule dans la plupart (les *Artistes* de Bruguière) étaient des t de ressemblance assez grands pour mettre à côté des *Térébratules*, *Lingules* et des *Orbicules*.

Cette incertitude de quel on a eu placer convenablement dans la des êtres ceux de cette classe, voir qu'on en avait mal saisi les ports. Ce sont les travaux de *Blainville*, du docteur *Leach* et de *Mark*, qui doivent nous fixer à égard, et ce sera d'après eux que en présenterons les caractères et divisions.

Caractères. — Corps symétrique subglobuleux, conique, recourbé lui-même, terminé postérieurement par une sorte de queue conique, ticulée, pourvue de chaque côté de pèdices en forme de cirrès longs, cornés, articulés et sert comme de tentacules; tête distincte, sans yeux ni tentacules; bouche inférieure pourvue d'appendices latéraux (machoières) pairs, articulés, ciliés, organes de la respiration branchiaux, pairs, latéraux et nombre variable; des appendices base de quelques-uns; une membrane longitudinale, noueuse; circulaire par un cœur, et des vaisseaux; médian terminal à la base d'un tube, terminant les organes de la génération, munis d'un manteau enveloppe charnue, fendue postérieurement et inférieurement, soufée par un plus ou moins grand nombre de pièces calcaires tantôt soudées entre elles, tantôt mobiles.

D'après ces caractères, il est possible de placer ces Animaux, parmi les *Articulés*, comme *Lamarck*

l'avait d'abord fait en formant avec eux le premier ordre des Crustacés, sous le nom de Crustacés aveugles, soit avec les Annelides, puisqu'ils sont dépourvus d'anneaux transverses et de soies, soit avec les Mollusques conchifères, puisqu'ils n'en ont ni les deux valves articulées à charnière, ni les mâchoires, ni le système nerveux. Comme ils ne pouvaient entrer dans aucune de ces trois classes, il a fallu en faire une particulière qui est intermédiaire, comme nous l'avons déjà dit, entre la série des Animaux articulés et celle des Mollusques.

Le système nerveux de Cirrhipèdes est composé d'une même noueuse dont la structure est semblable à celle des Animaux articulés; leur cœur est très-distinct; l'olt a vu battre leur Cœur et leurs branchies sont hors de l'abdomen, fixés sous le manteau. Le manteau recouvre ordinairement la plus grande partie du corps, et fournit le pédoncule de ceux qui ne sont pas immédiatement fixes.

Tous les Cirrhipèdes sont fixés aux corps marins; soit par l'intermédiaire d'un tube plus ou moins long (les Cirrhipèdes pédonculés, Lamk.; les Campilozomates, Leach), soit sans aucun intermédiaire (les Cirrhipèdes sessiles, Lamk.; les Acamptozomates, Leach). C'est dans son épaisseur que se développent les pièces calcaires qui protègent l'Animal; il n'est jamais séparé en deux lobes, il se trouve seulement percé pour le passage des bras; ceux-ci varient quant à leur nombre; il y en a jusqu'à douze paires, six de chaque côté; ils sont inégaux, les supérieurs les plus longs, les inférieurs qui se rapprochent le plus de la bouche les plus courts. Les bras sont ciliés et formés de petites articulations cornées qui portent chacune un petit faisceau de cils. Ceux de ces Animaux qui sont immédiatement fixes paraissent avoir une coquille d'une seule pièce, quoique souvent elle soit composée de plusieurs parties réunies dans ces mêmes valves; deux ou quatre petites valves ferment à la volonté de l'Ani-

mal l'ouverture supérieure par laquelle il fait sortir ses bras; ces valves se nomment operculaires.

Lamarck (*Anim. sans vert.* T. 4, p. 582) divise les Cirrhipèdes en deux ordres, les Cirrhipèdes sessiles et les Cirrhipèdes pédonculés. Il divise ensuite les Cirrhipèdes sessiles en deux familles: 1° ceux qui ont un opercule quadrivalve, qui renferment les genres Tubicinelle, Coronulle, Balane et Acaste; 2° ceux qui ont un opercule bivalve, qui ne comprennent que deux genres, Pyrgoma et Oresie.

Le deuxième ordre, les Cirrhipèdes pédonculés, sont également divisés en deux familles: 1° ceux qui ont le corps incomplètement enveloppé par le manteau, et dont les pièces de la coquille sont coniques; cette première famille est composée de deux genres, l'Anatifa et le Pouce-Pied; 2° ceux qui ont le corps complètement enveloppé par le manteau qui offre une ouverture antérieure; les pièces de la coquille sont séparées. Ils ne comprennent que deux genres, Cineras et Otion. Leach a proposé la division suivante dont les coupes principales reposent sur les mêmes caractères, mais qui admet un plus grand nombre de genres que de nouvelles observations rendaient nécessaires:

I. Les CAMPYLOZOMATES, *Campylozomata* (Cirrhipèdes pédonculés, Lamk.), divisés en deux familles.

† Les CINÉRIDES, *Cinridea*. Pièces calcaires petites, le corps peu comprimé supérieurement. Elle renferme les genres Otion et Cineras. Ces mots.

†† Les POLLICIPÈDES, *Pollicipedeae*. Corps comprimé en dessus, couvert de pièces calcaires.

Genres: PENTALASNIE, SCALPELLE, POUCE-PIED et POLLICIFE.

II. Les ACAMPTOZOMATES, *Acamptozomata* (Cirrhipèdes sessiles, Lamk.), divisés en deux familles

† Les CORONULIDES, *Coronulideae*. Opercule quadrivalve; coquille de

six pièces. Elle comprend les trois genres Tubicinelle, Coronulle, Chélonobie.

++ Les **BALANIDES**, *Balanides*: Coquille terminée inférieurement par une base calcaire; opercule bivalve. Cette famille est divisée en deux sections.

1. Coquille dont la base est infundibuliforme.

Genres: PYRGOME, CREUSIE, ACASTE.

2. Coquille dont la base est variable dans la forme.

Genres: BALANE, CONIE, CLYSIE. V. ces mots.

Férussac, à l'article BALANE de ce Dictionnaire, n'a établi qu'une seule division des Cirrhipèdes sessiles qui nous paraît préférable aux premières. Il y propose deux nouveaux genres, le Polytreme parmi les Coronulides, et le genre Boscie parmi les Balanides. V. tous ces mots. (D..H.)

**CIRRHIS**. pois. Il est difficile de reconnaître à quel Poisson les anciens donnaient ce nom; il pourrait bien n'être pas le même que leur Cérus. V. ce nom. Il vit parmi les pierres des rivages. (B.)

**CIRRHITE**. *Cirrhités*. pois. Genre de l'ordre des Acanthoptérygiens, famille des Percoides de Cuvier, placé par Duméril dans les Dimérèdes de sa Zoologie analytique. Il fut d'abord formé par Commerson, et Lacépède, qui le trouva dans ses dessins, l'ayant conservé, il a été adopté depuis. Ses caractères consistent dans une seule dorsale; les rayons inférieurs des pectorales sont plus gros et plus longs que les autres, et non fourchus quoiqu'articulés; ils sont aussi libres à leur extrémité; leurs ventrales sont un peu plus en arrière que dans les autres Percoides. Leurs préopercules finement dentés, la disposition de leurs mâchoires et de leurs dents les rapprochent des Lutjans.

La mer des Indes nourrit plusieurs

espèces de ce genre, entre lesquelles on distingue:

Le **TACHETÉ**, *Cirrhités maculatus*, Lac., Poisson brunâtre orné de grandes taches blanches et de petites taches noires, ayant la caudale arrondie.

Le **PANTHÉON**, *Cirrhités Pantherinus*, que Lacépède avait décrit comme un Sparc, mais que Duméril a remis à sa place. Il n'a que des taches noires, particulièrement sur la tête, à la disposition desquelles ce Poisson doit le nom qu'il porte. (A.)

\* **CIRRHOPODES**. MOLL. Nom qu'on a employé pour les corps organisés renfermés dans le genre *Lepus* de Linné. On se sert plus ordinairement, d'après Lamarck, du nom de Cirrhipèdes. V. ce mot. (D..H.)

\* **CIRRHULOS**. pois. (Varinus) Même chose que Cirrhia. V. ce mot. (B.)

\* **CIRARIS**. ois. (Virgile.) Supposé du Biboreau, *Ardea Nycticorax*, L. V. Hénon. (B..I.)

**CIRRITES**. ois. et MIN. Les anciens donnaient ce nom à des pierres qu'ils disaient se trouver dans l'estomac de l'Épervier, et auxquelles on attribuait des vertus médicales. (B.)

\* **CIRROLUS**. BOT. CRYPT. (*Lyco-perdaceés*.) Martius a décrit sous ce nom (*Nova Acta Leopold. Carol.* x. p. 511) un petit Champignon qu'il a observé au Brésil sur les bois pourris. Il le caractérise ainsi: péridium simple, globuleux, membraneux, s'ouvrant irrégulièrement vers le sommet; columelle contournée en spirale, sortant avec élasticité du péridium, et recouverte de sporules globuleuses très-petites. On ne connaît qu'une seule espèce de ce genre qui paraît parfaitement distinct de tous ceux observés en Europe. Martius l'a nommé *Cirrolus flavus*. Son péridium est jaune et sa columelle d'une rose foncé. Il en est donné une bonne figure dans l'ouvrage cité ci-dessus. (AD. B.)

\* **CIRONIUS.** **POIS.** Syn. de *Cir-hite* tacheté. *F. CIRRHITE.* (B.)

\* **CIRRUS.** **MOLL.** Ce genre, établi par Sowerby (*Mineral Conchy.*) pour quelques Troques fossiles entièrement dépourvus d'ombilic, est ainsi caractérisé : coquille univalve en spirale, conique, sans columelle, formant en dessous un entonnoir dont les bords sont joints. Trois espèces seulement sont connues : le *Cirrus acutus*, le *Cirrus nodosus* et le *Cirrus plicatus*, qui sont figurées planche 141. Elles ont encore été trouvées qu'en Angleterre, dans le Derbyshire. (D. H.)

**CIRSE.** *Cirsium.* **BOT. PHAN.** Famille des Synanthérées, tribu des Cinarocéphales de Jussieu ou Carduacées de Richard, Syngénésie égale, L. En établissant ce genre, Tournefort lui donna des caractères tout différens de ceux qui lui ont été imposés ensuite par Gaertner et De Candolle, et dont nous allons faire mention. Cependant la plupart des espèces qu'il y avait fait entrer se sont trouvées appartenir au *Cirsium* des auteurs modernes, et cette concordance surprend d'autant plus que le genre de Tournefort était fondé sur un caractère vague et arbitraire, celui d'avoir les folioles de l'involucre écailleuses et non épineuses. Une telle organisation, outre qu'il est très-facile de démontrer qu'elle n'existe pas dans plusieurs Cirses de Tournefort, est fort ambiguë pour la plupart des espèces, car il est souvent impossible de fixer la ligne de démarcation entre la structure écailleuse de l'involucre et sa dégénérescence épineuse. Linné n'adopta point le genre Cirse, quoiqu'il constituât sous le nom de *Chnicus* un groupe d'espèces qui s'en rapprochait beaucoup. Willdenow a depuis réformé ce genre, de manière que son *Chnicus* correspond parfaitement avec le *Cirsium* dont nous allons parler. Ce fut Gaertner, qui, dans son immortel ouvrage sur les fruits, fixa positivement la note caractéristique de ce genre, en séparant des *Carduus* de

Linné toutes les Plantes dont l'aigrette est plumeuse. Ce changement a été adopté par l'auteur de la seconde édition de la Flore Française; et la série des Cinarocéphales qui sont décrites sous le nom de Cirses dans cet ouvrage, forme un groupe assez naturel; quoiqu'à la vérité son caractère ne soit pas fort rigoureux; l'aigrette de quelques vrais *Carduus* étant légèrement plumeuse, mais jamais aussi évidemment que dans les Cirses. Voici les caractères assignés à ceux-ci : involucre ventru ou cylindrique, composé d'écailles imbriquées, terminées en pointes acérées ou épineuses; tous les fleurons hermaphrodites; réceptacle couvert de paillettes; aigrette composée de poils plumeux, égaux et réunis en anneau par leur base.

Si l'on compare ce caractère générique avec celui des Chardons, on voit que ces deux genres ne diffèrent entre eux que par leur aigrette, plumeuse dans les premiers, et simplement poilue dans les seconds. Malgré que cette différence ne soit pas d'une réalité absolue, on ne peut s'empêcher néanmoins de reconnaître la liaison des espèces de Cirses entre elles; c'est peut-être ce qui a fait que Tournefort, quoique n'ayant pas aperçu leur signe le plus distinctif, les a groupées très-heureusement. Les Cirses sont des Herbes caulescentes, armées de feuilles fort épineuses, et qui habitent généralement les lieux incultes et montueux de l'hémisphère boréal.

On a partagé ce genre en trois sections d'après la décurrence des feuilles sur la tige et les couleurs jaunes ou purpurines des fleurs.

Nous pourrions en citer quelques espèces remarquables par leur port et la vivacité des couleurs de leurs fleurs et de leur tige. Tout hérissées qu'elles sont d'épines roides et piquantes, elles n'en produisent pas pour cela un effet désagréable à la vue; telles sont les *Cirsium Acarna*, *C. ferax*, *C. eriophorum*, etc. Les réceptacles de plusieurs espèces sont assez charnus pour être mangés, en

quelques pays, comme les Artichauts dans le nôtre.

Le *Cirsium arvense*, De Cand., *Serratula arvensis*, L., Plante connue sous le nom vulgaire de Chardon hémorrhoidal, a fait l'objet d'un Mémoire publié récemment par Cassini, où ce savant botaniste prétend que ses fleurs sont constamment dioïques, c'est-à-dire qu'elles possèdent quedes fleurs mâles par avortement. Cette assertion avait été produite d'un autre côté par Smith dans les Transactions de la Société Linnéenne de Londres, vol. XIII, 2<sup>e</sup> partie; mais nous avons pu nous convaincre que l'organisation anormale de cette espèce, quoique la plus fréquente, était loin d'être constante. Nous avons, en effet, rencontré plusieurs fois dans les environs de Paris le *C. arvense* avec des fleurs hermaphrodites, et c'est même en cet état que Richard père, ce célèbre et très-exact observateur, les a figurées dans un dessin que son fils possède actuellement.

Dans le supplément de la Flore Française, le *Cirsium alpinum* a été séparé pour constituer un nouveau genre nommé *Saussurea* en l'honneur des deux illustres naturalistes de Saussure père et fils, et la variété de cette Plante, si remarquable par la blancheur de la surface inférieure des feuilles qui contraste avec la verdure de la partie supérieure, a formé une espèce sous le nom de *Saussurea discolor*. V. SAUSSUREE. (G. N.)

CIRSELE. *Cirsellium*. BOT. PHAN. Ce genre, établi par Gaertner (*de Fructib.* 2, 8, p. 454, t. 163), est un démembrement de l'*Atractylis* de Linné. Comme il n'en diffère que par un caractère d'une faible importance, et qui consiste dans ses aigrettes longues et plumeuses, le *Cirsellium* n'a pas été généralement adopté. Gaertner en a décrit deux espèces, le *Cirsellium cancellatum* et le *C. humile*. V. ATTRACTYLIS. Il y réunit aussi quelques Carthames de Linné, à aigrettes paléacées. Lamarck a aussi figuré l'*Atractylis cancellata*, L., sous le nom de *Cirsellium cancellatum* (Illust. t. 662). (G. N.)

CIRTODAIRES. MOL. Dandin avait appliqué ce nom aux Coquilles dont Lamarck a fait son genre *Cyrcinère*. V. ce mot. (D. L.)

CIRUELA. BOT. PHAN. Pour *Ciruela*. V. ce mot.

\* CIRULUS. ois. Syn. d'*Emberiza*. *Cirlus*, L. V. BRUANT. (D. L.)

CIS. Cis. INS. Genre de l'ordre de Coléoptères, section des Tétramères, famille des Xylophages, établi par Latreille aux dépens des Dermestes et Vrillettes, avec lesquels tous les auteurs l'avaient confondu. Ce genre a pour caractères : antennes plus longues que la tête, de dix articles apicaux, terminées en une massue perlée; palpes maxillaires beaucoup plus grands que les labiaux et plus gros à leur extrémité; ceux-ci presque recouverts; corps ovale, rebordé et toujours déprimé. Ces Insectes sont encore remarquables par deux petites éminences situées sur la tête, et qui sont propres aux mâles. La tête est enfoncée en partie dans le prothorax; celui-ci est large; les pattes sont courtes, et les trois premiers articles des tarses sont égaux et velus. Sous tous ces rapports les Cis diffèrent des autres genres de la même famille; leurs habitudes sont aussi très-différentes de celles des Vrillettes et des Dermestes. En effet, ils vivent en société dans les Agarics et les Bolets desséchés des Arbres; ils se tiennent de préférence à la partie inférieure, et au moindre danger, ils replient leurs antennes et leurs pattes contre le corps, et se laissent tomber. Ces Insectes sont très-petits; on les rencontre principalement au printemps, et on en compte un assez grand nombre d'espèces. Dejean (Catal. des Coléopt. p. 17) en mentionne seize. Parmi elles, quelques-unes se trouvent aux environs de Paris. L'espèce suivante est la plus commune, et peut être considérée comme type du genre. Le Cis est le BOLET, *Cis Boleti* ou le *Dermestes Boleti* de Scopoli (*Entom. cur.*

17, n. 49), qui est le même que (*Inobium Boleti* de Fabricius, ne tire pas de la Vrille bidentée Olivier (*Entom.* T. II, n. 16, pl. 2, 5, A, B, C). *V.*, pour les autres espèces, Dejean (*loc. cit.*) et Latreille (*Crust. et Ins.* T. III, p. 11).

(AUD.)

CIS. BOT. PHAN. Syn. polonais de *mus baccata*. *V.* IF. (B.)

CIS ou CISTRÉ. GÉOL. Le Grès calciné ou les débris de cette roche réduite en gravois dont on sert, en Languedoc, pour amender les terres. (B.)

\* CISANO. ois. Syn. italien du cygne, *Anas Cygnus*, L. *V.* CANARD. (DR..Z.)

CISERRE. ois. Syn. vulgaire de la pie, *Turdus viscivorus*, L. *V.* CORBELE. (DR..Z.)

CISIOLA. ois. Syn. vénitien d'Hirolle. (DR..Z.)

CISNE. ois. Syn. espagnol du Cygne, *Anas Cygnus*, L. *V.* CANARD. (DR..Z.)

CISSA. ois. Syn. grec de la Pie, *Corvus Pica*, L. *V.* CORBEAU. (DR..Z.)

CISSAMPELOS. BOT. PHAN. Plumier décrit le premier, comme appartenant à un nouveau genre, une plante de Saint-Domingue, à laquelle il donna le nom de *Caapeba*. En lui ajoutant une seconde espèce, Linné constitua le genre *Cissampelos* qu'ont adopté Jussieu, Lamarck, Swartz, De Petit-Thouars et tous les botanistes modernes. Ce genre a été placé par Linné à côté du *Menispermum*, dont le savant a fait remarquer l'identité d'organisation dans le fruit et la ressemblance du port avec celui des *Cissampelos*; les auteurs qui ont observé ce nouveau genre avec soin, ont confirmé ce rapprochement. Selon De Petit-Thouars, chaque fleur du *Menispermum* pourrait être considérée comme formée par la réunion de plusieurs fleurs de *Cissam-*

pelos, de sorte que la plus grande affinité existe entre ces deux genres, et que leur classification ne saurait être douteuse. Dans l'ouvrage le plus récent que nous ayons sur ce genre et dont la science est redevable au professeur De Candolle, il continue donc de faire partie de la famille des *Ménispermées* ou *Ménispermacées*. Voici les caractères qui lui sont assignés par l'illustre botaniste que nous venons de citer : Plantes dioïques; les fleurs mâles ont un calice composé de quatre sépales ouverts et disposés en croix; point de corolle; des étamines monadelphes et formant une colonne, à quatre anthères (uniloculaires?) extrorsées dans les individus observés. Les fleurs femelles n'ont qu'un sépale situé latéralement, devant lequel on aperçoit un seul pétale hypogyne. Leur ovaire est unique, en forme d'œuf, et portant trois stigmates. Le fruit est une sorte de drupe ou de baie monosperme, réniforme ou ovée obliquement, c'est-à-dire que les stigmates, par suite de la courbure du fruit, sont très-rapprochés de sa base. Il n'y a point d'albumen dans la graine dont l'embryon est long, cylindrique et disposé circulairement; sa radicule est supérieure, ou, en d'autres termes, elle est dirigée vers la base des stigmates.

Les *Cissampelos* sont des Arbrisseaux sarmenteux à feuilles simples, pétiolées, orbiculées, ovales, cordiformes ou peltées, de différentes formes selon qu'elles se trouvent sur un individu mâle ou sur un individu femelle. Leur inflorescence est en grappes axillaires : celle des mâles offre le plus souvent la disposition en corymbes ou en grappes trichotomes, portant plusieurs petites fleurs au sommet des pédicelles, sans bractées ou pourvues de bractées très-petites. Chez les femelles, au contraire, on observe de larges bractées foliacées et alternes, dans l'aisselle de chacune desquelles se trouve un faisceau de pédicelles qui portent des fleurs dont la forme générale est celle de grappes simples et allongées. Le seul *Cissam-*

*pelos andromorpha*, D. C., a ses fleurs femelles disposées de même que les mâles; mais cette Plante pourroit faire un genre à part, lorsque dans la suite on en connoîtra mieux l'organisation; du moins telle est l'opinion de De Candolle. Dans le *Syst. Regni Vegetabilis naturale*, T. 1, p. 632, cet auteur décrit vingt-une espèces de *Cissampelos* qu'il divise en trois sections: la première se compose des espèces à fleurs femelles, munies de bractées et à feuilles peltées. On y remarque surtout le *C. tropaeolifolia*, D. C., Plante de l'Amérique méridionale, rapportée par Dombey et figurée, planche 98, dans le 1<sup>er</sup> volume des *Icones selectae* de M. Benjamin Delessert.

Le *Cissampelos Pareira*, Lamk., est une autre espèce de la même section. Cette Plante étant digne d'attention en raison d'un produit utile qu'elle fournit à la médecine, nous allons en faire connoître la phrase caractéristique: ses feuilles sont peltées presque en cœur, ovales, orbiculées, pubescentes, soyeuses sur leur surface inférieure; les grappes femelles sont plus longues que la feuille et les baies hérissées de longs poils épars. Elle habite les bois peu élevés des Antilles, du Brésil et de la république de Colombie. Pison assure que, dans le Brésil, on emploie avec beaucoup de succès le suc du *Cissampelos Pareira* contre la morsure des Serpens venimeux; mais sa racine, connue dans les pharmacies sous le nom de *Pareira brava*, lui donne beaucoup plus d'importance à nos yeux, quoiqu'elle soit aujourd'hui presque entièrement tombée en désuétude. Une de ses qualités physiques, sa saveur amère, puis douceâtre, et l'expérience qui prouvait son action diurétique et tonique, l'ont fait beaucoup employer autrefois dans la dysurie, la néphrite calculieuse, la goutte, etc. Si l'on n'accorde pas trop de confiance à ce remède, nous croyons qu'il peut être un adjuvant très-utile dans ces maladies contre lesquelles l'art médical a ordinairement si peu de succès. Cette racine

n'est pas tellement caractérisée, qu'elle puisse la distinguer facilement de celles mêlées avec elle dans le commerce; mais comme celles-ci appartiennent, d'après les conjectures de De Candolle, à d'autres Mésemacées, la sophistication ne semble ni dangereuse ni susceptible de diminuer l'efficacité du remède.

Dans la seconde section des *Cissampelos*, qui comprend les espèces à fleurs femelles munies de bractées à feuilles non peltées, se trouve le *Caapeba* de Linné, la plus ancienne espèce du genre. De Candolle y rapporte quelques *Cissampelos* de l'Encyclopédie méthodique, qui appartiennent peut-être à d'autres genres.

Enfin la troisième section ne contient qu'une seule Plante, le *C. andromorpha*, D. C., dont les fleurs femelles n'ont point de bractées, et qui formera probablement un genre particulier lorsque les fleurs mâles seront connues. Elle est figurée dans les *Icones selectae* de M. Benjamin Delessert, 1<sup>er</sup> vol., pl. 99. Les *Cissampelos* sont tous indigènes des contrées équinoxiales de l'ancien et du nouveau monde. (G. N.)

**CISSANTHEMON.** BOT. PHAN. (Dioscoride.) L'un des noms du *Clamen europæum*, L. (B.)

**CISSAPHYLLUM.** BOT. PHAN. C'est-à-dire *feuille de Lierre*. (Dioscoride.) Probablement le *Cyclanthera hederifolium*. (B.)

**CISSARON.** BOT. PHAN. (Dioscoride.) Un Ciste, selon Adanson; Lierre, selon d'autres. (B.)

**CISSION.** BOT. PHAN. (Dioscoride.) Syn. d'Asclépiade. (B.)

**CISSITE.** *Cissites.* INS. Genre de l'ordre des Coléoptères et de la famille des Horiales, établi par Latreille (Nouv. Dict. d'Hist. Nat., 1<sup>re</sup> édit., 1, tab. 1, p. 154) et converti depuis (Genera Crust. et Ins. T. II, p. 21) en une division du genre Horia. Cette division comprend les Hories dont la tête est plus étroite que le corselet.



Latreille y rapporte l'*Horia testacea* de Fabricius. *V. Mones.* (6.)

**CISSUS.** MIN. Plinè désigne sous ce nom une pierre qu'on appelait aussi Cithites et Ciytes, parce qu'on croyait y distinguer des empreintes semblables à des feuilles de Lierre. On ne sait ce dont il a voulu parler. (L'ÉC.)

**CISSOPIS.** OIS. *V. PILLURION.*

**CISSUS.** BOT. PHAN. Genre de la famille des Sarméntacées ou Vignes de Jussieu, et de la Tétrandrie Monogynie, L. Les espèces de ce genre ont été confondues avec les Vignes proprement dites par Tournefort. L'année commença le premier à les distinguer en un genre particulier admis ensuite par Jussieu, Lamarck et les botanistes nos contemporains, avec les caractères suivans : calice très-petit et à quatre divisions si courtes et si peu apparentes, que les bords paraissent entiers ; corolle à quatre pétales un peu concaves ; quatre étamines insérées sur un petit disque dans lequel l'ovaire est à moitié plongé ; celui-ci est libre et surmonté d'un seul style de la longueur des étamines, et d'un stigmate aigu ; baie arrondie, qui contient le plus souvent une, mais quelquefois plusieurs semences rondes ou anguleuses.

On a décrit un grand nombre d'espèces de *Cissus* ; mais comme ce genre est très-rapproché du *Vitis* par ses caractères, les auteurs ont commis souvent des erreurs en transportant d'un genre à l'autre les espèces ambiguës. Le nombre des divisions de la fleur ayant servi de caractère essentiel, on a dû séparer des *Cissus* les Plantes qui offrent une corolle à cinq pétales, comme dans les Vignes, mais qui s'en distinguent en ce que leurs pétales ne sont pas réunis en forme de coiffe avant l'anthèse ; c'est ce qu'a fait feu Richard père en établissant le genre *Ampelopsis* dont les caractères tiennent parfaitement le milieu entre les *Vitis* et les *Cissus*. L'unité ou le nombre toujours très-petit de graines que l'on a cru observer dans ces der-

niers dépend d'un avortement constant, puisque, selon les observations de Richard (*in Michx. Fl. Bor. Amer. T. 2, p. 159*) leur ovaire est toujours biloculaire et que chaque loge renferme deux ovules. Les différences tirées du fruit, dont on s'est servi pour établir une distinction entre les *Vitis* et les *Cissus*, ne sont donc pas fondées sur des bases fixes, et c'est ce qui a introduit tant de confusion dans les espèces, en faisant regarder par un auteur telle Plante comme un *Cissus*, et par un autre comme une Vigne, selon l'importance qu'ils attachaient au nombre des graines dans le fruit. Néanmoins, à l'égard de celui-ci, Lamarck observe qu'il se termine en pointe et qu'il a un petit collet à sa base, structure un peu différente de la baie des Vignes. Le port des *Cissus*, nommés aussi vulgairement ACHITS, ainsi que de l'*Ampelopsis*, est le même que celui des Vignes. Comme elles, ce sont des Plantes volubiles et sarmenteuses dont les feuilles sont tantôt simples, tantôt ternées ou digitées ; les fleurs sont disposées en ombelles ou en corymbe. Richard (*loc. cit.*) fait remarquer qu'en général les *Cissus* ont leurs articulations plus cassantes, et conséquemment que leurs feuilles sont plus caduques que dans les Vignes.

Les cinquante espèces environ de *Cissus*, décrites par les auteurs, habitent les contrées intra-tropicales. La plus grande partie se trouve dans les Indes-Orientales ; quelques-unes sont indigènes de l'Arabie ; et ce sont elles dont Forskalh a constitué son genre *Sælanthus*. Enfin il y en a un certain nombre qui ont pour patrie les Antilles et l'Amérique méridionale. On en cultive communément une espèce sous le nom de VIGNE-VIERGE dans les jardins, particulièrement dans ceux des villes où elle cache les murs. La couleur de sang que prennent ses feuilles vers l'arrière-saison la rend très-remarquable et d'un bel effet dans les massifs et sur les tourelles. (G.N.)

**CISTE.** *Cistus.* BOT. PHAN. Genre de Plantes qui a donné son nom à la

famille des Cistées, et qui fait partie de la Polyandrie Monogynie. Il se compose d'un grand nombre d'espèces qui, pour la plupart, sont des Arbustes touffus, peu élevés, portant des feuilles opposées et simples. Les fleurs dont les pétales sont extrêmement caducs et fugaces, sont assez grandes, élégantes, jaunes, roses ou blanches; tantôt formant des épis ou grappes terminales, tantôt solitaires ou diversement groupées à l'extrémité des rameaux. Leur calice est fendu jusqu'à sa base en cinq segmens généralement égaux, étalés au moment de l'épanouissement de la fleur; persistans et redressés contre le fruit. Quelquefois trois des segmens sont un peu plus grands, et recouvrent les deux intérieurs. La corolle est rosacée et se compose de cinq pétales étalés, très-larges, minces. Les étamines insérées sous l'ovaire sont en très-grand nombre, entièrement libres et distinctes les unes des autres. L'ovaire est en général globuleux, supère, à cinq, très-rarement à dix loges, contenant chacune un assez grand nombre d'ovules attachés sur le bord interne des cloisons. Le style est court; le stigmate est simple; le fruit est une capsule toujours enveloppée par le calice, à cinq ou dix loges polyspermes, s'ouvrant en autant de valves septifères sur le milieu de leur face interne.

Les Cistes croissent presque tous dans le midi de l'Europe, l'Afrique septentrionale et l'Orient. L'Espagne est, sans contredit, le pays où on en trouve le plus grand nombre d'espèces; des parties considérables de terrain en sont entièrement couvertes. Bory de Saint-Vincent compare le rôle que jouent les buissons formés en Estramadure et en Andalousie par les Cistes et les Hélianthes, à celui que trois ou quatre bruyères jouent dans les landes aquitaines. On en chauffe les foyers, et leur bois sert à faire du petit charbon pour chauffer les appartemens, et qu'on appelle *steca*.

Linné avait réuni en un seul les deux genres *Cistus* et *Helianthemum*

de Tournesort; mais Jussieu, et à son exemple la plupart des auteurs modernes, ont de nouveau séparé le Ciste des Hélianthes. Dans ce dernier genre, en effet, la capsule est trois ou simplement à une seule loge et s'ouvre en trois valves; le calice se compose de cinq segmens très-inegaux, dont deux externes sont petits et étroits, et quelquefois à peine marqués.

#### 1°. Fleurs roses ou purpurines.

1. CISTE COTONNEUX, *Cistus albidus*, L. Cette belle espèce, qui est extrêmement commune dans les provinces méridionales de la France, est un Arbuste de trois à quatre pieds de hauteur, rameux et touffu. Ses feuilles sont blanches et tomenteuses des deux côtés, sessiles, ovales-oblongues, planes; les fleurs sont grandes, purpurines, portées sur des pédoncules cotonneux et terminaux; la capsule est ovoïde, pubescente, à cinq loges et à cinq valves. On cultive quelquefois ce Ciste dans les jardins d'agrément; il doit être abrité dans la serre tempérée pendant l'hiver.

2. CISTE CRÊPE, *Cistus crispus*, L. Moins élevé que le précédent, il croît dans les mêmes contrées. Son écorce est brune; ses jeunes rameaux sont velus et blanchâtres, et portent des feuilles lancéolées, crépues sur les bords, également blanchâtres et tomenteuses des deux côtés; ses fleurs sont purpurines, placées au sommet des rameaux, presque sessiles et environnées de bractées; ses pétales sont légèrement échancrés en cœur.

3. CISTE DE CRÈTE, *Cistus Creticus*, L. Dans cette espèce les tiges sont un peu étalées à leur base, rameuses, et forment un Arbuste très-touffu; les feuilles sont obovales, très-obtuses et comme spathulées, velues et crispées; elles sont recouvertes d'une substance résineuse fort odorante; les fleurs n'ont pas moins de deux pouces de diamètre; leurs pétales sont d'une teinte purpurine très-vive; leurs étamines d'un beau jaune doré. Ces

ns naissent au sommet des rameaux, et sont portées sur des pédoncules assez courts. Cette belle espèce est fort commune dans l'île de Corse, et en général dans presque toutes les autres îles de l'Archipel.

## 2°. Fleurs jaunes ou blanches.

1. CISTE LÉDON, *Cistus Ledon*, Link., Dict. Ce petit Arbuste se distingue par ses feuilles opposées, nécolées, d'un vert foncé en dessus, blanchâtres en dessous, recouvertes d'un enduit résineux et aromatique. Ses fleurs, d'un jaune pâle, presque blanches, sont disposées en une sorte de corymbe au sommet des ramifications de la tige. On trouve cet Arbuste aux environs de Montellier, de Narbonne, dans la Provence, etc.

2. CISTE LADANIFÈRE, *Cistus ladaniferus*, L. Cet Arbuste élégant peut acquérir une hauteur de cinq à six pieds. Ses rameaux élançés sont couverts de feuilles opposées lancéolées, étroites, aiguës, vertes en dessus, un peu blanchâtres à leur face inférieure, enduites d'une matière visqueuse, mais glabres, d'une odeur aromatique. Les fleurs sont très-grandes, blanches; leurs pétales sont souvent marqués à leur base d'une tache purpurine. Elles sont solitaires au sommet de pédoncules chargés d'un grand nombre de bractées blanchâtres et concaves. Le Ciste ladanifère croît en Orient, dans les îles de la Grèce, en Espagne, et même en Provence où il a été récemment découvert. C'est sur cette Plante et quelques autres du même genre, que l'on recueille la substance résineuse et balsamique connue dans le commerce sous le nom de *Ladanum*, et dont on faisait jadis un emploi très-fréquent en médecine. Du temps de Dioscoride, on se procurait le *Ladanum* en enlevant de la barbe des boues et des Chèvres qui s'en étaient chargés en broutant au milieu des bûches. Mais aujourd'hui on se sert d'une sorte de râteau portant un grand nombre de lanières de cuir que

l'on promène sur les Arbustes; on enlève ensuite le *Ladanum* en raclant ces lanières. Cette substance est si abondante dans les grandes chaleurs, que Bory de Saint-Vincent l'a vue tomber à terre par gouttes découlant de chaque feuille, et parfumant les déserts de l'Estramadure. Il est des cantons de cette province où le Ciste ladanifère est si fréquent, que les genoux des cavaliers étaient couverts d'un enduit de *Ladanum* après de longues marches dans la guerre d'Espagne, où notre confrère a recueilli sa part de gloire militaire. (A. R.)

## CISTÉES OU CISTINÉES. *Cistaceæ*.

NOT. PHAN. C'est une petite famille naturelle de Plantes dicotylédones, polypétales et hypogynes, uniquement composée aujourd'hui des genres Ciste et *Helianthemum*. Jussieu y avait d'abord réuni le genre *Viola* et trois genres d'Aublet, savoir : *Piriqueta*, *Piparea* et *Tachibota*; mais Ventenat, et depuis lui tous les botanistes modernes, en ont séparé ces quatre derniers genres, pour n'y laisser que les *Cistæ* et les *Helianthemum*. Ce sont tantôt des Plantes herbacées, annuelles ou vivaces; tantôt des Arbustes rampans ou dressés, portant des feuilles généralement opposées, entières, souvent munies de deux stipules. Les fleurs sont disposées en épis, en grappes, ou en sertules ou ombelles simples; elles sont quelquefois axillaires, terminales ou solitaires; leur calice est à cinq ou trois divisions très-profondes, tantôt égales, tantôt inégales; la corolle se compose toujours de cinq pétales minces, très-caducs, étalés en rose, dépourvus d'onglet; les étamines sont fort nombreuses; leurs filets sont libres, grêles, et s'insèrent immédiatement au-dessous de l'ovaire. Le pistil est supérieur; l'ovaire est globuleux, rarement à une seule loge, plus souvent à trois, à cinq ou même à dix loges. Dans l'ovaire uniloculaire, les ovules sont attachés à trois trophospermes pariétaux ou longitudinaux, légèrement saillans.

Lorsqu'il y a plusieurs loges, les ovules sont situés au bord interne des cloisons, surtout vers leur partie inférieure. Le style est simple et souvent très-court, le stigmate est indivis. Le fruit est une capsule ovale ou globuleuse, enveloppée dans la callosité qui est persistante. Elle offre tantôt une ou deux, trois, cinq ou même dix loges. A l'époque de sa maturité, elle s'ouvre naturellement en trois, cinq ou dix valves, chacune portant une des cloisons sur le milieu de sa face interne. Les graines sont assez nombreuses dans chaque loge, et fréquemment supportées par un petit périsperme filiforme. L'embryon est plus ou moins recourbé, quelquefois roulé en spirale, et contenu au centre d'un endosperme quelquefois très-mince.

Cette petite famille a de tels rapports avec les *Miliacées*, que peut-être, un jour on jugera convenable de les réunir. (A. R.)

**CISTÈLE.** *Cistela*. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Hétéromères, établi par Fabricius, et rangé par Latreille (Règn. Anim. de Cuv.) dans la famille des Sténélytres. Geoffroy (Hist. des Ins. T. 1, p. 115) avait appliqué ce nom à des Insectes dont Linné avait fait son genre *Byrrhus*. Mais cette dénomination impropre n'a pas prévalu, et le genre *Cistèle*, dont il est ici question, ne correspond nullement à celui de Geoffroy. Latreille assigne pour caractères aux *Cistèles* : tarses à articles simples ou non bilobés; mandibules sans fissure ou échancrure à leur extrémité, non terminées par une seule dent formant la pointe. Les *Cistèles* confondues avec les *Ténébrions*, les *Mordelles* et les *Chrysomèles*, en sont distinguées suffisamment par les antennes filiformes et le nombre des articles des tarses; l'absence d'une échancrure au sommet des mandibules empêche de les confondre avec les *Hallomènes*, les *Pythes*, les *Niliens*, et surtout avec les *Hétérops* auxquels elles ressemblent beaucoup.

*Fabricius* et *Paykull*, prenant en considération l'insertion des antennes sur la tête, ont démembré du genre *Cistèle* celui des *Allégules*; mais les caractères qu'ils ont assignés à ce nouveau genre ne sont pas assez tranchés pour autoriser une distinction.

Les *Cistèles* ont, suivant la description d'Olivier, la tête petite, plus étroite que le corselet, et supportant des antennes filiformes ordinairement de la longueur de la moitié du corps, composées de onze articles, dont le premier peu allongé, le second très-court, les autres presque coniques. La bouche présente une lèvre supérieure cornée, légèrement échancrée et ciliée antérieurement; des mandibules cornées, pointues, simples; des mâchoires avancées, membraneuses, bifides, supportant une paire de palpes filiformes de quatre articles, dont le dernier est ovale, un peu tronqué; enfin une lèvre inférieure cornée, terminée par deux pièces distantes et membraneuses à la base latérale desquelles s'insèrent les deux palpes postérieurs qui sont courts, filiformes et composés d'articles presque égaux. Le corselet est légèrement rebordé, un peu plus étroit que les élytres; celles-ci sont coriaces, aussi longues que l'abdomen, légèrement convexes. Il existe deux ailes membraneuses au métathorax; les pattes sont de longueur moyenne. Le corps tout entier est peu convexe et allongé.

Les *Cistèles* volent avec assez de facilité; on les trouve sur les fleurs; leurs larves ne sont pas connues. Ces espèces sont assez nombreuses. Dejean (Catal. des Coléopt., p. 71) en mentionne dix-sept; parmi elles on remarque :

La *CISTÈLE CÉRAMBOÏDE*, *Cistela ceramboïdes*, Fabr. ou la *Mordelle* à écus jaunes striés, de Geoffroy (Hist. des Ins. T. 1, p. 354, n° 3).

La *CISTÈLE SULFUREUSE*, *Cistela sulfurea*, Fabr., ou le *Ténébrion* jaune de Geoffroy (loc. cit., p. 351, n° 11). Cette espèce peut être considérée comme le type du genre. Elle se trouve, ainsi que la précédente,

aux environs de Paris où elle est très-commune. (AUD.)

**CISTÉLÉNIES.** *Cistelenia*. INS. Famille de l'ordre des Coléoptères, section des Hétéromères, établie par Latreille (*Gener. Crust. et Ins.* T. 11, p. 343 et 325); rangée ensuite (Consid. génér.; p. 348 et 309) avec celle des Ténébrionites, et réunie plus tard (Règn. Anim. de Cuv.) à celle des Stéclytres. Telle qu'elle avait été originairement fondée, la famille des Cisténiens comprenait les genres *Cistela*, *Oedemera*, *Rhinomacer* et *Rhinosome*. *V. STÉCLYTRIS.* (AUD.)

\* **CISTÈNE.** *Cistena*. ANNEL. Genre de l'ordre des Serpulées et de la famille des Amphitrites, établi par le docteur Leach (*Encycl. Brit. suppl.* T. 1, p. 452), et dont Savigny (*Syst. des Annelides*, p. 89) a fait la première tribu de son genre *Amphictène*. *V. ce mot.* Leach mentionne une espèce sous le nom de *Cistena Pallasii*, et il en donne une figure (*loc. cit.*, tab. 26) dans laquelle Savigny a cru reconnaître l'*Amphictène doré*, *Amphictena auricoma*. Ce nouveau genre et l'espèce unique qu'il renferme ne doivent par conséquent pas être adoptés. (AUD.)

**CISTES.** BOT. PHAN. Même chose que Cistées. *V. ce mot.*

**CISTICAPNOS.** BOT. PHAN. Pour *Cysticapnos*. *V. ce mot.*

**CISTICERQUE.** INTEST. Pour *Cysticerque*. *V. ce mot.*

\* **CISTICOLE.** OIS. Espèce du genre *Sylvie*, *Sylvia Cisticola*, Temm., pl. color. 6. *V. SYLVIE.* (DR..Z.)

**CISTINÉES.** BOT. PHAN. *V. CISTÉES.*

**CISTOIDES.** BOT. PHAN. Même chose que Cistées. *V. ce mot.*

\* **CISTOMORPHA.** BOT. PHAN. De Candolle (*Syst. Nat. Veget.* 1, p. 427) a ce nom comme synonyme d'une espèce d'*Hibbertia* originaire de la Nouvelle-Hollande, et qu'il appelle *Hibbertia saligna*, d'après R. Brown. *V. HIBBERTIE.* (A. R.)

\* **CISTOPTERIS.** BOT. ORNÉT. (*Fou-*  
3. 12.) Bernhardt avait donné ce nom

à un genre de Fougères qui appartient, ainsi que le genre *Odontopteris* du même auteur, aux *Lygodium* de Swartz. *V. ce mot.* Depuis, Desvieux a désigné sous ce nom, dans l'Herbier du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, sans l'avoir, croyons-nous, publié, un genre séparé des *Aspidium* de Swartz et qui correspond au genre *Aspidium* tel que De Candolle l'avait limité dans la Flore Française; mais le nom d'*Aspidium* devant plutôt être appliqué aux espèces dont le caractère est le plus en rapport avec la signification de ce nom, il nous paraît plus convenable, si on divise les *Aspidium* de Swartz en plusieurs genres, de réserver ce nom, comme R. Brown l'a fait, aux espèces à tégument rond et pelté, et de donner aux espèces dont De Candolle formait son genre *Aspidium*, le nom proposé par Desvieux. *V. à ce sujet l'article ASPIDIUM.*

Le genre *Cistopteris* serait ainsi caractérisé : capsules réunies en groupes arrondis, recouverts par un tégument lancéolé ou sétacé, inséré par sa base à la partie inférieure du groupe de capsules sur le dos même de la nervure, et transversalement à cette nervure, et s'étendant au-delà de ce groupe vers le sommet de la fronde dans le même sens que la nervure qui porte le groupe de capsules.

Les espèces qui appartiennent à ce genre sont la plupart d'Europe ou des pays tempérés. Nous citerons particulièrement les *Aspidium fragile*, *montanum*, *Rhaeticum*, *regium*, *alpinum* et *bulbiferum* de Willdenow, comme servant de type à ce genre.

La forme et la direction du tégument éloignent beaucoup ce genre des vrais *Aspidium* et des *Athyrium*, et les rapprochent plus des *Dicksonia* que de tout autre genre. Ces derniers n'en diffèrent réellement que par leurs groupes de capsules insérés à l'extrémité des nervures sur le bord de la fronde, et non vers le milieu de cette nervure; du reste, le mode d'insertion et la direction du tégument sont les mêmes. La forme générale des

frondes des *Cistopteris* confirme cette analogie; elle se rapproche beaucoup de celle des *Dicksonia*, mais elles sont toujours plus petites et plus délicates. Ce sont pour ainsi dire les représentants, dans les climats tempérés, de ce genre presque exclusivement propre aux régions équinoxiales.

(AD. B.)

**CISTRASI** MIN. SYN. de Marne en plusieurs lieux de la France. (LUC.)

**CISTRÉ**. BOT. PHAN. L'*Aithusa Naum* dans quelques cantons de la Provence. (B.)

**CISTULE**. *Cistula*. BOT. CRYPT. (*Lichens*.) Willdenow a désigné sous ce nom une des diverses formes des apothécies des Lichens, qui consiste en un tubercule ou conceptacle d'abord fermé, presque globuleux, renfermant dans son intérieur des seminules entremêlées de filaments qui se répandent au dehors par la destruction de l'épiderme. Le genre *Sphaerophore* fournit un exemple de ce mode de fructification. (AD. B.)

**CITA-MATAKI**. BOT. PHAN. (Rhéede.) Syn. indou de *Rondelétia* asiatique. (B.)

**CITAMBEL**. BOT. PHAN. (Rhéede.) Syn. de *Nymphæa cærulea* ou *stellata* à la côte de Malabar. (B.)

**CITA-MERDU**. BOT. PHAN. (Rhéede.) Syn. malabare de *Menispermum cordifolium*. (B.)

**CITABELLE**. MOLL. Coquille du genre *Cancellaire* de Lamarck. (B.)

**CITAVANACU**. BOT. PHAN. P. AVANACOE.

**CITELLUS** ou **CITILLUS**. MAM. Vieux nom du Soulsic, et devenu scientifique pour désigner cet Animal. (B.)

**CITHAREXYLON**. *Citharexylum*. BOT. PHAN. Le genre, de la famille des Verbenacées et de la *Dialyanthaceae*, a été établi par Linné qui l'a caractérisé ainsi : calice campanulé à cinq dents, ou tronqué à son bord, et persistant; corolle mono-

pétale infundibuliforme, dont le tube plus long que le calice est évasé péricieusement en un limbe à cinq lobes oblongs, presque égaux et vides en dessus; quatre étamines non saillantes hors du tube de la corolle dont les anthères sont dressées. D'après Linné, on trouve en outre un filet d'une cinquième étamine rudimentaire; ovaire libre surmonté d'un style court et d'un stigmate capité baie ovale contenant deux noyaux chacun à deux loges dispermes et monospermes par avortement.

Ce genre, figuré par Lamarck (Illustr., t. 545), a de grands rapports avec les *Duranta* et les *Wolkameria*; il ne diffère même des premiers que par le nombre des noyaux, qui, dans le fruit de ceux-ci, est double de celui des *Citharexylons*. Il se compose de petits Arbrres qui croissent presque tous aux Antilles où on les nomme vulgairement COTELET, GUITARIN et BOULE GUITARE, dont le mot *Citharexylon* est la traduction grecque. Aux trois espèces que Linné a dérites sous les noms de *Citharexylum cinereum*, *C. caudatum* et *C. quadrangulare*, les botanistes en ont ajouté une douzaine de nouvelles parmi lesquelles il régnait un peu de confusion. Ainsi, Swartz nomme *C. caudatum* le *C. quadrangulare* de Linné. Ce dernier nom a été donné par l'auteur du Catalogue du Jardin de Madrid au *C. pulverulentum* de Persoon, etc. Kunth (in Humb. Bonpl. Nov. Genar. et Spec. Amer. æquinoct.) en a publié quatre espèces nouvelles indigènes de l'Amérique méridionale. (G. N.)

**CITHARINE**. *Citharinus*. POIS. Sous-genre de Saumon. P. ce mot. (B.)

**CITHARON**. BOT. PHAN. Même chose que *Cisaron*. P. ce mot.

**CITHARUS**. POIS. (Belon.) Syn. de Linande, espèce du genre *Pleuronecte*. P. ce mot. (B.)

**CITIGRADES**. INS. Section établie par Latreille dans la famille des *Filicæ*. P. ce mot. (AUD.)

\* **CITILLUS.** MAM. *V.* **CITELLUS:**  
**CITLI.** MAM. ( Hernandez. ) Syn.  
 de *Lepus brasiliensis.* *V.* LIÈVRE.  
 (B.)

\* **CIT - NAGUARI.** BOT. PHAN.  
 (Rhéde.) Syn. indou de *Melastoma*  
*aspera.* (B.)

\* **CIT-OBTH.** BOT. PHAN. (Rhéde.)  
 Syn. indou de *Calophylle.* *V.* cemot.  
 (B.)

**CITRAC ET CITRACCA.** BOT.  
 CRYPT. *V.* **CETRACCA.**

**CITRAGO.** BOT. PHAN. (Gesner.)  
 Syn. de Mélisse. (B.)

**CITRANGULA.** BOT. PHAN. Va-  
 riété de Citron dont le jus est âcre, se-  
 lon Cœsalpin. (B.)

\* **CITRATES.** MIN. Sels résultans  
 de la combinaison de l'Acide citrique  
 avec les bases salifiables. Les Citrates  
 de Chaux et de Potasse font partie  
 constituante de plusieurs matières vé-  
 gétales. (DR..Z.)

\* **CITRE.** BOT. PHAN. ( Olivier  
 de Serres. ) Variété de Citrouille de  
 qualité inférieure, cultivée seule-  
 ment pour la nourriture des Pour-  
 ceaux. (B.)

**CITREOLUS.** BOT. PHAN. Une va-  
 riété de Melon, le Concombre ordi-  
 naire et une variété de ce dernier  
 fruit. (B.)

**CITREUM ET CITRIA.** BOT. PHAN.  
 Syn. de Citronier et de Cidratier.  
 (B.)

**CITRIL.** OIS. Syn. vulgaire du  
 Venturon, *Fringilla Citrinella*, L.  
*V.* Gros-Bec. (DR..Z.)

\* **CITRINA.** OIS. ( Schwenefeld. )  
 Syn. du Tarin, *Fringilla Spinus*, L.  
*V.* Gros-Bec. (DR..Z.)

**CITRINELLE.** *Citrinella.* OIS.  
 (Sibbald.) Nom scientifique d'une  
 espèce du genre Bruant. ( Vieillot. )  
 Espèce du genre Guépier. *V.* ce mot.  
 (DR..Z.)

\* **CITRINUOLO.** BOT. PHAN. *V.*  
**CEDRUOLO:**

\* **CITRIQUE.** MIN. *V.* ACIDE.

**CITRO.** BOT. PHAN. Probable-  
 ment la même chose que Citre. *V.* ce  
 mot. (B.)

**CITROBALANUS.** BOT. PHAN.  
 ( Daléchamp. ) Syn. de *Mirobolan*  
*Citrin.* (B.)

**CITRON.** INS. Nom vulgaire sous  
 lequel Geoffroy a désigné une espèce  
 de Lépidoptère qui est le *Papilio*  
*Rhamni* de Linné ou le Coliade Ci-  
 tron. *V.* COLIADE! (AUD.)

\* **CITRON.** BOT. PHAN. Fruit du  
 Citronier. Selon les remarques judi-  
 cieuses de Risso, on appelle ainsi à  
 Paris le fruit et l'Arbre qui, dans le  
 reste de l'Europe, on nomme Limon  
 et Limonier; et les Parisiens donnent  
 le nom de Citron au fruit avec lequel  
 ils préparent la limonade. Il est donc  
 plus rationnel de ne traiter du Ci-  
 tronier qu'au mot LIMONIER ou ORAN-  
 GER. *V.* ces mots. (A. R.)

**CITRON.** BOT. CRYPT. ( *Champi-  
 gnons.* ) On appelle ainsi un petit  
 Agaric qui croît aux environs de Pa-  
 ris, et que Bulliard nomme *Agaricus*  
*sulfureus.* Paulet, qui le considère  
 comme suspect, l'a figuré pl. 85, fig.  
 3 et 4 de son Traité. (A. R.)

**CITRONADE ET CITRONELLE.**  
 BOT. PHAN. On donne vulgairement  
 ce nom à des Plantes qui exhalent  
 l'odeur du Citron, telles que la Mé-  
 lisse officinale, l'Abrotanum et le  
 Goyavier aromatique. (B.)

**CITRONELLE ROUILLÉE.** INS.  
 Nom vulgaire sous lequel Geoffroy  
 (Hist. des Ins. T. II, p. 139, n. 59)  
 désigne un Insecte lépidoptère du  
 genre Phalène; c'est la *Phalena Cra-*  
*taegata* de Linné. (AUD.)

**CITRONIER.** BOT. PHAN. *V.* LI-  
 MONIER et ORANGER. (A. R.)

**CITROSMA.** BOT. PHAN. Ruiz et  
 Pavon, dans leur Flore du Pérou et  
 du Chili, ont appelé ainsi un genre  
 nouveau uniquement composé d'es-  
 pèces américaines, et que Jussieu a  
 placé dans sa nouvelle famille des  
 Monimides. On compte aujourd'hui

dix-huit espèces de ce genre, savoir : sept décrites par Ruiz et Pavon, dans l'ouvrage que nous venons de citer, et onze dans le *Nova Genera et Species* de Humboldt et Kunth. Ce sont tous des Arbrisseaux qui exhalent une odeur agréable de Citron. Leurs tiges sont cylindriques, dressées ; leurs rameaux portent des feuilles opposées ou verticillées, entières ou dentées. Leurs fleurs sont petites, dioïques, disposées en grappes courtes, axillaires et souvent gémées. Chacune d'elles offre un involucre caliciforme, renflé inférieurement, rétréci vers son ouverture et présentant quatre ou huit divisions à son limbe. Dans les fleurs mâles, on trouve de quatre à soixante étamines dont les filets sont planes et comme pétaloïdes. Les fleurs femelles offrent de trois à vingt pistils renfermés dans l'involucre ; chacun d'eux est surmonté d'un long style et d'un stigmate simple. Le fruit se compose de l'involucre devenu épais, charnu, et contenant intérieurement autant d'akènes durs, osseux, anguleux, qu'il y avait de pistils.

Aucune espèce de ce genre n'est cultivée dans les jardins. Le genre *Siparuna* d'Aublet paraît avoir les plus grands rapports avec celui dont il s'agit, qui peut-être devra lui être réuni. *V. SIPARUNA.* (A. R.)

**CITROUILLE.** *Citrullus.* BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires de la Courge. *V. COTRÉE.* (A. R.)

\* **CITRYNLE.** OIS. Même chose que Citril. *V. ce mot.*

**CITTA.** MAM. Syn. de Chat en Arménie. (B.)

**CITTA.** BOT. PHAN. Loureiro a fait sous ce nom un genre particulier du *Delichos urans*, L. Adanson, avant lui, l'avait nommé *Mucuna*. (A. R.)

**CITTAMETHON ET CITTAMPELOS.** BOT. PHAN. *V. HELIXINE.*

**CITTITES.** MIN. *V. CISSITIS.*

**CITTOS.** BOT. PHAN. *V. CISSUS.*

**CITT-RANA-NIMBA.** BOT. Nom

brame du *Limonia acidissima*, LIMONIER. (B.)

\* **CITULA.** POIS. Syn. de Zeus, ber dans quelques parties de l'Italie notamment dans les États romains. (B.)

**CITULE.** *Citula.* POIS. Sous-genre de Scombres. *V. ce mot.* (B.)

\* **CITUS.** POIS. (Willughby.) Syn. de *Cottus Gobius.* *V. COTTE.* (B.)

**CIUFOLOTTO.** OM. Syn. italien du Bouvreuil commun, *Loxia Pyrrhula*, L. *V. BOUVREUIL.* (DR. Z.)

**CIURO.** MAM. Du latin *Sciurus*. L'Écureuil dans plusieurs dialectes du Midi. (B.)

**CIUS.** OIS. Syn. vulgaire en Picardie de la Hulotte, *Strix Aluco*, L. et du petit Duc, *Strix Scops*, L. *V. CHOUETTE.* (DR. Z.)

**CIVADA.** BOT. PHAN. L'Avoine dans quelques dialectes méridionaux. (B.)

**CIVE OU CIVETTE.** BOT. Nom vulgaire de l'*Allium Schœnoprismum*, L., qu'on nomme *Cives* et *Chives* en anglais. (B.)

**CIVELLE.** POIS. Nom vulgaire de l'Ammocète Lamprillon sur les bords de la Loire. (B.)

**CIVETTA.** OIS. Syn. romain de Chouette Chevêche, *Strix Accipiter*, L. *V. CHOUETTE.* (DR. Z.)

**CIVETTE.** *Viverra.* MAM. Genre de Carnassiers digitigrades caractérisé par trois fausses molaires en haut et quatre en bas, dont l'extérieure est souvent caduque ; deux tuberculeuses assez grandes en haut, une seule en bas : en tout quarante dents. Les deux tuberculeuses d'en haut sont à peu près quadrilatères, transversalement étendues ; la carnassière a son axe oblique d'arrière en avant et de dehors en dedans. Elle a trois pointes sur une même ligne. La première ou la tranchante intermédiaire est beaucoup plus grande que les deux autres, et a un petit talon à son côté interne ; des trois fausses molaires, la première est conique, les deux autres sont à simple triangle en bas ; la tuberculeuse



seuse est carrée, moitié plus petite que la carnassière qui a deux tranchans à son côté interne, un autre sur son bord antérieur, le reste de cette dent étant plus ou moins tuberculeux. La première fausse molaire a un bord postérieur dentelé et un talon en arrière, ce qui, dans l'état de ses individus, lui donne l'air de la carnassière dont les tranchans sont alors usés. Les autres fausses molaires ressemblent à leurs correspondantes en haut. Le nombre des mamelles varie d'une espèce à l'autre.

La tête osseuse des espèces de ce genre diffère beaucoup de celle des genres voisins : il n'y a pas de fosse périgonide, l'une des ailes de l'apophyse de ce nom étant seule développée ; cet effacement de la fosse périgonide est combiné pour la direction et l'application du mouvement latéral à la mâchoire inférieure avec l'absence de rebord antérieur à la fosse glénoïde du temporal, ce qui permet aux condyles de la mâchoire des mouvemens de latéralité tout-à-fait impossibles dans les genres voisins. L'os de la caisse très-bombé annonce une ouïe très-fine. La fosse ethmoïdale est très-profonde, et son aire transversale surpasse le trou occipital ; l'orbitor y est donc aussi fort actif. La langue hérissée de papilles rudes et épineuses, doit être le siège d'un goût subtil : les yeux ont une pupille verticale, ce qui en fait des Animaux nocturnes : tous les pieds ont cinq doigts dont les ongles sont à demi-rétractiles. La queue est longue ; il y a entre l'anus et la vulve chez les femelles, l'orifice correspondant chez les mâles, une troisième ouverture aussi grande que l'anus, et placée à peu près à égale distance de l'un et de l'autre. C'est l'embouchure d'une cavité d'une longueur variable, suivant les espèces, et étendue entre le vagin et le rectum. Au fond de cette cavité s'ouvrent deux poches, à parois penduleuses, bosselées extérieurement, et dont chaque bosselure répond à une sorte de follicule ou petit

sac sécrétoire d'une liqueur huileuse : ces petits follicules communiquent l'un avec l'autre, en ont de plus petits dans leur propre épaisseur, qui dégorgent, soit directement, soit par l'intermédiaire des premiers, dans la cavité générale où la liqueur s'épaissit et prend la consistance de pommade (Perrault, Mém. anat. pour servir à l'hist. des Anim., in-8°, 1670).

Dans les Mangoustes, d'après Geoffroy (Description de l'Égypte, Hist. Nat. T. II, p. 140), les poches sont situées au-dessus de l'anus ; l'Animal ouvre et ferme à volonté le sac ou vestibule qui les précède ; ce qu'il paraît faire avec grand plaisir, car il le met en contact avec tous les corps froids et saillans qu'il rencontre : dans les Mangoustes, ainsi que dans les Civettes, outre l'écoulement successif de cette humeur hors des follicules, à mesure qu'elle est exhalée, chaque poche est enveloppée par un muscle qui vient du pubis, et dont la contraction, en comprimant tout l'appareil, débarrasse l'Animal du superflu de son parfum. Les organes mâles ne sont pas extérieurs ; ces poches ont donné lieu sans doute aux fables dont l'Hyène a été l'objet.

Dans ce genre, au moins dans les trois espèces du premier sous-genre, les anfractuosités du cerveau sont longitudinales comme dans les *Felis*. Comme chez ces derniers aussi, la verge se dirige en arrière dans l'état de repos. Tous ces Animaux, surtout les Mangoustes, à cause de la brièveté de leurs pattes, ont le port et la démarche des Furets et des Martes ; ils ne marchent que sur les doigts ; le talon ne pose que pour prendre du repos ou se dresser sur les pieds de derrière quand ils reconnaissent le pays autour d'eux. Ils habitent les zones intertropicales ou voisines des tropiques dans l'ancien continent. Une seule espèce, la Genette, habite le midi de l'Europe et celui de la France. Comme on avait d'abord confondu plusieurs de ces espèces, on avait assigné à chacune de celles du petit nombre admis une patrie fort

étendue. Des deux espèces de Civettes, la Civette proprement dite paraît seule commune à l'Asie et à l'Afrique. Le Zibeth est asiatique; la Genette commune habite depuis la France jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Selon Poivre (P. Buff. T. XIII), la Fouine serait commune à Madagascar, à l'Indo-Chine et aux Philippines; deux Civettes seraient du continent de l'Inde; une autre aurait Java pour patrie.

Des neuf espèces de Mangoustes décrites par Geoffroy (*loc. cit.*), quatre sont de l'Inde ou de l'archipel Indien, une de Madagascar, deux de patrie indéterminée, la neuvième du nord-est de l'Afrique. L'existence de la Genette depuis la France jusqu'au cap de Bonne-Espérance s'explique par l'ancienne continuité de l'Espace avec la Barbarie, continuité dont dépose, indépendamment des Maïs qui habitent encore aujourd'hui le rocher de Gibraltar, l'ensemble de la zoologie du sud-est de l'Espagne (P. Bory de Saint-Vincent, Guide du Voyageur en Espagne). L'Amérique ne possède donc aucune espèce de ce genre. Buffon reconnut, T. III de son Supplément, que c'était à tort qu'il avait cru le Suricate de la Guinée.

Nous séparons des Civettes, pour en former un genre à part, les Suricates qui n'ont que quatre doigts à tous les pieds comme les Hyènes.

1<sup>er</sup> SOUS-GENRE. — Les CIVETTES PROPREMENT DITES, *Viverra* (Cuv. Règn. Anim. T. I, p. 156), où la poche est profonde, divisée en deux sacs et remplie d'une pommade abondante, d'une forte odeur musquée.

La CIVETTE, *Viverra Civetta*, L., Buff. T. IX, pl. 34; Encycl., pl. 87, fig. 3, et Schreb. T. II, pl. 111; *Catè de Abbatia* des Espagnols, *Nzimè*, *Nzusi* au Congo; *Kaukau* en Ethiopie, *Kastoren* Guinée.

Espèce d'environ deux pieds trois ou quatre pouces de long du museau à la queue; et haute de dix à douze pouces au garrot; à museau un peu moins pointu que celui du Renard;

oreilles courtes et arrondies; poil long et grossier; celui qui règne tout le long de l'échine, depuis le cou jusque dans la queue, forme une sorte de crinière qui se redresse dans la colère; la couleur générale est d'un gris brun foncé, varié de taches et de bandes d'un brun noirâtre; toute l'échine est d'un brun — les flancs tachetés irrégulièrement de même couleur; ces taches s'allongent en rayures noires sur les fesses, tout le poitrail et les épaules; deux bandes obliques également noires de chaque côté du cou et séparées par un espace gris blanc; la tête est aussi blanchâtre, excepté le tour des yeux, les joues et le menton qui sont bruns ainsi que les quatre pattes et la moitié postérieure de la queue, qui a trois ou quatre anneaux plus clairs vers la base. Outre l'organe odorifère dont nous avons parlé aux généralités du genre, la Civette a de plus de chaque côté de l'anus un petit trou d'où suinte une humeur noirâtre très-quantité. Elle n'a que quatre mamelles; elle passe pour avoir deux dents de plus que le Zibeth, parce que la première fausse molaire lui tombe bientôt souvent qu'à ce dernier. Sa queue a vingt-cinq vertèbres. Les Civettes, quoique farouches, s'apprivoisent aisément. Agiles et souples malgré l'épaisseur apparente de leur fourrure droite et grossière, elles sautent comme les Chats et peuvent courir comme les Chiens. Leurs yeux brillants dans l'obscurité leur permettent de chasser de nuit les Oiseaux et les petits Quadrupèdes. Au défaut de gibier et de nourriture dans les basse-cours, elles se rabattent sur les fruits et les racines qu'il leur est facile de broyer avec leurs larges molaires tuberculeuses au moyen des mouvements que permet en avant et de côté une construction de l'articulation maxillaire. On en élève beaucoup en domesticité pour recueillir leur parfum. La Civette boit peu, habite les plaines et les montagnes arides. Av

eurs quatre mamelles, elles ne peuvent guère porter que deux ou trois petits. On ignore encore le nombre de chaque portée. Ainsi que nous l'avons déjà dit, c'est à la Civette que se rapportent la plupart des fables dont la Hyène était le sujet chez les anciens.

Le ZIBETH, *Fiverra Zibetta*, L., Buff. T. ix, pl. 31, Encycl. pl. 88, f. 2; Schreb. T. II, pl. 114; *Oull et Baardès* Arabes, *Sawadu Fînée* des Malabars. Sans crinière; fond du pelage d'un gris jaunâtre, avec de nombreuses taches noires pleines, et quelquefois assez rapprochées pour former des lignes continues; ce qui arrive surtout au train d'arrière. Ces taches ne sont pas dans la même série plus distantes l'une de l'autre que la longueur de leur diamètre. La queue est noire en dessus de toute sa longueur, mais ornée de noir et de blanc sur ses côtés seulement, car la noir ne se prolonge pas dessus. Le ventre est gris; mais c'est au cou que se trouve la livrée la plus caractéristique du Zibeth après la queue. Une bande noire naissant derrière la partie supérieure de l'oreille décrit un arc de cercle jusqu'au devant du bras, et forme la bordure de la robe tachetée qu'elle sépare du blanc pur des côtés du dessous du cou. Une autre bande un peu plus large, naissant derrière le dos de l'oreille, et régulièrement concentrique à l'autre dont elle est séparée par un arc blanc de la même largeur, se réunit sous le cou à celle du côté opposé. Une troisième descend verticalement d'un peu au-dessous de l'oreille; enfin une quatrième, partant le gris des joues du blanc du cou, correspond à la branche montante de la mâchoire. Les moustaches sont ornées de barbes noires et blanches. Les figures de Schreber et de l'encyclopédie copiées sur celle de Buffon sont donc inexactes. On n'y voit pas surtout les taches rondes pleines en séries horizontales, ni la couleur toute noire de la queue. F. Cuvier vient d'en donner la première bonne figure (Mamm. lithog.)

d'où nous avons tiré notre description. Longueur du museau à l'anus, douze ou quinze pouces; hauteur au garrot, un pied; à la croupe, treize poices. Le Zibeth a vingt-deux vertèbres à la queue, trois de moins que la Civette dont la queue est pourtant bien plus courte. Il voit mal le jour, n'est actif que la nuit; il aime les fruits, et son régime paraît omnivore. Il est généralement silencieux. Dans la colère, il hérisse les poils de l'échine. Celui qu'a observé F. Cuvier venait des Philippines. On n'a pas d'autre indication authentique de la patrie de cet Animal qu'auparavant on croyait africain.

II<sup>e</sup> sous-GENRE. — Les GENETTES ou, dit Cuvier, la poche se réduit à un enfoncement léger, formé sur la saillie des glandes, et presque sans excréction sensible, quoiqu'il y ait une odeur très-manifeste. Néanmoins Daudenton (Buff. T. ix, p. 35 et 352) en donne une idée un peu différente (V. aussi sa figure n. 2, pl. 37).

La GENETTE COMMUNE, *Fiverra Genetta*, L., Buff. T. ix, pl. 36, Encycl. pl. 88, fig. 3, Schreb. T. II, pl. 113. Identique avec la Genette du Cap de Buff., Sup. T. vi, la *Fiverra malaccensis* de Gmelin, le Chat Bizaam de Vosmaer, t. 8, et le Chat du Cap de Forster, *Trans. Phil.* t. 71. V., une bonne figure dans Cuvier et Geoffroy. (Mammif. lithog.)

A peu près de la longueur, de la grosseur et de la figure de la Fouine, mais à tête plus étroite, museau plus effilé, oreilles plus grandes, plus minces et plus nues; pattes moins grosses et queue plus longue. (Elle a vingt-huit vertèbres.) La Genette a la pupille tout-à-fait pareille à celle du Chat; elle est tachée de noir sur un fond mêlé de gris et de roux; elle a deux sortes de poils, le plus long n'a guère pourtant qu'un demi-pouce de long sur le corps, et un pouce à la queue; l'extrémité des deux pelages est noire, grise ou rousse; la queue à quinze anneaux alternativement noirs et blanchâtres avec des teintes de roux. Les anneaux noirs

augmentent de largeur à mesure qu'ils sont plus voisins du bout de la queue; toute la tête est roussâtre, avec quelques teintes de noir et de gris. Les taches des flancs sont disposées par séries assez régulières. Elle n'a que quatre mamelles qui sont ventrales. Daubenton (*loc. cit.*) lui a trouvé sous l'an us les poches ordinaires des Civettes transformées par l'épaisseur de leurs parois crypteuses en deux glandes de dix lignes de longueur et cinq d'épaisseur. Les saillies qui forment ces deux glandes sont jointes du côté de l'an us par une bride de la peau qui donne à cette partie l'apparence d'une poche. La cavité de ces glandes était pleine d'huile jaunâtre et odorante qu'y versaient les cryptes (fig. 2, pl. 37, t. 9), et Buffon le premier en a fait connaître l'existence en France (Sup. T. III, p. 236 et 237); mais la figure annexée (*loc. cit.*) à sa description, pl. 47, sous le nom de Genette de France, appartient à une espèce étrangère de patrie inconnue. La Genette en France ou en Espagne habite les endroits humides et le bord des ruisseaux. On avait dit à Buffon qu'en Rouergue la Genette se retire pendant l'hiver dans des terriers. Son site paraît le même depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'en Barbarie. Quoique vivant de proie, son naturel est doux; elle s'apprivoise aisément, et chasse les Rats et les Souris. Deux Genettes envoyées de Tunis ont vécu à la Ménagerie. Elles étaient tristes et taciturnes, dormaient tout le jour enroulées l'une sur l'autre, s'agitaient et couraient toute la nuit. Elles s'accouplèrent à la manière des Chats. La durée de la gestation ne put être fixée, on la crut de quatre mois. Il naquit un seul petit marqué comme ses parens. — Les anciens ne paraissent pas avoir connu la Genette. Isidore de Séville en a parlé le premier (Encycl. pl. 89, fig. 1).

La Genette du Cap de Buff. T. VII, pl. 58, et la *Viverra malaccensis*, Enc. pl. 88, f. 1, et Schreb. pl. 11, 12, 3, ne sont, d'après Cuvier, que le Chat Bi-

saam, du Cap (Encycl. pl. 89, f. 5, et Schreb. pl. 115, sous le nom de *Viverra tigrina*), et tous deux sont identiques avec la Genette. Déjà Kolbe, T. II, pag. 180, avait observé que la peau du Chat musqué (Bizaam Kalte) est recherchée à cause de son odeur agréable de musc. Wosmaer qui a décrit cet Animal (fascic. 8) le rapprochait du Margay, tout en lui trouvant le museau bien plus pointu et plus effilé; ce qu'il dit de sa couleur se rapporte assez bien à la Genette dont il a surtout la longue queue annelée de blanc et de noir. Le Chat du Cap de Forster ne diffère pas du Chat Bizaam, et par conséquent de la Genette, d'après Cuvier (Ménag. du Muséum et Règne Animal).

La GENETTE A QUEUE NOIRE, Buff., Sup. T. III, sous le nom de Genette de France. Cuvier (Ménag. du Mus.) pense que cette Genette est une espèce distincte. Elle avait vingt pouces de longueur sur sept de haut; tout le poil plus long qu'à la Genette, surtout sur le cou; il n'y a d'anneaux distincts qu'au premier tiers de la queue, les deux autres tiers sont tout noirs; elle a seize pouces de long; le dessus du dos rayé et moucheté de noir sur un fond gris mêlé de grands poils noirs à rellets ondoians; le dessous du corps blanc; les jambes et les cuisses noires; l'œil était grand, la pupille étroite, les oreilles rondes. C'était un Animal toujours en mouvement et qui ne se reposait que pour dormir; il avait été acheté à Londres; on ignorait sa patrie.

La CIVETTE A BANDEAU, *Viv. fasciata*, Geoff. Grande comme une Fouine, à série de taches d'un brun marron le long du dos et des flancs sur un fond jaune clair, ayant le bout du museau, la mâchoire inférieure et le front blanc jaunâtre, tout le dessous du corps d'un gris fauve uniforme, l'extrémité de la queue et les pattes brun foncé, elle pourrait bien être identique avec la Genette à queue noire. Nous en disons autant de la grande Civette de Java, qui n'est qu'un peu plus petite, et qui a noir ce qui est

on dans la *Piverra fasciata* dont on ne connaît pas la patrie; Ces deux derniers Animaux sont au Muséum d'Histoire Naturelle. La figure donnée par Schreber sous le nom de *Viv. fasciata* a sur le dos et les fesses de grandes bandes noires imaginaires!

La FOSSANE DE MADAGASCAR, *Piverra Fossa*, Buff. T. XIII, pl. 50; Encycl., pl. 89, fig. 2; Schreb. T. II, pl. 114. Poivre, dans une notice adressée à Buffon (*loc. cit.*), donne les seuls enseignemens qu'on ait sur cette espèce dont Daubenton n'a vu que la peau bourrée. Il n'est donc pas certain que la Fossane n'ait pas de bourse urinale. Poivre dit ne lui en avoir pas trouvé sur trois individus qu'il a examinés: l'un de Madagascar, un autre de la Cochinchine, et l'autre des Philippines; d'ailleurs très-semblable, pour la figure, le fond et la distribution des couleurs, à la Genette; seulement les taches, disposées plus régulièrement encore, forment trois lignes parallèles le long de chaque flanc. La queue n'a que des demi-anneaux étroits et de couleur brune, qui ne s'étendent pas sur le tiers inférieur, lequel est d'une couleur mêlée de roux, de gris et de blanc sale, ainsi que la face extérieure de la cuisse; tout le dessous du corps est blanchâtre. Ceux que Poivre leva fort jeunes conservaient un air tout un caractère de férocité, contraste remarquable dans un Animal qui se referait les fruits à la chair. — Le mâle de Guinée (Bosmann, Voy. 1756, fig. n° 1) doit plutôt être une Genette qu'une Fossane.

GENETTE DE L'INDE, *Viv. indica*, Geoff. Grande comme une Genette, mais plus allongée, plus haute sur jambes, avec la queue plus courte; six bandes brunes sur le dos et continues au cou, se détachant d'un fond blanc jaunâtre; trois ou quatre lignes de points bruns parallèles sur les flancs; tour des yeux brun; lèvres et menton blancs; queue mêlée de brun et de blanc jaunâtre. Il y en a un autre individu plus petit, marqué de blanc, sous le nom de Petite Genette

de Java. Toutes deux sont au Muséum.

POTORS RAYÉ DE L'INDE, *Viv. fasciata*, Gmel.; Schreb. T. II, pl. 114, n° figure qui diffère beaucoup de celle de l'Encyclopédie, pl. 90, fig. 2; Buff., Suppl. T. VII, pl. 87. Semblable au Putois pour la taille; la forme du corps et des oreilles; tête et queue d'un brun fauve, plus pâle autour des yeux; nœuds jaunes et sous la mâchoire. Six larges bandes noires et cinq blanchâtres plus étroites le long du dos et des flancs. Sonnerat l'a trouvé à la côte de Coromandel. — La *Piverra hermaphrodita* de Pallas (*V. Schreb. T. II, p. 426*), à museau, gorge, moustaches et pieds noirs; une tache blanche sous les yeux; poil cendré à la base, noir à la pointe; trois bandes noires le long du dos; queue un peu plus longue que le corps, et noire à l'extrémité. Elle est certainement de ce genre, car elle a une poche entre l'anus et l'ouverture de la génération. Elle venait de Barbarie.

III<sup>e</sup> sous-GENRE. — Les MANGOUSTES, *Cuv.*; *Herpestes*, Illig.; Ichneumon; Geoff.; Description d'Égypte, Hist. Nat. T. II, p. 138 et suiv. — Cuvier (*Règn. Anim.*) les caractérise par une poche volumineuse simple, ayant l'anus percé dans sa profondeur. Toutes les Mangoustes, dit Geoffroy (*loc. cit.*), ont le poil court sur la tête et les pattes, et les doigts à demi-palmés; aussi s'éloignent-elles peu des rivières.

La MANGOUSTE DE L'INDE, *Viv. Mungo*, L. et Koempfer, Buff. T. XIII, pl. 19; Schreb. T. II, pl. 116, p. 430; Encycl., pl. 84, fig. 4; et Wosmaer, pl. et fasc. 11, 1773. Wosmaer l'a aussi confondue avec l'Ichneumon et avec la Mangouste de Java. C'est à cette dernière qu'on se rapporte sa figure. *Gagartangan* des Javans; *Chitré*, *Kirpélé* au Malabar; *Sunsa* au Bengale. A peu près de la taille de la Fouine; mais sa queue, bien moins touffue à l'extrémité que celle de la Fouine, va au contraire en grossissant de la pointe vers la racine comme une queue de Kangouroo. Cette queue

est un peu moins longue que le corps; sur le dos, vingt-six à trente bandes transversales, alternativement rousses et noirâtres, d'autant plus longues qu'elles sont postérieures; dessous de la mâchoire fauve; pieds noirs, et la queue d'un brun noirâtre uniforme. Buffon (*loc. cit.*) l'a confondue avec l'Ichneumon, et comme la Mangouste est juste moitié plus petite, « il lui paraît seulement qu'en Egypte, où les Mangoustes sont pour ainsi dire domestiques, elles sont plus grandes qu'aux Indes où elles sont sauvages. » Dans ce moment-là, Buffon ne croyait pas apparemment que la domesticité détériore ces Animaux. Le fait est que la Mangouste n'existe pas en Egypte. Kœmpfer et le P. Vincent - Marie disent qu'elle fait aux Serpens une guerre implacable. Elle habite le continent de l'Inde et les îles de la Sonde. Wosmaer en a vu, dit-il, trois variétés, toutes des Indes. L'une d'elles était friande de fruits, d'œufs, et buvait beaucoup, se roulait en boule comme un Hérisson pour dormir, était très-propre et aimait à clapoter dans l'eau. Les yeux sont bleus avec un cercle de couleur d'orange; les testicules sont fort gros à proportion de la verge.

L'ICHNEUMON INDIEN d'Edwards (*Ois.*, pl. 199). Museau brun rougeâtre; tout le dos et la queue annelés de brun sur un fond olivâtre; c'est la seule Mangouste, avec la suivante, qui ait les ongles noirs. Elle venait des Indes-Orientales.

LA MANGOUSTE NEMS, Buff., Sup. T. III, pl. 27. D'un cinquième plus grande que la *Fiv. Mungo*; sa queue se termine aussi en pointe. C'est elle que Daubenton a décrite (T. XIII, p. 160) sous le nom de Mangouste. Elle avait vingt-deux pouces du museau à l'anus, et la queue longue de vingt pouces; le pelage est plus clair qu'à la Mangouste, et d'une couleur uniforme au dos et aux pattes; le poil est dur, redressé comme à l'Ichneumon; le blanchâtre et le noirâtre s'y succèdent quatre ou cinq fois en anneaux;

la teinte générale est jaune paille; l'iris est d'un fauve foncé.

Le VANSIRRE, *Vohang-Spira* à Madagascar, Buff. T. XIII, pl. 21; *Eur.*, pl. 80, fig. 3. Geoffroy s'est assuré sur deux individus vivans à la Ménagerie, que c'est une Mangouste. Plus petit que le Mungos, son poil est gris brun, pointillé de jaunâtre, et les pattes brunes; son crâne diffère de celui de l'Ichneumon, parce que l'orbite n'est pas fermée en arrière. Vit à Madagascar, d'où elle a passé à l'Île-de-France.

LA MANGOUSTE DE MALACCA, *Ichneumon malaccensis*. F. Cuv. (Mamm. lith.) a figuré et décrit sous ce nom une Mangouste longue de onze pouces, dont la queue a un pied, où la distance du museau à l'oreille est de deux pouces six lignes, et la plus grande hauteur de cinq pouces quatre lignes. La pupille est allongée horizontalement; il n'y a pas de paupière clignotante; la couleur générale est d'un gris sale, parce que les poils sont annelés de noir et de blanc sur leur longueur; le tour de l'œil, l'oreille et le bout du museau sont nus et violâtres; le poil est très-rude, entremêlé d'un laineux rare à sa base; la queue, conique comme dans la Mangouste à bandes, acquiert dans la colère un énorme volume par le hérississement des poils redressés perpendiculairement; son attitude ordinaire est celle des Fourmes: elle peut s'étendre à quatre-vingt pouces et se réduire à huit. Elle était très-apprivoisée, aimait les caresses quoique très-féroce pour tout Animal susceptible de devenir sa proie; elle recherchait surtout les Oiseaux, et les prenait dans sa grande cage avec une rapidité de mouvement extraordinaire. F. Cuvier dit que les organes gustatifs et l'anus s'ouvrent dans la poche glanduleuse. Il ne faut pas confondre cette espèce avec la Civette de Malacca, qui n'est que la Genette. N'est-ce pas en la confondant avec la Mangouste à bandes, que Leschenault dit qu'elle se nomme *Keripoulie* au Malabar? car c'est le nom qu'y por-

si cette dernière. Ce voyageur dit qu'elle habite les trous de muraille et les petits terriers voisins des habitations qu'elle ravage comme le Putois et nous.

La MANGOUSTE DE JAVA. F. Cuv. Mamm. lith., liv. 26) vient d'en former une figure toute semblable à celle de Wosmaer qui l'a décrite sous le nom d'*Ichneumon* indien, et à la p. 116 de Schreber. Elle était privée comme un Chat domestique. Diard avait envoyée de Java. Il y en a aussi sur le continent. Sans doute le *Ngur-Angan* de Java, Séba, vol. 1, fig. 77, pl. 48, fig. 4, ressemble par sa taille, et à peu près par les couleurs, au Vansurre; seulement il a en dessous ce qui est en brun dans l'autre. La queue se termine aussi en pointe.

La MANGOUSTE ROUGE, *Ichneumon ruber*, Geoff. (Patrie inconnue.) Pelage d'un rouge ferrugineux très-brillant; poils annelés de roux et de fauve, rouge cannelle sur la tête et les épaules; surpasse d'un cinquième le Mungos, et a la queue encore plus épaisse et plus longue.

La GRANDE MANGOUSTE, *Ichneumon major*, Geoff., Buff., Suppl. T. III, pl. 26. Poil annelé de fauve et de marron; mais les anneaux fauves sont si étroits, que l'autre couleur domine partout; la queue, plus hérissée et plus longue que le corps, terminée en pointe, y prend une couleur plus foncée; les doigts couverts de poils ras et serrés, comme chez les Animaux aquatiques; double du Mungos, c'est la plus grande des Mangoustes. On ignore son pays; Geoffroy l'a croit rapportée par Sonnerat.

L'ICHNEUMON, *Viverra Ichneumon*, L., *Ichneumon Pharaonis*, Geoff., Noms des Arabes, *Tezerdea* des Barbaresques, Schreber, pl. 115, B; Encycl., pl. 84, fig. 3; Descrip. d'Égypte, Hist. Nat., Mamm. planch. 6. Buffon n'a pas connu l'Ichneumon; il a pris pour lui le Mungos à qui il a appliqué tous les récits qui concer-

nent l'Ichneumon. Plus petit d'un sixième que l'espèce précédente; à queue aussi longue que le corps, et terminée par une touffe de très-longs poils noirs étalés en éventail, et dont la couleur se détache fortement de la teinte fauve marron uniforme de tout le corps; le poil est plus gros, plus sec et plus cassant que dans aucun de ses congénères; l'orbite est complet. L'Ichneumon est d'une timidité extrême; il se glisse toujours à l'abri de quelque sillon; il ne lui suffit pas de ne rien voir de suspect, il n'est tranquille et ne continue sa route qu'après avoir flairé tout ce qui est à sa portée; l'odorat est son guide suprême; même quand il est apprivoisé, il va sans cesse flairant, remuant continuellement ses naseaux avec un petit bruit qui imite le souffle d'un Animal haletant après une longue course. Il est d'une très-grande douceur, caressant, vient à la voix de son maître. En Egypte, il se nourrit de Rats, de Serpens, d'Oiseaux et d'œufs. Lors de l'inondation, il se retire près des villages et dévaste les basse-cours; mais resserré alors avec les Renards et les Chacals, il devient en grande partie leur proie. Dans le Saïd il a pour ennemi le Tupinambis qui a les mêmes habitudes et se tient dans les mêmes sites. Il détruit tous les œufs qu'il rencontre, et conséquemment ceux du Crocodile; mais il est absurde de supposer qu'il attaque l'Animal. Son utilité par la destruction des œufs de ce Reptile était sans doute le seul motif du culte que lui rendirent les Égyptiens. Aristote et Strabon disent qu'on ne le trouve qu'en Egypte; nous avons cité un nom barbaresque qui porte à croire qu'on le trouverait aussi au moins dans l'est de la Barbarie. Le nom *Ichneumon* est grec et significatif des habitudes de l'Animal. Hérodote l'a employé le premier. L'Ichneumon n'a jamais été domestique en Egypte, l'espèce y vit partout sauvage; on n'en apporte de jeunes aux marchés que lorsqu'on en trouve par hasard d'égarés dans les champs.

(A. D. N. S.)

\* **CIVETTE**. POIS. On dit que l'on donne ce nom sur les bords de la Loire à de petites Angaïlles qu'on y prend en quantité. Ce nom est peut-être un double emploi de Civelle. *V.* ce mot. (B.)

**CIVICH**. OIS. Syn. piémontais du Friquet, *Fringilla montana*, L. *V.* Gros-Bec. (DR..Z.)

**CIVIÈRE**. OIS. L'un des noms vulgaires du Bouvreuil, *Loxia Pyrrhula*. *V.* BOUVREUIL. (DR..Z.)

**CIXIE**. *Cixius*. INS. Genre de l'ordre des Hémiptères établi par Latreille (*Gener. Crust. et Ins.* T. III, p. 166), et réuni depuis au genre Fulgore. *V.* ce mot. (AUD.)

**CIYTES**. MIN. *V.* CISSITIS.

**CLABAUD**. MAM. Race de Chiens courans à oreilles pendantes, et peu estimés. L'importunité de leurs cris, passée dans le langage familier, est l'étymologie de clabaudage, clabaudens, etc. (B.)

**CLA-CLA**. OIS. *V.* CHA-CHA.

\* **CLADANTHE**. *Cladanthus*. BOT. PHAN. Famille des Synanthérées corymbifères de Jussieu, Syngénésie Polygamie frustrancée, L. Genre fondé par H. Cassini et placé dans la tribu des Anthémidées. Il est ainsi caractérisé : calathide radiée ; fleurons du centre nombreux, réguliers et hermaphrodites ; demi-fleurons de la circonférence disposés sur un seul rang, ligulés et stériles ; involucre formé d'écaïlles ovales, scarieuses et comme frangées à leur sommet ; réceptacle conique, allongé, couvert de petites écaïlles et de petits organes que Cassini nomme simbrilles, filiformes et membraneux ; akènes ovales, striés, glabres et sans aigrettes. Ce genre, dont Cassini a exprimé les caractères avec plus de détails (*Bull. de la Soc. philom.*, déco. 1816), n'est composé que d'une seule espèce, le **CLADANTHE D'ARABIE**, *Cladanthus arabicus*, Cass., ou *Anthemis arabica*, L. Les Arabes lui donnent le nom de *Crassas*. Cette jolie plante annuelle

croît naturellement en Arabie et sur les côtes septentrionales de l'Afrique. Elle pourrait être cultivée facilement en pleine terre dans les jardins de France, car elle fleurit au Jardin des Plantes de Paris depuis juillet jusqu'en septembre. Sa hauteur est de trois décimètres ; les rameaux nombreux qu'elle étale autour d'elle sont grêles, ligneux et disposés en verticilles, au milieu desquels est une calathide sessile, solitaire et d'un beau jaune orangé. Chaque ramuscule est aussi terminé par un verticille de branches plus petites, qui contiennent également une calathide au milieu d'elles. (G.M.)

\* **CLADIE**. *Cladius*. INS. Genre de l'ordre des Hyménoptères, section des Térébrans, famille des Porte-Scies, tribu des Tenthredinines, établi par Klug et adopté par Latreille (*Consid. génér.*, p. 294) qui lui assigne pour caractères : antennes de neuf articles, rameuses dans les mâles, simples dans les femelles ; mandibules tridentées. Ce genre, très-voisin des Lophyres, s'en distingue par les antennes rameuses et non pennées, ainsi que par les mandibules tridentées. La composition des antennes empêche de le confondre avec les Tenthredes, les Dolères, les Nématés et les Pristiphores qui ont les appendices simples dans les deux sexes.

Pelletier de Saint-Fargeau (*Monogr. Tenthredin.*, p. 57) rapporte à ce genre cinq espèces dont la plupart sont nouvelles. Le Cladie difforme, *Cl. difformis*, Latr., ou le *Pteronius difformis* de Jurine (*Class. des Hym.*, p. 64), représenté par Pelletier de Saint-Fargeau, dans la Faune Française (pl. 12, fig. 4), peut être considéré comme le type du genre.

*V.*, pour les autres espèces, Pelletier de Saint-Fargeau (*loc. cit.*). (AUD.)

**CLADIUM**. BOT. PHAN. Ce genre, de la famille des Cyperacées, est un démembrement des *Scheuchzeria* de Linné. Brqwns (*Jam.*, p. 114) lui imposa ce nom et le constitua avec une plante



des Antilles, évidemment congénère de notre *Cladium Mariscus*, si même elle ne lui est pas identique. Schrader adopta ensuite le genre proposé, et R. Brown (*Prodr. Flor. Nov.-Holl.*, p. 236) en fit mieux connaître les caractères qu'il définit de la manière suivante : épillets à une ou deux fleurs, composés d'écaillés imbriquées, dont les extérieures sont vides; style caduc articulé avec l'ovaire; point de soies ou de squammules hypogynes. Le fruit est une espèce de noix glabre renfermant un petit noyau lisse. De tels caractères sont, il faut l'avouer, bien analogues à ceux des *Schœnus*. C'est plutôt par leur port que les *Cladium* diffèrent un peu de ce dernier genre. Ce sont des Plantes herbacées plus grandes et plus consistantes, dont les chaumes sont garnis de feuilles très-longues, souvent dentées en scie et engainantes. R. Brown en a décrit treize espèces indigènes de la Nouvelle-Hollande, parmi lesquelles il indique le *Cladium Mariscus* ou *Schœnus Mariscus* de Linné, qui croît aussi en Europe et dans les environs de Paris. Schrader regarde l'espèce exotique comme distincte de l'européenne, et il les désigne, l'une sous le nom de *Cl. occidentale*, et l'autre sous celui de *Cl. germanicum*. Labillardière (*Nov.-Holl.* T. 1, p. 18, t. 19) a figuré une espèce de *Cladium* en lui conservant l'ancien nom générique de *Schœnus*; c'est son *Sch. filum*. F. CHOIN. (G.N.)

\* **CLADOBOTRYUM.** BOT. CRYPT. (*Mucédinées.*) Ce genre, établi par Nées (*Syst. der Schwämme*, p. 15, tab. 4, fig. 54), est un de ceux qui nous semblent fondés sur des caractères tout au plus spécifiques. Il nous paraîtrait devoir être réuni en un seul genre avec les *Stachylidium*, *Ferticillium*, *Botrytis* et *Virgaria*, qui conserverait le nom de *Botrytis*. C'est ce que Persoon a fait dans sa Mycologie européenne. F. BOTRYTIS.

Le genre *Cladobotryum* était ainsi caractérisé par Nées : filamens ascendants, divisés dès leur base en

forme de corymbe; sporules oblongues, éparées vers l'extrémité des rameaux. Il ne renfermait qu'une espèce, le *Cladobotryum varium* (*Botrytis macrospora*, Link, Dittmar, Persoon, *Myc. eur.* T. 1, p. 34). Il vient sur les bois et sur les feuilles de Chênes pourris. (AN. B.)

\* **CLADOCÈRE.** *Cladocerus*. POLYP. Genre de Polypiers fossiles dont Raffinesque n'a pu déterminer la famille, ayant pour caractère d'offrir un corps pierreux, rameux, comprimé, à écorce distincte, couverte de petites lignes ridées; les pores sont nuls ou invisibles. Ce genre est composé de plusieurs espèces : *C. Alcides*, *armatus*, *clavatus*, etc. F. le Journ. de Phys., 1819, T. LXXXVIII, p. 429. (LAM. X.)

**CLADODES.** BOT. PHAN. Loureiro (*Fl. Cochinch.*, ed. Willd., p. 703) a donné ce nom à un nouveau genre qu'il caractérise ainsi : fleurs monoïques; les mâles, comme les femelles, munies d'un calice quadripartit et dépourvues de pétales. Les premières ont huit étamines dont les filets sont courts et membraneux, les anthères arrondies. Les secondes n'ont point de style. Leur ovaire trigone porte trois stigmates oblongs, réfléchis, et devient une capsule à peu près globuleuse, trilobée, à trois loges monospermes et s'ouvrant par trois valves.

A ces caractères on reconnaît que ce genre doit appartenir à la famille des Euphorbiacées; mais le défaut de renseignements ultérieurs nous rend fort réservés sur son adoption, car il est malheureusement arrivé trop souvent que dans l'établissement de ses nouveaux genres Loureiro n'a fait que décrire des Plantes de genres déjà si connus, qu'on ne conçoit pas comment cet auteur a pu faire de pareilles méprises. Au surplus, une seule espèce constitue ce nouveau genre : c'est le *Cladodes rugosa*, nommé *Cay Môr* en Cochinchine, Arbrisseau des forêts de ce pays, dont les branches extrêmement nombreuses por-

tent des feuilles lancéolées dentées en scie, glabres, rugueuses et alternes. Les fleurs sont terminales et très-petites, disposées en grappes lâches qui se terminent en épis. (A. D. J.)

**CLADONIE.** *Cladonia*. BOT. CRYPT. (*Lichens*.) Ce genre, fondé par Hoffmann et adopté par De Candolle dans la Flore Française, correspond à une partie du genre *Cenomyce* d'Acharius. Nous croyons, vu le passage insensible qui existe entre ce genre et les *Scyphophorus* par l'intermédiaire des *Helopodium*, devoir adopter l'opinion du lichenographe suédois, suivie en grande partie par Dufour dans la monographie de ces genres, et selon laquelle ces trois genres réunis ne forment qu'un seul et même genre sous le nom de *Cenomyce*. V. CENOMYCE. (AD. B.)

**\*CLADORA.** BOT. CRYPT. (*Lichens*.) Genre formé par Adanson qui le rapportait (*Fam. Plant.* T. II, p. 6) à sa seconde section des Champignons, et qui rentre dans le genre *Cladonia*, tel que l'ont adopté les botanistes. (B.)

**\*CLADORYNCHUS.** ORS. (Gesner.) Syn. présumé du Pluvier à collier d'Égypte, *Charadrius aegyptus*, L. V. PLUVIER. (DR. 2.)

**\*CLADOSPORUM.** BOT. CRYPT. (*Mucédinées*.) Link, qui a établi ce genre, l'a ainsi caractérisé : filamens rapprochés, droits, simples ou peu rameux, dont les extrémités se séparent pour former les sporules; sporules ovales d'abord continues avec le sommet des rameaux, s'en détachant plus tard. Les espèces qui servent de type à ce genre faisaient partie du genre *Dematiium* de Persoon qui les y a rapportées de nouveau dans sa *Mycologia europæa*. V. ce mot. Link en a décrit quatre espèces sous les noms de *Cladosporium herbarum* (*Dematiium herbarum*, Pers., Syn. Fung.); *Cladosporium abietinum* (*Dematiium abietinum*, Pers., *ibid.*); *Cladosporium atrum*; *Cladosporium aureum*. Les trois premiers croissent sur les écorces ou sur les

feuilles et les tiges des Plantes sèches. Le dernier, qui vient sur les rochers, n'appartient probablement pas à ce genre. (AD. B.)

**\*CLADOSTÈME.** *Cladostema*. POLYP. Genre de Polypiers fossiles de l'ordre des Encrines, dont les caractères sont ainsi fixés par Rafinesque : base branchue; bouches terminales aréolées; articulations à circonférence lisse; centre tubuleux semi-radié autour du creux. Les *C. flexuosa*; *hioperis*, etc., appartiennent à ce genre; elles se trouvent aux États-Unis. V. Journ. de Phys., 1819, T. LXXXVIII, p. 429. (LAM. X.)

**\*CLADOSTEPHE.** *Cladostephus*. BOT. CRYPT. (*Chaodiniées*.) Genre établi par Agardh, adopté par Lyngbye, et que nous plaçons parmi les Chaodiniées dont il se rapproche par la grande analogie que présente son organisation avec celle des Thorées et des Draparnaldes; mais qui, lorsque sa fructification sera connue, pourra bien passer aux Cérampiaires. Ici nous arrivons à la fin d'une famille, dont les genres se sont compliqués graduellement, et les deux derniers que nous y rattachons commencent à moins y convenir. Cependant le genre *Cladostephus* conserve encore une sorte de mucosité extérieure, du moins vers les extrémités de ses rameaux, et les Lémanses, V. ce mot, semblent conserver cette mucosité dans leur intérieur. Les caractères du genre dont il est question sont : filamens ronds, articulés, rameux, chargés de ramules également articulées par sections transversales, simples ou légèrement divisées, disposées en verticilles simples autour des articulations des rameaux principaux, comme les feuilles d'un Hypuris le sont autour des tiges. L'espèce qui sert de type à ce genre est le *Cladostephus Myriophyllum*, N., *Cladostephus verticillatus*, Agardh, Syn. Lyngbye, Tent., p. 102, pl. 50., *Ceramium verticillatum*, D. C., Flor. Fr. T. II, p. 39. Cette Plante abonde dans les mers d'Europe, et son

port est assez élégant. Elle n'adhère pas au papier sur lequel on la prépare, ce qui indique déjà qu'elle s'éloigne des autres Chaodinees qui toutes ont éminemment cette propriété. (B.)

**CLADOSTYLES.** BOT. PHAN. Famille des Convolvulacées, Pentandrie Digynie, L. Ce genre a été établi sur une Plante nouvelle rapportée de l'Amérique méridionale par Humboldt et Bonpland. Ils l'ont publiée dans le premier volume de leurs *Plantas equinoxiales*, en fixant ainsi ses caractères génériques : calice divisé en cinq parties profondes ; corolle campanulée très-ouverte, dont le limbe est à cinq divisions ; deux styles fourchus (d'où le nom grec du genre) ; stigmates simples ; capsule uniloculaire, monosperme, indéhiscente. Selon Bonpland, à qui on doit la description précédente faite sur la Plante vivante, cette graine n'est unique dans la capsule que par l'avortement constant d'une ou de plusieurs autres graines ; mais Kunth (*Synopsis Plantarum æquinoct. orbis novi*, T. II, p. 250) suppose en outre, avec plus de vraisemblance, que l'ovaire (qui n'a pas été observé par Bonpland) est biloculaire, et que chacune de ses loges est disperme. Si cela était ainsi, le genre *Cladostyles* ne différencierait de l'*Evolvulus* que par la capsule dépourvue de valves, et aux yeux de l'auteur que nous venons de citer, cette différence est bien faible pour la distinction d'un genre.

Le *Cladostyles paniculata*, H., B. et Kth., est la seule espèce connue. C'est une Plante herbacée, droite, à feuilles alternes et entières, dont les fleurs sont terminales, blanches et disposées en panicules. Elle fleurit en juin près de Turbaco dans le royaume de la Nouvelle-Grenade. Humboldt et Bonpland en ont publié une très-belle figure (*Plantas equinoxiales*, 1<sup>er</sup> vol., tab 57). (G.N.)

\* **CLAIKGEES, CLAIKS, CLAK-GUSE et CLAKIS.** ois. Syn. vulgaires en Ecosse de la Bernache, *Anas erythropus*, L. F. CANARD. (DR.Z.)

**CLAIRETTE.** BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires de la Mâche. F. VALERIANELLE. (B.)

\* **CLAIRIDES.** *Cleridae*. INS. Tribu établie par Kirby, correspondant à celle des Clairons. F. ce mot. (AUD.)

**CLAIRON.** *Clerus*. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, famille des Clavicornes, tribu des Clairons, établi originairement par Geoffroy (*Hist. des Ins.* T. I, p. 305) qui lui assignait pour caractères : antennes en masse, composée de trois articles posés sur sa tête ; point de trompe ; corselet presque cylindrique sans rebords ; tarses garnis de pelottes. Les Clairons confondus par Linné avec les Attelabes, ont, pour la plupart, le premier article des tarses très-court ; cette particularité en avait imposé à Geoffroy qui, ne voyant que quatre divisions aux tarses, les avait rangés parmi les Tétramères. Le fait est qu'ils en ont cinq, et qu'avec quelque attention, on parvient toujours à distinguer l'article rudimentaire. Le genre Clairon n'a pas seulement subi des changemens dans ses limites ; mais il a été complètement bouleversé par Fabricius. Cet entomologiste, par une manie qui lui était trop commune, a établi un genre Clairon, qui ne comprend aucune des espèces décrites par Geoffroy, et il a créé, pour celles-ci, la dénomination de Trichode, *Trichodes*. Olivier, (*Hist. des Coléopt.*) accorde au genre Clairon une acception très-étendue, qui comprend sous le nom de section les genres Notoxe, Clairon, Trichode de Fabricius. Enfin Latreille, rendant à chacun ce qui lui est dû, rejette les dénominations abusives de Fabricius, et adopte le genre Clairon de Geoffroy, qui, à raison des changemens utiles qu'il a subis, correspond aujourd'hui à une famille ou tribu désignée sous le nom de Clairons, F. ce mot, et comprend plusieurs sous-genres qui en ont été démembrés. Parmi eux, celui des Clairons proprement dits, dont il est ici question, offre pour caractères : tarses vus en dessus, ne

paraissent avoir que quatre articles; l'avant-dernier aussi grand que le précédent, et pareillement bilobé; antennes à articles intermédiaires très-courts, les trois derniers transversaux, formant une massue presque triangulaire, tronquée obliquement au bout, et pointue à l'angle interne du sommet; dernier article des palpes maxillaires un peu plus grand, en forme de triangle renversé, allongé; le même des labiaux beaucoup plus grand, ayant la figure d'une hache.

Ces Insectes ont le corps allongé, presque cylindrique, plus étroit en devant. La tête est assez large, inclinée et enfoncée postérieurement dans le prothorax; les yeux sont ovales, peu saillans, souvent échançrés au côté interne. Les antennes ont la longueur du prothorax; celui-ci est allongé et plus étroit que les élytres; l'écusson est très-petit, arrondi postérieurement. Les élytres sont étroites, surtout en avant, et de la longueur de l'abdomen; elles recouvrent deux ailes membranées. Les pattes sont de longueur moyenne; les deux postérieures ont, dans les mâles de quelques espèces, des cuisses assez fortes; les articles intermédiaires des tarses sont larges, bilobés et garnis inférieurement de pelottes.

Les Clairons diffèrent des Cylydres et des Tilles, par les articles des tarses, n'étant pas tous très-distincts; ils s'éloignent des Nécrobies et des Enoplies, par les articles intermédiaires des tarses bilobés, par la forme de la massue et par celle du corselet. Enfin ils ont de tels rapports avec les Notoxes, les Trichodes et les Corynetes de Fabricius, que Latreille (Règn. Anim. de Cuv.) leur réunit ces trois genres.

Les Clairons ont, en général, le corps hérissé d'un duvet poilu, et orné de couleurs vives et variées, disposées par bandes transversales sur les élytres. On les rencontre souvent sur les fleurs, ils volent avec facilité. Lorsqu'on les prend, ils n'ont d'autre moyen de défense qu'une ruse commune à un grand nombre d'In-

sectes; ils contrefont les morts, inclinent leur tête et replient leurs pattes contre leur poitrine. — Léon Dufour a étudié anatomiquement les Clairons, et voici les principaux résultats de son travail qui est encore manuscrit : l'oesophage est gros, proportionnellement à celui de la plupart des autres Insectes; les parois sont épaisses et charnues. Parvenu dans la poitrine, il se renfle, mais insensiblement, en un estomac cylindroïde, flexueux, à la surface duquel la loupe découvre de fort petites papilles, en forme de points saillans. Après cet estomac, dont la terminaison est marquée par un léger bournelet, où se fait l'insertion antérieure des vaisseaux hépatiques, on trouve une portion intestinale fort courte, puis un cœcum allongé, renfermant une pulpe excrémentitielle blanche. Quant aux vaisseaux hépatiques, ils sont au nombre de six, et ont leurs insertions sur deux points éloignés du tube alimentaire; la première de ces insertions, ou l'antérieure, a lieu autour du bournelet qui termine l'estomac par six conduits distincts et isolés; l'autre, ou la postérieure, se fait à l'origine du renflement intestinal qui précède le rectum par deux vaisseaux seulement; mais chacun de ceux-ci est trifide.

Les larves des Clairons, connues des anciens, se nourrissent de celles des autres Insectes, particulièrement des Hyménoptères; on les rencontre dans leurs nids. — Ce genre est assez nombreux en espèces dont plusieurs se trouvent dans nos environs.

Le CLAIRON DES RUCHES, *Clerus alvearius*, Latr., ou le *Trichodes alvearius* de Fabricius, peut être considéré comme le type du genre. La larve se rencontre dans les ruches des Abeilles domestiques. Elle y fait un grand tort en détruisant leurs nymphes et leurs larves. Panzer (Faun. Insect. Germ. fasc. 31. fig. 14) en a donné la figure.

Le CLAIRON APIVORE, *Clerus apiarius* d'Olivier (Hist. des Coléopt. T. IV, n° 76, pl. 1, fig. 5-6), ou le *Tri-*



*hodes apiarius*, a été confondu quelquefois avec le genre précédent. On le trouve dans les mêmes lieux ; mais sa larve s'introduit dans les nids des Mégachiles des murs. Panzer (*loc. cit.* t. 31, fig. 15) l'a aussi représenté.

Comme on n'a pas encore observé l'insecte parfait cherchant à s'introduire dans les ruches d'Hyménoptères, et qu'il n'est d'ailleurs doué d'aucun moyen très-efficace pour se garantir de la piqure de l'aiguillon, on suppose que les œufs sont d'abord pondus sur les fleurs, et que les abeilles ou les Mégachiles les transportent dans leurs nids avec le pollen de ces fleurs. Cette opinion ne nous paraît guère admissible ; car elle supposerait la perte d'un grand nombre d'œufs, et ne nous expliquerait pas comment l'insecte, devenu parfait, pourrait rencontrer moins de danger, pour sortir de la ruche ou du nid, que pour s'y introduire ; attendons que l'observation vienne encore dévoiler ce mystère. Les hypothèses, quelque raisonnables qu'elles paraissent, ne doivent jamais être admises que comme de simples conjectures ; autrement elles nuisent à la science, parce qu'elles s'engagent à la recherche de la vérité. (AUD.)

**CLAIRONS.** *Clerid.* INS. Famille de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, établie par Latreille (*Gener. Crust. et Ins.* T. 1, p. 238 et 64) et correspondant au grand genre *Claron* de Geoffroy. Cette famille a été convertie (Règn. Anim. de Cuv.) en une tribu de la famille des Clavicornes. Ses caractères sont : antennes possédant insensiblement ou terminées en massue, pectinées dans les uns, presque filiformes et presque entièrement en scie dans les autres ; corps allongé, cylindroïde, plus étroit en devant ; abdomen mou ou carré plus ou moins allongé, recouvert par les élytres ; articles intermédiaires des tarses bilobés et membraneux en dessous ; palpes maxillaires très-avancés, aussi longs que la

tête ; les labiaux aussi longs ou plus saillans que les précédens, terminés par un article grand, en hache ou en cône très-allongé. Les Clairons se trouvent ordinairement sur les fleurs, quelquefois dans les matières animales en putréfaction ou dans les bois pourris. A l'état de larves, elles se nourrissent de matières animales ; celles de quelques espèces de Clairons proprement dits, se rencontrent souvent dans les ruches des Abeilles ou elles dévorent les larves. — Latreille divise cette tribu ou famille de la manière suivante :

I. Tarses ayant cinq articles très-distincts, tant en dessus qu'en dessous.

Genres : CYLYDRE, TILLE.

II. Tarses ne paraissant avoir, vus en dessus, que quatre ou même que trois articles bien distincts.

† Le quatrième ou l'avant-dernier article des tarses aussi grand que le précédent, pareillement bilobé et très-distinct.

Genres : THANASIME, OPILÉ, CLAIRON.

†† Avant-dernier article des tarses, ou le quatrième, beaucoup plus petit que le précédent, caché entre ses lobes et peu apparent dans quelques-uns, entier.

Genres : ENOPLIE, NÉCROBIE.

*N.* ces différens mots.

Latreille (Règn. Anim.) comprend aussi dans cette tribu les genres Mastige et Scydmiène ; mais dans le tableau que nous avons donné et qui est extrait du nouveau Dictionnaire d'Histoire Naturelle, il ne les mentionne plus.

Kirby (*Linn. Soc. Trans.* T. XII) a donné la division suivante de la tribu des Clairons, qu'il nomme en latin *Cleridae* ; il en exclut les genres Mastige et Scydmiène.

I. Antennes dentelées (*Serricornes*).

Genres : EURYPE, TILLE, AXINE, PRIOCÈRE. Les trois nouveaux genres

qu'on remarque ici ont été établis aux dépens du genre Tille.

H. Antennes renflées.

Genres : ENOPHIE, CLAYTON.

V. ces mots. (AUB.)

CLAYTONIA. BOT. PHAN. PORT. Claytonia. V. CLAYTON.

CLAMATORIA. ORS. (Plin.) Syn. présumé de la Sittelle, *Sitta europæa*, L. SITTELLE. (DR. Z.)

CLANCULUS. MOLL. Nom scientifique que Montfort donne à son genre Bouton, qui n'est fondé sur aucun caractère générique, et qui doit se rapporter au genre Monodonte. V. ce mot et BOUTON. (D. H.)

\* CLANDESTINARIA. BOT. PHAN. Nom de la troisième section établie par De Candolle dans son genre *Nasturtium*. Elle est ainsi caractérisée : pétales blancs très-petits ou quelquefois nuls; siliques un peu cylindriques. Cette section, aux yeux de l'auteur lui-même, est douteuse; elle se compose d'espèces qui, par leurs caractères génériques encore trop peu connus, pourraient être rapportées, les unes aux *Arabis*, les autres aux *Sisymbrium*. Elles habitent les Indes-Orientales et le Brésil. C'est à cette section qu'appartient le *Sisymbrium indicum*, L. (G. N.)

CLANDESTINE. *Lathræa*. BOT. PHAN. Genre très-voisin des Orobanches et faisant partie de la Didynamie Angiospermie. Linné avait réuni sous le nom de *Lathræa* les genres *Clandestina*, *Philippæa* et *Amblatum* de Tournefort, que les botanistes modernes ont avec raison séparés de nouveau, en sorte qu'aujourd'hui ce genre ne se compose que de deux espèces qui croissent en France. Ces deux Plantes ont, non-seulement la même organisation intérieure que les Orobanches, mais elles rappellent encore ces singuliers Végétaux par leur port. Elles sont herbacées, parasites, et vivent sur la racine d'autres Plantes dans les lieux couverts et humides. Leur racine est implantée

sur celle de quelque autre Arbrisseau; leur tige est horizontale, souterraine, et forme une souche, donnant naissance, dans sa partie supérieure, à quelques ramifications dressées, partant, ainsi que la souche, des écailles au lieu de feuilles. Les fleurs sont assez grandes, groupées en une sorte d'épi à la partie supérieure des ramifications de la tige. Leur calice est tubuleux, un peu comprimé latéralement, à quatre lobes peu profonds et inégaux. La corolle est monopétale, irrégulière, à deux lèvres; la supérieure est concave, entière; l'inférieure est à trois lobes peu marqués. Chaque fleur contient quatre étamines didynames, placées sous la lèvre supérieure; les anthères sont à deux loges et velues. L'ovaire est allongé, marqué de deux sillons longitudinaux. Coupé transversalement, il présente une seule loge contenant un très-grand nombre d'ovules insérés à deux trophospermes pariétaux épais et légèrement bipartis. A la base de l'ovaire, et, antérieurement, existe un petit corps glanduleux, en forme de languette; c'est un véritable disque hypogyne. Le style est plus ou moins allongé, terminé par un stigmate divisé en deux lèvres inégales et obtuses.

Le fruit est une capsule un peu comprimée, uniloculaire, s'ouvrant en deux valves, qui chacune entraîne avec elles un des trophosperme sur le milieu de leur face interne.

La CLANDESTINE ÉCAILLEUSE, *Lathræa squamaria*, L., *Clandestina penduliflora*, Lamk., Fl. Fr., est vivace et croît dans les lieux ombragés et humides. On la trouve aux environs de Paris, dans le parc de Gesvres près Meaux. Sa souche est horizontale, rameuse, entièrement couverte d'écailles charnues, imbriquées; elle donne naissance par son extrémité supérieure, à deux ou trois rameaux dressés, hauts de six à huit pouces, portant quelques écailles écartées, et terminés par un épi de fleurs blanchâtres et purpurines, pendantes, portées chacune sur un péd

de qui naît de l'aisselle d'une aille. Leur calice est comprimé, à quatre lobes aigus et inégaux. La corolle, deux fois plus longue que le calice, est à deux lèvres; la supérieure entière et obtuse; l'inférieure à peine trilobée; le style et le stigmate dépassent la lèvre supérieure.

LA CLANDESTINE ORDINAIRE, *Lactuca clandestina*, L.; *Clandestina ciliiflora*, Lamk., Fl. Fr. La souche est très-courte et munie d'écaillés linéaires et imbriquées. Elle est horizontale et cachée sous la mousse dans les lieux humides, au milieu des pierres qui garnissent les ruisseaux. De l'extrémité supérieure de la souche, naissent plusieurs grandes fleurs violettes et dressées qui ont la seule partie de la Plante visible au-dessus du sol. La Clandestine croît dans le centre et le midi de la France. Daléchamp regarde cette Plante comme douée d'une propriété merveilleuse. Il dit qu'elle a rendu fécondes des femmes jusque-là stériles. (A. R.)

\* CLANGA. OIS. (F. Cuvier.) Syn. dénommé de l'Orfraie, *Falco Ossifragus*, L. F. AIGLE. (DR. Z.)

CLANGULA. OIS. (Gesner.) Syn. de Goral. F. CANARD. (DR. Z.)

\* CLAPALOU. BOT. PHAN. Syn. de Cariss à la côte de Coromandel. (B.)

\* CLAPAS. BOT. PHAN. (Gaimard.) Syn. de Cocotier à Timor. (B.)

CLAPIER. ZOOL. Retraite du Lapin. Ce nom a été étendu aux abris où on élève de ces Animaux. (B.)

\* CLAQUE. OIS. Syn. vulgaire de la Givre Litorne, *Turdus pilaris*, L. F. MERLE. (DR. Z.)

CLAQUETTE DE LADRES OU DR. LEPREUX. MOLL. Nom vulgaire et marchand du *Spondylus* et *Perdium* dont la charnière est disposée de façon à ce que les deux valves, tombant l'une sur l'autre sans

se désunir après la mort de l'Animal, imitent l'effet de ces espèces de castagnettes dont on obligeait autrefois les lépreux à faire usage dans certaines villes de Hollande pour annoncer leur contagieuse présence. (B.)

CLARCKIE. *Clarckia*. BOT. PHAN. Pursh (*Flora Americæ septentrionalis*, vol. 1, p. 260) décrit une Plante sous ce nouveau nom de genre qu'il avait précédemment établi dans les Transactions de la Société Linnéenne de Londres. Ce genre appartient à la famille des Onagracées et à l'Octandrie Monogynie, L. Il est ainsi caractérisé : calice tubuleux à quatre segments, comme dans le genre *Eurothera*; corolle composée de quatre pétales disposés en croix, rétrécis à leur base en un onglet très-mince, ayant un limbe trilobé; huit étamines, dont quatre munies d'anthères linéaires; les quatre autres de moitié moins longues et supportant des anthères arrondies, ne sont que des étamines avortées; stigmate quadrilatère et pelté; capsule à quatre loges.

La seule espèce que l'on connaisse de ce genre, est figurée dans Pursh (*loc. cit.*) sous le nom de *Clarckia pulchella*, que Poirlet, dans le Dictionnaire encyclopédique, a changé en celui de *C. elegans*. C'est une Plante herbacée, à feuilles alternes et dont les fleurs ont une belle couleur rose ou pourpre. Elle a été trouvée par Lewis, gouverneur de la Californie septentrionale, sur le banc formé par le Kooskoosky et la rivière de Clark, deux des branches principales du fleuve Columbia. (G. N.)

CLARIA. POIS. (Belon.) Probablement la Loite. F. GADE. (B.)

CLARIAS. POIS. (Gronou.) Syn. de Silure anguille. (B.)

\* CLARIONÉE. *Clarionea*. BOT. PHAN. Genre de la famille des Synanthérées, section des Labiatiflores de DeCandolle, Syngénésie égale, L., extrait des *Perdicium* par Lagasca, et que De Candolle a adopté dans son troisième Mémoire sur les Labiatiflores.

flores, inséré dans les Annales du Muséum d'Histoire Naturelle, vol. 19, p. 65. Ce dernier auteur a fait figurer l'analyse des fleurs du *Clarionea magellanica* ou *Perdicion magellanicum*, Willd., et a donné à ce genre les caractères suivans : involucre oblong, imbriqué, composé de folioles membraneuses ou scarieuses sur leurs bords; fleurons extérieurs plus grands que les autres, et simulant les rayons des fleurs radiées, tous, sans exception, bilabiés, hermaphrodites; la lèvre intérieure formée de deux lanières très-étroites et roulées ensemble en spirale; réceptacle ponctué, nu, ou, selon Lagasca, cilié dans quelques espèces sur le bord des points; aigrette sessile, poilue et couverte de dents très-fines et nombreuses.

Les Clarionées sont des Plantes herbacées ou sous-frutescentes, à feuilles entières ou pinnatifides. Lagasca en cite plusieurs espèces sans description. La seule authentique est donc celle qui a servi à l'établissement du caractère générique par De Candolle, ou le *Cl. magellanica*. Depuis la publication du Mémoire de De Candolle, Lagasca a changé le nom de *Clarionea* qu'il avait lui-même donné au genre dont il s'agit, en celui de *Perezia*. Nous ne pensons pas qu'on doive se soumettre à une pareille fluctuation, et nous ne parlerons du *Perezia* que comme synonyme. (G..N.)

**CLARIONIE.** BOT. PHAN. Pour Clarionée. V. ce mot. (G..N.)

**CLARISIA.** BOT. PHAN. Genre fondé par Ruiz et Pavon dans la Flore du Pérou, et auquel ils assignent les caractères suivans : Arbres dioïques; fleurs mâles disposées en chatons filiformes, n'ayant pour calice qu'une très-petite écaille; fleurs femelles possédant un périanthe particulier composé de quatre à six écailles peltées, et deux styles réunis par la base. Le fruit est une drupe monosperme. Les auteurs de ce genre l'ont placé dans la Dicotyle Diandrie, et, d'après l'exposition de ses caractères, il paraît appartenir à la famille des Amentacées de

Jussieu ou à celle des Myricées de Chard, qui en est un démembré.

Aucune nouvelle espèce n'a ajoutée aux deux premières dont la description est due à Ruiz et Pavon. Celles-ci sont des Arbres indigènes des forêts du Pérou, possédant un dur qui exsude un suc laiteux. L'un d'eux (*Clarisia racemosa*) a l'écorce intérieure rouge. L'autre (*Clarisia flora*) a cette écorce blanche; sa tige particulière est le bord des

**CLARKIE.** BOT. PHAN. Pour Clarkie. V. ce mot.

**CLARY.** BOT. PHAN. Syn. de Salsola des prés en Angleterre.

**CLASSES.** HIST. NAT. GÉN. On appelle ainsi les grandes divisions établies dans les trois règnes de la nature pour rassembler les différens êtres qui les composent. Ce mot n'ayant point un sens rigoureux et absolu, mais une acception variant suivant les divers systèmes d'espèces de classifications et même les branches de l'histoire naturelle, dans lesquelles on s'en sert, nous en traiterons aux mots MÉTHODES et SYSTÈMES. (A..R.)

**CLASSIFICATION.** HIST. NAT. GÉN. Le nombre des êtres dont s'occupe chaque branche de l'histoire naturelle est tellement grand, que pour arriver à la connaissance de chacun d'eux, ou en retrouver un en particulier, les naturalistes ont de bonne heure senti la nécessité de les grouper dans un ordre quelconque, soit d'après des considérations étrangères à leur corps, soit d'après des caractères particuliers d'eux-mêmes. C'est à ces arrangements que l'on a donné le nom de *Classifications*. Les aspects sous lesquels les corps peuvent être envisagés, sont tellement nombreux, qu'il est fort difficile de déterminer le nombre des Classifications qui ont été proposées par les divers naturalistes. Cependant, en considérant d'une manière générale, il existe deux séries principales de Classifications, les Classifications



riques et les Classifications méthodiques. Dans les premières, les êtres sont groupés d'après des considérations qui leur sont étrangères : tel est, par exemple, l'ordre alphabétique qui peut être employé que pour des êtres qui tous sont déjà connus, au moins de nom. Les secondes, au contraire, sont fondées sur les caractères tirés d'un ou de plusieurs organes. Dans le premier cas, elles ont reçu le nom de Classifications *artificielles*; on les nomme Classifications ou *méthodes naturelles* dans le second cas. Mais cette dernière expression nous paraît un peu à-fait impropre. En effet il n'existe pas, il ne peut pas exister de *méthode naturelle*. Aucune Classification n'est dans la nature; toutes sont le résultat de l'observation et des conclusions de l'Homme. Il existe des groupes plus ou moins naturels de végétaux ou d'Animaux, c'est-à-dire que la nature leur a donné une forme, une organisation tellement analogue, que leur ressemblance peut être facilement appréciée par tous les Hommes. C'est à ces groupes que l'on a donné le nom de *familles naturelles* (V. ce mot). Mais, nous le répétons, il n'existe pas de méthode naturelle. Au lieu d'employer les mots d'*artificielles* et de *naturelles*, pour désigner les deux espèces de Classification que nous avons établies, nous préférons employer les mots de *système* et de *méthode*. Un *système* est une classification dans laquelle les caractères des classes sont tirés d'un seul organe. Ainsi, en botanique, Tournefort a établi un système d'après la forme de la corolle, Linné d'après les organes sexuels, etc. Dans une *méthode*, au contraire, on fait concourir à la formation des classes, l'ensemble des matières tirées d'un grand nombre d'organes. Nous développerons ces deux fondamentales aux articles MÉTHODES et SYSTÈMES. (A. R.)

**CLASTA.** BOT. FRAN. Nom générique donné par Commerson à une espèce de Caséarie, *Casearia fragilis*, L'Herminier. Ce genre n'ayant pas été

adopté, V. CASÉARIE et SAMYDÉES. (G. N.)

\* **CLATHRAIRE.** *Clathraria.* BOT. FOSS. Nous avons désigné sous ce nom (V. Classif. des Végétaux fossiles, Mém. Mus. T. VIII) un genre de tiges fossiles caractérisé par des mamelons disposés en quinconce, et séparés par des sillons formant une sorte de réseaux dont les intervalles sont plus larges que hauts; les mamelons portent une impression de base pétiolaire en forme de disque plus large que haute, ordinairement échancrée supérieurement et présentant vers son milieu deux ou trois petits points qui indiquent l'insertion des faisceaux vasculaires du pétiole. Ces Fossiles sont propres aux terrains houilliers. Nous n'en avons vu jusqu'à présent que des échantillons peu étendus. Ces Végétaux fossiles paraissent assez rares, puisqu'aucun auteur n'en avait encore figuré. Nous en connaissons cependant trois ou quatre espèces, et nous pensons qu'elles peuvent se rapporter à des tiges de Fougères arborescentes. (AD. B.)

**CLATHRE.** *Clathrus.* BOT. CRYPT. (*Champignons.*) Ce genre, l'un des plus remarquables parmi les Champignons, a été établi et parfaitement caractérisé par Micheli (*Nov. Gen.* p. 215, t. 95) qui en a donné une description meilleure que celle d'aucun des auteurs plus récents. Linné, en y réunissant les genres *Clathroides* et *Clathroidastrum* de Micheli, en avait fait un genre composé des Plantes les plus disparates. Les botanistes modernes sont revenus au genre de Micheli, qui est ainsi caractérisé : Champignon presque globuleux, entièrement renfermé dans sa jeunesse dans une volva charnue, persistante, formée d'une partie creuse et percée de trous, renfermant dans son intérieur une matière farineuse, blanchâtre, et dans son centre une substance gélatineuse. Ces deux matières se résolvent, lors du développement complet de la Plante, en un liquide épais et fétide, qui sort par les trous

du *Champignon*. Origine, voisin surtout des *Phallus*, formé avec ce genre et quelques autres le petit groupe des *Clathroides*, rapporté tantôt aux *Champignons* proprement dits ou *Gymnocarpes*, tantôt aux *Angiocarpes*. V. *CLATHROIDES*.

Les espèces du genre *Clathrus* sont peu nombreuses, deux habitent l'Europe : ce sont les *Clathrus ruber* et *Clathrus flavescens* de Persoon; peut-être ce dernier qu'aucun auteur moderne n'a observé, et qui n'est figuré que par Barrhier (*Plant. Icon.* 1265) n'est-il qu'une variété du premier.

Le *Clathrus ruber* qui est assez commun dans le midi de l'Europe, est un des plus beaux *Champignons* connus. Lorsqu'il est parvenu à son état parfait, d'une volva d'un blanc jaunâtre, et divisée en trois ou quatre lobes, il sort une tête arrondie d'un beau rouge orangé, composée de branches anastomosées, et renfermant une matière noirâtre produite par les séminules mêlées à un fluide gélatineux. Cette matière qui devient de plus en plus liquide, et qui sort par les trous que présente le corps du *Champignon*, répand une odeur très-fétide qu'on observe dans presque toutes les Plantes de ce genre, ainsi que dans les *Phallus*.

Deux espèces de *Clathrus* croissent en Amérique : le *Clathrus crispus* de Turpin (*Atlas du Dict. des Sc. Nat.*; *Ramier, Fung.* t. 167, n), et le *Clathrus columnatus* de Bosc.

Turpin a figuré dans le *Dict. des Sc. Nat.*, comme un genre particulier, sous le nom de *Laternia tristapa*, un *Champignon* qui se rapproche par plusieurs caractères des *Clathrus*, et surtout de la dernière espèce que nous venons de citer, mais qui mérite cependant d'en être distingué. V. *LANTERNE*, *Laternia*.

Raffinesque avait aussi formé du *Clathrus columnatus* un genre particulier sous le nom de *Columnaria*. Mais cette distinction ne nous paraît pas fondée sur des caractères suffisants pour être adoptée.

Le *Clathrus Campana* de Loureiro

n'appartient certainement pas à ce genre; il paraît même, d'après la description assez incomplète de cet auteur, devoir faire un genre nouveau très-voisin des *Phallus*. Sa description lui donne surtout la plus grande analogie avec le *Phallus indusiat* de Ventenat; mais Loureiro ne parle pas de la volva, et dit au contraire que le pédicule est nu, caractère qui se paraîtrait propre à distinguer cette Plante des *Phallus*, ou plutôt du genre *Hymenophallus*, auquel appartient *Phallus indusiat*, si toutefois il a été bien observé. (AD. B.)

\* *CLATHROIDASTRUM*. BOT. CRYPT. (*Lycoperdaceés*.) Le genre fondé par Micheli sous ce nom avait été confondu par Linné avec les *Clathrus* dont il diffère cependant beaucoup. Il correspond exactement au genre *Stemonitis* de Persoon, mais non aux *Stemonitis* de Gmelin et de Toentepohl, qui comprennent les genres *Arcyria*, *Stemonitis* et *Trichia* de Persoon. V. *STEMONITIS*. (AD. B.)

\* *CLATHROIDES*. BOT. CRYPT. (*Lycoperdaceés*.) Micheli avait établi sous ce nom un genre que Linné réunit aux *Clathrus*, quoiqu'il en différât extrêmement. Persoon l'a rétabli sous le nom d'*Arcyria*. V. ce mot. (AD. B.)

\* *CLATHROIDÉES*. BOT. CRYPT. (*Champignons*.) Nous désignerons sous ce nom un groupe de *Champignons* désignés successivement par les noms de *Lytothecii* par Persoon, de *Rhantisporei* par Link, de *Fung. Pistillares* par Nées, groupe assez naturel, mais dont la position est très-difficile à fixer, et dont on se peut-être obligé de former une famille particulière.

Fries et Link les placent parmi les *Champignons* à séminules renfermées dans un péricidium ou angiocarpe; Persoon et Nées les rangent au contraire parmi les vrais *Champignons*, opinion qui nous paraît plus exacte; mais il est certain qu'ils présentent des points d'analogie avec c

ur familles, et qu'ils forment entre eux un passage assez naturel.

Ainsi la volva qui enveloppe le champignon dans sa jeunesse a plus d'analogie avec la volva des Agarics d'autres Champignons, qu'avec leidium des Lycoperdaciées; la paracentrale qui sert de support aux minules est charnue et non pas filamenteuse comme dans toutes les Lycoperdaciées; enfin la disposition des minules elles-mêmes, quoique différant beaucoup de celles des vrais champignons, se rapproche encore davantage de celle de quelques genres de cette famille, tels que les *Agarici* déliquescents de la section des *aprinus*, que de celle des *Lycoperdaciées* ou autres Champignons angiospermes. L'absence de volva dans quelques genres encore peu connus, s'ils appartiennent bien à cette famille, couvrirait d'une manière évidente que ce n'est pas un périidium. Ce caractère est indiqué dans le genre *Ædycia* de Adolphe et dans le *Clathrus camana* de Loureiro. Dans tous les genres bien connus, il existe une volva charnue et en partie mucilagineuse, au centre de laquelle s'élève ou un pédicule creux portant à son sommet un chapeau dont la surface extérieure est couverte de cellules remplies de sporules mêlées à une matière mucilagineuse, ou un corps central creux, charnu, composé de branches diversement anastomosées, et renfermant entre elles des sporules mêlées également avec une substance mucilagineuse. Le caractère essentiel de cette famille consiste donc dans la manière dont les sporules sont mêlées avec une matière muqueuse qui les entoure sous forme d'un liquide d'une odeur en général très-fétide.

Les genres de cette section sont les suivants :

\* PHALLOIDES.

*Battarea*, Pers. (*Dendromyces*? Lichsch.) — *Phallus*, Pers., *Hymenophallus*, Nées. — *Ædycia*, Raff.

\*\* CLATHROIDES.

*Clathrus*, Pers. (*Colonnaria*, Raff.) — *Laternia*, Turp. *V.* ces mots. (Xp. n.)

CLATHRUS. MOLL. Ocken a désigné sous ce nom le Scalaire. *V.* ce mot. (D. H.)

CLATTER-GOOSE. ois. Syn. anglais du Cravant, *Anas Bernicla*. *V.* CANARD. (D. R. Z.)

\* CLAUCEA ET CLAUSENA. BOT. RHAN. Ce genre a été proposé par N.-L. Burmann (*Flora Indica*, p. 87) pour une Plante indigène de l'île de Java, dont il a donné la description suivante : calice monophylle à quatre dents courtes et planes; corolle formée de quatre pétales arrondis et sans onglet; huit étamines plus courtes que la corolle, à filets subulés et réunis à leur base en un urcéole entourant l'ovaire; style plus petit que les étamines, surmonté par un stigmate simple. L'unique espèce (*Claucea excavata*) dont se compose ce genre, est un Arbre dont les feuilles sont alternes et pinnées; chaque foliole est pétiolée, oblongue, presque entière et pubescente. Les fleurs sont disposées en grappes.

La description précédente a sans doute paru trop incomplète à A.-L. de Jussieu, pour qu'il pût établir les rapports du *Claucea* avec d'autres genres connus; il l'a en conséquence placé parmi les genres *incertæ sedis*, à la fin du *Genera Plantarum*. Lamarck (Dict. Encycl.) lui a reconnu des affinités avec certaines Térébinthacées, et notamment avec le *Brucea*. Il l'a figuré dans les Illustrations des genres, t. 310. (G. N.)

CLAUDEE. *Claudea*. (*Hydrophytes*.) Thalassiophyte de la classe des Floridées dont le caractère est d'avoir des tubercules en forme de silique allongée, attachés aux nervures par les deux extrémités. L'on ne connaît point de production marine, soit Plante, soit Polypier, dont l'aspect soit aussi singulier que celui de cette Thalassiophyte, et qui réunisse au même degré la variété dans les couleurs, la grâce dans le port, et la délicatesse dans l'organisation. C'est sur les côtes de la Nouvelle-Hollande que Péron a trouvé cette brillante produc-

tion, aussi extraordinaire par sa forme que par la manière dont la fructification est fixée aux feuilles.

D'un petit empatement qui sort de racine s'élève une tige rameuse et garnie de feuilles qui émettent sur un seul côté une membrane invisible à l'œil nu dans l'état de dessiccation, à bords échancrés comme les ailes des Chauve-Souris, et se courbant presque en demi-cercle. Cette membrane est soutenue par des nervures qui partent de la principale : rapprochées à leur origine, elles s'éloignent en divergeant vers les bords, et se courbent légèrement au sommet des feuilles. Elles sont liées entre elles par d'autres petites nervures parallèles, et réunies les unes aux autres par de petites fibres parallèles également entre elles, et aux nervures rayonnantes, de sorte que ces feuilles sont ornées de quatre ordres de nervures, se croisant presque à angle droit, et diminuant de grosseur en diminuant de grandeur ; la membrane paraît séparée de la nervure principale qui n'est qu'un prolongement de la tige ou des rameaux. Dans la partie moyenne des feuilles, présentant une courbure presque parallèle à leurs bords, se trouve une grande quantité de fructifications formées par la réunion des petites fibres et des petites nervures, et par la destruction de la membrane. Ce sont des tubercules en forme de silique, atténués aux deux extrémités, et fixés par elles aux nervures rayonnantes. On trouve quelquefois jusqu'à douze de ces tubercules parallèles les uns aux autres, et situés entre les mêmes nervures ; ils sont remplis de capsules granifères presque visibles à l'œil nu. La grandeur des *Claudea* varie d'un à deux décimètres.

Ne les ayant jamais vues vivantes, nous ne pouvons rien dire de la durée de leur vie ni de leur couleur lorsqu'elles sont fraîches ; desséchées, elles offrent des nuances rouges, vertes, jaunes, violettes, qui se fondent les unes dans les autres de la manière la plus gracieuse. On ne connaît

encore qu'une seule espèce de ce genre, le *Claudea elegans*, ainsi nommé à cause de sa beauté. (LAM. X.)

**CLAUJOT.** BOT. THÉN. Un des noms vulgaires de l'*Arum maculatum*. V. GOUT.

**CLAUSENE.** *Clausena*. BOT. FR. V. CLAUENA.

**CLAUSILIE.** *Clausilia*. MOLL. Tous les auteurs avant Linné, et même ceux qui l'ont suivi jusqu'à Draparnaud, ont confondu les Coquilles de ce genre, tantôt avec une famille, tantôt avec une autre. C'est ainsi que Lister (Anim. Angl. T. II, fig. 6 et 8) les a désignées sous le nom de Buccin, ce qui est synonyme pour lui de Coquille allongée. Bonanni (Récré., 3<sup>e</sup> partie, fig. 41) et Müller (Zool. Denica, vol. 3, p. 102, fig. 1, 2 et 3) en font des Turbots, comme Chemnitz (Conch. 9, t. 123, fig. 76, p. 1-2) et Linné, après eux, l'ont également admis. Geoffroy (Traité sommaire des Coquil. terr. et fluv. des environs de Paris, p. 65), divisant les Coquilles terrestres en globuleuses et en allongées, a subdivisé ces dernières en deux paragraphes, celles qui tournent à droite et celles qui tournent à gauche, et, sous la dénomination de *Nompareille*, il est le premier qui ait indiqué une séparation entre deux genres, quoi qu'il n'ait pas fait mention des caractères essentiels. Dargenville (Conch., 2<sup>e</sup> part., pag. 83, pl. 9, fig. 15-14), suivant la dénomination de Lister, leur conserve le nom de Buccin. Après lui, Bagnière (Encycl. méth.) établissent des coupes plus naturelles, les rapprochant, dans son genre Bulime, des Maillots, des Ampullaires, des Lymnées ; et Olivier (Voyage au Levant, T. 1<sup>er</sup>, p. 297 et 416), suivant les préceptes de son ami, décrit également sous le nom de Bulime les nouvelles espèces qu'il découvrit dans le cours de son voyage. Enfin, Draparnaud, auquel nous devons des recherches intéressantes sur les Mollusques terrestres et fluviatiles de France, est le



remier qui ait fait le genre *Clausilie*, et qui lui ait donné ses caractères (Hist. des Moll. terr. et fluvi. de France, p. 34). Tout en les séparant du genre *Bulime* de Bruguière, il les a pourtant placés près de ces derniers et du genre *Maillet* qui en a été également extrait. Cuvier (Règn. Anim. T. II, p. 109) admet le genre de Draparnaud, et, comme lui, le place auprès des *Hélices*, après les sous-genres *Bulime*, *Maillet*, etc. Férussac (Syst. des Anim. Moll., p. 52, n° 14) (fig. 62) admet aussi le genre des *Clausilies*, mais comme quatrième groupe de son sous-genre *Cochlodina*, leur conservant les caractères suivans qui sont ceux de Draparnaud : bouche armée ; des lames, dont une en opercule élastique.

Lamarck (Anim. sans vert. T. VI, p. 2) circonscrit le genre *Clausilie*, en admettant que les Coquilles qui ont le péristome continu, ne regardant pas comme essentiel le caractère de la lame operculaire élastique, puisque tantôt elle existe, et que tantôt elle n'est que rudimentaire ou qu'elle ne se rencontre pas du tout. On pourrait pourtant observer que parmi les espèces citées par Lamarck, deux seulement ne rentrent pas dans le groupe de Férussac, et cette circonstance ne nous paraît pas suffisante pour détruire le caractère donné par Draparnaud, puisque, dans ses Prodrômes, Férussac en cite trente-une espèces qui sont toutes pourvues de cette lame élastique. Quoi qu'il en soit, voici les caractères qu'il convient de donner à ce genre : Animal à corps glisse, semblable à celui des *Hélices*, seulement plus allongé ; trachéeillante en tube conique et court, reçue dans la gouttière de la columelle ; coquille fusiforme, à sommet glisse et obtus ; ouverture arrondie, ovale, présentant un sinus pour le passage de la trachée ; à bords partourneus, libres, réfléchis en dehors. Parmi les espèces qui sont connues, nous citerons de préférence celles qui se rencontrent en France et qui ont été décrites par Draparnaud, ainsi que

quelques-unes des belles espèces rapportées par Olivier de son voyage au Levant.

La *CLAUSILIE COL-TORS*, *Clausilia torticolis*, Lamk. (Anim. sans vert. T. VI, p. 115, n° 1). Jolie Coquille tournant à gauche, cylindrique et tronquée. Elle est d'un jaune ferrugineux ; ses stries sont droites et élégantes ; son col est rétréci, anguleux et courbé ; sa bouche sans dents. C'est l'*Helix Cochlodina torticolis* de Férussac (Tab. des Moll. p. 62, n° 515), qui est très-bien figurée dans le Voyage au Levant d'Olivier, sous le nom de *Bulimus torticolis* (pl. 17, fig. 4, A, B). Elle habite Staudid.

La *CLAUSILIE LISIE*, *Clausilia bidens*, Drap. (p. 68, n° 2, pl. 4, fig. 5, 6 et 7), est une Coquille répandue dans toute l'Europe, nommée *Helix bidens* par Müller (Hist. Verm., pl. 2, pag. 116, n° 315), *Turbo bidens* par Linné (p. 3609, n° 87), *Helix Cochlodina derugata* par Férussac (Tab. des Moll., p. 65, n° 529). Elle est figurée dans Favanne (*Conch.*, p. 65, fig. 2, 11) et dans Martini (*Conch.*, t. 112, fig. 950, n° 1). Elle se distingue par sa forme allongée, un peu ventrue, sa couleur corneée claire et ses surfaces lisses, très-légèrement striées, transparentes, luisantes ; son ouverture est ovale, munie de deux gros plis sur la columelle, et de deux autres plus petits et plus enfoncés sur l'autre côté. Elle présente toujours à l'état adulte le petit osselet élastique.

La *CLAUSILIE PAPILLEUSE*, *Clausilia papillaris*, Drap. (Hist. des Moll. terr. de France, p. 71, n° 5, pl. 4, fig. 15), Lamk. (Anim. sans vert. T. IV, p. 115, n° 110) ; *Bulimus papillaris*, Bruguière (Encycl., p. 553, n° 94) ; *Helix papillaris*, Müller (Hist. Verm., part. 2, p. 120, n° 317) ; figurée par Favanne (*Conch.*, t. 65, fig. 2, 9) et par Martini sous le nom de *Turbo papillaris* (*Conch.*, t. 9, part. 1, p. 121, t. 112, fig. 963-964) ; *Helix Cochlodina papillaris*, Férussac (Tabl. systém. des Moll., p. 62, n° 528). Cette jolie espèce est remar-

quable surtout par ses sutures couronnées de petits tubercules blancs ; la coquille est diaphane, brun pâle ou cendré ; les stries longitudinales sont bien apparentes ; la spire est composée de dix à douze tours ; l'ouverture est ovale. Elle offre sur la columelle deux plis blancs et un troisième transversal plus enfoncé ; le bord est blanc, très-évasé, détaché ; l'osselet élastique se rencontre toujours dans cette espèce. Toute la Coquille est longue de huit lignes environ. Elle habite la France septentrionale.

La CLAUSILIE VENTRUE, *Clausilia ventricosa*, Drap. (Hist. des Moll. terres. de France, p. 71, n. 6, pl. 4, fig. 14). C'est l'*Helix perversa* de Sturmer, et le *Turbo buplicatus* de Montagu (Test. Britan., t. 11, fig. 5) ; *Helix Cochlodina ventriculosa* de Férussac (Tab. syst. des Moll., p. 63, n. 531). Cette Clausilie est fusiforme, ventrue, transparente, brune, striée ; ses stries sont saillantes ; sa spire composée de onze à douze tours ; ouverture ovale bidentée ; péristome blanc peu réfléchi. Elle habite la Bresse, la Lorraine où nous l'avons trouvée en juin 1823, la Suisse, l'Allemagne et l'Angleterre.

Nous pourrions donner un plus grand nombre d'espèces ; mais ne voulant pas passer les limites qui nous sont tracées, nous renvoyons à l'ouvrage de Draparnaud (*loc. cit.*) pour les espèces de France ; à celui d'Olivier pour les espèces du Levant, et à celui de Férussac pour un grand nombre d'autres espèces de tous les pays. (D..H.)

\* CLAUSS-RAPP. OIS. Nom allemand d'une espèce de Coracias que Buffon a surnommée Sonneur, et que Linné a décrite sous le nom de *Corvus eremita* d'après Gesner qui paraît ne l'avoir pas vue. (DR..Z.)

CLAUSULIE. *Clausulus*. MOLL. Le Clausulie de Montfort (T. 1, p. 178) et la Mélanie de Lamarck (Anim. sans vert. T. VII, pag. 615) sont deux genres établis pour le même être ; c'est le *Nautilus Melo* de von Fichtel

(Test. microsc., p. 118, fig. A, B, C, D, E, F). V. MÉLONIE. (D..H.)

CLAVA. POLYP. V. CLAVÉE.

\* CLAVAGELLE. *Clavagella*. MOLL. Ce genre, établi par Lamarck (Anim. sans vert. T. V, p. 430) pour former le passage de l'Arrosoir à la Fistulane, présente des particularités assez remarquables. Si nous le considérons dans ses rapports avec les autres genres de la même famille (les Tubicolées), nous le verrons former une transition naturelle et fort singulière. Dans l'Arrosoir, deux valves ouvertes, fixées et faisant partie du tube, se remarquent à sa face postérieure au-dessous de la corolle spinifère. Dans la Clavagelle, une massue également spinifère offre à l'un de ses côtés une seule valve enchâssée dans son épaisseur, tandis que l'autre reste libre sur la charnière dans l'intérieur du tube. La Fistulane, enfin, présente un tube qui n'est plus spinifère, et dont les deux valves sont libres dans le fourreau. La Clavagelle se trouve donc placée naturellement entre les deux genres qui ont avec elle le plus de rapport, et forme ainsi dans cette famille si bien réunie dans ses élémens, le passage insensible d'un genre à son suivant. Voici les caractères que Lamarck a donnés à celui dont il s'agit : fourreau tubuleux, testacé, atténué et ouvert antérieurement, terminé en arrière par une massue ovale, subcomprimée, hérissée de tubes spiniformes ; massue offrant d'un côté une valve découverte, enchâssée dans la paroi ; l'autre valve libre dans le fourreau. Outre ces caractères, nous pouvons en ajouter deux qui sont particuliers à notre observation : 1<sup>o</sup> c'est que la valve libre, rapprochée de celle qui est fixée, laisse des deux côtés un baillement assez notable, quoique celle-ci, à l'endroit de son insertion dans le tube, fasse un léger bourrelet qui correspond entièrement aux contours de l'autre valve ; 2<sup>o</sup> la charnière est munie le plus ordinairement d'un dent lamelleuse courbée, laissant der

est-elle une petite cavité pour l'insertion du ligament. Jusqu'à présent, on n'a connu de Clavagelles qu'à l'état fossile. Lamarck en a décrit trois espèces des environs de Paris, et Brocchi en a fait connaître une quatrième d'Italie sous le nom de *Teredo echinata*; enfin, dans nos recherches aux environs de Paris, nous en avons trouvé une cinquième sur laquelle nous avons fait les observations précédentes, et que nous avons décrite dans les Mémoires de la Société d'Histoire Naturelle sous le nom de *Clavagella Brongnartii* (V. la 2<sup>e</sup> part. de ses Mémoires, 1823). La Clavagelle décrite, *Clavagella echinata*, Lamk. Anim. sans vert. T. v, p. 432) a été décrite par cet auteur sous le nom de *Fistulana echinata* dans les Ann. du Mus. (vol. 7, p. 429, n. 3) où elle est très-bien figurée (vol. 12, pl. 45, fig. 9). Elle est fossile à Grignon.

La CLAVAGELLE A CRÊTE, *Clavagella cristata*, également fossile à Grignon, n'a été connue que par la phrase caractéristique que Lamarck (loc. cit.) en a donnée; elle n'a pas encore été figurée. Il n'en est pas ainsi de la troisième espèce, Clavagelle tibiale, *Clavagella tibialis*, fort bien figurée dans les Ann. du Mus. (vol. 12, pl. 43, fig. 8) et décrite avec précision sous le nom de *Fistulana tibialis* (p. 428, n. 2 du 7<sup>e</sup> vol. du même Recueil).

Enfin, la quatrième espèce à laquelle l'auteur des Anim. sans vert. a donné le nom de *Brocchi*, est celle que le conchyliologue italien avait nommée *Teredo echinata* sur laquelle il a fait plusieurs observations intéressantes auxquelles nous renvoyons, ainsi qu'à la figure de Brocchi (*Conch.*, vol. 2, p. 270, t. 15, fig. 1). (D. H.)

CLAVAIRES. *Clavaria*. BOT. CRYPT. (Champignons.) Ce genre, d'abord fondé par Linné, a depuis été limité à une partie seulement des espèces que ce naturaliste y avait placées. Malgré ces séparations nombreuses, Fries en compte encore cin-

quante-sept espèces, et Persoon, qui laisse parmi elles plusieurs des genres de Fries, en énumère, dans sa *Mycologia europæa*, quatre-vingt-cinq. Plusieurs des Clavaires de Linné, qui présentaient des loges ou conceptacles distincts, ont été rangées parmi les Sphériques; tel est le *Clavaria hypoxylon*, Bull. D'autres espèces sont devenues le type des genres *Geoglossum*, *Sparassis*, *Spathularia*, *Pistillaria*, *Typhula*, *Phacorrhiza*, *Mitrella*, etc., de sorte que l'ancien genre Clavaire correspond maintenant à la section entière des Clavariées. Le genre Clavaire proprement dit, ainsi que Fries l'a limité dans son *Systema mycologicum*, est ainsi caractérisé : Champignon charnu, simple, en forme de massue, ou rameux à branches rebrassées, sans pédicule distinct; membrane séminifère, lisse, couvrant toute sa surface, mais ne présentant de capsules (*thecæ*) que vers la partie supérieure.

Les formes très-différentes de ces Champignons les ont fait séparer en deux sections considérées même par quelques auteurs comme deux genres sous les noms de *Ramaria* et de *Clavaria*. Les premières forment des sortes de buissons composés d'une tige plus ou moins grosse et courte, divisée en un grand nombre de rameaux comprimés, rapprochés, fastigiés et en général d'une longueur à peu près égale. Les espèces de cette section sont très-nombreuses, plusieurs sont bonnes à manger, et comme elles atteignent une taille assez considérable, qu'elles croissent généralement en grande quantité dans un même lieu, et que les espèces bonnes à manger sont faciles à reconnaître, elles peuvent être d'une grande ressource pour les gens pauvres pendant l'automne. Les meilleures sont les suivantes :

CLAVAIRES FAUVE. *Clavaria flava*, Fries, *Clavaria Coralloides*, Bull., t. 222. Sa tige, grosse d'un pouce environ, est blanchâtre. Ses rameaux, simples inférieurement, se divisent supérieurement; ils sont égaux, fastigiés, et forment une tête arrondie de

trois à quatre pouces, d'un jaune plus ou moins foncé.

**CLAVAIRE CORALLOÏDE**, *Clavaria Coralloides*, L. Ne diffère de la précédente que par sa couleur toute blanche et par ses rameaux de longueur inégale et moins fastigiés.

**C. CENDRÉE**, *Clavaria cinerea*, Bull., t. 354. Cette espèce est toute grise, à rameaux serrés, sinueux; presque denticelés sur leurs bords, tronqués au sommet; c'est une des plus communes aux environs de Paris.

Il paraît que les autres espèces de cette section des Clavaires, et probablement même que toutes les Plantes de ce genre peuvent être mangées sans danger: mais quelques-unes sont ou trop coriaces, ou d'un goût amer qui empêche qu'elles soient comestibles; les précédentes sont les plus recherchées. — La singulière espèce que Bory de Saint-Vincent a découverte sur les troncs des vieux Lauriers aux îles Canaries et qu'il a figurée dans ses Essais sur les îles Fortunées, paraît être intermédiaire entre les deux sections de ce genre, si elle n'en forme un nouveau.

La seconde section de ce genre renferme les espèces simples en forme de massue, tantôt très-renflée, comme dans le *Clavaria pistillaris*, Bull., t. 244, tantôt presque cylindrique, comme dans les *Clavaria cylindrica*, Bull., t. 463, fig. 1, et *C. fistulosa*, Bull., t. 463, fig. 2. Aucune de ces espèces, dont un grand nombre croissent sur les feuilles mortes ou sur les bois pourris, n'est bonne à manger.

Fries a réuni à la fin du genre Clavaire, sous le nom de *Calocera*, quelques petites espèces remarquables par leur nature presque gélatineuse ou cornée, simples ou rameuses, mais sans pédicule distinct du reste de la Plante; ces Champignons sont jaunes ou orangés, et croissent sur les bois pourris. Les espèces les plus connues de ce genre sont:

**CALOCÈRE VISQUEUSE**, *Calocera viscosa* (*Clavaria viscosa*, Pers.); elle est rameuse à rameaux divisés et aigus; sa couleur est d'un beau jaune;

elle atteint jusqu'à plus d'un pouce.

**CALOCÈRE CORNÉE**, *Calocera cornes* (*Clavaria aculeiformis*, Bull., t. 463, fig. 4). Elle forme sur les bois morts des petites pointes simples ou peu rameuses, presque coniques, aiguës, d'un jaune orangé. Elle est commune aux environs de Paris. (AD. B.)

**CLAVAILIER**. BOT. PHAN. *V. ZANTHOXYLE*.

**CLAVARIE**. *Clavaria*. BOT. CRYPT. (*Hydrophytes*.) Stackhouse, dans la deuxième édition de sa Néréide Britannique, donne le nom de Clavarie à son trentième genre, composé d'une seule espèce, le *Fucus clavatus*, Lamx., Dissert., appartenant maintenant au genre Gélidie. *V.* ce mot.

(LAM.X.)

**CLAVARIÉES**. *Fungi clavati*. BOT. CRYPT. (*Champignons*.) On désigne sous ce nom une des sections de la famille des Champignons, qui renferme toutes les espèces dont la membrane fructifère recouvre entièrement ou en grande partie la substance charnue du Champignon, lequel n'offre pas de chapeau distinct, mais qui a la forme d'une massue simple, ou qui est irrégulièrement divisé, à rameaux redressés; de manière que dans ces Plantes, la membrane fructifère est en même temps supérieure et latérale et forme ainsi un passage entre les vrais Champignons à membrane séminifère inférieure et ceux à membrane supérieure, tels que les Helvelles, les Pezizes, etc. Les genres *Leotia*, *Morchella*, dans cette dernière section, se rapprochent même beaucoup des Clavariées, tandis que les *Hecium*, parmi les premiers, ressemblent beaucoup à quelques Clavaires. *V.* ces mots et CHAMPIGNONS. Le genre Merisma de Persoon, quoique placé par la plupart des auteurs auprès des Théléphores et réparti même par Fries dans ce genre et dans les *Hymenium*, nous paraît avoir plus d'analogie avec les Clavaires. Les genres de cette tribu sont les suivants:

*Sparassis*, Fries; *Clavaria*, Fries; *Geoglossum*, Pers.; *Pisillaria*, Fries;



*ula*, Fries; *Typhula*, Fries; *acorchisa*, Pers.; *Mitrula*, Fries.

(AD. B.)

**CLAVATELLE.** *Clavatella*. BOT. FR. (*Chaodiniées*.) Il est difficile de savoir comment Lyngbye, observateur exact, a pu confondre avec ses acéphores une Plante d'une organisation aussi différente que l'est celle son *Chaetophora marina*, qui devient le type de notre genre Clavatelle; caractères de ce genre consistent des filamens qui se développent du centre à la circonférence, des globules, et mucosités, qui deviennent bientôt petites expansions membraneuses, bulbeuses, vides, élastiques, côtelées, imbriquées. Ces filamens sont fendus par sections transverses, et non par globules, comme dans les acéphores; ils sont entièrement dépourvus de matière colorée, et se terminent en massue, au lieu de renflemens dus au développement de la fructification qui est entièrement sensible.

Nous connaissons deux espèces fort remarquables dans ce genre : 1<sup>o</sup> *Clavatella Nostoc marina*, N. (F. planes de ce Dict.), *Chaetophora marina*, Lyngbye, Tent., p. 196, pl. 65 (figure imparfaite), *Ulva Nostoc*, De Cand., Fl. Fr., Suppl. Elle a l'aspect d'un petit Nostoc ordinaire, mais sa consistance est plus membraneuse et a couleur d'un brun jaunâtre. Elle croît sur les rochers, parmi les Fucus, à Saint-Jean-de-Luz, à Biarritz, toute dans le bassin d'Arcachon, et se trouve dans le Nord. 2<sup>o</sup> *Clavatella viridissima*, N., *Ulva bullata*, De Cand., Flor. Fr., Supplém. Croît aux mêmes lieux que la précédente en membranes qui ont un peu la consistance du cuir et se contractent avec élasticité. Elles sont du plus beau vert, tirant sur le bleu dans leur transparence. (B.)

**CLAVATULE.** *Clavatula*, Lamk., Cours. Montfort. MOLL. Dénomination d'un genre de Coquille réuni à celui de Pleurotome. F. ce mot.

(N. II.)

**CLAVE.** BOT. FRAN. L'un des

synonymes vulgaires de Trèfle. F. ce mot.

(B.)

**\*CLAVÉE.** *Clavea*. POLYPT. Genre de l'ordre des Tubulariées, dans la division des Polypiers flexibles, établi par Ocken pour un petit Animal que Müller a figuré dans la Zoologie du Danemarck; il lui donne pour caractères : Animal contenu dans une enveloppe gélatineuse, gélatineux lui-même, à corps allongé, terminé en massue et couronné par douze tentacules. Une seule espèce compose ce genre; on la nomme la Clavée gélatineuse, *Clavea gelatinosa*, Ocken, *Hydra gelatinosa*, Gmel., Syst. Nat., p. 5869, n. 16.

Nous regardons cet Animal comme intermédiaire entre les Tubulaires d'eau douce et celles de mer. Il se trouve réuni en famille sur les Hydrophytes. Cuvier, Lamarck et Schweigger ne font aucune mention du genre Clavée. De Blainville, dans le Dictionnaire des Sciences Naturelles, est le seul qui le cite au mot CLAVA. (LAM. X.)

**CLAVEL.** BOT. PHAN. Syn. d'Oëillet chez les Espagnols qui nomment *Clavel de Muerto* (Oëillet de Mort) le Tagète que nous nommons ordinairement Oëillet d'Inde, et au Chili *Clavel de campo* le *Mutisia subulata* de Ruiz et Pavon.

Les Espagnols nomment encore le Girofle *Clavel*, ce qui signifie proprement Cion par excellence. (B.)

**CLAVEL, CLAVELADA, CLAVELADE ET CLAVELADO.** ROIS. Syn. de Raie bouclée dans la mer de Nice. (B.)

**CLAVELLAIRE.** *Clavellaria* et *Clavellarius*. INS. Olivier a le premier employé ce nom et l'a remplacé ensuite par celui de Cimex. Lamarck (Anim. sans vertèbres, T. IV, p. 175) a fait un mélange des deux dénominations en se servant en français du mot Clavellaire, et le remplaçant en latin par celui de *Cimex*. Enfin Leach a appliqué ce nom de Clavellaire, *Clavellaria*, à un genre démembré de

celui des *Cimbex* et comprenant les *Cimbex Amerince* et *marginata* de Fabricius. *V. CIMBEX.* (AUD.)

\* **CLAVELLE.** *Clavella.* ANNEL. Ocken a établi ce genre aux dépens de la famille des *Lernées*, et lui a donné pour caractères : corps mou, blanc, en forme de massue, terminé en arrière par deux ovaires entre lesquels est l'anus ; point de bras ni de crochets ; sang rouge. Ce genre comprend les *Lernea clavata* et *uncinata* de Müller. *V. LERNÉE.* (G.)

\* **CLAVELON DE SERRANIAS.** BOT. PHAN. C'est à-dire *petit Clou de montagne*. On appelle ainsi au Pérou la *Bacasia spinosa* de Ruiz et Pavon. (A. R.)

\* **CLAVER-APPELKINS.** BOT. PHAN. Rhéde dit qu'on appelle ainsi, en Belgique, le *Limonia acidissima*. *V. LIMONIER.* (A. R.)

**CLAVICÈRE.** INS. Nom générique d'abord adopté par Latreille et remplacé ensuite par celui de Cératine. *V. ce mot.* (AUD.)

**CLAVICORNES.** *Clavicornes.* INS. Grande famille de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, fondée par Latreille (Règn. Anim. de Cuv.) et comprenant, sous la dénomination de tribu, plusieurs familles établies dans ses précédents ouvrages. La famille des Clavicornes a pour caractères : quatre palpes ; élytres recouvrant entièrement la majeure partie du dessus de l'abdomen ; antennes grossissant insensiblement vers leur extrémité, ou terminées en massue de formes diverses, perfoliée ou solide, et toujours sensiblement plus longues que les palpes maxillaires, avec la base nue ou à peine recouverte. Les Clavicornes se nourrissent, au moins dans leur premier état, de matières animales. Cette famille a été divisée par Latreille (Nouv. Dict. d'Hist. Natur., seconde édit. T. VII, p. 182) de la manière suivante :

I. Palpes maxillaires longs et avancés dans les uns ; les labiaux plus grands ou aussi grands que les précédents, et terminés en massue dans

les autres ; corps allongé ; tête et corselet plus étroits que les élytres. † Tête dégagée ; palpes maxillaires longs ; abdomen ovoïde, embrassé par les élytres ; tarses à articles simples.

TRIBU I. Les PALPEURS.

†† Tête s'enfonçant postérieurement dans le corselet ; palpes maxillaires à peine plus longs que les labiaux ; abdomen en carré long ou cylindracé ; pénultième article des tarses bilobé.

TRIBU II. Les CLAIRONS.

II. Palpes maxillaires courts ou de longueur moyenne, et plus grands que les labiaux ; corps ovale ou arrondi dans les uns, oblong dans les autres, avec le corselet de la largeur des élytres ; du moins à sa base.

† Mandibules aussi longues ou moins que la tête ; antennes très-coudées ( toujours courtes et en massue solide) ; les quatre derniers pieds plus écartés entre eux à leur naissance que les deux antérieurs. Latreille observe qu'ici le corps est presque carré, et la tête reçue dans une échancrure du prothorax ; les élytres sont tronquées, les pieds contractiles et les jambes dentées.

TRIBU III. Les HISTÉRIDES.

†† Mandibules plus courtes que la tête, droites ou peu coudées ; tous les pieds séparés à leur naissance par des intervalles égaux.

I. Antennes plus longues que la tête de dix à onze articles distincts, grossissant insensiblement vers leur extrémité, ou terminées en une massue, soit solide, soit perfoliée, d'un à cinq articles.

TRIBU IV. Les PELTOÏDES.

TRIBU V. Les NITIBULAIRES.

TRIBU VI. Les DERMESTINS.

TRIBU VII. Les BYRRHIENS.

II. Antennes plus courtes ou guère plus longues que la tête, de six à sept articles dans les uns, en ayant davantage dans les autres, mais toujours depuis la troisième une massue dentelée en scie ou en fuseau.

TRIBU VIII. Les MACRODACTYLES.

Ces tribus n'ont pas été ainsi établies dans le T. III du Règn. Animal; mais elles correspondent à autant de grands genres qui les représentent. C'est ainsi que les Palpeurs et les Clairons sont compris dans le genre Clairon de Geoffroy, les Histerides dans celui des Escarbots ou Histers de Linné, les Peltoides dans celui des Boucliers ou Silphes du même auteur, etc. *V.* tous les mots de tribus. (AUD.)

**CLAVICULE. ZOOL. F. SQUELETTE.**

**CLAVICULE. Clavícula. MOLL.** Les anciens conchyliologues ou oryctographes entendaient par ce mot la columelle des Coquilles spirales qui ressemblaient plus ou moins aux vrilles que la Vigne produit pour s'accrocher. (D. H.)

**CLAVIÈRE ou CLAVIERS. POIS.** Syn. de Labre varié et une espèce de Spire sur certaines côtes de la Méditerranée. (B.)

**\*CLAVIFORME. Claviformis. ZOOL. et BOT.** Cette épithète s'emploie pour caractériser les différentes parties des êtres organisés qui ont plus ou moins la forme d'une massue, c'est-à-dire qui sont ovoïdes, allongés dans leur partie supérieure, et minces inférieurement. Parmi les Plantes, le spadice de l'*Arum vulgare* offre un exemple de cette forme. (A. R.)

**CLAVIGÈRE. Claviger. INS.** Genre de l'ordre des Coléoptères établi par Preysler (*W'erzeichniss Boehmischer Insecten*, p. 68, tab. 3, fig. 5, A, B), et ayant pour caractères: tarses terminés par un seul crochet; antennes grossissant insensiblement vers leur extrémité, de six articles, dont les derniers perfoliés; bouche simplement composée de deux très-petites mâchoires portant chacune un palpe très-court de deux à trois articles.

Ce genre singulier, rangé par Latreille (*Gener. Crust. et Ins. T. III*, p. 78) dans la famille des Psélaphiens, appartient (Règn. Anim. de Cuv.) à la section des Dimères et à une famille de même nom. Il se compose

d'une seule espèce, le Clavigère testacé, *Clav. testaceus* de Preysler (*loc. cit.*). Il a été rencontré en Allemagne. Panzer (*Fauna Ins. German.*, fasc. 59, fig. 3) l'a représenté avec assez d'exactitude. (AUD.)

**CLAVIJE. Clavija. BOT. PHAN.** Genre établi par Ruiz et Pavon (*Prod. Fl. Peruv.*, p. 142) pour quatre Arbrisseaux du Pérou, dont ils n'ont pas décrit les caractères spécifiques, et qui, selon Robert Brown (*Observ. on Botany of Congo*, p. 46), appartiennent aux *Theophrasta* de Linné. Cet auteur les place dans la quatrième section de la famille des Myrtinées à côté du *Jacquinia*. Nous passerons sous silence l'exposition du caractère générique donné par les auteurs de la Flore du Pérou, puisqu'étant fondé sur des Plantes inédites, cette description ne serait d'aucune utilité.

(G. N.)

**CLAVIPALPES. Clavipalpata. INS.** Famille de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères, fondée par Latreille (Règn. Anim. de Cuv.), et ayant, suivant lui, pour caractères: premiers articles des tarses garnis de brosses en dessous; le pénultième bifide; antennes terminées en massue perfoliée; mâchoires ayant au côté interne un crochet écailleux. Les Clavipalpes se distinguent des autres familles de la même section par leurs antennes et surtout par la dent cornée dont le côté interne de leurs mâchoires est armé. Leurs antennes ont moins de longueur que le corps; les mandibules sont échancrées ou dentées à leur sommet; les palpes sont terminés par un article plus gros que ceux qui précèdent; le dernier des maxillaires est très-grand, transversal, comprimé presque en croissant; enfin le corps est arrondi, souvent même bombé et hémisphérique.

Les Insectes appartenant à cette famille se rencontrent dans les Bolets qui croissent sur les troncs d'Arbres, ou se trouvent sous les écorces et dans les bois pourris. On pourrait les réunir tous dans le grand genre

Érotyle de Fabricius. Latreille divise de la manière suivante les genres de la famille des Clavipalpes :

I. Dernier article des palpes maxillaires transversal presque en forme de croissant ou en hache.

Genres ; ÉROTYLE, ÉGITHE, TRI-TOME.

II. Dernier article des palpes maxillaires allongé et plus ou moins ovulaire.

Genres : LANGURIE, PHALACRE.  
V. ces mots. (AUD.)

CLAVUS. MOLL. V. CLAVATULE.

**CLAYTONIE.** *Claytonia*. BOT. PHAN. Genre de la famille naturelle des Portulacées et de la Pentandrie Monogynie, qui a pour caractères distinctifs : un calice monosépale à deux divisions très-profondes ; cinq pétales soudés par leur base en une corolle monopétale régulière et comme campanulée ; cinq étamines libres dressées, opposées aux pétales, c'est-à-dire placées en face de leur lame intérieure, et insérées à leur base, caractère qui dénote une corolle monopétale. Ces étamines ont leurs anthères à deux loges tournées en dehors ; l'ovaire est libre et supère, à une seule loge, contenant de trois à six ovules dressés, insérés à un trophosperme charnu qui forme un tubercule lobé au fond de la loge. Du sommet de l'ovaire naît un style simple, cylindrique, qui se termine par un stigmate à trois divisions étroites. Le fruit est une capsule globuleuse ou à trois angles, offrant une seule loge intérieurement, qui contient ordinairement trois graines ovoïdes dressées, attachées au fond de la cavité. Cette capsule s'ouvre naturellement en trois valves à l'époque de sa maturité. Les graines renferment sous leur tégument propre un embryon cylindrique roulé circulairement autour d'un endosperme charnu.

Ce genre se compose d'environ une douzaine d'espèces qui toutes sont des Herbes annuelles, à feuilles un peu épaisses et charnues, à fleurs en grappes ou en sentules, qui ne croissent pas

naturellement en Europe. Nous distinguerons les suivantes :

La CLAYTONIE DE CUBA, *Claytonia cubensis*, Humboldt et Bonpl., Pl. Ég. 1, 91, t. 26. Cette belle espèce, qui a été trouvée par Humboldt et Bonpland à l'île de Cuba, dans les lieux inondés, sur les plages maritimes, près du port de Batabano, est annuelle ; ses feuilles radicales sont longuement pétiolées, rhomboïdales et comme spatulées ; ses tiges sont nombreuses, dressées, cylindriques, munies vers la partie supérieure d'une feuille perfoliée, creusée et marquée à son bord de deux ou trois petites dents ; les fleurs sont petites et blanches ; les unes disposées en grappes unilatérales ; les autres pédicellées, partant de la feuille perfoliée, et formant une petite ombelle simple. Cette espèce ressemble beaucoup à *Claytonia perfoliata* de Jacquin, dont elle diffère surtout par ses feuilles entièrement perfoliées et ses pétales échancrés en cœur. On la mange comme Plante potagère.

La CLAYTONIE DE VIRGINIE, *Claytonia virginiana*, L., Lamk. Ill., t. 144, f. 1. Elle est vivace. Sa racine est tuberculeuse, charnue ; ses feuilles radicales sont étroites, lancéolées, aiguës ; sa tige est dressée, cylindrique, haute de six à huit pouces, portant vers sa partie supérieure deux feuilles opposées, semblables à celles qui naissent de la racine ; les fleurs sont assez grandes, roses, formant une sorte de sentule ou ombelle simple au sommet de la tige. Cette espèce, que l'on cultive dans les jardins, est originaire de l'Amérique septentrionale. (A. B.)

**CLEF-DE-MONTRE.** BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires de la Lunaire commune, justifié par la forme de la silicule. (B.)

**CLEMA.** BOT. PHAN. Syn. d'Euphorbia *Esula*. V. EUPHORBIE. (B.)

\* **CLÉMATIDÉES.** *Clematidea*. BOT. PHAN. Nom donné par De Candolle à la première tribu qu'il a établie dans les Renonculacées ; et à la



uelle il assigne les caractères suivants : estivation du calice valvaire ou aduplicative ; pétales planes ou n'existant pas ; anthères linéaires extrorses ; arpelles monospermes indéhiscentes, terminant en une queue plumeuse ou l'accroissement du style après la fécondation ; graine pendante dans le sarcosperme, et ayant par conséquent un embryon très-petit à radicule supérieure. Les tiges des Clématidées sont sarmenteuses, rarement droites et herbacées ; leurs racines sont annuelles et fibreuses ; enfin leurs feuilles palmées sont constamment opposées.

Deux genres seulement composent cette tribu : le premier, *Clematis*, D. C., est formé de la réunion des *Clematis* et des *Atragene* de Linné ; le second avait été proposé autrefois par Adanson, et a été adopté par De Candolle qui l'a fait connaître sous le nom de *Naravelia*. F. ces mots.

(G. N.)

**CLÉMATITE.** *Clematis*. BOT. PHAN. Famille des Renouculacées, Polyandrie Polygamie, L. Ce genre, un des plus nombreux en espèces et le type d'une tribu de la famille où on l'a placé, présente les caractères suivants : involucre nul, ou, lorsqu'il en existe un, il est placé sous la fleur et a la forme d'un calice ; quatre à huit sépales colorés dont l'estivation est valvaire ou induplicative ; corolle nulle ou composée de pétales plus courts que le calice ; caryopses nombreuses sans pédicelles particuliers, et terminées par une queue le plus souvent plumeuse. Les racines des Clématites sont fibreuses et vivaces, et leurs tiges annuelles ou persistantes le plus souvent sarmenteuses et grimpantes. Elles portent des feuilles opposées, pétiolées, simples, entières ou lobées. Les pétales quelquefois prennent la forme de vrilles. Les pédoncules tantôt axillaires, tantôt terminaux, sont les uns disposés en panicules rameux, les autres triflores ; d'autres enfin sont solitaires et uniflores. Dans quelques espèces, deux bractées opposées, libres ou réunies en forme d'involu-

cre, accompagnent les pédicelles. Les fleurs ou plutôt les calices, le plus souvent blanchâtres, sont quelquefois bleus ou jaunâtres. La prolixité de l'exposition des caractères que nous venons de tracer, d'après le *Systema Vegetabilium* de De Candolle, prouve que le genre Clématite est composé de Plantes qui, quoiqu'ayant des affinités tellement prononcées qu'elles ne peuvent cesser de faire partie d'un seul et même groupe, offrent cependant assez de diversités dans leur organisation pour former des coupes considérées maintenant, à la vérité, comme de simples sections, mais qui, aux yeux de certaines personnes, pourraient passer pour de véritables genres. Cette dernière manière de voir n'est point celle du professeur De Candolle. Il fait observer (*Syst. Regn. Veget.* vol. 1, p. 132) que les caractères des sections sont combinés de telle sorte qu'ils enchainent ces sections, et empêchent que leur distinction soit bien tranchée.

Dans l'ouvrage précité, quatre-vingt-six espèces ont été décrites. Elles sont répandues sur tout le globe avec assez d'uniformité, eu égard néanmoins à la nature et à l'élévation du sol ; car en parlant de chaque section, nous ferons remarquer les stations qu'elles préfèrent. Ainsi, l'Amérique, l'Europe et les Indes-Orientales en nourrissent beaucoup plus que l'Afrique, l'Australasie, etc. Mais il faut observer que ces dernières contrées étant les moins connues, on ne peut pas comparer exactement le nombre de leurs Végétaux avec celui des autres pays.

D'après les formes du fruit, celles des feuilles et l'inflorescence, De Candolle a établi quatre sections dans le genre Clématite. La première qu'il nomme *Flammula* n'a ni involucre ni pétales, et ses caryopses sont terminées par des queues barbuées et plumeuses. Elle comprend plus des quatre cinquièmes de la totalité des espèces du genre, c'est-à-dire environ soixante-dix, sous-divisées en cinq

groupes fondés sur l'inflorescence. L'estivation du calice des *Flammula* est valvaire, tandis qu'elle est plus ou moins induplicative dans les autres sections. Ces Plantes habitent plus particulièrement les plaines que les autres Clématites. Parmi les espèces les plus intéressantes qu'elle nous offre, nous mentionnerons :

La CLÉMATITE FLAMMULE, *Clematis Flammula*, L. Sous-Arbrisseau de l'Europe méridionale et de l'Afrique méditerranéenne, dont les tiges grimpantes sont chargées de feuilles découpées à segmens glabres, entiers ou trilobés de diverses manières, et de fleurs blanches très-nombreuses. Une variété à feuilles découpées en segmens linéaires, indigène des lieux maritimes près de Montpellier, est cultivée dans les jardins où elle répand l'odeur la plus suave au mois d'août, époque de sa floraison. De toutes les Clématites européennes, c'est la moins dangereuse. Lorsque cette Plante est desséchée, les Animaux et les Hommes eux-mêmes, après l'avoir fait cuire dans l'eau, peuvent la manger impunément.

La CLÉMATITE DES HAIES, *Clematis Vitalba*, L. Espèce la plus commune de l'Europe moyenne et australe, à tige grimpante et à feuilles découpées en segmens ovales lancéolés, dentés et acuminés. Les pédoncules sont plus courts que la feuille. Elle est connue vulgairement sous le nom d'Herbe aux Gueux, parce que son suc est tellement caustique, qu'il fait naître sur la peau des ulcères d'une grande surface et peu profonds, par conséquent aussi dégoûtans que peu douloureux.

La CLÉMATITE À FEUILLES ENTIÈRES, *C. integrifolia*, L., remarquable par ses pédoncules uniflores, ses belles fleurs penchées et ses feuilles entières, ovales, lancéolées, est cultivée dans les jardins comme Plante d'ornement. Elle est indigène de Hongrie et des contrées orientales. Les *Clematis brissilliana*, *C. mauritiana*, *C. lineariloba*, *C. diversifolia* et *C. gentianoides*, D. C., figurées t. 1, 2, 3, 4 et 5

des *Icones selectæ* de M. Benjamin Delessert, appartiennent encore à la section des Flammules.

La seconde section qui porte le nom de *Viticella* n'a, de même que la précédente, point d'involucre ni de corolle; mais elle s'en distingue par la brièveté des queues qui terminent les caryopses et leur surface glabre ou simplement pubescente. On en compte quatre espèces dont une, *Clematis Viticella*, L., croît dans les haies et les buissons des parties australes de l'Europe. Les *Viticelles* se plaisent dans les collines et les lieux boisés et humides.

Dans la troisième section (*Cheiropsis*, D. C., *Muralia*, Adanson, *Vitornis*, Pers.), on observe un involucre caliciforme, situé au sommet du pédicelle et formé par l'intime réunion de deux bractées. L'estivation des sépales est presque induplicative. Il n'y a point de corolle, et les caryopses sont prolongées en queues barbuës. Cinq espèces, dont le *Clematis cirrhosa*, L. est le type, constituent cette section. Ce sont des Plantes indigènes des pays montagneux et chauds de l'Europe méridionale et des Indes-Orientales.

Enfin, la quatrième section, à laquelle De Candolle conserve le nom d'*Atragene*, que Linné lui avait imposé lorsqu'il la considérait comme un genre particulier, se reconnaît aux caractères suivans : involucre nul, quatre sépales dont l'estivation est induplicative; un grand nombre de pétales planes et de la moitié plus petits que les sépales; caryopses terminées par des queues barbuës. Les *Atrages* ont des tiges salementomies et grimpantes, des feuilles en fasciculus et divisées en segmens tridentés, et des pédoncules uniflores qui naissent en même temps que les feuilles. On n'en a décrit que quatre espèces qui habitent les montagnes pierreuses et froides de l'Europe, de la Sibirie et de l'Amérique du nord. L'*Atragene alpina*, L.; *Clematis alpina*, D. C., est une fort belle Plante à fleurs d'un bleu foncé, qui croît dans les Alpes et

es Pyrénées, mais que l'on ne trouve qu'en certaines localités particulières.

Les Clématites, si ressemblantes aux autres Renouculacées par les caractères ci-dessus exposés, s'en rapprochent aussi beaucoup par leurs propriétés. Leurs diverses parties, mais surtout la substance herbacée, lorsqu'elle est verte, appliquées sur la peau, sont des rubéfiants et même des vésicatoires assez actifs. Ces qualités s'évanouissent par la dessiccation ou la coction dans l'eau, ce qui porte à croire que le principe corrosif est relatif de sa nature. (G. N.)

**CLEMATITIS. BOT. PHAN.** Ce nom, dérivé de celui qui désignait la Vigne chez les Grecs, a été imposé comme spécifique à plusieurs Plantes de genres très-différens, par les anciens botanistes. Le *Clematis Filalba*, des Paulistes, des *Bauhinia*, un *Banisteria*, des *Lygodium*, le *Fumaria claviculata*, un *Eupatorium*, etc., l'ont porté; une Aristoloche le porte encore. (B.)

**CLEMENTEA. BOT. CRYPT.** (*Fougères*.) Cavanilles a donné ce nom au genre décrit quelques années avant, par Hoffmann, sous le nom d'*Angioperis*. F. ce mot. (AD. B.)

**CLÉNACÉES. BOT. PHAN. F.**  
**CHÉNACÉES.**

**CLEODOR. MOLL.** (Ocken.) Pour Cléodore. F. ce mot.

**CLEODORE. Cleodora. MOLL.** Linné (p. 3148) plaça parmi les Clios des Mollusques qui, quoiqu'ayant bien des rapports avec elles, présentent pourtant assez de différences pour être séparés en deux genres distincts, mais voisins. Brownne lui-même (Hist. Nat. de la Jamaïque, p. 386) avait antérieurement établi le genre Clio pour les animaux dont Péron et Lesueur ont fait ensuite le genre Cléodore, changeant ainsi la dénomination primitive pour l'appliquer à d'autres êtres. Ainsi le nom de Cléodore désigna les anciennes Clios de Brownne, et le nom de Clio fut réservé à des Mollusques qui n'avaient pas connus. Ce genre

a pour caractères : corps oblong, gélatineux, contractile, à deux ailes, ayant une tête à sa partie antérieure, et contenue postérieurement dans une coquille ; tête saillante, très-distincte, arrondie, munie de deux yeux et d'une bouche en petit bec ; point de tentacules (du moins, ils ne sont point encore connus) ; deux ailes opposées, membraneuses, transparentes, échancrées en cœur, insérées à la base du cou ; coquille gélatineuse - cartilagineuse, transparente, en pyramide renversée ou en forme de lance, tronquée ou ouverte supérieurement, au fond de laquelle l'Animal est fixé ; Lamk. (Anim. sans vert. T. VI, p. 288).

On avait placé parmi les Hyales quelques Coquilles qui paraissent plutôt devoir appartenir aux Cléodores : aussi Blainville les y plaça (Dict. des Sc. Natur., art. Cléodore), et nous pensons qu'on pourrait y ajouter un petit corps fossile qui se rencontre en abondance aux environs de Bordeaux, qui a tous les caractères des coquilles des Cléodores, si ce n'est qu'il est calcaire. Il est à remarquer que le corps des Cléodores, quoique très-saillant ordinairement hors de la coquille, est tellement contractile qu'il peut y entrer tout entier avec les deux uageoires.

**CLÉODORE PYRAMIDALE**, Blainv. (Dict. des Sc. Nat.) ; Cléodore en pyramide, *Cleodora pyramidata*, Lamk. (Anim. sans vert. T. VI, p. 288, n. 1) ; *Cleodora pyramidata*, Péron (Ann. du Mus., t. 15, pl. 2, fig. 14) ; *Clio pyramidata*, L. (p. 3148, n. 2). Brownne lui avait donné le même nom bien antérieurement, en 1756, dans son Hist. Nat. de la Jamaïque (p. 386, t. 45, fig. 1). Cette espèce est longue d'un pouce environ ; son corps est opaque ; sa tête arrondie est garnie d'un petit bec pointu et de deux yeux d'un beau vert. La coquille est longue de huit lignes environ ; elle est transparente, assez solide, et présente une carène saillante. L'ouverture est coupée obliquement.

**CLÉODORE À QUEUE**, *Cleodora cau-*

*data*, Lamh. (*loc. cit.*). Celle-ci est encore une *Clio* de Browne (Hist. Nat. de la Jam., p. 306, n. 2), ainsi que de Linné (p. 3148, n. 1); mais Lessueur (Nouv. Bullet. des Sc., mai 1813, n. 69) la range avec doute parmi les *Hyaes*. Blainville (Dict. des Sc. Natur.) n'hésite pas de la placer parmi les *Cléodores*, et nous pensons comme lui que c'est la seule place qu'elle doit occuper. L'Animal de cette espèce est en tout semblable à celui de la précédente; il n'en diffère que par la coquille qui est toujours plus grande (un pouce environ), plus comprimée et terminée par une pointe.

**CLÉODORE RÉTUSE**, *Cleodora retusa*, Blainv. (Dict. des Sc. Nat.); *Clio* n. 3, Browne (Hist. Nat. de la Jam.); *Clio retusa*, Linné (p. 3148, n. 3); *Clio vaginâ triquetâ, ore horizontali*, Müller (Zool. Dan. prodr. 2742). La *Cléodore* rétuse est encore plus grande que les précédentes, et peut-être n'est-ce que la *Cléodore* pyramidale, car elle n'en diffère essentiellement que par l'ouverture qui est horizontale au lieu d'être oblique. D'après la phrase de Linné, il semblerait que cette espèce a deux tentacules; mais ce fait demande à être vérifié.

**CLÉODORE ÉTRANGLÉE**, *Cleodora strangulata*? N. Cette espèce, qui n'a encore été décrite nulle part, du moins à ce que nous sachions, doit faire partie du genre *Cléodore* puisqu'elle en a tous les caractères, si ce n'est qu'elle offre un test calcaire quand les autres n'ont qu'une coquille cornée. L'ouverture de celle-ci est comprimée transversalement, ce qui lui produit deux angles; l'ouverture est séparée du reste par un rétrécissement, après lequel la coquille s'enfle, devient presque globuleuse, et se termine par une pointe courte mais aiguë. (D. H.)

**CLÉOMÉ**. *Cleome*. BOT. PHAN. Famille des *Capparidées*, Hexandrie Monogynie, L. Tournefort avait institué ce genre sous le nom de *Sinapis-*

*trum* que Linné, pour se conformer à ses propres principes, changea en celui qu'il a toujours porté depuis. On l'a aussi désigné en français sous le nom de *Mozambé*; mais ce mot, non technique, est très-rarement employé, tandis que celui de *Cléomé* l'est dans toutes les langues. Quelle que soit la dénomination usitée pour exprimer le genre dont il est ici question, il nous semble plus important de rechercher quel est ce groupe de Plantes et d'en définir les caractères. Les auteurs, en effet, ont placé parmi les *Cléomés*, des Plantes appartenant non-seulement à d'autres genres de *Capparidées*, mais encore à des genres de familles différentes. Ainsi plusieurs *Cléomés* de Burmann sont des *Héliophiles* dont la place est fixée parmi les *Crucifères*, et réciproquement quelques *Raphan* et autres *Crucifères* dans Willdenow appartiennent au genre que nous traitons ici. En outre, l'anomalie de formes dans certains *Cléomés* a décidé le professeur De Candolle à les séparer du genre *Cléomé* et à en constituer plusieurs genres partiels qui, par leur intime connexion, forment une tribu dans la famille des *Capparidées*, et à laquelle il donne le nom de *Cléomées*. V. ce mot. Cette tribu est donc l'ancien genre *Cléomé* de Linné. Les principales différences qui ont engagé De Candolle à établir ces nouveaux genres, consistent dans la soudure des filets des étamines avec le torus qui porte l'ovaire, et dans la forme des siliques. Nous ferons connaître les diversités de cette organisation en traitant des genres *Cleomella*, *Gynandropsis* et *Peritoma*, noms que leur a imposés leur auteur dans le *Prodr. Syst. universalis Regn. Veget.*, vol. 1, p. 237.

Voici les caractères du genre *Cléomé* ainsi réformé, tels qu'ils sont exposés dans l'important ouvrage que nous venons de citer : calice à quatre sépales, étalé, presque régulier; quatre pétales; torus presque hémisphérique; étamines le plus souvent au nombre de six, rarement quatre: é-



que déhiscente stipitée dans le calice ou quelquefois sessile.

Ce genre est partagé en deux sections : la première, qui porte le nom de *Pedicularia*, contient seize espèces. Elle se distingue par son torus charnu presque globuleux, et par son thécapore allongé. Toutes les Plantes de cette section sont indigènes de l'Amérique méridionale. Quelques-unes sont arborescentes. La seconde section est appelée *Siliquaria*, un générique donné antérieurement par Forskahl à plusieurs Plantes de ce groupe, et que Jussieu (*Gener. Plant.*, pl. 245) avait déjà reconnu pour être congénère du Cléomé. Dans cette section, le torus est petit, ainsi que le thécapore qui quelquefois n'existe pas. Elle est très-nombreuse, et sur les cinquante espèces bien connues de Cléomés, elle en renferme trente-quatre. Aussi, pour faciliter la recherche de chacune, De Candolle a sous-divisé la section en deux coupes : le premier se compose des espèces à feuilles simples, le second de celles dont les feuilles sont à trois, ou à sept folioles. Les Plantes de la section des *Siliquaria* sont indigènes des climats tempérés et tropicaux, et se trouvent répandues sur toute la terre entre certaines latitudes. Aucune n'est remarquable par les usages ou l'agrément de ses fleurs.

De toutes les Capparidées, le genre Cléomé est celui qui offre le plus de rapports avec les Crucifères. En ne voyant que les siliques, on s'y tromperait très-facilement ; mais l'organisation du reste de la fleur, et même celle des organes de la végétation et surtout des feuilles, suffisent pour assigner de cette famille le genre en question. On ne cultive que pour le seul motif de la curiosité, plusieurs espèces de Cléomés, et encore demandent-elles quelques soins pour réussir. Celles que l'on rencontre le plus communément dans les jardins de botanique et dont les fleurs ont une élégance toute particulière, n'appartiennent plus à ce genre. Elles

constituent le genre *Gynandropsis* de De Candolle. V. ce mot. (G. N.)

\* **CLÉOMÈES.** *Cleomeae.* BOT. PHAN. De Candolle appelle ainsi la première tribu de la famille des Capparidées, qui se compose du genre *Cleome* de Linné, lequel a été divisé en plusieurs genres distincts par les auteurs modernes, et entre autres par De Candolle. Le caractère principal de cette tribu consiste surtout dans son fruit sec, s'ouvrant naturellement en plusieurs valves membraneuses. Ce sont des Herbes ou des Arbrisseaux à feuilles généralement composées et recouvertes d'un duvet visqueux et glanduleux. (A. R.)

\* **CLÉOMELLE.** *Cleomella.* BOT. PHAN. De Candolle a donné ce nom à un nouveau genre de la tribu des Cléomées dans la famille des Capparidées, qui offre pour caractères : un calice de quatre sépales étalés ; une corolle de quatre pétales ; six étamines ; et pour fruit une capsule siliculiforme stipitée, plus courte que le calice qui l'enveloppe.

Ce genre, qui ne comprend qu'une seule espèce originaire du Mexique, portant des feuilles glabres et composées de trois folioles, et dont les fleurs sont jaunes, se distingue des autres genres de la même tribu par son fruit très-court. (A. R.)

**CLEONICON.** BOT. PHAN. (Dioscoride.) Syn. de Clinopode vulgaire. (B.)

**CLÉONIE.** *Cleonia.* BOT. PHAN. Famille des Labiées et Didynamie Gymnospermie, L. Ce genre, établi par Linné, n'a pas semblé à Lamarck et à Jussieu être fondé sur des caractères assez importants pour mériter d'être conservé. Il ne diffère effectivement du genre *Brunella* ou *Prunella* que par son stigmate quadrilobé, par ses bractées laciniées, et surtout par la touffe de poils qui ferment l'entrée de son calice pendant la maturation des graines. Il existe en outre quelques légères différences dans les formes des deux lèvres de la corolle. Du reste, la forme du calice, celle des

étamines sont exactement les mêmes que dans les Brunelles. Cependant, malgré cette conlammation du genre Cléonie, on le trouve conservé dans les ouvrages postérieurs à l'Encyclopédie et au *Genera Plantarum*. Le *Synopsis* de Persoon et la Flore Française de De Candolle donnent l'exposition de ses caractères, et la description de l'unique espèce dont il se compose.

La CLÉONIE DE PORTUGAL, *Cleonia lusitanica*, L.; *Prunella odorata*, Lamk., est une petite Plante de Barbarie, de la péninsule espagnole et des environs de Carcassonne en France, dont les tiges sont très-velues et branchues vers leur sommet; les feuilles pétiolées, obtuses et dentées; les bractées à pinnules, linéaires, aiguës et ciliées. Les fleurs, de grandes dimensions, sont violettes ou bleuâtres, un peu tachées de blanc et disposées en épi terminal. Le nom de Cléonie a été donné originairement par les anciens, si l'on s'en rapporte à Adanson, à un *Helianthus* que ce savant appelait Vosacan (G.N.)

\* CLÉONIS. *Cleonis*. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères, famille des Rhinophores de Latreille, établi par Megerle aux dépens du genre Lixé d'Olivier, adopté par Dejean (Catal. de Coléopt., p. 96), et dont nous ignorons les caractères. Dejean en mentionne trente espèces. Nous n'en citerons que deux d'Europe, ce sont les *Lixus plicatus* et *alternans* d'Olivier. V. LIXE. (G.)

CLÉONYME. *Cleonymus*. INS. Genre de l'ordre des Hyménoptères, section des Pupivores, tribu des Chalcidites, établi par Latreille (*Genera Crust. et Ins.* T. IV, p. 29), et ayant, suivant lui, pour caractères : segment antérieur du corselet resserré ou aminci vers la tête; mandibules bidentées à leur extrémité; antennes insérées vers le milieu de la face de la tête; abdomen en forme de triangle allongé, déprimé, avec la coulisse servant à loger la tarière, étendue dans toute la longueur du ventre. — Les Cléonymes, qu'on pourrait réu-

nir aux Pteromales de Swederus, et que Latreille avait rangés (loc. cit.) dans la famille des Cynipsères, se rapprochent des Spalangies par la forme du corselet et les divisions des mandibules, et n'en diffèrent que par l'insertion des antennes. Tous les caractères cités plus haut empêchent de les confondre avec les autres genres de la famille.

Latreille considère comme type Cléonyme déprimé, *C. depressus*, *Diptolepsis depressa*, Fabr., figuré par A. Coquebert (*Illustr. Icon. Insect. dec.* 1. tab. 5, fig. 5). On trouve cette espèce en France sur les troncs d'arbres. (CAT.)

\* CLÉOPE. *Cleopus*. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères, famille des Rhinophores de Latreille, établi par Megerle aux dépens des Charançons, adopté par Dejean (Catal. de Coléopt., p. 96) et dont les caractères nous sont inconnus. Il en mentionne quarante-neuf espèces, presque toutes d'Europe. V. CHARANÇON.

CLÉOPHORE. *Cleophora*. ENTOM. PHAN. Les fleurs mâles de ce genre, de la famille des Palmiers, avaient d'abord été décrites par Commerson et Jussieu sous le nom de *Lantia*, mais latinisé du nom vulgaire LATANIE, que ce Palmier porte à l'île Bourbon. Cette dénomination doit être conservée, parce qu'elle est plus ancienne que celle que Gaertner lui a substituée, sans qu'on sache pourquoi. Néanmoins nous parlerons ici du fruit, parce que l'auteur de la Carpologie a décrit et figuré (Gaertn. de Fruct. 185 et t. 120) sous le nom de *Clephora lontaroides*. Voici un extrait de sa description : fruit rond, un peu trigone, glabre et uniloculaire; épicarpe coriace devenant à la longue fragile et comme crustacé; sarcocarpe pulpeux, succulent, qui se dessèche promptement et se résout en membranes adhérentes aux noyaux. Ceci, au nombre de trois, sont crustacés, minces, striés, anguleux sur le côté interne, très-glabres et mon-

semences; semences uniques dans chaque noyau et ayant une forme semblable et comme moulée dans celui-ci, munies d'un albumen corné transparent près des bords et transparent. L'embryon est conique, plus grand à sa base et placé sur le côté de la graine en dehors de l'albumen.

Quant aux détails généraux tirés des autres organes, *V.* le mot LATER.

(G. N.)

\* **CLEPSINE.** *Clepsina.* ANNEL. Genre établi par Savigny (Syst. des Annelides, p. 107) aux dépens des sangsues, et ayant, suivant lui, pour caractères distinctifs : ventouse orale en concave, à lèvres supérieure avancée en demi-ellipse; mâchoires réunies à trois plis saillants; deux yeux à quatre à six disposés sur deux lignes longitudinales; ventouse anale exactement inférieure. Ce nouveau genre appartient, dans la Méthode de Savigny, à l'ordre des Annelides limnées et à la troisième section de la famille des Sangsues. Il se distingue des Sangsues, des Bdelloides, des Hémopis, par l'état des mâchoires, la position de la ventouse orale et surtout par le nombre des anneaux. Ce dernier caractère empêche de le confondre avec les Néphélis qui en rapprochent par les trois plis saillants des mâchoires.

Les Clepsines ont le corps légèrement crustacé, sans branchies, déprimé, un peu convexe dessus, exactement plat en dessous, rétréci insensiblement et acuminé en avant, très-susceptible, susceptible, en se contractant, de se rouler en boule ou en cylindre, composé de segmens ternés, c'est-à-dire ordonnés trois par trois, courts et égaux; les vingt-quatre ou vingt-cinquène et vingt-sept ou vingt-huitième portant les orifices de la génération. Les yeux très-distincts, au nombre de deux ou bien de quatre paires, sont, comme nous l'avons dit, disposés sur deux lignes longitudinales; la ventouse orale est formée de plusieurs segmens non séparés du corps, et peu concave; l'ouverture transverse à deux lèvres; la lèvre su-

périeure est avancée en demi-ellipse et formée de trois premiers segmens, dont le terminal est plus grand et obtus; la lèvre inférieure est rétrécie. La bouche est grande relativement à la ventouse orale, et munie intérieurement d'une sorte de trompe exsertile, tubuleuse, cylindrique, très-simple. L'existence de cette trompe paraît être constante, c'est-à-dire qu'on la retrouve dans toutes les espèces. Müller en a cependant nié l'existence. C'est Bergmann qui l'a aperçue le premier dans l'*Hirudo complanata*. Kirby l'a représentée dans la même espèce, et Savigny l'a aperçue dans une autre. Les Clepsines ont une ventouse anale de médiocre grandeur, déformée des deux côtés par les derniers segmens, et tout-à-fait inférieure. Ces Annelides se trouvent dans les eaux douces.—Savigny divise le genre en deux tribus : la première, *Clepsina Illyrinae*, a pour caractères : deux yeux situés sur le second segment, un peu écartés; corps étroit. Elle comprend la **CLEPSINE BIOCULÉE**, *Clepsina bioculata*, Sav., ou l'*Hirudo bioculata* de Bergmann (*Act. Stockh.* Ann. 1757, n. 4, t. 6, fig. 9-11), qui est la même que celle de Bruguière (Encycl. Méthod. Helm. pl. 51, fig. 9-11), de Müller (*Hist. Verm.* T. 1, part. 2, p. 41, n. 171) et de Gmelin (*Syst. Nat.* T. 1, part. 6, p. 5096, n. 5.) Cette espèce ne diffère pas non plus de l'*Eripobdella bioculata* de Lamarck (*Hist. des Anim. sans vert.* T. v, p. 256, n. 2). Elle est commune dans les ruisseaux de Gentilly près Paris. Elle se tient fortement appliquée contre les pierres, au fond de l'eau, et les parcourt à la manière des Chenilles arpeuteuses, en formant des anneaux complets. Elle ne s'expose jamais entièrement à l'air sec; mais souvent elle monte à fleur d'eau, pour s'y placer dans une position renversée, et se promène ainsi à sa surface, à l'aide de ses ventouses. Des individus observés au commencement de juillet portaient chacun, sous la partie moyenne du corps, dilatée et courbée en voûte, quinze à vingt petits qui se tenaient



fixés par leur disque postérieur; ces petits sont entièrement blancs.

Savigny croit que l'*Hirudo pulligera* de Daudin (Recueil de Mémoires et de Notes, p. 19, pl. 1, fig. 1, 5) pourrait être rapportée à cette espèce. La seconde tribu, *Cleptinae simplices*, est caractérisée par six yeux rapprochés, placés sur les trois premiers segmens, et par un corps large; elle renferme une espèce, la CLEPTINE APLATIE, *Cl. complanata*, Sav., ou l'*Hirudo complanata* de Linné (*Fauna Suec.* édit. 11, n. 2082, et *Syst. Natur.* édit. 12, T. 1, part. 2, p. 1079, n. 6), de Müller (*loc. cit.* pl. 47, n. 175), de Gmelin (*loc. cit.* p. 5097, n. 6) et de Hyac. Carena (*Monogr. du genre Hirudo, Mem. della R. Accad. dell Sc. di Torino*, T. XXV, p. 275). Cette espèce est la même que l'*Hirudo sexoculata* de Bergmann (*loc. cit.* p. 515, t. 6, fig. 12-14), ou l'*Hirudo crenata* de Kirby (*Trans. Linn. Soc.* T. 11, p. 518, t. 29). Elle appartient au genre Erpobdelle de Lamarck (*loc. cit.*). On la trouve dans les mêmes lieux que la précédente. Elle y est aussi commune et a les mêmes allures.

Savigny pense que l'*Hirudo hyalina* de Müller pourrait bien être une Cleptine. Ses *Hirudo marginata* et *H. Tessulata* n'en sont pas non plus éloignées. On doit peut-être rapporter encore à ce genre l'*Hirudo cephalota* de Carena, dont le disque peut adhérer à la surface de l'eau, et qui, de même que la Cleptine bioculée, marche à la renverse contre la surface du liquide, en y appliquant alternativement sa bouche et son disque. Cette espèce a quelque analogie avec la Cleptine aplatie; mais elle est très-remarquable par l'existence d'un col bien marqué, supportant une tête très-distincte, au sommet de laquelle on aperçoit quatre yeux. Elle ne nage pas, enroule légèrement son corps, et se laisse tomber au fond de l'eau lorsqu'on la détache; elle est vivipare. Carena l'a rencontrée en Piémont dans les lacs d'Avigliana et du Canavais. L'*Hirudo trioculata* de Carena ressemble beaucoup pour la couleur à la

Cleptine bioculée; mais elle s'éteint par une taille moindre. Le nombre des yeux qui se trouvent de trois placés en trois, formés par des lignes allongées que par des points longs, rapprochant ces deux espèces voisines, il faudrait modifier les caractères du genre et

CLEPTE. *Cleptes*. 188  
L'ordre des Hyménoptères des Térébrans, famille des Chrysides, tribu des Chrysides, Latreille et adopté par les entomologistes. Ses caractères mandibules courtes et de guette entière; corselet avant; abdomen sans cruraux, presque ovobide, en-dessous, composé de six anneaux, suivant le sexe. Ces rapports, les Cleptes, autres genres de la tribu, avant Jurine (*Class. des* p. 298), des antennes bifurquées, formes, composées de trois segments dans la femelle comme dans les ailes antérieures offre une cellule radiale demi-circulaire cubitale allongée, qui reçoit une nervure qui est très-distante du bord. Sous le rapport des ailes, ressemblent beaucoup à ceux, en effet, la différence n'est que dans la figure demi-circulaire cellule radiale, et dans la nervure récurrente à la base de la cellule cubitale, donc plus aisé, d'après cela lui-même, de les distinguer par les caractères tirés d'elles. Les Cleptes, confondus avec les Guêpes, avec les Ichneumonés, sont assez petits, très-agiles, couleurs métalliques variant les sexes. On les rencontre de différentes parties de l'Europe en un décrier un assez grand nombre d'espèces, parmi les autres appartiennent à Chalcidites. Telles sont

*igma, fulgens, coctorum, larvarum, macerum.* Le *CLEPTE* DEMI-BOBÉ, *C. emicauata* de Fabricius qui, suivant Latreille et Jurine, a décrit le mâle sous le nom de *C. splendens*, figuré par *Amér. (Fauna Ins. Germ., fasc. 5, pl. 2, mas; ibid., fasc. 52, tab. 1, fem.)*, peut être considéré comme le type du genre. Il se trouve aux environs de Paris. *F.*, pour les autres espèces, Latreille (*loc. cit.*), Pelleter de Saint-Fargeau (*Ann. du Mus. Hist. Natur. T. VIII, p. 115*), Max. Gignola (*Ins. Ligur.*), Jurine (*loc. cit.*), Coquebert (*loc. cit.*), Panzer (*loc. cit.*). (AUD.)

**CLEPTIOSES.** *Cleptiosa*. INS. C'est le nom d'une famille de l'ordre des Hyménoptères établie par Latreille (*Hist. Génér. des Crust. et des Ins. T. III, et 1<sup>re</sup> édit. du Dict. d'Hist. Natur.*), et qui est venue se fondre avec *Alleg. Anim. de Cuv.* dans la tribu des Chrysides et dans celle des Oxyures. *F.* ces mots. Cette famille comprenait les genres Béthyle, Sparasion et *Clept.* (AUD.)

**CLERKIA.** BOT. PHAN. Ce nouveau nom de genre a été proposé par *Becker* pour le *Tabernaemontana multiflora* de Linné; mais, ainsi que la plupart des innovations de cet auteur, il n'a pas été adopté. (G. N.)

**CLERODENDRON.** *Clerodendrum*. BOT. PHAN. Ce genre, de la famille des Verbinacées et de la Didymie Angiospermie, L., a des rapports intimes avec le *Volkameria*, qu'il paraît convenable de les réunir en un seul. Le défaut absolu de caractères précis et tranchés a fait transporter tour à tour de l'un à l'autre genre leurs diverses espèces par les auteurs, et il s'en est suivi une confusion qui ne sera pas facile à débrouiller tant qu'on ne détruira pas le genre le moins anciennement connu. En exposant le caractère du *Clerodendrum*, suivant R. Brown dit (*Prodrom. Flor. Nov. Holland.*, p. 510) que la plupart des *Volkameria* doivent y rentrer; il ajoute même avec doute que toutes les espèces de ce dernier

genre sont des Cléródendrons, et il y réunit aussi le genre *Ovicola* de Linné. A cette opinion s'est déjà rangé l'auteur des *Nova Genera et Species Plant. Amer. equin.* Kunth, en effet, décrit deux nouveaux Cléródendrons et adopte la fusion de la plupart des espèces de ces deux genres. L'analyse de leurs fruits a fourni, il est vrai, à Gaertner un moyen de distinction qui semble d'abord avoir assez d'importance. La baie des Volkameries renferme deux noyaux biloculaires, tandis que celle des Cléródendrons est à quatre osselets uniloculaires; mais chacun de ces deux noyaux biloculaires des Volkameries, à en juger par la figure même donnée par Gaertner (*de Fruct.* t. 56), nous paraît être l'union de deux osselets plutôt qu'un osselet unique à deux loges, et dès-lors une soudure plus ou moins complète serait la seule différence entre les deux fruits; or on convient que, dans ce cas, une pareille soudure ne peut offrir assez de valeur pour opérer une distinction générique. Autrement ce serait absolument de même que si on voulait éloigner génériquement le *Mespilus Oxyacanthoides*, D. C., du *M. Oxyacantha*, à cause de la liberté de ses deux noyaux. On s'est encore servi de la forme du style et du stigmate pour différencier les deux genres dont il est question; Gaertner a dit que les Volkameries ont le stigmate bifide; Poiret (*Dict. Encycl.*) ajoute que les Cléródendrons ont, par opposition, un stigmate simple, et nous trouvons dans le caractère du Cléródendron exposé par R. Brown et Kunth que le stigmate est bifide. Toutes ces assertions sont vraies, quoique contradictoires en apparence; il y a des Cléródendrons à stigmate simple, ou si peu échanuré qu'on peut le regarder comme simple; il existe aussi des Cléródendrons à stigmate bifide: telles sont les espèces décrites par Brown et Kunth. Cette diversité de formes dans le stigmate ne doit pas être un motif pour désunir les Cléródendrons d'avec les Volkameries; elle nécessite seule-

ment un léger changement dans les caractères du genre Clérodendron, dont voici l'énoncé : calice campanulé à cinq divisions ou à cinq dents ; corolle dont le tube est cylindrique, ordinairement très-allongé, le limbe à cinq divisions égales ; quatre étamines didynames, exsertes et déclinées du même côté ; ovaire quadriloculaire, à loges monospermes ; stigmate bifide, quelquefois simple ou légèrement écharncré ; baie souvent entourée par le calice qui s'est accru pendant la maturation, à quatre noyaux soudés par paires dans quelques espèces.

Les Clérodendrons sont de beaux Arbres et Arbustes indigènes des climats tropiques ; les feuilles sont opposées, simples, indivises ou quelquefois lobées. Ils portent des fleurs disposées en corymbes trichotomes, axillaires ou terminales. Les auteurs en ont décrit une trentaine d'espèces, dont quelques-unes sont cultivées dans les jardins d'Europe. Nous n'en citerons qu'une seule de bien remarquable sous ce rapport : c'est le CLÉRODENDRON SANS AISUILLONS, *Clatodendrum inerme*, Gaertn., *Volkumaria inermis*, L. Ce charmant Arbuste a une tige droite, un peu rameuse, qui s'élève à deux ou trois mètres. Ses rameaux sont droits et opposés. Ses feuilles sont opposées, pétiolées, lancéolées, oblongues, vertes et d'une consistance assez forte. Les fleurs d'un blanc lacté, quelquefois nuancé de rose, naissent de l'aisselle des feuilles par trois à la fois. Il est originaire des Indes-Orientales et de la Nouvelle-Hollande ; néanmoins il n'est pas très-délicat, car, quoique de terre chaude, il peut passer tout l'hiver dehors, pourvu qu'on le place à une bonne exposition. On le multiplie très-facilement par boutures faites en pot sur couche ombragée ou dans la tannée, et ensuite on le place dans une terre substantielle, en ayant soin de l'arroser souvent, surtout au moment où la végétation devient plus active. C'est ainsi qu'on le cultive au Jardin du Roi à Paris, où il en existe de fort beaux individus.

Parmi les autres Clérodendrons non cultivés et décrits par Linné avec son exactitude accoutumée, on distingue les *Clérodendrum fortunatum*, *Cl. infortunatum* et *Cl. calamitæum*. Plantes des Indes-Orientales que les anciens auteurs avaient déjà fait connaître sous différents noms. Ces épithètes paraissent singulières ; si on n'y reconnaissait pas la brillante imagination du naturaliste suédois qui se plaisait à répandre la vie et la sensibilité sur toutes les productions de la nature. Que d'allusions fines, ingénieuses et touchantes ne rencontrons-nous pas à chaque instant dans ses écrits ! Que de souvenirs mythologiques ne réveille-t-il pas, comme pour soulager notre mémoire fatiguée par l'aridité des détails ! Mais, il faut en convenir, l'esprit est ici choqué du contresens des expressions : Clérodendron est un mot grec qui signifie *Arbre heureux* ; or, dire qu'un Arbre heureux est en même temps infortuné ou calamiteux, nous semble une façon de parler un peu bizarre. Le genre *Clérodendrum* a été désigné vulgairement sous le nom de *Pérage*, mot barbare que nous n'adoptons pas, et auquel nous substituons la dénomination gréco-latine francisée.

Palisot de Beauvois a publié et figuré deux nouvelles espèces de *Clérodendrum* dans la Flore d'Oware et de Benin. L'une, qu'il nomme *Cl. volatile*, a des fleurs petites dont le limbe de la corolle est manifestement bilabié ; l'autre (*Cl. scandens*) a de plus grandes fleurs, et sa corolle offre la même disposition ; mais comme les fleurs du *Cl. infortunatum*, L., tendent aussi à l'irrégularité, cette modification n'est pas suffisante pour constituer avec ces espèces un nouveau genre. — Ventenat a figuré et décrit dans le magnifique ouvrage intitulé *Jardin de la Malmaison*, une espèce qui a fleuri dans les serres de ce jardin et qui est évidemment le *Pérage* de Rhéde. (*Hort. Malab.* vol. II, p. 41, pl. 25). Mais Linné ayant donné à son *Clérodendrum infortunatum* pour synonymes le *Pérage* de

hède et le *Cl. folio lato et acuminato* de Burmann, lequel est une plante essentiellement différente, contenata nommé sa nouvelle espèce *terodendrum viscosum*. Cette Plante est le *Volkameria laurifolia* des jardiniers. (G. N.)

CLERUS. INS. Nom sous lequel les Latins désignaient une espèce de larve, et que Geoffroy (Hist. des Ins. T. I. p. 505) a appliqué à un genre d'insectes de l'ordre des Coléoptères. CLAIRON. (AUD.)

CLETHRE. *Clethra* BOT. PHAN. C'est à la famille des Ericinées et à la Décandrie Monogynie qu'appartient ce genre composé d'Arbrisseaux élégans qui, pour la plupart, habitent les contrées américaines, et sont cultivés dans nos jardins d'agrément. Leurs feuilles sont alternes et simples; leurs fleurs, élégamment disposées en grappes, axillaires ou terminales, sont quelquefois réunies en forme de panicule; leur calice est à cinq divisions très-profondes; leur corolle est campanulée, à cinq lobes tellement profonds qu'elle semble formée de cinq pétales soudés par la base; dix étamines incluses sont insérées à la partie inférieure de la corolle, dressées et rapprochées les unes contre les autres; leurs anthères, l'abord tournées en dehors et par conséquent extrorsées, se renversent en dedans quand la fleur est épanouie, de manière que le sommet qui est terminé en pointe, devient la base; elles sont bifides inférieurement et s'ouvrent par deux fentes ovales; l'ovaire est à trois loges multiovulées; l'ovule est court, terminé par un stigmate trilobé; la capsule est enveloppée dans le calice qui est persistant; elle offre trois loges et s'ouvre en trois valves septifères sur le milieu de leur face interne.

Parmi les espèces de ce genre qui sont cultivées dans les jardins, nous citerons les suivantes:

CLETHRE A FEUILLES D'AULNE, *Clethra alnifolia*, L. Joli Arbuste de cinq à six pieds d'élévation, ayant

des tiges rameuses ornées de feuilles alternes ovales, dentées, pubescentes en dessous; des fleurs blanches, disposées en épis terminaux. Il est originaire des lieux humides de l'Amérique du nord. On le cultive en pleine terre dans les plate-bandes de terre de bruyère. Il se multiplie de semences et de marcottes.

CLETHRE TOMENTEUX, *Clethra tomentosa*, Lamk. Originaire des mêmes contrées, cette espèce demande les mêmes soins que la précédente. Elle s'en distingue surtout par ses rameaux et ses feuilles blanchâtres en dessous.

CLETHRE EN ARBRE, *Clethra arborea*, Aiton, Kew; Ventenat, Jard. Malm. t. 40. Cette belle espèce, originaire de l'île de Madère, a le port de l'*Arbutus Andrachne*, L. Elle est plus grande que les deux précédentes; sa tige ligneuse se divise en branches dont les extrémités sont rougeâtres; ses feuilles sont pétioolées, persistantes, un peu coriaces, lisses, ovales, lancéolées, dentées; ses fleurs d'une teinte rose pâle et d'une odeur suave, forment à l'aisselle des feuilles supérieures, des épis solitaires et unilatéraux. On la cultive en orangerie.

On cultive encore quelquefois dans les jardins le *Clethra acuminata* de Michaux et le *Clethra paniculata* d'Aiton, qui viennent de l'Amérique du nord.

Dans le troisième volume des *Novæ Genera et Species* de Humboldt et Boupland, publiés par Kunth, on trouve décrites trois nouvelles espèces de *Clethra* arborescentes sous les noms de *Clethra fagifolia*, *Cleth. bicolor* et *Cleth. fimbriata*. Cette dernière, remarquable par sa corolle dont les lobes sont échancrés en cœur et fimbriés sur leur bord, est figurée pl. 264 du même ouvrage. Kunth réunit au *Clethra* le genre *Cueillaria* de Ruiz et Pavon, qui, en effet, ne présente aucune différence bien notable. (A. R.)

Chez les anciens, particulièrement dans Théophraste, le nom de CLETHRA désignait l'Aulne. (B.)

**CLETHRIA.** BOT. CRYPT. (Hill.)  
 Pour *Clethra*. V. ce mot. (B.)

**CLETRITE.** BOT. FOSS. On a donné ce nom à du bois pétrifié que l'on croyait être celui de l'Aulne, nommé *Clethra* par les anciens. (B.)

**CLETTE.** OUS. Syn. vulgaire de l'Avocette, *Recurvirostra Avocetta*, L. V. AVOCETTE. (DR..Z.)

\* **CLEVEN - RAY.** POIS. Syn. de Centropome à onze rayons, à la Jamaïque. (B.)

**CLÉYÈRE.** *Cleyera*. BOT. PHAN. Sous ce nom, Thunberg (*Fl. Japon.*, p. 12 et 224) a décrit un genre de la Polyandrie Monogynie, L., que Jussieu n'a rapproché d'aucune famille, si ce n'est en indiquant d'une manière dubitative ses affinités avec le *Camellia*, et qu'il a rejeté dans les *Genera incertæ sedis*. Ses caractères sont : calice persistant à cinq divisions obtuses; cinq pétales; environ trente étamines courtes, insérées sur les côtés de l'ovaire, à filets adhérens entre eux à leur base, et à anthères didymes; ovaire libre; style unique, filiforme; stigmate échancré; capsule pisiforme, entourée inférieurement par le calice biloculaire et bivalve. L'unique espèce de ce genre incertain (*Cleyera Japonica*, Th.) croît près de Nagasaki au Japon. C'est un Arbre glabre dont les rameaux et ramuscules sont verticillés; les feuilles sont aussi en verticilles ou fasciculées au sommet des branches; leur consistance est charnue et elles sont toujours vertes. Les fleurs sont solitaires sur des pédoncules axillaires. Cette Plante est voisine du *Vateria indica*, L., genre placé à la suite des Guttifères par Jussieu, mais que ses feuilles alternes et plusieurs points de son organisation font aller près des *Camellia* dans les Hespéridées. Thunberg lui donne pour synonyme la Plante désignée et figurée par Koempfer (*Amen. exot.*, p. 873 et 874) sous le nom japonais de *Mokokf* ou *Mukokf*; mais Jussieu regarde ce rapprochement comme douteux.

Adanson a donné le nom de *Cleyera* à un genre de Plantes de la famille des Scrophularinées, et que Linné avait déjà nommé *Polypremum*. N'ayant pas justifié ce changement de mots, nous ne l'adoptons pas et nous renvoyons à POLYPREME pour sa description. (G.N.)

\* **CLEYRIA.** BOT. PHAN. (Necker.) V. AROUNIER.

\* **CLIAMONNONE.** BOT. PHAN. Syn. de *Jatropha gossypifolia* à la côte de Coromandel. (B.)

**CLIBADE.** *Clibadium*. BOT. PHAN. Genre de la Monocleie Pentandrie, L., ainsi caractérisé : fleurs fasciculées réunies en tête; celles du centre mâles et pédicellées; celles de la circonférence au nombre de trois à quatre femelles et sessiles; involucre imbriqué, devenant violet par la maturité; fruits drupacés, ombiliqués, monospermes. A.-L. de Jussieu, qui a donné les caractères précédents d'après Linné et Allamand, place ce genre parmi les Corymbifères anomaux à côté de l'*Iva* et du *Parthenium*. Deslontaines le renvoie aux Urticées, à cause de ses étamines libres et de ses fruits drupacés. Comme il a, selon Lamarck, quelques rapports avec le *Bailliera*, affinité déjà pressentie par Jussieu, et que ce dernier genre appartient aux Corymbifères, on serait tenté de laisser les genres précités à la suite des Composées, au lieu de les rejeter dans une autre famille éloignée.

On ne connaît que l'espèce décrite par Linné, *Clibadium surinamense*. C'est une Plante à feuilles opposées et raboteuses, dont les pédoncules sont aussi opposés et les corolles blanches. Les drupes ont une couleur verte et sont pleines d'un suc jaune et visqueux. (G.N.)

**CLIBADION.** BOT. PHAN. (Dioscoride.) Syn. présumé de Pariétaire. (B.)

**CLICHE-FALSA.** BOT. Syn. d'*Guilandina axillaris*, Lamk. (B.)

\* **CLIDEMIE.** *Clidemia*. BOT. PHAN. Genre de la famille des Mélastomacées, établi par David Don dans



un Mémoire sur les Plantes de cette famille, publié récemment parmi ceux de la Société Wernérienne d'Edimbourg (vol. IV, 2<sup>e</sup> partie, p. 184), et auquel son auteur donne pour caractères : calice oblong, nu à la base ou muni d'écaillés, à limbe pinnquédenté, persistant ; cinq pétales ; anthères à deux oreillettes, plus étroites à la base ; stigmate ne formant qu'un petit point papillaire ; baie capsulaire à cinq loges.

Ce genre, consacré à la mémoire de Clidemius, botaniste de l'ancienne Grèce cité par Théophraste, se compose de dix-neuf espèces, toutes indigènes de l'Amérique méridionale. Ces sont les sous-Arbrisseaux très-hérissés, à branches tétragones et à feuilles crénelées, pétioles, à trois ou cinq nervures ; leurs baies de couleur pourpre ou écarlate ont une saveur douce, gréable, et par conséquent sont comestibles. La plupart de ces espèces ont nouvelles, ou étaient inédites dans les herbiers sous le nom de *Melastoma*. Quelques-unes ont été décrites par Aublet (Guian., p. 425 et 427). Ce sont les *Melastoma agrestis*, *M. elegans* de cet auteur. Richard Bonpland en avaient aussi fait connaître deux espèces : *Melastoma alba*, Rich., ou *Clidemia heteromalla*, D., et *Melast. capitellata*, Bonpl., ou *Cl. capitellata*, D. (G.N.)

**CLIFFORTIE.** *Cliffortia*. BOT. PHAN. Genre de la Dioécie Polyandrie, établi par l'illustre naturaliste suédois en l'honneur du protecteur éclairé chez lequel il composa ses premiers ouvrages, et placé par Jussieu dans la dixième tribu de la famille des Rosacées à laquelle il a donné le nom de *Sanguisorbées*. Il présente les caractères suivans : Plante dioïque ; calice à six divisions profondes ; corolle simple. Dans les fleurs mâles, on trouve environ trente étamines dont les anthères sont didymes. Les fleurs femelles ont deux ovaires surmontés de deux styles et de deux stigmates. Les petits fruits sont aussi au nombre de deux et renfermés dans l'intérieur

du calice qui s'est changé en une capsule biloculaire. Toutes les *Clifforties* sont de petits Arbrisseaux indigènes du cap de Bonne-Espérance, à feuilles simples ou ternées, tantôt alternes, tantôt opposées, engainantes et stipulées à leur base ; leurs fleurs sont presque sessiles dans les aisselles des feuilles. Une trentaine d'espèces ont été décrites par les auteurs ; aucune ne mérite de fixer l'attention sous les rapports de l'utilité ou de l'agrément. Une d'entre elles est seulement remarquable en ce qu'elle porte sur ses rameaux des excroissances strobiliformes, qui ne sont que des galles d'Insectes, d'où son nom spécifique *Cl. strobilifera*, L. L'amplitude des stipules de cette Plante, ainsi que ces sortes de galles, lui donnent un air si particulier que Jussieu se demande si elle est bien véritablement congénère du *Cliffortia*. D'un autre côté, il rapporte à ce genre, mais avec doute, l'*Empetrum pinnatum* de Lamarck.

La place du genre *Cliffortie* est-elle bien fixée parmi les *Sanguisorbées* ? C'est encore une question présentée par le savant auteur du *Genera Plantarum*, et qui ne sera éclaircie qu'après un mûr examen de la famille des Rosacées. (G.N.)

**CLIFTONIA.** BOT. PHAN. Banks a donné ce nom générique au *Mylocaryum* de Willdenow, qui avait déjà pour synonyme le *Waltheriana* de Fraser. V. ces mots. (G.N.)

**CLIGNOT.** OIS. Espèce du genre Traquet, *Motacilla perspicillata*, L. V. TRAQUET. (DR.Z.)

**CLIMACIUM.** BOT. CRYPT. (*Mousses.*) Weber et Mohr ont établi sous ce nom un genre de Mousses qui ne renfermait que l'*Hypnum dendroides* de Smith. Cette Plante, successivement placée parmi les *Leskea* par Hedwig et parmi les *Neckera* par Swartz et par Bridel, a été remise de nouveau au nombre des vrais *Hypnum* par Hooker. La forme de son péristome intérieur paraît cependant assez particulière pour en faire un

CLETHRIA, BOT. CRYPT. (Hill.)  
Pour Clathre. *V.* ce mot. (n.)

CLETRITE. BOT. ROSS. On a donné ce nom à du bois pétrifié que l'on croyait être celui de l'Aulne, nommé Clethra par les anciens. (R.)

CLETTE. ois. Syn. vulgaire de l'Avocette, *Recurvirostra Avocetta*, L. F. AVOCETTE. (n. 2.)

\* CLEVEN - RAY. pois. Syn. de Centropome à onze rayons, à la Jamaïque. (n.)

CLÉYÈRE. *Cleyera*, FOR. RU.  
 Sous ce nom, Thunberg (*Fl. Jap.*  
 p. 12 et 224) a décrit un ge-  
 nre la Polyandrie Monogynie, l'  
 Jussieu n'a rapproché d'au-  
 mille, si ce n'est en indi-  
 manière dubitative ses a-  
 le *Camellia*, et qu'il a r-  
*Genera incerta sedis.*  
 sont : calice persist-  
 sions obtuses; cinq  
 trente étamines o-  
 les côtés de l'ova-  
 entre eux à les  
 didymes; ovi-  
 filiformes; si-  
 pisiforme  
 par le ca-  
 L'unique  
 (*Cleyera*  
 Neges  
 glabr  
 les :  
 (S. cis. Temminck.)

VOIE, *nom. Syn. de*  
*passage dans l'île de*  
*des Antilles. (2.)*

nom que l'on donne commun sur lequel on voit les fleurs dans les Plantes des Synanthérées. Il est mou et charnu, tantôt plane, tantôt concave ou convexe; quelquefois au centre des fleurs, des poils, des paillettes ou des alvéoles; ces modifications servent à distinguer les genres nombreux de la classe des Synanthérées. (A. R.)

Adanson a donné  
sa à un genre de  
des Scrophal  
né avait de  
N'ayant po  
mois, ne  
renvoye  
cripti

*Hypolepis*

...CANDOLLE. BOT. RHOD.  
De Candolle à la q  
du genre *Polygala* (2  
Univ., 1, p. 527),  
et trois sous-Arbrisseaux  
dont le plus remarquab  
*Polygala thesioides*, Willd.,  
décrit par le P. Feuillée  
nom de *Clinclin*, F. POLYGA  
CLINE. trois. Pour Clinus  
mot.

**CLINOCÈRE.** *Clinocera*  
Genre de l'ordre des Diptères  
le des Tanystomes, tribu  
famille des Rhagionides de  
(Rég., An. de Cuv.), établi  
gen., et ayant, suivant lui  
système des Diptères d'Europ.  
p. 115), pour caractères :  
arabes, portées en dehors  
articles dont les deux premi  
rotaux, le troisième con  
une soie terminale cour  
yeux lisses frontaux ; ailes  
couchées sur le corps. La  
antennes rapproche le gen  
cère de celui des *Leptis* de F  
et principalement du *Leptis*  
dont les ailes sont égalemen  
sur le corps, ce qui pourrai  
lieu à une division dans la  
rangerait cette espèce avec  
cère noire, *Clinocera nigra*  
jusqu'à présent la seule  
genre dont il est question. A  
figurée (loc. cit., tab. 16, fig.

**CLINOPODE.** *Clinopodium*  
THUAN. Genre de la famille  
liées et de la Dyalnamic  
spermie, L., dont les caracté-  
l'imbe du calice divisé su-  
ment en trois parties et inférie-  
en deux; gorge de la corolle



la lèvre supérieure  
l'inférieure trifide,  
bien plus grand

Plantes  
verti-  
cues

Les  
à  
ment  
posées en  
la Plante, et  
de couleur rose;  
ur varie quelquefois  
ne. Les propriétés to-  
picales qu'on lui a at-  
tribuées sont moins exaltées dans  
la Plante que dans les autres La-  
ment, attendu la petite quantité  
d'huile volatile et de principe amer  
qu'elle renferme. — Une belle espèce  
a été décrite et figurée sous le nom  
de *Clinopodium organifolium* par La-  
bordiere (*Decad. Syriac.* 4, p. 24,  
fig. 9). Ce naturaliste l'avait trouvée  
sur le mont Liban. Les diverses espèces  
à bractées décrites comme *Cli-*  
*nopodes* dans quelques auteurs, appar-  
tiennent aux genres *Phlomis*, *Hyptis*  
et *Perovskia*. V. ces mots. (C. N.)

CLISOPROCHIOS. BOT. TRAN.  
Theophraste.) Syn. d'Érable. (D.)

CLINUS, rois. Syn. de Blennies  
en général chez les Grecs modernes,  
et l'une des divisions de ce genre dans  
le Règne Animal de Cuvier. V.  
Blennie. (B.)

CLIO. CLIO. MOLL. Ce genre indi-  
qué par Browne (*Historia Natur.*  
Jen. p. 386) pour les Animaux aux-  
quels Péron a donné le nom de  
Gastropodes, fut établi postérieurement  
par Pallas sous le nom de Clione;  
et quoique Martens l'ait fait figurer  
dans son Voyage au Spitzberg, Linné  
néanmoins ne commença à en parler  
qu'à sa douzième édition, en y com-  
prenant, ainsi que dans les suivantes,

et la Clione figurée par Martens et celles  
indiquées par Browne. Cuvier, dans  
un Mémoire inséré dans le premier  
volume des Annales du Muséum,  
donna sur l'Animal de la Clione des dé-  
tails anatomiques fort curieux, et  
fit pour ce genre, ainsi que pour quel-  
ques autres avoisinans, la seconde  
classe des Mollusques, les PRÉROPO-  
DES. V. ce mot. Les Clions ne renfer-  
ment plus que des Animaux mous,  
peuvent être génériquement caracté-  
risées de la manière suivante : corps  
nu, gélatineux, libre, plus ou moins  
allongé, un peu déprimé; une tête  
distincte, surmontée de six tentacules  
rétractiles, longs et coniques, séparés  
en deux faisceaux de trois chaque, qui  
rendent la tête bilobée lorsqu'ils sont  
contractés, et peuvent être entière-  
ment cachés dans une sorte de pré-  
puce, portant lui-même un petit ten-  
tacule à son côté externe; deux yeux  
à la partie supérieure de la tête; bou-  
che terminale, verticale; deux na-  
geoires opposées, branchiales, insé-  
rées de chaque côté à la base du cou;  
une sorte de ventouse sous le cou;  
l'anus et l'orifice pour la génération  
s'ouvrant au côté droit près du cou,  
sous la nageoire.

Le système nerveux est composé  
d'un cerveau bilobé, duquel partent  
deux filets qui aboutissent sous l'oso-  
phage où ils se renflent en ganglions.  
Ces ganglions fournissent eux-mêmes  
deux autres filets, lesquels donnent en-  
core un ganglion chaque, qui se réu-  
nissent au-dessus de l'osophage par  
un filet intermédiaire; les nerfs des au-  
tres organes partent en rayonnant de  
ces divers ganglions. La respiration  
est branchiale; ses organes sont par-  
tie des nageoires; c'est pour cela que  
Blainville propose le nom de PRÉRO-  
DIBRANCHE. De chaque branchie naît  
un vaisseau qui se réunit à son con-  
gène au-dessus du cœur, pour don-  
ner naissance à un tronc unique, lequel  
se rend directement à cet organe. V.,  
pour d'autres détails anatomiques, le  
Mémoire de Cuvier (Ann. du Mus.  
T. 1, p. 242, pl. 17). Tous les organes  
internes des Clions sont enveloppés

genre distinct ainsi caractérisé : capsule latérale ; péristome double : l'externe à seize dents simples, lancéolées, courbées en dedans ; l'intérieur composé de seize lanières subulées, percées d'une série de trous dans leur milieu et unies à leur base par une membrane très-courte ; coiffe se fendant latéralement.

Chacune des lanières du péristome interne paraît formée de deux cils rapprochés, unis par leur sommet et dont l'intervalle serait traversé par des filamens transverseaux qui forment une sorte de grillage ; cette structure est très-différente de celle des *Hypnum*, des *Neckera* et des *Leskea*, et ce genre qui, par son port, s'éloigne assez des autres *Hypnum*, paraît mériter d'être conservé. La seule espèce qu'il renferme se trouve dans les grands bois ; elle est rare en fructification ; sa tige est rameuse, assez élevée, à rameaux redressés ; ses feuilles sont insérées tout autour de la tige, lâchement imbriquées, ovales, lancéolées, dentelées au sommet ; sa capsule est droite, cylindroïde, à opercule conique aigu. Bridel a séparé comme une espèce distincte celle qui croît dans l'Amérique septentrionale, et que Michaux avait décrite sous le nom de *Leskea dendroïdes* ; peut-être n'est-elle qu'une variété de la précédente ; le véritable *Climacium dendroïdes* croît aussi en Amérique et, à ce qu'on assure, au Japon. (AN. II.)

\*CLIMACTERIS. ois. (Temminck.)

\*Echellet.

\*CLIMBING-VOIE. BOT. Syn. de *Psychotria parasitica* dans l'île de Montserrat, l'une des Antilles. (B.)

CLINANTHE. *Clinanthium*. BOT. RHAN. C'est le nom que l'on donne au réceptacle commun sur lequel sont placés les fleurs dans les Plantes de la famille des Synanthérées. Il est tantôt épais et charnu, tantôt plane, tantôt concave ou convexe ; quelquefois il porte, outre les fleurs, des poils, des soies, des paillettes ou des alvéoles. Ces diverses modifications servent à caractériser les genres nombreux de la famille des Synanthérées. (A. R.)

CLINCHE MAM. Même Chinche. V. ce mot.

\* CLINCHIN ET CLINC PHAN. (Feuillée.) Nom du genre *Polygala* au Pérou. CLINIA.

\* CLIN-CLIN. ois. Petit que l'on trouve en abondance à Domingue, et que l'on rap Guignette, *Tringa hypoleuca* CHEVALIER.

\* CLINCLINIA. BOT. R. donné par De Candolle à la section du genre *Polygala* *System. Univ.*, 1, p. 527). prend trois sous-Arbrisseaux dont le plus remarquable est *Polygala thesioides*, Willd. décrit par le P. Feuillée sous le nom de *Clinclin*, V. *Polyg.*

CLINE. ois. Pour Clin mot.

CLINOCÈRE. *Clinocera*. Genre de l'ordre des Diptères de la famille des Rhagionides de (Règn. An. de Cuv.), établi par Linné, et ayant, suivant lui, le système des Diptères d'Europe (p. 115), pour caractères : avancées, portées en dehors des articles dont les deux premiers sont ronds, le troisième conique, la soie terminale courte, les yeux lisses frontaux ; ailes couchées sur le corps. La première antenne rapproche le genre de celui des *Leptis* de Linné et principalement du *Leptis* dont les ailes sont également couchées sur le corps, ce qui pourroit le faire placer dans la même division dans la nomenclature de Linné, mais on rangerait cette espèce avec le genre *Clinocera* noir, *Clinocera nigra*, jusqu'à présent la seule espèce du genre dont il est question. (loc. cit., tab. 16, fig. 1.)

CLINOPODE. *Clinopodium*. RHAN. Genre de la famille des Labiées et de la Didymie spermie, L., dont les caractères sont : le calice divisé seulement en trois parties et inséré en deux ; gorge de la corolle



ent évasée; la lèvre supérieure roite émarginée, l'inférieure trifide, dont son lobe du milieu plus grand échancré.

Les Clinopodes sont des Plantes herbacées, à fleurs axillaires, verticillées et munies de plusieurs bractées soyeuses. Elles sont en petit nombre, et habitent les climats tempérés de l'un et l'autre hémisphère. La seule espèce indigène de la France est le CLINORHODE COMMUN, *Clinopodium vulgare*, L., très-abondant, vers la fin d'été, dans les bois et près des ruis. Il a une tige haute de cinq à dix décimètres, velue et ordinairement simple. Ses fleurs sont disposées en verticilles au sommet de la Plante, et ont le plus souvent de couleur rose; mais cette couleur varie quelquefois et passe au blanc. Les propriétés toniques et céphaliques qu'on lui a attribuées sont moins exaltées dans cette Plante que dans les autres Labiées, attendu la petite quantité d'huile volatile et de principe amer qu'elle renferme. — Une belle espèce a été décrite et figurée sous le nom de *Clinopodium origanifolium* par Labillardière (*Decad. Syriac.* 4, p. 24, fig.). Ce naturaliste l'avait trouvée au mont Liban. Les diverses espèces arborescentes décrites comme Clinopodes dans quelques auteurs, appartenant aux genres *Plumis*, *Hyptis*, *Pysnanthemum* &c. ces mots. (G. N.)

CLINOPROCHIOS. BOT. PHAN. (*Prophaster*). Syn. d'Érable. (B.)

CLINUS. POISS. Syn. de Blennies, en général, chez les Grecs modernes, l'une des divisions de ce genre dans

Règne Animal de Cuvier. V. BLENNIE.

CLIO. CLIO. MOLL. Ce genre indiqué par Browne (*Historia Natur.* tom. p. 586) pour les Animaux aux quels Péron a donné le nom de Clione, fut établi postérieurement par Pallas sous le nom de Clione; quoique Martens l'ait fait figurer dans son *Voyage au Spitzberg*, Linné auparavant ne commença à en parler que dans sa douzième édition, en y contenant, ainsi que dans les suivantes,

et la Clione figurée par Martens et celles indiquées par Browne. Cuvier, dans un Mémoire inséré dans le premier volume des Annales du Muséum, donna sur l'Animal de la Clione des détails anatomiques fort curieux, et fit pour ce genre, ainsi que pour quelques autres avoisinans, la seconde classe des Mollusques, les PTÉROPODES. V. ce mot. Les Clions ne renfermant plus que des Animaux mous, peuvent être génériquement caractérisées de la manière suivante : corps nu, gélatineux, libre, plus ou moins allongé, un peu déprimé; une tête distincte, surmontée de six tentacules rétractiles, longs et coniques, séparés en deux faisceaux de trois chaque, qui rendent la tête bilobée lorsqu'ils sont contractés, et peuvent être entièrement cachés dans une sorte de prépuce, portant lui-même un petit tentacule à son côté externe; deux yeux à la partie supérieure de la tête; bouche terminale, verticale; deux nageoires opposées, branchiales, insérées de chaque côté à la base du cou; une sorte de ventouse sous le cou; l'anus et l'orifice pour la génération s'ouvrant au côté droit près du cou, sous la nageoire.

Le système nerveux est composé d'un cerveau bilobé, duquel partent deux filets qui aboutissent sous l'œsophage où ils se renflent en ganglions. Ces ganglions fournissent eux-mêmes deux autres filets, lesquels donnent encore un ganglion chaque, qui se réunissent au-dessus de l'œsophage par un filet intermédiaire; les nerfs des autres organes partent en rayonnant de ces divers ganglions. La respiration est branchiale; ses organes font partie des nageoires; c'est pour cela que Blainville propose le nom de PTÉRODIBRANCHE. De chaque branchie naît un vaisseau qui se réunit à son congénère au-dessus du cœur, pour donner naissance à un tronc unique, lequel se rend directement à cet organe. V. pour d'autres détails anatomiques, le Mémoire de Cuvier (*Ann. du Mus.* T. 1, p. 242, pl. 17). Tous les organes internes des Clions sont enveloppés

genre distinct ainsi caractérisé : capsule latérale ; péristome double : l'externe à seize dents simples, lancéolées, courbées en dedans ; l'intérieur composé de seize lanières subulées, percées d'une série de trous dans leur milieu et unies à leur base par une membrane très-courte ; coiffe se fendant latéralement.

Chacune des lanières du péristome interne paraît formée de deux cils rapprochés, unis par leur sommet et dont l'intervalle serait traversé par des filamens transverseaux qui forment une sorte de grillage ; cette structure est très-différente de celle des *Hypnum* ; des *Neckera* et des *Leskea*, et ce genre qui, par son port, s'éloigne assez des autres *Hypnum*, paraît mériter d'être conservé. La seule espèce qu'il renferme se trouve dans les grands bois ; elle est rare en fructification ; sa tige est rampante, assez élevée, à rameaux redressés ; ses feuilles sont insérées tout autour de la tige, lâchement imbriquées, ovales, lancéolées, dentelées au sommet ; sa capsule est droite, cylindroïde, à opercule conique aigu. Bridel a séparé comme une espèce distincte celle qui croît dans l'Amérique septentrionale, et que Michaux avait décrite sous le nom de *Leskea dendroïdes* ; peut-être n'est-elle qu'une variété de la précédente ; le véritable *Climacium dendroïdes* croît aussi en Amérique et, à ce qu'on assure, au Japon. (AD. B.)

\* **CLIMACTERIS.** ois. (Temminck.)  
V. ÉCHELET.

\* **CLIMBING-VOIE.** bot. Syn. de *Psychotria parasitica* dans l'île de Montserrat, l'une des Antilles. (P.)

\* **CLINANTHE.** *Clinanthium.* bot. PHAN. C'est le nom que l'on donne au réceptacle commun sur lequel sont placés les fleurs dans les Plantes de la famille des Synanthérées. Il est tantôt épais et charnu, tantôt plane, tantôt concave ou convexe ; quelquefois il porte, outre les fleurs, des poils, des soies, des paillettes ou des alvéoles. Ces diverses modifications servent à caractériser les genres nombreux de la famille des Synanthérées. (A. R.)

**CLINCHE** MAM. Même.  
Chinche. V. ce mot.

\* **CLINCHIN** et **CLING** PHAN. (Feuillée.) Nom d'un du genre *Polygala* au Pérou.  
CLINIA.

\* **CLIN-CLIN.** ois. Petit que l'on trouve en abondance Domingue, et que l'on rap Guignette, *Tringa hypoleuca* CHEVALIER.

\* **CLINCLINIA.** bot. B. donné par De Candolle à la section du genre *Polygala* *System. Univ.*, 1, p. 527, prend trois sous-Arbrisseaux dont le plus remarquable *Polygala thesioides*, Willd. décrit par le P. Feuillée nom de *Clinclin*. V. POLYGA.

**CLINE.** rois. Pour Clin mot.

**CLINOCÈRE.** *Clinocera.* Genre de l'ordre des Diptères des Tanystomes, tribu famille des Rhagionides de (Règn. An. de Cuv.), établi par Gen. et ayant, suivant lui, système des Diptères d'Europe p. 115, pour caractères : avancées, portées en dehors articles dont les deux premiers ronds, le troisième conique, une soie terminale courte, yeux lisses frontaux ; ailes couchées sur le corps. La antennes rapproche le genre de celui des *Leptis* de l'Europe et principalement du *Leptis* dont les ailes sont également sur le corps, ce qui pour lieu à une division dans la rangerait cette espèce avec *Clinocera nigra* jusqu'à présent la seule du genre dont il est question. figurée (*loc. cit.*, tab. 16, fig. 1).

**CLINOPODE.** *Clinopoda* PHAN. Genre de la famille des Dydymies et de la Didymie spermiée, L., dont les caractères du calice divisés seulement en trois parties et insérés en deux ; gorge de la corolle



nt évasée; la lèvre supérieure est émarginée, l'inférieure trifide, et son lobe du milieu plus grand et échancré.

Les Clinopodes sont des Plantes buvées, à fleurs axillaires, verticilles et munies de plusieurs bractées moyennes. Elles sont en petit nombre et habitent les climats tempérés l'un et l'autre hémisphère. La seule espèce indigène de la France est le CLINODE COMMUN, *Clinopodium vulgare*, L., très-abondant, vers la fin d'été, dans les bois et près des rivières. Il a une tige haute de cinq à six décimètres, velue et ordinairement simple. Ses fleurs sont disposées en grappes au sommet de la tige, et le plus souvent de couleur rose; mais cette couleur varie quelquefois jusqu'au blanc. Les propriétés toniques et céphaliques qu'on lui attribue sont moins exaltées dans cette plante que dans les autres Labiées, attendu la petite quantité d'huile volatile et de principe amer qu'elle renferme. — Une belle espèce est décrite et figurée sous le nom de *Clinopodium organifolium* par Lardière (*Decad. Syriac.* 4, p. 24, fig.). Ce naturaliste l'avait trouvée sur le mont Liban. Les diverses espèces appartenant décrites comme Clinopodes dans quelques auteurs, appartiennent aux genres *Phlomis*, *Hyptis*, *Ynanthemum*, &c. ces mots. (G. N.)

CLINOPROCHIOS, BOT. PHAN. (Céphariste.) Syn. d'Érable. (B.)

CLON, CLONIS, BOT. de Blennies, nom général chez les Grecs modernes, d'une des divisions de ce genre dans le Règne Animal de Cuvier. (V. CLONIE.)

CLON, CLONIE, MOLL. Ce genre indiqué par Browne (*Historia Natur.* p. 586) pour les Animaux auxquels Péron a donné le nom de Clonies, fut établi postérieurement Pallas sous le nom de Clonie; mais Martens l'a fait figurer dans son Voyage au Spitzberg, Linné au moins ne commença à en parler que dans sa douzième édition, en y comprenant, ainsi que dans les suivantes,

et la Clonie figurée par Martens et celles indiquées par Browne. Cuvier, dans un Mémoire inséré dans le premier volume des Annales du Muséum, donna sur l'Animal de la Clonie des détails anatomiques fort curieux, et fit pour ce genre, ainsi que pour quelques autres avoisinans, la seconde classe des Mollusques, les PRÉROPODES. (V. ce mot.) Les Clonies ne renfermant plus que des Animaux mous, peuvent être génériquement caractérisées de la manière suivante : corps nu, gélatineux, libre, plus ou moins allongé, un peu déprimé; une tête distincte, surmontée de six tentacules rétractiles, longs et coniques, séparés en deux faisceaux de trois chaque, qui rendent la tête bilobée lorsqu'ils sont contractés, et peuvent être entièrement cachés dans une sorte de prépuce, portant lui-même un petit tentacule à son côté externe; deux yeux à la partie supérieure de la tête; bouche terminale, verticale; deux nageoires opposées, branchiales, insérées de chaque côté à la base du cou; une sorte de ventouse sous le cou; l'anus et l'orifice pour la génération s'ouvrant au côté droit près du cou, sous la nageoire.

Le système nerveux est composé d'un cerveau bilobé, duquel partent deux filets qui aboutissent sous l'œsophage où ils se renflent en ganglions. Ces ganglions fournissent eux-mêmes deux autres filets, lesquels donnent encore un ganglion chaque, qui se réunissent au-dessus de l'œsophage par un filet intermédiaire; les nerfs des autres organes partent en rayonnant de ces divers ganglions. La respiration est branchiale; ses organes sont partie des nageoires; c'est pour cela que Blainville propose le nom de PRÉODIBRANCHE. De chaque branchie naît un vaisseau qui se réunit à son congénère au-dessus du cœur, pour donner naissance à un tronc unique, lequel se rend directement à cet organe. (V. pour d'autres détails anatomiques, le Mémoire de Cuvier (Ann. du Mus. T. 1, p. 242, pl. 17). Tous les organes internes des Clonies sont enveloppés

genre distinct ainsi caractérisé : capsule latérale ; péristome double : l'externe à seize dents simples, lancéolées, courbées en dedans ; l'intérieur, composé de seize lanières subulées, percées d'une série de trous dans leur milieu et unies à leur base par une membrane très-courte ; coiffe se fendant latéralement.

Chacune des lanières du péristome interne paraît formée de deux cils rapprochés, unis par leur sommet et dont l'intervalle serait traversé par des filamens transverseaux qui forment une sorte de grillage ; cette structure est très-différente de celle des *Hypnum*, des *Neckera* et des *Leskea*, et ce genre qui, par son port, s'éloigne assez des autres *Hypnum*, paraît mériter d'être conservé. La seule espèce qu'il renferme se trouve dans les grands bois ; elle est rare en fructification ; sa tige est rameuse, assez élevée, à rameaux redressés ; ses feuilles sont insérées tout autour de la tige, lâchement imbriquées, ovales, lancéolées, dentelées au sommet ; sa capsule est droite, cylindroïde, à opercule conique aigu. Bridel a séparé comme une espèce distincte celle qui croît dans l'Amérique septentrionale, et que Michaux avait décrite sous le nom de *Leskea dendroïdes* ; peut-être n'est-elle qu'une variété de la précédente ; le véritable *Climacium dendroïdes* croît aussi en Amérique et, à ce qu'on assure, au Japon. (AD. B.)

\* **CLIMACTERIS.** ois. (Temminck.) ECHÉLET.

\* **CLIMBING-VOIE.** BOT. Syn. de *Psychotria parasitica* dans l'île de Montserrat, l'une des Antilles. (B.)

\* **CLINANTHE.** *Clinanthium.* BOT. PHAN. C'est le nom que l'on donne au réceptacle commun sur lequel sont placées les fleurs dans les Plantes de la famille des Synanthérées. Il est tantôt épais et charnu, tantôt plane, tantôt concave ou convexe ; quelquefois il porte, outre les fleurs, des poils, des soies, des paillettes ou des alvéoles. Ces diverses modifications servent à caractériser les genres nombreux de la famille des Synanthérées. (A. R.)

**CLINCHE MAM.** Même chose que Chinche. V. ce mot. (B.)

\* **CLINCHIN ET CLINCLIN.** BOT. PHAN. (Feuillée.) Nom d'une espèce du genre *Polygala* au Pérou. F. CLINCLINIA. (A.)

\* **CLIN-CLIN.** ois. Petit Echassier que l'on trouve en abondance à Saint-Domingue, et que l'on rapporte à la Guignette, *Tringa hypoleucos*, L. F. CHEVALIER. (DR. Z.)

\* **CLINCLINIA.** BOT. PHAN. Nom donné par De Candolle à la quatrième section du genre *Polygala* (*Prodrom. System. Univ.*, 1, p. 327), qui comprend trois sous-Arbrisseaux américains dont le plus remarquable est le *Polygala thesioides*, Willd., figure et décrit par le P. Feuillée sous le nom de *Clinclin*. V. POLYGALÉ. (G. S.)

**CLINE.** pois. Pour Clinus. V. ce mot. (B.)

**CLINOCÈRE.** *Clinocera.* INSECT. Genre de l'ordre des Diptères, famille des Tanystomes, tribu ou sous-famille des Rhagionides de Latreille (Règn. An. de Cuv.), établi par Meigen, et ayant, suivant lui (Description. systém. des Diptères d'Europe, T. II. p. 113), pour caractères : antennes avancées, portées en dehors, de trois articles dont les deux premiers spléroïdaux, le troisième conique avec une soie terminale courbée ; trois yeux lisses frontaux ; ailes parallèles couchées sur le corps. La forme des antennes rapproche le genre Clinocère de celui des *Leptis* de Fabricius, et principalement du *Leptis vermicis*, dont les ailes sont également croisées sur le corps, ce qui pourrait donner lieu à une division dans laquelle on rangerait cette espèce avec la Clinocère noire, *Clinocera nigra*, qui est jusqu'à présent la seule propre au genre dont il est question. Meigen la figurée (*loc. cit.*, tab. 16, fig. 4). (ALB.)

**CLINOPODE.** *Clinopodium.* BOT. PHAN. Genre de la famille des Labiées et de la Didymie Gymnospermie, L., dont les caractères sont limbe du calice divisé supérieurement en trois parties et inférieurement en deux ; gorge de la corolle sensible



nt évasée; la lèvre supérieure nte émarginée, l'inférieure trifide, nt son lobe du milieu plus grand chancré.

es Clinopodes sont des Plantes bacées, à fleurs axillaires, verticées et munies de plusieurs bractées soyeuses. Elles sont en petit nombre, et habitent les climats tempérés l'un et l'autre hémisphère. La le espèce indigène de la France est CLINOPODE COMMUN, *Clinopodium* *officinale*, L., très-abondant, vers la fin l'été, dans les bois et près des s. Il a une tige haute de cinq à écimètres, velue et ordinairement ple. Ses fleurs sont disposées en icilles au sommet de la Plante, et le plus souvent de couleur rose; s cette couleur varie quelquefois asse au blanc. Les propriétés tonues et céphaliques qu'on lui a attées sont moins exaltées dans e Plante que dans les autres La-s, attendu la petite quantité ile volatile et de principe amer lle renferme. — Une belle espèce é décrite et figurée sous le nom *Clinopodium origanifolium* par Lamière (*Decad. Syriac.* 4, p. 24, ). Ce naturaliste l'avait trouvée le mont Liban. Les diverses espèces mbroscantes décrites comme Cli-odes dans quelques auteurs, appartenent aux genres *Phlomis*, *Hyptis* *venanthium*. F. ces mots. (G. N.)

CLINOTROCHOS. BOT. PHAN. cophraste.) Syn. d'Erable. (B.)

CLINUS. POIS. Syn. de Blennies général chez les Grecs modernes, une des divisions de ce genre dans Règne Animal de Cuvier. V. SNIE.

CLIO. CLIO. MOLL. Ce genre indiqué par Browne (*Historia Natur.* p. 386) pour les Animaux aux Péron a donné le nom de Clione, fut établi, postérieurement Pallas sous le nom de Clione; quoique Martens l'ait fait figurer son Voyage au Spitzberg, Linné moins ne commença à en parler sa douzième édition, en y comprenant, ainsi que dans les suivantes,

et la Clio figurée par Martens et celles indiquées par Browne. Cuvier, dans un Mémoire inséré dans le premier volume des Annales du Muséum, donna sur l'Animal de la Clio des détails anatomiques fort curieux, et fit pour ce genre, ainsi que pour quelques autres avoisinans, la seconde classe des Mollusques, les PRÉROPODES. V. ce mot. Les Clios ne renfermant plus que des Animaux mous, peuvent être génériquement caractérisées de la manière suivante : corps nu, gélatineux, libre, plus ou moins allongé, un peu déprimé; une tête distincte, surmontée de six tentacules rétractiles, longs et coniques, séparés en deux faisceaux de trois chaque, qui rendent la tête bilobée lorsqu'ils sont contractés, et peuvent être entièrement cachés dans une sorte de prépuce, portant lui-même un petit tentacule à son côté externe; deux yeux à la partie supérieure de la tête; bouche terminale, verticale; deux nageoires opposées, branchiales, insérées de chaque côté à la base du cou; une sorte de ventouse sous le cou; l'anus et l'orifice pour la génération s'ouvrant au côté droit près du cou, sous la nageoire.

Le système nerveux est composé d'un cerveau bilobé, duquel partent deux filets qui aboutissent sous l'œsophage où ils se renflent en ganglions. Ces ganglions fournissent eux-mêmes deux autres filets, lesquels donnent encore un ganglion chaque, qui se réunissent au-dessus de l'œsophage par un filet intermédiaire; les nerfs des autres organes partent en rayonnant de ces divers ganglions. La respiration est branchiale; ses organes sont partie des nageoires; c'est pour cela que Blainville propose le nom de PRÉRODIBRANCHE. De chaque branchie naît un vaisseau qui se réunit à son congénère au-dessus du cœur, pour donner naissance à un tronc unique, lequel se rend directement à cet organe. V., pour d'autres détails anatomiques, le Mémoire de Cuvier (*Ann. du Mus.* T. 1, p. 242, pl. 17). Tous les organes internes des Clios sont enveloppés

genre distinct ainsi caractérisé : capsule latérale ; péristome double : l'externe à seize dents simples, lancéolées, courbées en dedans ; l'intérieur composé de seize lanières subulées, percées d'une série de trous dans leur milieu et unies à leur base par une membrane très-courte ; coiffe se fendant latéralement.

Chacune des lanières du péristome interne paraît formée de deux cils rapprochés, unis par leur sommet et dont l'intervalle serait traversé par des filaments transversaux qui forment une sorte de grillage ; cette structure est très-différente de celle des *Hypnum*, des *Neckera* et des *Leskea*, et ce genre qui, par son port, s'éloigne assez des autres *Hypnum*, paraît mériter d'être conservé. La seule espèce qu'il renferme se trouve dans les grands bois ; elle est rare en fructification ; sa tige est rameuse, assez élevée, à rameaux redressés ; ses feuilles sont insérées tout autour de la tige, lâchement imbriquées, ovales, lancéolées, dentelées au sommet ; sa capsule est droite, cylindroïde, à opercule conique aigu. Bridel a séparé comme une espèce distincte celle qui croît dans l'Amérique septentrionale, et que Michaux avait décrite sous le nom de *Leskea dendroïdes* ; peut-être est-elle qu'une variété de la précédente ; le véritable *Climacium dendroïdes* croît aussi en Amérique et, à ce qu'on assure, au Japon. (AD. B.)

\* CLIMACTERIS. ois. (Temminck.)  
F. ECHELET.

\* CLIMBING-VOIE. BOT. Syn. de *Psychotria parasitica* dans l'île de Montserrat, l'une des Antilles. (P.)

\* CLINANTHE. *Clinanthum*. BOT. PHAN. C'est le nom que l'on donne au réceptacle commun sur lequel sont placées les fleurs dans les Plantes de la famille des Synanthérées. Il est tantôt épais et charnu, tantôt plane, tantôt concave ou convexe ; quelquefois il porte, outre les fleurs, des poils, des soies, des paillettes ou des alvéoles. Ces diverses modifications servent à caractériser les genres nombreux de la famille des Synanthérées. (A. R.)

CLINCHE MAM. Même chose que Chinche. F. ce mot. (B.)

\* CLINCHIN ET CLINCLIN. BOT. PHAN. (Feuillée.) Nom d'une espèce du genre *Polygale* au Pérou. F. CLINCLINIA. (B.)

\* CLIN-CLIN. ois. Petit Echassier que l'on trouve en abondance à Saint Domingue, et que l'on rapporte à la Guignette, *Tringa hypoleucos*, L. F. CHEVALIER. (DE. Z.)

\* CLINCLINIA. BOT. PHAN. N. donné par De Candolle à la quatrième section du genre *Polygala* (*Prodrom. System. Univ.*, 1, p. 327), qui comprend trois sous-Arbrisseaux américains dont le plus remarquable est le *Polygala thesioides*, Willd., figure décrite par le P. Feuillée sous le nom de *Clinclin*. F. POLYGALE. (G. N.)

CLINE. FOIS. Pour Clinus. F. ce mot. (B.)

CLINOCÈRE. *Clinocera*. INSECT. Genre de l'ordre des Diptères, famille des Tanystomes, tribu ou sous-famille des Rhagionides de Latreille (Règn. An. de Cuv.), établi par Meigen, et ayant, suivant lui (Description systématique des Diptères d'Europe, T. II, p. 113), pour caractères : antennes avancées, portées en dehors, de trois articles dont les deux premiers spiroïdaux, le troisième conique avec une soie terminale courbée ; trois yeux lisses frontaux ; ailes parallèles couchées sur le corps. La forme des antennes rapproche le genre Clinocère de celui des *Leptis* de Fabricius, et principalement du *Leptis oermides*, dont les ailes sont également croisées sur le corps, ce qui pourrait donner lieu à une division dans laquelle on rangerait cette espèce avec la Clinocère noire, *Clinocera nigra*, qui est jusqu'à présent la seule propre au genre dont il est question. Meigen l'a figurée (*loc. cit.*, tab. 16, fig. 4). (A. R.)

CLINOPODE. *Clinopodium*. BOT. PHAN. Genre de la famille des Labiées et de la Didymie Gymnospermie, L., dont les caractères sont : limbe du calice divisé supérieurement en trois parties et inférieurement en deux ; gorge de la corolle sensible

ment évasée; la lèvre supérieure droite émarginée, l'inférieure trifide, ayant son lobe du milieu plus grand échancré.

Les Clinopodes sont des Plantes herbacées, à fleurs axillaires, verticillées et munies de plusieurs bractées soyeuses. Elles sont en petit nombre, et habitent les climats tempérés de l'un et l'autre hémisphère. La seule espèce indigène de la France est

**CLINORHODE COMMUN**, *Clinopodium officinale*, L., très-abondant, vers la fin de l'été, dans les bois et près des ruis. Il a une tige haute de cinq à six décimètres, velue et ordinairement simple. Ses fleurs sont disposées en grappes au sommet de la Plante, et sont le plus souvent de couleur rose; mais cette couleur varie quelquefois jusqu'au blanc. Les propriétés toniques et céphaliques qu'on lui a attribuées sont moins exaltées dans cette Plante que dans les autres Labiées, attendu la petite quantité d'huile volatile et de principe amer qu'elle renferme. — Une belle espèce a été décrite et figurée sous le nom de *Clinopodium origanifolium* par Laffardière (*Decad. Syriac.* 4, p. 24, g.). Ce naturaliste l'avait trouvée sur le mont Liban. Les diverses espèces arborescentes décrites comme Clinopodes dans quelques auteurs, appartiennent aux genres *Phlomis*, *Hyptis*, *Pycnanthemum*. V. ces mots. (G. N.)

**CLINOTROCHOS**, BOT. THAN. (Céphalastre.) Syn. d'Érable. (N.)

**CLINUS**, POISS. Syn. de Blennies général chez les Grecs modernes, l'une des divisions de ce genre dans le Règne Animal de Cuvier. V. BLANNE.

**CLIO**, *Clio*, MOLL. Ce genre indiqué par Browne (*Historia Natur.* 2, p. 386) pour les Animaux auxquels Péron a donné le nom de Anélors, fut établi postérieurement par Pallas sous le nom de Clione; quoique Martens l'ait fait figurer dans son Voyage au Spitzberg, Linné n'en a jamais commencé à en parler dans sa douzième édition, en y comptant, ainsi que dans les suivantes,

et la Clio figurée par Martens et celles indiquées par Browne. Cuvier, dans un Mémoire inséré dans le premier volume des Annales du Muséum, donna sur l'Animal de la Clio des détails anatomiques fort curieux, et fit pour ce genre, ainsi que pour quelques autres avoisinans, la seconde classe des Mollusques, les PRÉROPODES. V. ce mot. Les Clios ne renfermant plus que des Animaux mous, peuvent être génériquement caractérisées de la manière suivante : corps nu, gélatineux, libre, plus ou moins allongé, un peu déprimé; une tête distincte, surmontée de six tentacules rétractiles, longs et coniques, séparés en deux faisceaux de trois chaque, qui rendent la tête bilobée lorsqu'ils sont contractés, et peuvent être entièrement cachés dans une sorte de prépuce, portant lui-même un petit tentacule à son côté externe; deux yeux à la partie supérieure de la tête; bouche terminale, verticale; deux nageoires opposées, branchiales, insérées de chaque côté à la base du cou; une sorte de ventouse sous le cou; l'an us et l'orifice pour la génération s'ouvrant au côté droit près du cou, sous la nageoire.

Le système nerveux est composé d'un cerveau bilobé, duquel partent deux filets qui aboutissent sous l'œsophage où ils se renflent en ganglions. Ces ganglions fournissent eux-mêmes deux autres filets, lesquels donnent encore un ganglion chaque, qui se réunissent au-dessus de l'œsophage par un filet intermédiaire; les nerfs des autres organes partent en rayonnant de ces divers ganglions. La respiration est branchiale; ses organes font partie des nageoires; c'est pour cela que Blainville propose le nom de PRÉRODIBRANCHE. De chaque branchie naît un vaisseau qui se réunit à son congénère au-dessus du cœur, pour donner naissance à un tronc unique, lequel se rend directement à cet organe. V., pour d'autres détails anatomiques, le Mémoire de Cuvier (Ann. du Mus. T. 1, p. 242, pl. 17). Tous les organes internes des Clios sont enveloppés

imitent plus ou moins la forme d'une cloche. Paulet n'a pas manqué ces noms dans sa barbare nomenclature, pour désigner quelques Champignons du genre *Agaric*. (N.)

**CLOCHER CHINOIS.** MOLL. Le Cérite Obélisque, élégamment étagé par un rang de tubercules qui dessinent la spire, a été vulgairement nommé ainsi à cause de cette disposition. *V. Cérise*. (D..H.)

**CLOCHETTE.** MOLL. Nom vulgaire de quelques espèces de Balanes, *Balanus balanoides*, et surtout d'une espèce de Calyptrée, *Calyptra equestris*. (D..H.)

\* **CLOFYF.** ois. (Dapper.) Nom d'un Oiseau de mauvais augure pour les superstitieux Africains, et quel'on n'a encore pu déterminer exactement. (DR..Z.)

**CLOISON.** *Dissepimentum.* BOT. PHAN. On nomme ainsi les lames, ordinairement verticales, qui partagent la cavité générale d'un fruit en plusieurs autres cavités partielles ou loges. Denis presque tous les fruits, les Cloisons sont placées verticalement; très-rarement elles sont horizontales, comme on l'observe par exemple dans le fruit des diverses espèces de Casses. Il est important de ne pas confondre les véritables Cloisons avec les lames saillantes que l'on trouve dans l'intérieur de quelques péricarpes. Les vraies Cloisons ont toutes une même organisation; elles sont formées d'une petite portion du sarcocarpe qui constitue leur partie centrale, recouverte des deux côtés par l'endocarpe ou membrane qui tapisse la paroi interne du péricarpe. Les fausses Cloisons au contraire ne sont pas recouvertes par cette membrane interne du péricarpe. Ainsi dans la capsule du Pavot on trouve un nombre plus ou moins considérable de lames saillantes sur la paroi interne du péricarpe, libres par leur côté intérieur, et recouvertes par les graines qui s'y attachent. Ces lames

ont été généralement considérées comme des Cloisons, mais n'en sont pas dans la réalité: 1° elles ne sont pas formées, comme les vraies Cloisons, d'une saillie du sarcocarpe revêtue des deux côtés par la membrane pariétale interne du fruit; 2° elles donnent immédiatement attache aux graines. Ce sont des placentas ou trophospermes.

Il est encore une autre distinction à faire dans les Cloisons, ce sont les Cloisons complètes et les Cloisons incomplètes. Les premières s'étendent depuis la base jusqu'au sommet de la cavité, sans laisser aucune communication entre les deux loges qu'elles séparent. Les secondes ne s'élèvent pas jusqu'au sommet du péricarpe, en sorte qu'il y a une communication entre les deux loges contiguës. Le fruit de la Pomme épineuse (*Datura Stramonium*, L.) offre à la fois des exemples de ces deux espèces de Cloisons. Il est partagé en quatre loges par quatre lames verticales ou Cloisons dont deux sont complètes et deux n'atteignent pas jusqu'au sommet du péricarpe, en sorte qu'il existe un vide, et que les loges communiquent ensemble deux par deux.

La position des Cloisons relativement aux valves n'est pas moins importante à étudier, et fournit des caractères souvent mis à contribution pour grouper les genres en familles naturelles. En effet, tantôt les Cloisons correspondent aux sutures par lesquelles s'ouvre la capsule, tantôt elles sont placées sur le milieu de la face interne des valves, tantôt enfin chaque Cloison semble formée par les bords rentrants des valves, et se compare en deux feuillets à l'époque de la déhiscence. Ces trois modes principaux servent de caractères, d'ordres et de genres. *V. FRUIT et PÉRICARPE*. (A. R.)

**CLOMENA.** BOT. PHAN. Paliset de Beauvois, dans son Agrostographie, a établi sous ce nom un genre nouveau dans la famille des Graminées pour une Plante originaire du Pérou.



l'un dont ils ont l'aspect et avec lesquels ils avaient été long-temps confondus; mais ils en diffèrent par leur membrane fructifère, organisée comme dans les vrais Champignons, caractère qui les rapproche des Pezizes, après desquelles on doit les placer dans une classification naturelle.

Les espèces encore peu nombreuses de ce sous-genre croissent sur les rameaux morts de différens Arbres, tels que les Pins, les Chênes, les Bruyères, etc. Les espèces les plus anciennement connues sont les *Cenangium ferrugineum*, Fries (*Peziza Abietis*, Pers. Syn. 671, *Triblidium pineum*, Pers. Myc. Europ. 552), et *Cenangium quercinum* (*Hysterium quercinum*, Pers. Syn. 100, *Triblidium quercinum*, Pers. Myc. Europ. 555).

(AD. B.)

**CLITORE.** *Clitoria*. BOT. PHAN. Famille des Légumineuses, Diadelphie Décandrie, L. Ce genre, décrit sous le nom de *Ternatea* par Tournefort, et constitué de nouveau par moi sous celui qu'il porte aujourd'hui, comprenait des Plantes dont l'organisation différente a nécessité la séparation comme genre particulier. Ainsi les espèces à calice formé de deux bractées et à légume cylindriques en ont été retirées pour former le genre *Galactia*. Le mot. Ce retranchement opéré, les *Clitores* doivent être ainsi caractérisées : calice tubuleux, campanulé à cinq divisions dont la plus intérieure offre souvent la forme d'une corolle renversée; l'étendard grand et écarté, recouvrant néanmoins les ailes et la carène qui sont petites; légume linéaire, très-gros et se terminant en pointe. Les *Clitores* sont des Plantes herbacées rampantes, ayant beaucoup de rapports avec les *Glycine*, à feuilles ternées ou rarement imparipennées, à folioles articulées comme celles des légumineuses et munies de deux stipules à leur base; les pédoncules des fleurs sont axillaires à une ou deux fleurs, ou quelquefois multiflores et en épis.

Quinze espèces environ de *Clitores* ont été décrites dans les divers auteurs. A l'exception de la plus anciennement connue (que Tournefort a fait connaître sous le nom générique de *Ternatea* parce qu'elle croît à Ternate et dans les Indes-Orientales) et d'une seconde espèce décrite par Lamarck et Ventenat, les autres *Clitores* sont toutes indigènes du Nouveau-Monde. La plupart habitent le Brésil et les Antilles, et deux croissent dans l'Amérique septentrionale. Leurs fleurs sont en général d'un aspect fort agréable, mais comme ces Plantes de serre chaude exigent trop de soins pour leur culture, elles sont rares dans les jardins, ou du moins il n'en existe que deux ou trois espèces cultivées dans les jardins de botanique; telles sont les *Clitoria Ternatea*, L.; *C. virginiana*, L., et *C. heterophylla*, Lamk. et Ventenat. Nous lisons, dans la Relation du voyage de Bory de Saint-Vincent aux principales îles des mers d'Afrique, une singulière remarque faite par ce voyageur sur le *Clitoria Ternatea* qu'il a trouvé en abondance aux îles de France et de Mascareigne; c'est que dans l'une de ces îles, les fleurs sont constamment blanches, et dans l'autre toujours bleues. (G. N.)

**CLITORIS.** ANAT. Ce nom, d'origine grecque, est dérivé d'un verbe pouvant se traduire par *titiller avec volupté*; tel est aussi le sens des deux autres synonymes latins, *æstus veneris*, *amoris dulcedo*. L'exquise sensibilité du Clitoris, comme si c'en était la seule considération importante, fut ce qui fixa d'abord sur lui l'attention: cependant on ne tarda pas à juger de ses rapports avec une partie du sexe mâle, d'où on lui donna de plus le nom de *Penis muliebris*. Cette vue, d'une justesse parfaite suivant nous, est encore regardée aujourd'hui par quelques anatomistes comme une hardiesse plus instinctive que raisonnée. En effet, la Philosophie actuelle des écoles, basant tout sur la considération des formes, n'ose déclarer identique ce qu'elle

aperçoit dissimulable. Bien qu'on ait vu le pénis des mâles et le Clitoris des femelles constitués par deux corps caverneux d'un tissu semblable, terminés par un gland qu'un même capuchon ou prépuce couvrait également, enveloppés par un même système dermoïque, nourris par de semblables rameaux vasculaires, et cédant à la même excitation nerveuse, on crut procéder avec une plus grande exactitude en regardant ces deux organes comme distincts et en effet comme assez dissimulables, pour ne devoir point être confondus sous le même nom. Trois circonstances motivèrent cette manière de voir. On se refusa à admettre comme semblable, ce qui, chez l'un, est d'un si grand volume quand il est chez l'autre d'un si extrême petitesse, ce qui est là prolongé et entièrement dégagé, et ici, au contraire, à moitié rentré et enveloppé, et, chose plus remarquable, ce qui dans l'un admet en dedans de soi le tube terminal d'un autre appareil, et ce qui, dans l'autre, est soustrait à ce mélange.

Ces idées particulières résultent des observations usuelles. Mais vous arrive-t-il d'agrandir votre champ d'observations et de passer des Mammifères aux Oiseaux, ou même, sans quitter les premiers, de passer des faits normaux aux cas irréguliers, les plus grandes de ces différences s'effacent, et l'identité des pénis et des Clitoris, déjà si fortement réclamée par les faits précédemment rapportés, devient enfin une conséquence absolument obligée. Il n'est plus chez les Oiseaux (V. les Mém. du Mus. d'Hist. Nat. T. IX, p. 439), entre le pénis et le Clitoris, de différence, que celle qui résulte de leur volume respectif : et encore, dans quelques-uns, cette différence est peu sensible. Le pénis est imperforé aussi bien chez les mâles que chez les femelles; et, chez les uns comme chez les autres, il est réduit au seul gland, unique portion qui soit dégagée des téguemens communs. C'est la même chose dans les monstruosités dites

*Hypoperties* : le méat urinaire est ouvert en dessous du pénis chez les Mammifères mâles viciés par cette anomalie; leur gland est de même imperforé, et il n'y a guère aussi que cette partie qui se voit extérieurement. Ainsi en qui est un cas pathologique, chez les Mammifères deviant de règle, chez les Oiseaux.

Au total, le Clitoris des premiers doit être considéré comme un organe rudimentaire, tenant ce caractère en défaut de développement et le justifiant par une très-grande susceptibilité à la variation. (GEOR. ST.-H.)

**CLIVINE.** *Clivina.* UNA. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, famille des Carnassiers, tribu des Carabiques bipartis, établi par Latreille, et dont les caractères sont : palpes extérieurs terminés par un article de la grosseur du précédent ou plus épais; languette saillante, droite ou obtuse à son sommet, avec une oreillette de chaque côté; labre membraneux ou coriace, sans dents; mandibules sans dentelures notables, plus courtes que la tête; antennes en forme de chapelet, avec les second et troisième articles presque égaux; jambes antérieures échancrées, dentées au côté extérieur et terminées par deux pointes très-fortes et longues, dont l'intérieure articulée à sa base.

Ce genre a été confondu avec les Ténébrions par Linné. Fabricius et les auteurs, jusqu'à Latreille, l'ont mis dans le genre Scarité, qui en diffère essentiellement par le labre, par la longueur de ses mandibules et par le corps qui est toujours plus aplati. Les Clivines vivent dans le sable mouillé, au bord des rivières ou sous les racines des Arbres, au lieu que les Scarites ne se rencontrent que dans les lieux secs et arides exposés à l'ardeur du soleil.

On peut diviser ce genre en deux petits groupes, d'après l'organisation des jambes antérieures : le premier comprend les Clivines dont les deux premières jambes sont dentées au côté

extérieur. Dans cette division se range la CLIVINE ARÉNAIRE, *Scarites arenaria*, Fab., Oliv. Elle varie du fauve au noirâtre ; le corselet est presque carré ; les élytres sont striées à stries ponctuées. Le second groupe comprend celles qui ont les jambes antérieures terminées par deux pointes très-fortes et longues, dont l'antérieure articulée à sa base ou en forme d'épine. C'est le genre *Dischidia* de Bonelli. Il renferme les *Scarites thoracicus* et *gibbus* de Fahr. *V. DISCHIDIE.* (6.)

\* CLIVINIA. ois. *V. CLAMATO-*

\* CLOAQUE. ANAT. Terme dont on fait l'application à un réceptacle commun supposé existant chez des Animaux avec une seule issue pour la sortie des produits stercoraires, urinaires et génitaux : ces Animaux sont Oiseaux et quelques Reptiles. Il est bien qu'on a imaginé plutôt qu'après une poche ayant cette destination ; car il n'y a nulle part en effet de plusieurs appareils semblable communauté de fonctions. La différence, sous ce rapport, est Oiseaux à l'égard des Mammifères, tient uniquement à ce que le rectum débouche dans la vessie urinaire et dans ce cas, c'est une suite de compartimens qui, pour être en fait, ne se distinguent pas moins les uns des autres. Ce sont autant de segments d'un long intestin, autant de anneaux dont les nodosités sont créées par des étranglemens valvulaires ou par des sphincters avec muscles.

Le rectum s'évase en une très-grande cellule, VESTIBULE RECTAL, où parviennent les fèces : au-delà est un autre compartiment rarement si considérable que dans l'Aigle, le plus souvent petit et rudimentaire (la vessie urinaire) ; arrive ensuite une poche annulaire (canal uréthro-sexuel) dans laquelle aboutissent les urètres et les oviduc-  
Le dernier des compartimens

est une poche fort considérable, théâtre de la copulation des sexes, fournie en abondance de nerfs et de vaisseaux, et bordée par les parties sexuelles externes, ou les organes excitateurs. Elle est analogue au capuchon qui couvre le gland des pénis ou des clitoris. Elle en remplit la même les fonctions : aussi l'avons-nous nommée BOURSE DU PRÉPUCE. *V. notre second volume de Philosophie anatomique.*

Ce dernier compartiment se retourne sur lui-même comme le capuchon qui coiffe le gland pénial chez les Mammifères, et se renversant comme un doigt de gant, il met le canal uréthro-sexuel en mesure de se prolonger dehors ; mais c'est alternativement que les orifices des urètres ou ceux des oviductus y arrivent. Ces orifices, fidèles à des devoirs différens, ne se nuisent jamais dans leurs évolutions. La production des uns n'est possible qu'en contraignant les autres au repos ou même à une retraite intérieure. Chaque système vaque à ses fonctions, à des momens marqués, et le plus grand ordre règne au milieu de ce qui avait apparu dans une extrême confusion. Quand le système urinaire abandonne ses produits, le rectum le suit de près ; il porte en avant son orifice et il vient lancer dehors les fèces. Il n'arrive donc jamais à la dernière poche réservée au mélange des sexes et à toutes les excitations amoureuses d'être heurtée ou salie par quoi que ce soit, venant à la traverser.

Des préjugés nous avaient donc abusés ; plus de récipient unique, plus de Cloaque dans le sens d'une sentine commune, organisation toute d'imagination et supposée sur la considération d'un seul passage praticable pour les produits génitaux, urinaires et intestinaux. (GEOR. ST.-H.)

CLOCHE ET CLOCHETTE. BOT. On donne vulgairement ce nom à plusieurs Plantes, telles que des Lisérons, des Campanules, des Muguet ou des Narcisses, dont les corolles

imitent plus ou moins la forme d'une cloche. Paulet n'a pas manqué ces noms dans sa barbare nomenclature, pour désigner quelques Champignons du genre *Agaric*. (2.)

**CLOCHER CHINOIS.** MOLL. Le Cérite Obélisque, élégamment étagé par un rang de tubercules qui dessinent la spire, a été vulgairement nommé ainsi à cause de cette disposition. *F. CÉRITE*. (D..H.)

**CLOCHETTE.** MOLL. Nom vulgaire de quelques espèces de Balanes, *Balanus balanoides*, et surtout d'une espèce de Calyptrée, *Calyptra equestris*. (D..H.)

\* **CLOFYF. OIS.** (Dapper.) Nom d'un Oiseau de mauvais augure pour les superstitieux Africains, et qu'on n'a encore pu déterminer exactement. (DR..Z.)

**CLOISON.** *Diasepimentum.* BOT. FRAN. On nomme ainsi les lames, ordinairement verticales, qui partagent la cavité générale d'un fruit en plusieurs autres cavités partielles ou loges. Dans presque tous les fruits, les Cloisons sont placées verticalement; très-rarement elles sont horizontales, comme on l'observe par exemple dans le fruit des diverses espèces de Cassea. Il est important de ne pas confondre les véritables Cloisons avec les lames saillantes que l'on trouve dans l'intérieur de quelques péricarpes. Les vraies Cloisons ont toutes une même organisation; elles sont formées d'une petite portion du sarcocarpe qui constitue leur partie centrale, recouverte des deux côtés par l'endocarpe ou membrane qui tapisse la paroi interne du péricarpe. Les fausses Cloisons au contraire ne sont pas recouvertes par cette membrane interne du péricarpe. Ainsi dans la capsule du Pavot on trouve un nombre plus ou moins considérable de lames saillantes sur la paroi interne du péricarpe, libres par leur côté intérieur, et recouvertes par les graines qui s'y attachent. Ces lames

ont été généralement considérées comme des Cloisons, mais n'en sont pas dans la réalité : 1° elles ne sont pas formées, comme les vraies Cloisons, d'une saillie du sarcocarpe revêtue des deux côtés par la membrane pariétale interne du fruit; 2° elles donnent immédiatement attache aux graines. Ce sont des placentas ou trophospermes.

Il est encore une autre distinction à faire dans les Cloisons, ce sont les Cloisons complètes et les Cloisons incomplètes. Les premières s'étendent depuis la base jusqu'au sommet de la cavité, sans laisser aucune communication entre les deux loges qu'elles séparent. Les secondes ne s'élèvent pas jusqu'au sommet du péricarpe, en sorte qu'il y a une communication entre les deux loges contiguës. Le fruit de la Pomme épineuse (*Datura Stramonium*, L.) offre à la fois des exemples de ces deux espèces de Cloisons. Il est partagé en quatre loges par quatre lames verticales ou Cloisons dont deux sont complètes et deux n'atteignent pas jusqu'au sommet du péricarpe, en sorte qu'il existe un vide, et que les loges communiquent ensemble deux par deux.

La position des Cloisons relativement aux valves n'est pas moins importante à étudier, et fournit des caractères souvent mis à contribution pour grouper les genres en familles naturelles. En effet, tantôt les Cloisons correspondent aux sutures par lesquelles s'ouvre la capsule, tantôt elles sont placées sur le milieu de la face interne des valves, tantôt enfin chaque Cloison semble formée par les bords rentrants des valves, et se sépare en deux feuillets à l'époque de la déhiscence. Ces trois modes principaux servent de caractères, d'ordre et de genres. *F. FRUIT ET PÉRICARPE*. (A. B.)

**CLOMENA.** BOT. FRAN. Paliset de Beauvois, dans son Agrostographie, a établi sous ce nom un genre nouveau dans la famille des Graminées pour une Plante originaire du Pérou,



l'avant, pour le port, beaucoup de ressemblance avec nos *Agrostis*. Ses fleurs forment une panicule presque simple; leur légicène est à peu près de la même longueur que la glume dont la valve supérieure est tridentée, et l'inférieure est entière; la paillette glabre de la glume est bifide à son sommet, et porte une petite soie qui sort de cette échancrure. Ces derniers caractères distinguent parfaitement le genre *Clomena* de tous ceux avec lesquels on pourrait le confondre.

(A. R.)

**\*CLOMENOCOME.** *Clomenocoma*. GR. PHAN. Genre nouveau de la famille des Synanthérées, tribu des Helianthées de Cassini, et de la Synthésie superflue de Linné. H. Cassini qui l'a fondé (Bull. Soc. Philom. déc. 1816) lui donne les caractères suivants: calathide radiée, composée de fleurons nombreux, réguliers, fertiles, et de rayons ligulés femelles, disposés sur un rang unique; involucre formé d'écaillés imbriquées, allongées, linéaires et aiguës, glanulifères sur leur côté extérieur et supérieur; réceptacle garni d'aspérités filiformes; akènes grêles, striés et surmontés d'une aigrette composée d'environ dix petites lanieres écailleuses, unisériées, dont chacune, indivise à sa base, est partagée supérieurement d'abord en trois branches, puis en cinq. C'est cette singularité de l'aigrette, ainsi que les glandes de l'involucre, qui ont engagé Cassini à établir ce genre, lequel d'ailleurs ne renferme qu'une seule espèce dont cet auteur ne connaît pas l'origine, l'ayant trouvée sans indication dans l'Herbier de Jussieu. Il résume cependant que c'est l'*Aster aurantius* de Linné, et il l'a nommée *Clomenocoma aurantia*. — Kunth *Synopsis Plant. Equinoct. orbis col.* T. II, p. 462) réunit ce genre à *Barbarea* de Willdenow. Les akènes des deux espèces qu'il décrit ont, en effet, comme dans le *Clomenocoma*, des aigrettes formées de poils fasciculés et réunis en forme

de fouet (*Pili subfasciculato-fasciculati*). (G. N.)

**CLOMIUM.** BOT. PHAN. Pour *Clodium*. V. ce mot. (B.)

**CLOMPAN.** *Clompanus*. BOT. PHAN. Aublet (Plantes de la Guiane, p. 775) appelle ainsi, d'après Rumph, une Plante de la famille des Légumineuses et de la Diadelphie Décandrie, L., dont les fleurs sont pourpres et paniculées; les petites branches grimpantes; les feuilles alternes et formées de folioles opposées, ovales, glabres et très-entières. Cette Liane croît dans la Guiane, au bord de la crique Saint-Régis. Suivant Aublet (*loc. cit.*), le *Clompanus funicularis* ou le *Tali bocompot mera* de Rumph (*Herb. Amb. T. V, p. 70, t. 37*), est identique avec son *Clompanus paniculata*. Cette Plante est assez bien figurée dans ce dernier ouvrage. Le genre *Clompanus* se rapproche, selon Lamarck, des genres *Galedupa* et *Pterocarpus*. (G. N.)

**CLONISSE.** MOLL. C'est le nom qu'Adanson (Voy. au Sénégal, pl. 16, n° 1) donne à la *Venus verrucosa* de Gmelin, nom qui est également employé vulgairement à Marseille, d'après Rondelet, pour désigner la même Coquille. (D. H.)

**CLOPORTE.** *Oniscus*. CRUST. Genre de l'ordre des Isopodes, établi originairement par Linné et subdivisé en plusieurs sous-genres. V. CLOPORTIDES. Les Cloportes proprement dits appartiennent (Règn. An. de Cuv.) à la section des Ptérygibranches, et ont pour caractères, suivant Latreille: quatre antennes dont les latérales seules, bien apparentes, de huit articles et recouvertes à leur base par les bords latéraux de la tête; branchies renfermées dans les premières écailles placées sous la queue; appendices du bout de la queue d'inégale longueur, les deux latéraux étant beaucoup plus grands que les intermédiaires. Les Cloportes diffèrent de tous les genres de la section à laquelle ils appartiennent par la composition et le recou-

vement de leurs antennes. Ce sont de petits Crustacés qui fuient la lumière et recherchent les endroits humides. On les trouve dans les caves, sous les pierres; leur démarche est assez vive lorsqu'on les inquiète. Ils se nourrissent de matières végétales; ils s'entredévorent même quelquefois. Ils sont vivipares. Nous reviendrons sur les particularités de leur organisation et sur les fonctions propres au sexe femelle; au genre Porcellion. *V.* ce mot. — Le CLOPORTE ORDINAIRE, *Oniscus Asellus* de Linné et de tous les auteurs, doit être considéré comme le type du genre. Il est très-commun.

(AUD.)

**CLOPORTE DE MER.** CRUST. et MOLL. On a désigné sous ce nom vulgaire des petits Crustacés appartenant aux genres Ligie et Sphérome; on a appliqué aussi ce nom aux Oscabrians. D'Argenville nomme Cloporte une espèce de Porcelaine, *Cypræa staphylæa*.

(AUD.)

**CLOPORTES CHENILLES.** INS. On nomme ainsi les chenilles de plusieurs Papillons de la division des Plébéiens urbicoles de Linné. (AUD.)

**CLOPORTIDES.** *Oniscides*. CRUST. Famille établie par Latreille (*Gener. Crust. et Ins.* T. I, p. 62, 67) dans l'ordre des Tétracères, et correspondant au grand genre *Oniscus* de Linné, qui depuis a été subdivisé par les entomologistes. Cette famille appartient (Règn. Anim. de Cuv.) à l'ordre des Crustacés isopodes, et est comprise dans la tribu des Ptérygibranches. Ses caractères sont : deux antennes apparentes, les moyennes étant fort courtes, cachées ou n'existant pas; corps ovale, plat en dessous, convexe en dessus, susceptible de contraction, et composé d'une tête et de treize anneaux; les sept premiers portant chacun une paire de pattes simples et terminées par un ongle; les six derniers anneaux formant une sorte de queue, garnie en dessous de cinq paires d'écaillés ou de fausses pattes sous-caudales; imbriquées graduellement sur deux rangées longitudina-

les; les premières ou les plus voisines des pattes proprement dites renfermant dans leur intérieur les organes de la respiration, et étant le siège des organes sexuels.

Les Cloportides ont une tête transverse plus étroite que le corps, et recue dans une échancrure du premier anneau; de chaque côté des yeux gros et réticulés. La bouche se compose d'un labre recouvrant une sorte d'épiglotte; de deux mandibules cornées, dentelées irrégulièrement, épaisses à leur base, très-comprimées et crochues à leur sommet; de deux paires de mâchoires en recouvrement, de manière que la plus reculée ou l'inférieure sert de gaine à la paire supérieure; celle-ci est finement dentelée à l'extrémité. Enfin il existe en arrière de toutes ces parties une sorte de lèvre inférieure composée de deux pièces extérieures s'appliquant sur toutes les autres en forme de feuillets contigus au bord interne, et terminés par une saillie conique ou triangulaire, offrant quelques articulations et semblable à un palpe. On peut considérer ces deux pièces comme des premières mâchoires auxiliaires. Ces caractères joints à ceux du genre que nous avons présentés d'après Latreille, donnent une idée assez complète de l'organisation extérieure de ces Crustacés. Quant à l'organisation interne, nous en parlerons au genre Porcellion qui a été étudié d'une manière spéciale par Trevirantus, et nous rapporterons à ce sujet les travaux importants de Cuvier et des autres observateurs. — Les Cloportides attaquent différentes matières végétales; ils se nourrissent même de substances animales; la plupart sont terrestres et habitent les lieux humides. Cette famille comprend les genres Ligie, Philoscie, Cloporte, Porcellion et Armadille. *V.* ces mots. (AUD.)

**CLOR et CYLOR.** BOT. PHAN. Noms galleis du *Banum Balbocastanum*. (B.)

\* **CLORIS.** REPT. OPH. (Daudin.) Espèce d'*Hydrus* du sous-genre *Hydrophis*. *V.* *Hydrus*. (B.)

\*CLOSCUAU. ois. Selon donne ce nom à l'Oiseau le dernier éclos de la couvée. (Dn. Z.)

\*CLOSIROSPERMUM. bot. ru. n. Quoiqu'antérieur de quelques années à *Harckausia* de Moench, ce genre était si obscurément caractérisé par Neckler, que la plupart des botanistes l'ont méconnu. Nous pensons avec Ossini que le genre de Moench lui est identique et doit lui être préféré, tant à cause de la clarté de son exposition que parce qu'il a été adopté par plusieurs auteurs, et notamment par De Candolle dans la Flore Française, deuxième édition. *F. BARKAUSIE* et *ARIDE*. (G. N.)

CLOSTEROCÈRES. ins. Famille de l'ordre des Lépidoptères, établie par Dornéril, et dont les caractères essentiels sont tirés de la forme particulière de leurs antennes, qui sont moniliformes et plus grosses au milieu qu'aux extrémités. Cette famille correspond à celle des Crépusculaires de Latreille. *F. CRÉPUSCULAIRES*.

(AUD.)

CLOTHO. moll. Sous cette dénomination, Faujas (Ann. du Mus. xi, p. 384, pl. 40) propose un nouveau genre de Conchifères qui ont la particularité remarquable de vivre dans l'intérieur des Coquilles perforantes. Celles dont il est ici question furent trouvées à l'état fossile dans un bloc de Calcaire enterré sous des pieds de profondeur dans une couche de Marne argileuse, encore partiellement rempli de Cardites qui l'avaient percé de toutes parts, et dont vingt sur toute superficie renfermaient de ces Coquilles parasites.

Cette observation n'est pas la seule à laquelle on puisse citer d'Animaux parasites dans la série des Coquilles perforantes; dernièrement nous eûmes l'occasion de nous procurer une pierre très-dure, criblée de trous de Fisulanes non fossiles. Quelques-unes étoient encore entières; nous cassâmes cette pierre, et ce ne fut pas sans étonnement que du même trou nous tirâmes les deux valves entières d'une Pistulane et celles d'une autre

Coquille que nous ne pûmes rapporter à aucun genre connu, pas même à celui qui nous occupe dans ce moment; nous nous proposons par la suite de faire connaître cette Coquille.

Voici les caractères génériques que Faujas a donnés à la Coquille qu'il a observée: coquille bivalve, équivalve, presque équilatérale, striée transversalement; charnière à une dent bifide un peu comprimée, recourbée en crochets sur chaque valve, une dent plus large que l'autre; deux impressions musculaires; ligament intérieur. Nous proposons de lui donner le nom de l'illustre naturaliste qui l'a fait connaître, *Clotho* de Faujas, *Clotho Faujasii*. (D. H.)

CLOTHO. Clotho. ARACHN. Genre de l'ordre des Pulmonaires, famille des Aranéides ou des Fileuses, section des Tubitèles, établi par Latreille (*Genera Crust. et Ins.* T. IV, *Addenda*, p. 370) sur des dessins et des notes communiqués par Walckenaer, et ayant pour caractères: huit yeux; les deux filières supérieures beaucoup plus longues que les autres; pieds presque égaux; la quatrième paire, ensuite la seconde, puis la troisième, un peu plus longues; mâchoires inclinées sur la lèvre, dont la forme est triangulaire. Ce genre qui se rapproche des Thomises par la forme générale du corps, et des Clubiones par la disposition des yeux, a été étudié d'une manière toute spéciale par notre savant ami, Léon Dufour, qui en a parfaitement circonscrit les caractères, et lui a assigné le nom d'*Uroctée*, *Uroctea* (Annales générales des Sc. phys. T. v, p. 198). Celui de *Clotho*, imposé par Latreille et Walckenaer, nous paraît devoir conserver la priorité, à moins qu'on ne croie utile de le supprimer à cause du mot employé pour désigner un genre de Mollusque. — Nous transcrivons ici les observations importantes de Dufour. Le corselet des Clothos est à peu près orbiculaire, déprimé ou à peine convexe. On y remarque, entre les yeux et l'origine des mandibules, une por-

tion remarquable de front tombant verticalement. Les yeux, placés sur deux lignes transversales, sont disposés de manière que les intermédiaires des deux séries forment entre eux un quadrilatère bien plus ouvert en arrière qu'en avant. Ces yeux sont arrondis, cristallins dans l'Animal vivant, et ceux du centre de la ligne antérieure sont un peu plus grands et plus saillans que les autres. Les mandibules, pressées l'une contre l'autre, verticales, oblongues, cylindroïdes et faibles, s'appuient par leurs extrémités sur la lèvre, et par conséquent ne dépassent point cette dernière. Elles sont dépourvues de dents à leur bord interne, et ne paraissent point susceptibles d'un grand écartement; elles sont même contiguës de telle sorte, près du milieu de leur face interne, qu'on les croirait soudées vers ce point, disposition analogue à celle du genre *Filistate* de Latreille. Leur crochet est fort petit. Les mâchoires, inclinées sur la lèvre, conniventes, courtes, très-obtuses, ne sont point garnies de soles particulières à leur bord interne, mais elles sont velues surtout en dehors. La lèvre qui se trouve entre elles est presque arrondie. Les palpes, presque de même grosseur que les pates, ne s'insèrent point, comme c'est l'ordinaire, dans un sinus du bord externe de la mâchoire, mais bien au-dessus de ce bord, et en quelque sorte sur la surface supérieure de l'organe maxillaire. Leur second article est assez gros, comme cambré et habituellement dirigé en avant. Le dernier se termine par un ongle ou crochet dans la femelle, tandis qu'il est inerme dans le mâle, et concave en dessous pour abriter en partie l'organe copulateur. Celui-ci est un gros bourrelet orbiculaire, sessile, glabre, solide, dont le centre plus saillant est armé en dessous de deux crochets sétacés un peu contournés en spirale. La poitrine est cordiforme; les pates ont une longueur moyenne; les ongles sont pectinés. L'abdomen est ovale, comme tronqué à sa base, légèrement dépri-

mé à sa région dorsale qui est marquée de quatre paires de points orbiculaires, dont les postérieurs sont peu sensibles. Les filières (quoique cette dénomination soit sans doute impropre pour les appendices anales du *Clotho*) sont au nombre de deux paires apparentes: l'une, fort courte et ne semblant exister que comme des vestiges ou des rudimens, est plus antérieure et tout-à-fait cachée sous le ventre. L'autre est saillante et formée d'un article principal allongé, conoïde, légèrement arqué et velu surtout en dehors. Elle paraît borgne, c'est-à-dire imperforée à sa pointe. Entre ces derniers appendices se rencontre un appareil qui paraît propre au genre *Clotho*; il consiste en un pinceau de poils implantés sur deux lèges opposées, de manière à former deux espèces de valves pectiniformes qui s'ouvrent et se ferment au gré de l'Animal. Dufour présume que les véritables filières sont placées entre ces valves, et que celles-ci servent de pigne ou de carder pour escharétrer les fils dont l'Araignée fabrique sa demeure. C'est de la présence de ces deux valves pectiniformes, situées à l'extrémité de l'anus, qu'a été tiré le nom d'*Uroctea*, ou plutôt *Uroctus*, dont les racines grecques signifient *queue* et *poigne*. On peut ajouter à tous les caractères qui viennent d'être développés, que les *Clothos* ont une paire de bourses pulmonaires. On ne connaît encore qu'une espèce propre au genre que nous décrivons; Latreille et Walckenaer lui donnent le nom de *Clotho* de Durand, *Cl. Durandii*, en l'honneur de la personne qui la leur a fait connaître. Cette espèce est la même que l'*Uroctea* à cinq taches, *Uroctea quinquemaculata* de Dufour (*loc. cit.* pl. 76, fig. 1, a-f), trouvée dans les rochers de la Catalogne, principalement aux environs de Barcelone et de Gérone, dans les montagnes de Narbonne, et dans les Pyrénées, près de Saint-Sauveur. Elle établit, à la surface inférieure des grosses pierres, ou dans les fentes des rochers, une coque en forme de cr-



lotte ou de patelle, d'un bon ponce de diamètre. Son contour présente sept à huit échancrures dont les angles seuls sont fixés sur la pierre, au moyen de faisceaux de fils, tandis que les bords sont libres. Cette singulière tente est d'une admirable texture. L'extérieur ressemble à un taffetas des plus fins, formé, suivant l'âge de l'ouvrière, d'un plus ou moins grand nombre de doublures. Ainsi, lorsque l'A-raignée, encore jeune, commence à établir sa retraite, elle ne fabrique que deux toiles entre lesquelles elle se tient à l'abri. Par la suite et à chaque mue, selon Dufour, elle ajoute un certain nombre de doublures. Enfin, lorsque l'époque marquée pour la reproduction arrive, elle tisse un appartement tout exprès, plus duveté, plus moelleux, où doivent être renfermés et les sacs des œufs et les petits récemment éclos. Quoique la calotte extérieure ou le pavillon soit, à l'usage sans doute, plus ou moins ali par des corps étrangers qui servent à en masquer la présence, l'appartement de l'industrielle fabricante est toujours d'une propreté recherchée. Les poches ou sachets, qui renferment les œufs, sont au nombre de quatre, de cinq ou même de six pour chaque habitation qui n'a cependant qu'une seule habitante. Ces poches ont une forme lenticulaire, et ont plus de quatre lignes de diamètre. Elles sont d'un taffetas blanc comme la neige, et garnies intérieurement d'un édredon des plus fins. Ce n'est que dans les derniers jours de décembre ou au mois de janvier que la ponte des œufs a lieu. Il fallait prémunir la progéniture contre la rigueur de la saison et les incursions ennemies; tout a été prévu. Le réceptacle de ce précieux dépôt est séparé de la toile immédiatement appliquée sur la pierre par un vel moelleux, et de la calotte extérieure par les divers étages dont il a été dit. Parmi les échancrures qui boitent le pavillon, les unes sont tout-à-fait closes par la continuité de l'étoffe, autres ont leurs bords simplement exposés, de manière que l'Animal,

se relevant ceux-ci, peut à son gré sortir de sa tente et y rentrer. Lorsqu'elle quitte son domicile pour aller à la chasse, elle a peu à redouter sa violation, car elle seule a le secret des échancrures impénétrables, et la clef de celles où l'on peut s'introduire. Lorsque les petits sont en état de se passer des soins maternels, ils prennent leur essor et vont établir ailleurs leurs logemens particuliers, tandis que la mère vient mourir dans son pavillon. Ainsi ce dernier est en même temps le berceau et le tombeau du Clotho. Ces détails sont si intéressans, que nous avons cru devoir n'en rien omettre. (AUD.)

**CLOTHONIE.** REPT. OPH. Le genre formé sous ce nom par Daudin du *Boa anguiformis* de Schneider, n'a pas été adopté. (B.)

**CLOU.** BOT. CRYPT. On a vulgairement donné ce nom à divers Champignons. Paulet l'a adopté en y ajoutant l'épithète de *Tête de Crapaud*, qui n'est ni plus exacte ni plus heureuse. Il a aussi nommé *Clous dorés* l'un de ses genres si bizarrement établis. (H.)

\* **CLOU-A-PORTE.** CRUST. Pour Cloporte. V. ce mot.

**CLOU DE DIEU.** BOT. PHAN. Nom vulgaire du *Sparganium erectum*. (B.)

**CLOUDET.** OIS. Syn. vulgaire du Hibou, *Strix Otus*, L. V. CHOUETTE. (DR. Z.)

**CLOUS.** MOLL. On entend vulgairement, par le mot Clous, des Coquilles allongées et turritulées des genres Cérithie, Vis, Turritelle, etc. Lamarck (*Mémoires sur les Fossiles des environs de Paris*, p. 85, n° 21) a donné le nom de Clou, *Clavus*, à une Coquille fossile du genre Cérithie. (D. H.)

**CLOUVA.** OIS. Syn. indien du Cormoran, *Pelecanus Carbo*, L. V. CORMORAN. (DR. Z.)

\* **CLOVISSE.** MOLL. V. BIVRONE.

**CLUACINA.** BOT. PHAN. (Pline.) Syn. de Myrte. (B.)

**CLUBIONE.** *Clubiona*. ARACHN.

Genre de l'ordre des Pulmonaires, famille des Aranéides, section des Tubulés, établi par Latreille; et ayant, suivant lui, pour caractères: huit yeux; filières extérieures presque également longues; mâchoires droites, élargies à leur base extérieure pour l'insertion des palpes, et arrondies à son extrémité; lèvres en carré long. Les Clubionés diffèrent des Ségestries et des Dysdèles par le nombre des yeux; des Clothos et des Aranéides propres par la longueur semblable des filières; des Filistales et des Dracnes par leurs mâchoires droites; enfin, quoique très-voisines des Argyronètes, elles s'en éloignent par la forme de l'extrémité des mâchoires, et par celle de la lèvre. Ces Arachnides sont voraces; elles épient leur proie et courent après; on les voit tendre autour des chambres des fils de soie fine et blanche, qu'elles emploient aussi à s'envelopper dans l'intérieur des feuilles et les cavités des murailles. Leurs yeux sont différemment placés au-devant du corselet sur deux lignes transversales. Walckenaer (Tableau des Aranéides, pl. 5, fig. 40, 46, 45 et 48) représente leurs diverses positions. Leur lèvre est allongée, coupée en ligne droite à son extrémité; les palpes sont propres à la course, et varient respectivement de longueur; la première paire est ensuite la quatrième sont en général les plus grandes; mais dans certaines espèces, cette dernière, et ensuite la première ou la seconde, dépassent les autres. Les caractères tirés de ce degré de développement, joints à quelques autres, ont servi à Walckenaer (loc. cit., p. 41) des bases pour l'établissement des cinq sections suivantes auxquelles il donne le nom de familles:

I<sup>re</sup> Section. — Les DRYADES, *Dryades*. La quatrième paire de pattes plus longue que les autres; la seconde sensiblement plus longue que la première; la troisième la plus courte; yeux sur deux lignes parallèles, droites; mandibules dirigées en avant. — Les Arachnides de ce groupe

se renferment dans des feuilles ou derrière l'écorce des Arbres; leur corselet est aplati. Walckenaer en cite deux espèces; nous citerons le Clubioné SOURTEUX, *Cl. holosericeus*, figuré par Clerck sous le nom d'*Aranus pellucida* (tab. 7, fig. 1 et 2), et par Walckenaer (Hist. des Aran., fasc. 4, tab. 3, la femelle) qui a aussi figuré la disposition des yeux (Tabl. des Aranéid., pl. 5, fig. 25). Latreille ne pense pas que l'*Araignée* figurée par Lister (tab. 23, fig. 25) puisse être rapportée à cette espèce. On la trouve communément.

II<sup>e</sup> Section. — Les HAMADRYADES, *Hamadryades*. Première paire de pattes la plus longue, la quatrième ensuite, la troisième la plus courte; yeux ramassés en demi-cercle; corselet pointu à sa partie antérieure; mâchoires courtes, peu dilatées à leur extrémité; lèvres légèrement échancrées à son extrémité; mandibules verticales. — Ces Aranéides se renferment ou se tiennent dans des feuilles sèches. Walckenaer n'en cite qu'une espèce, la Clubioné ATTENUÉE, *Cl. attenuata*, Walck. (Faune Paris. T. II, p. 226, n° 75).

III<sup>e</sup> Section. — Les NYMPHES, *Nymphæ*. Première paire de pattes la plus longue, la quatrième ensuite, celle-ci surpassant un peu la seconde; la troisième la plus courte; lèvres légèrement échancrées à son extrémité; yeux latéraux rapprochés; mandibules verticales. Les espèces de ce groupe se renferment entre des feuilles qu'elles rapprochent. Walckenaer mentionne six espèces; parmi elles nous remarquerons la Clubioné SOURICE, *Cl. nutrita*, Latr. Ses yeux, sa lèvre, ses mâchoires et ses mandibules sont représentées par Walckenaer dans son Tableau des Aranéides (pl. 5, fig. 43 et 44). On la rencontre vers la fin de l'été sur le Panicaut des champs ou Chardon Roland dont elle plie les feuilles pour s'en faire un nid.

IV<sup>e</sup> Section. — Les PARQUES, *Parces*. La première paire de pattes plus longue que les autres; la qua-

trème ensuite, la troisième la plus courte; yeux latéraux rapprochés; corselet très-bombé à sa partie antérieure; lèvres coupées en ligne droite; et légèrement échambrées à son extrémité. Les Aranéides de cette division se renferment dans une toile fine pratiquée dans les cavités des murs, les caves et les lieux obscurs, Walckenaer cite deux espèces; la plus remarquable est la *CLUBIONA ATROX*; *Cl. atrox*, Latr., Walck., représentée par Dégeer (Hist. des Insect. T. VII, pag. 253; n° 15, pl. 14, fig. 24 et 25), par Albin (pl. 2, fig. 9 et 10), et par Lister (p. 68, tit. 21, fig. 21).

V<sup>e</sup> Section. — Les *FURIES*, *Furiae*. La quatrième paire de pattes plus longue que les précédentes, la première onguite, la troisième la plus courte; mâchoires bombées à leur base et vers leur extrémité; lèvres allongées, coupées en ligne droite à son extrémité; yeux sur deux lignes courbées, parallèles; les latéraux distants et écartés. Ici sont rangées les tranéides construisant leur demeure sous des pierres, et dont le cocon est globuleux. On n'en connaît qu'une espèce, la *CLUBIONA LAPIDICOLA*, *l. lapidicola* de Walckenaer (Faun. Paris. T. II, p. 222, n. 70) qui représente les yeux au trait (Tab. des ran, pl. 5, fig. 48). (AUB.)

\* *CLUB-RUSH*. BOT. PHAN. *V. CL-RUSH*.

\* *CLUGNIA*. BOT. PHAN. (*Comptonson*.) *V. BARHARA*.

\* *CLUK-NOCNY*, ois. Syn. poloïs du Cormoran, *Pelecanus Carbo*, *V. CORMORAN*. (DR..Z.)

\* *CLUNAU* ou *CLUNEAU*. Nom gaire de l'Agaric élevé dans le midi de la France. On l'appelle Cluseau dans d'autres provinces. (S.)

\* *LUNIPÈDES*. Oiseaux dont les os, en partie retirés dans l'abdomen, sont placés très-en arrière. Leur vol est droit, dans un équilibre parfait. (DR..Z.)

\* *LUPANODON*. POIS. Genre établi Lacépède aux dépens du genre

*Clupe*, et fondé sur l'absence des dents. Il n'a pas été conservé par Cuvier, même comme sous-genre, tant les passages aux véritables Harénages sont insensibles. *V. CLUPE*. (S.)

**CLUPE.** *Clupea*. POIS. Genre nombreux en espèces, et fort important à connaître par l'utilité que retire l'Homme de plusieurs d'entre celles-ci. Formé d'abord par Artedi, il a été conservé par tous les ichthyologistes à peu de changemens près, et se range dans l'ordre des Abdominaux de Linné. Il appartient à celui des Malacoptérygiens abdominaux de Cuvier, où il sert de type à la famille très-naturelle des Clupes ou Clupées. Duméril le place parmi ses Gymnognomes. Ses caractères sont : plus de trois rayons à la membrane des branchies; une seule dorsale; l'anale libre; le ventre fort aminci en carène, et inférieurement comme denté en scie. Le Dictionnaire de Levrault répète textuellement d'après Cuvier : que les Poissons de ce genre ont encore deux caractères bien marqués dans leurs intermaxillaires, étroits et courts, qui ne font qu'une petite partie de la mâchoire supérieure dont les maxillaires complètent les côtés; et en sorte que ces côtés seuls sont protractiles; et dans le bord inférieur de leur corps qui est comprimé, et dont les écailles forment une dentelure. Les maxillaires se divisent en outre en trois pièces; les oses sont très-fendues : aussi dit-on que ces Poissons meurent à l'instant où on les retire de l'eau. Les arceaux de leurs branchies sont garnis, du côté de la bouche, de longues dents comme des peignes; l'estomac est un sac allongé; la vessie natatoire longue et pointue; les cœcums nombreux. Ce sont de tous les Poissons ceux qui ont le plus d'arêtes très-fines. Le savant auteur du Règne Animal a réparti les Clupes dans sept sous-genres; ainsi qu'il suit, sans tenir compte du genre Clupanodon qui, dans Lacépède, renfermait les espèces totalement dépourvues de dents aux mâchoires.

I. Les HARENGS, *Clupea*, dont les os maxillaires sont arqués en avant, divisibles longitudinalement en plusieurs pièces ayant l'ouverture de la bouche médiocre, non entièrement garnie de dents, souvent même entièrement édentée; la dorsale située au-dessus des ventrales. Les espèces de ce sous-genre, toutes argentées et se ressemblant beaucoup, sont assez difficiles à distinguer; nous citerons entre elles:

Le HARENG COMMUN, *Clupea Harengus*, L., Bloch, tab. 29, fig. 1; Encyc. Pois. pl. 76, f. 510. Trop connu pour qu'il soit nécessaire de le décrire, nous nous bornerons, pour caractériser ce Poisson précieux, au nombre des rayons qui supportent ses nageoires. D. 18-19, P. 15-18, V. 8-9, A. 16-17, C. 18. « Honneur aux peuples de l'Europe qui virent, dit l'éloquent Lacépède, dans les légions innombrables de Harengs que chaque année amène auprès de leurs rivages, un don précieux de la nature! Honneur à l'industrie éclairée qui a su, par des procédés aussi faciles que sûrs, prolonger la durée de cette faveur maritime, et l'étendre jusqu'au centre des plus vastes continents! Honneur au chef des nations dont la toute-puissance s'est inclinée devant les heureux inventeurs qui ont perfectionné l'usage de ce bienfait annuel! » Le savant continuateur de Buffon rappelle qu'un empereur victorieux voulut saluer le tombeau de Guillaume Deukalzoön, pêcheur hollandais, qui, trouvant le moyen de saler et de conserver le Hareng, ouvrit à son pays l'une des principales sources de sa prospérité; « et nous, Français, s'écrie-t-il, n'oublions pas que si un pêcheur de Biervliet a trouvé la véritable manière de saler et d'encaquer le Hareng, c'est à nos compatriotes, les habitants de Dieppe, que l'on doit un art plus utile à la partie la plus nombreuse et la moins fortunée de l'espèce humaine, celui de le fumer. Le Hareng est une de ces productions naturelles dont l'emploi décide de la destinée

des empires. La graine du Caféier, la feuille du Thé, les épices de la Zone Torride, le Ver qui file la soie, ont moins influé sur la richesse des nations que le Hareng de l'océan Atlantique; le luxe ou le caprice demandent les premiers, le besoin réclame l'autre. Le Batave en a porté le pêche au plus haut degré: ce peuple qui avait été forcé de créer un asile pour sa liberté, n'aurait trouvé que de faibles ressources sur son territoire lactice; mais la mer lui a ouvert ses trésors.... L'a chaque année fait partir des flottes nombreuses pour aller les recueillir; il a vu dans la pêche du Hareng la plus importante des expéditions maritimes; il l'a surnommé la grande pêche; il l'a regardée comme ses mines d'or.... La chair de ce Poisson est imprégnée d'une sorte de graisse qui lui donne un goût très-agréable, et qui la rend aussi plus propre à répandre dans l'obscurité une lueur phosphorique. La nourriture à laquelle il doit ses qualités consiste communément en œufs de petits Poissons, en petits Crabs et en Vers.... On a cru pendant long-temps que les Harengs se retiraient périodiquement dans les régions des cercles polaires; que n'y trouvant pas une nourriture proportionnée à leur nombre prodigieux, ils envoyaient au commencement de chaque printemps des colonies nombreuses vers les rages plus méridionaux de l'Europe et de l'Amérique. On a tracé la route de ces légions errantes; on a pensé que l'une de ces grandes colonies se pressait autour des côtes d'Islande, et, se répandant sur le banc de Terre-Neuve, allait remplir les golfes et les baies du continent américain. L'autre, descendant le long de la Norvège, pénètre dans la Baltique en faisant le tour des Orcades et de l'Irlande, et, cinglant vers le midi de la Grande-Bretagne, elle inonde les côtes de France et d'Espagne. »

Ces migrations sont réputées impossibles selon plusieurs observateurs qui remarquent que le retour des Harengs n'est pas constant sur certaines



soit elles les ramèneraient. Chaque de voit cependant arriver les Harengs en certains lieux, soit afin d'y poser leurs œufs, soit pour y rechercher une nourriture préférée. Si qu'il en soit, les Harengs naissent par bancs épais et innombrables; à leur approche la mer est verte d'une matière épaisse, visqueuse, et qu'on assure être phosphore pendant la nuit. Les Oiseaux tyrophages, les Squales, les Cétacés, réunissent autour de ces amas migrants, et les pêcheurs, préparant des filets, viennent concourir à une traction qui n'influe jamais sur la pêche. Les filets dont se servent les Hollandais pour les détruire n'ont pas moins de six à huit cents toises de longueur; on les fait avec une soie grosse venue de Perse, qu'on enduit d'une fumée huileuse pour les garantir l'humidité et les soustraire à la vue du Hareng qui s'y laisse prendre. La grande pêche a lieu depuis la fin de mai jusqu'au commencement de janvier. On est parvenu à attirer les Harengs sur des rivières qu'ils ne fréquentaient pas; c'est surtout en Suède qu'on les a appelés sur des plages où mais on ne les avait vus, et dans l'Amérique septentrionale où le commerce et l'industrie sont les fruits de la véritable liberté; on a fait éclore les œufs du Hareng vers l'embouchure de fleuves où les individus sortis de ces œufs ont contracté l'habitude de revenir avec de nouvelles générations. On cite des baies dans le Nord où plus de vingt millions de Harengs sont devenus la proie des pêcheurs. Il est peu d'années où l'on ne prenne dans la Baltique seule plus de quatre cent millions de ces Animaux. Bloch prétend qu'aux environs de Gottenbourg on en a pêché annuellement plus de sept cent millions d'individus.

On prépare les Harengs de plusieurs manières: on les sale en pleine mer, et lorsqu'ils sont le résultat de la pêche du printemps ou de l'été, on les donne nouveaux ou verts. Pris dans l'arrière-saison ou en hiver, ce sont

les Harengs *secs* ou *pekels*; fumés, on les appelle *saures* ou *saurets*; dans la saumure, *alms*. Nos marchés sont remplis de ces diverses qualités de Harengs, et les frais y sont fort recherchés. Noël a donné sur ces Animaux, leur pêche et leurs préparations, un traité justement estimé.

Le PILCHARD, *Clupea Pilchardus*, Bloch, pl. 406; *Clupanodon*, Lacép. T. v, p. 472; vulgairement le Célou. A mâchoire inférieure plus avancée que la supérieure, pointue et courbée vers le haut, avec une fossette sur le vertex et la ligne latérale droite. La taille de ce Poisson, mal à propos confondu avec le Hareng, est pareille; mais ses écailles sont plus grandes. L'anale a un ou deux rayons de ples. On le pêche surtout vers la fin de juillet par troupes innombrables sur les côtes du pays de Cornouailles. L'arrivée du Pilchard est soigneusement guetée par des pêcheurs nommés *luers*, qui en ont pris jusqu'à un milliard dans une saison. L'Angleterre en tire une grande ressource.

La SARDINE, *Clupea Sprattus*, L., Gmel. T. xiii, p. 1; pers 2, p. 2403; Bloch, t. 30, f. 2; Encycl., pl. 75, f. 311. Cette espèce est plus petite et plus étroite que le Hareng; sa chair est plus délicate. On la pêche surtout dans le golfe de Gascogne depuis l'embouchure de la Loire jusqu'en Galice où elle est une source incalculable de richesses. Le bassin d'Arcachon en produit une variété dont la chair est exquise et qui se recherche à Bordeaux sous le nom de *Royan*. D. 17, p. 16-17, v. 6-7, m. 19, c. 18.

L'ALOSE, *Clupea Alosa*, L., Gmel., loc. cit., p. 1404; Bloch, t. 30, f. 1; Encycl. Pois., pl. 75, f. 312, n'étant pas moins connue que le Hareng et la Sardine, nous n'en donnerons pas plus la description. Plus grande que les espèces précédentes, elle atteint jusqu'à trois pieds de longueur, et remonte les rivières. On la trouve jusque dans la mer Caspienne; sa chair est délicate, mais son goût est moins savoureux quand on la prend dans la

† *Manis. de ventrales.*

I. Les HARENGS, *Clupea*, dont les os maxillaires sont arqués en avant, divisibles longitudinalement en plusieurs pièces ayant l'ouverture de la bouche médiocre, non entièrement garnie de dents, souvent même entièrement édentée; la dorsale située au-dessus de ventrales. Les espèces de ce sous-genre, toutes argentées et se ressemblant beaucoup, sont assez difficiles à distinguer; nous citerons entre

Le HARENG COMMUN, *Clupea harengus*, L., Bloch, tab. Encyc. Pois. pl. 75, connu pour qu'il soit à décrire, nous nous caractériser ce Poisson nombre des rayons de ses nageoires.

Le HARENG COMMUN, *Clupea harengus*, L., Bloch, tab. Encyc. Pois. pl. 75, connu pour qu'il soit à décrire, nous nous caractériser ce Poisson nombre des rayons de ses nageoires.

Le HARENG COMMUN, *Clupea harengus*, L., Bloch, tab. Encyc. Pois. pl. 75, connu pour qu'il soit à décrire, nous nous caractériser ce Poisson nombre des rayons de ses nageoires.

des empires. — TASSART, Encycl. feuille du 76, pl. 76, fig. 315; Clupea Torrida, 1766, L., Gmel., loc. cit., p. 404. Ce Clupe se trouve dans les mers de la Chine, du Japon, de la Caroline et des Antilles. Il acquiert un peu plus d'un pied de longueur, a la chair exquise, mais sujette à devenir vénéneuse. Cette espèce est du nombre de celles qu'on appelait Poissons Bananes à Saint-Domingue. N. 5-7, D. 14-20, P. 16, V. 7-9, C. 21-25.

Le NASIQUE, *Clupea nasus*, Bloch, p. 429, Clupanodon, Latép., Pois. T. V, p. 470, a les deux mâchoires également avancées, mais avec un museau plus saillant. Sa chair, qui passe pour être malsaine, est toute remplie de petites arêtes. On pêche ce Poisson vers l'embouchure des rivières de la côte de Malabar. N. 4, P. 15, C. 20.

III. ANCHOIS, *Engraulis*. Ils diffèrent des autres Clupes parce que leur ethmoïde et leurs naseaux forment une pointe saillante au-dessous de laquelle leurs petits intermaxillaires sont fixes, tandis que leurs maxillaires sont droits et très-longs, leur gueule très-fendue, leurs deux mâchoires bien garnies de dents, et leurs ouïes plus ouvertes encore.

L'ANCHOIS proprement dit, *Clupea Encrasicholus*, L., Gmel., loc. cit., p. 1805; Bloch, t. 30, f. 2; Encycl. Pois., pl. 75, f. 513. Ce Poisson est beaucoup plus connu, dit judicieusement Bonnaterrre, par l'usage que l'on en fait pour l'assaisonnement de la table, que par la forme du corps qu'on est rarement à portée d'observer, parce qu'elle se trouve dénaturée par la préparation qu'on lui fait subir. L'Anchois est long, étroit, dépourvu d'écaillés, remarquable par sa transparence qui n'est interrompue que vers l'épine du dos. Sa tête, dont le sommet est plat, se termine par une sorte de museau. Ses mâchoires sont luisantes et légèrement teintées de rouge; le dos est bleuâtre et le reste du corps argenté; sa taille s'étend de

ances. Le nom d'*Engras* par les anciens à l'Anchoa conservé comme il a le fiel dans le préjugé ou le petit ha- et surtout encore une ri- qu'il fréquen- immenses quanti- et mises dans de la répandues par le com- entre des continents. Il est pas où l'Anchoa ne soit ho- ment servi. Nous en avons vu andre plusieurs millions dans un seul coup de filet entre Malaga et Ve- tez-Malaga, lieux renommés en Es- pagne pour ce genre de salaison. B. 12, D. 14, F. 15, V. 7, A. 18, C. 18.

Le MÉLET ou MÉLETTE, Duhamel, part. 2, pl. 5, f. 1; *Esox Hesperus*, L. Gmel., loc. cit., p. 1592; *Atherina Brownii*, Gmel., loc. cit., p. 1597 (par double emploi); Clupée-Raie d'argent, Lacépède, T. v, p. 416; Stolephore commersonien, Lacép. T. v, p. 582, pl. 12, f. 1 (encore par double emploi); le Poisson d'argent, Encyc. Pois., pl. 75, f. 503, à laquelle cet ouvrage rapporte mal à propos la description et le nom d'*Atherina Menidia*, L. On voit que ce petit Poisson, qui se trouve dans la Méditerranée, l'Inde, les îles d'Afrique et le Brésil où Maregraff le mentionne sous le nom de Pillingua, a été désigné par ces mêmes auteurs sous des noms divers. C'est Cuvier qui a savamment rétabli sa synonymie. D. 14, F. 12, V. 6, A. 15, C. 14.

Les *Clupea Atherinoides* de Bloch, pl. 408, f. 1, et *Malabarica* du même auteur, appartiennent encore à ce sous-genre, en y formant une section dont les caractères consistent dans la position de la dorsale qui est placée plus en arrière de la ventrale, ou même vis-à-vis le commencement de l'anneau qui est longue.

Cuvier (Règn. Anim. T. 11, p. 175) pense que le Poisson Banane des Antilles, qu'il regarde comme le même

Poisson que le Clupe macrocephale de Lacépède (Pois. T. v, pl. 14, f. 1), pourrait bien appartenir au sous-genre dont il est ici question. Ce savant a, comme on l'a vu à l'article ARGENTINE, rapporté ces synonymes à l'espèce que nous avons décrite sous le nom de *Glossodon* ou *Bonuk*. Il paraît, d'après l'assertion de ce grand naturaliste, que le Synode Renard de Lacépède (Pois. T. v, pl. 8, f. 2) est le même Animal, ainsi que le Butirum du même auteur. De telles incertitudes prouvent assez combien il est dangereux d'établir, dans les ouvrages classiques, des espèces et surtout des genres sur des figures qu'accompagnent des descriptions imparfaites.

IV. Les THRISSES, *Thrissa*, ont pour caractères des os maxillaires bien dentés, se prolongeant en pointes libres au-delà de la mâchoire inférieure. L'espèce qui sert de type à ce sous-genre compose le genre *Myste*, *Mystus*, de Lacépède.

Le MYSTE, Lacép., Pois. T. v, pl. 467, Encyc. Pois. pl. 100, f. 401; *Clupea Mystus*, L., Gmel., Syst. Nat. xiii, 1, pars 2, pl. 1408. Ce Poisson est d'une forme très-singulière, fort aplati; on dirait une lame de couteau. Ses mâchoires surtout sont fort remarquables, ainsi que la longueur de l'anale et la rondeur de la caudale, fourchue dans la plupart des autres Clupes. Il nous paraît que le genre *Myste* pouvait être conservé, et que son nom même, ayant été consacré par l'antériorité, eût été préférable à celui de Thrisse appliqué déjà comme spécifique à un *Mégalo*. Quoi qu'il en soit, le *Myste* est un Poisson des mers de l'Inde qui n'atteint guère qu'un demi-pied de longueur. B. 10, D. 15, P. 17-18, V. 6-7, A. 84-86, C. 11-13.

Le Boalam des Arabes, *Boalama* de Forsk., Balam ou Bélame, Encyc. Pois. pl. 76, f. 516, et le *Clupea setirostris* de Broussonet, avec le *Clupea mystax* de Schneider, sont encore des Thrisses.

†† Sans ventrales.

V. ODONTOGNATHES, *Gnathobolus*,

mer. Les Russes, qui n'en apprécient pas la saveur, croient ce Poisson malsain et la rejettent de leurs filets. D. 18-19, P. 15, V. 8-9, A. 18-21, C. 18-26.

La FAUTE, *Clupea fallax*, Lacép., T. V, p. 352. Cette espèce, qui a été souvent confondue avec l'Alose, est commune à l'embouchure de la Seine. On doit lui ajouter, pour compléter le sous-genre dont il est question, la Roussie, *Clupea rufa*, avec les *Clupea chinensis*, Lacép. T. V, pl. 11, f. 2, *Cl. africana* de Bloch, et le Clupanodon, Jussieu; Lacép. T. V, pl. 11, f. 3. Les *Clupea Dorab* et *Dentex* des auteurs sont des Chirocentres. Les pêcheurs de la Manche distinguent sous les noms d'Eproët et de Blanquets deux Poissons qui, mieux examinés, pourront, avec la Nadelle de Méditerranée, grossir le nombre des Clupes proprement dits.

II. MÉGALOPES, *Megalops*. Ils ont le dernier rayon de la dorsale prolongé en un long filament. Lacépède institua le premier un genre sous ce nom; mais il ne pouvait être conservé que comme une simple division.

MÉGALOPES-FILAMENT, *Megalops filamentosus*, Lacép., Pois. T. V, p. 290, qui en a fait un double emploi sous le nom de Clupea Apulike; *ibid.*, p. 66, pl. 18, f. 3; l'Apulike; Encycl. Méth., p. 187, pl. 78, f. 514; d'après Brachmann, *Clupea cyprinoides*, L., Gmel., Syn. Nat. T. XIII, 1, pars 2; 2049; Bloch, pl. 405. C'est probablement le *Camari-Pugneau* de Margraff et de Pison. Ce Poisson acquiert une fort grande taille, et jusqu'à douze pieds de longueur. Il a été observé dans la mer du Sud, dans celle de l'Inde, sur les côtes de Madagascar et du Brésil, dans les fleuves de ce pays et même dans un lac de l'île de Formosa. Ces divers habitats et quelques différences dans les proportions, selon les descriptions qu'on en a données, pourraient indiquer que plusieurs espèces ont été ici confondues. D. 22, A. 17, B. 15, V. 10, A. 25, C. 5-5/30.

Le CAILLON-TASSART, Encycl. Pois., p. 186, pl. 76, fig. 315; Clupanodon, Lacép., Pois. T. V, p. 472; *Clupea Thriass*, L., Gmel., loc. cit., p. 1406; Bloch, pl. 404. Ce Clupe se trouve dans les mers de la Chine, du Japon, de la Caroline et des Antilles. Il acquiert un peu plus d'un pied de longueur, a la chair exquise, mais sujette à devenir vénéneuse. Cette espèce est du nombre de celles qu'on appelait Poissons Baunanes à Saint-Domingue. B. 5-7, D. 14-20, P. 16, V. 7-9, C. 21-25.

Le NASIQUE, *Clupea nasus*, Bloch, p. 429, Clupanodon, Lacép., Pois. T. V, p. 470, a les deux mâchoires également avancées, mais avec un museau plus saillant. Sa chair, qui paraît pour être malsaine, est toute remplie de petites arêtes. On pêche ce Poisson vers l'embouchure des rivières de la côte de Malabar. B. 4, P. 13, C. 20.

III. ANCHOIS, *Engraulis*. Ils diffèrent des autres Clupes parce que leur ethmoïde et leurs naseaux forment une pointe saillante au-dessous de laquelle leurs petits intermaxillaires sont fixes, tandis que leurs maxillaires sont droits et très-longs, leur gueule très-fendue, leurs deux mâchoires bien garnies de dents, et leurs oses plus ouvertes encore.

L'ANCHOIS proprement dit, *Clupea Encrasicolus*, L., Gmel., loc. cit., p. 1805; Bloch, t. 50, f. 2; Encycl. Pois., pl. 76, f. 513. Ce Poisson est beaucoup plus connu, dit judicieusement Bonnatier, par l'usage que l'on en fait pour l'assaisonnement de la table, que par la forme du corps qu'on est rarement à portée d'observer, parce qu'elle se trouve dénaturée par la préparation qu'on lui fait subir. L'Anchois est long, étroit, dépourvu d'écaillés, remarquable par sa transparence qui n'est interrompue que vers l'épine du dos. Sa tête, dont le sommet est plat, se termine par une sorte de museau. Ses mâchoires sont luisantes et légèrement teintées de rouge; le dos est bleuâtre et le reste du corps argenté; sa taille s'étend de

aux à cinq pecces. Le nom d'*Enricholus* donné par les anciens à l'Anchois, et qui lui a été conservé comme spécifique, signifie qui a le fiel dans le crâne, et vient du préjugé où on était à cet égard. Ce petit habitant des côtes de l'Océan et surtout de la Méditerranée, est encore une richesse pour les parages qu'il fréquente. On en pêche d'immenses quantités qui, préparées et mises dans de la saumure, sont répandues par le commerce au centre des continents. Il est peu de poissons que l'Anglois ne soit honorablement servi; Nous en avons vu prendre plusieurs millions dans un seul coup de filet entre Malaga et Vélez-Málaga, lieux renommés en Espagne pour ce genre de saison. D. 14, F. 26, V. 7, A. 18, C. 18.

Le *Mélur* ou *Mélurus*, Duhamel, part. 2, pl. 3, f. 1; *Ecos Hespetus*, L. Gmel., loc. cit., p. 1392; *Atherina Brownii*, Gmel., loc. cit., p. 1397 (par double emploi); Clupée-Raie d'argent, Lacépède, T. v, p. 416; Stoléphore commersonien, Lacép. T. v, p. 382, pl. 12, f. 1 (encore par double emploi); le Poisson d'argent, Encyc. Pois., pl. 73, f. 303, à laquelle cet ouvrage rapporte mal à propos la description et le nom d'*Atherina Menidia*, L. On voit que ce petit Poisson, qui se trouve dans la Méditerranée, l'Inde, les îles d'Afrique et le Brésil où *Margraff* le mentionne sous le nom de *Pittingua*, a été désigné par ces mêmes auteurs sous des noms divers. C'est *Ouvier* qui a sagement rétabli sa synonymie. D. 14, F. 12, V. 6, A. 15, C. 14.

Les *Clupea Atherinoides* de Bloch, pl. 408, f. 1, et *Malabarica* du même auteur, appartiennent encore à ce sous-genre, en y formant une section dont les caractères consistent dans la position de la dorsale qui est placée plus en arrière de la ventrale, ou même vis-à-vis le commencement de la nageoire qui est longue.

*Cuvier* (Rég. Anim. T. 11, p. 176) pense que le Poisson Bariné des Antilles, qu'il regarde comme le même

Poisson que le *Clupea macrocephala* de Lacépède (Pois. T. v, pl. 14, f. 1), pourait bien appartenir au sous-genre dont il est ici question. Ce savant a, comme on l'a vu à l'article *Anguine*; rapporté ces synonymes à l'espèce que nous avons décrite sous le nom de *Glassadote* ou *Bonuk*. Il paraît, d'après l'assertion de ce grand naturaliste, que le Synode Renard de Lacépède (Pois. T. v, pl. 8, f. 2) est le même Animal, ainsi que le *Butirini* du même auteur. De telles incertitudes prouvent assez combien il est dangereux d'établir, dans les ouvrages classiques, des espèces et surtout des genres sur des figures qu'accompagnent des descriptions imparfaites.

IV. Les *THRISSES*, *Thrysa*, ont pour caractères des os maxillaires bien développés, se prolongeant en pointes libres au-delà de la mâchoire inférieure. L'espèce qui sert de type à ce sous-genre compose le genre *Myxale*, *Myxalus*, de Lacépède.

Le *MYXTE*, Lacép. (Pois. T. v, pl. 407, Encyc. Pois. pl. 100, f. 401; *Clupea*, L. Gmel., loc. cit., p. 1392; *Myxus*, L. Gmel., *Syst. Nat.* XIII, pars 2, pl. 1408. Ce Poisson est d'une forme très-singulière, fort aplati; on dirait une lame de corne. Ses mâchoires surtout sont fort remarquables, ainsi que la longueur de l'antenne et la rondeur de la caudale; son corps dans la plupart des autres *Clupes*. Mais nous paraît que le genre *Myxale* paraît être conservé, et que son nom même, ayant été consacré par l'antériorité, eût été préférable à celui de *Thryse* appliqué déjà comme spécifique à un *Megalops*. Quoi qu'il en soit, le *Myxte* est un Poisson des côtes de l'Inde qui n'atteint guère qu'un demi-pied de longueur. D. 14, F. 22, V. 2, 27-18, V. 6-7, A. 84-86, C. 21-22.

Le *Boalam* des Arabes, *Boalam* de Forskell, *Balam* ou *Bélam*; *Enay*, Pois. pl. 76, f. 336, est le *Clupea* ou *Myxale* de *Broussonet*, avec le *Clupea* de *Schneider*, sont encore des *Thryses*.

† Sans ventrales.

V. ODONTOGNATHES, *Gnathobolus*,

mer. Les Russes, qui n'en apprécient pas la saveur, croient ce Poisson malsain et le rejettent de leurs filets. D. 18-19, P. 15, V. 8-9, A. 18-21, C. 18-26.

**La FEINTE**, *Clupea fallax*, Lacép., T. V, p. 352. Cette espèce, qui a été souvent confondue avec l'Allose, est commune à l'embouchure de la Seine. On doit lui ajouter, pour compléter le sous-genre dont il est question, la Bousse, *Clupea rufa*, avec les *Clupea chinensis*, Lacép. T. V, pl. 11, f. 2, *Cl. africana* de Bloch, et le Clupanodon, Jussieu, Lacép. T. V, pl. 11, f. 3. Les *Clupea Dorab* et *Dentex* des auteurs sont des Chirocentres. Les pêcheurs de la Manche distinguent sous les noms d'Eproët et de Blanquets deux Poissons qui, mieux examinés, pourront, avec la Nadelle de Méditerranée, grossir le nombre des Clupes proprement dits.

**II. MÉGALOPES**, *Megalops*. Ils ont le dernier rayon de la dorsale prolongé en un long filament. Lacépède institua le premier un genre sous ce nom; mais il ne pouvait être conservé que comme une simple division.

**MÉGALOPES FILAMENTOSUS**, *Megalops filamentosus*, Lacép., Pois. T. V, p. 290, qui en a fait un double emploi sous le nom de Clupea Apalike, *ibid.*, p. 664, pl. 28, f. 3; l'Apalike; Encycl. Méth., p. 237, pl. 75, f. 314; d'après *Megascopus*; *Clupea cyprinoides*, L., Gmel., Syn. Nat. T. XIII, 1, pars 2, 2299; Bloch, pl. 405. C'est probablement le *Gamari-Pugnacu* de Marcgravi et de Pison. Ce Poisson acquiert une fort grande taille, et jusqu'à douze pieds de longueur. Il a été observé dans la mer du Sud, dans celle de l'Inde, sur les côtes de Madagascar et du Brésil, dans les fleuves de ce pays et même dans un lac de l'île de Tanna. Ces divers habitats et quelques différences dans les proportions, selon les descriptions qu'on en a données, pourraient indiquer que plusieurs espèces ont été ici confondues. D. 22, D. 17, A. 15, V. 10, A. 25, C. 5-5/30.

**Le CAILLEU - TASSART**, Encycl. Pois., p. 186, pl. 76, fig. 313; Clupanodon, Lacép., Pois. T. V, p. 421; *Clupea Thraso*, L., Gmel., loc. cit., p. 1406; Bloch, pl. 404. Ce Clupe se trouve dans les mers de la Chine, du Japon, de la Caroline et des Antilles. Il acquiert un peu plus d'un pied de longueur, a la chair exquise, mais sujette à devenir vénéneuse. Cette espèce est du nombre de celles qu'on appelle Poissons Baianes à Saint-Domingue. D. 5-7, D. 14-20, P. 16, V. 7-9, C. 21-25.

**Le NASIQUE**, *Clupea nasus*, Bloch, p. 429, Clupanodon, Lacép., Pois. T. V, p. 470, a les deux mâchoires également avancées, mais avec un museau plus saillant. Sa chair, qui pèche pour être malsaine, est toute remplie de petites arêtes. On pêche ce Poisson vers l'embouchure des rivières de la côte de Malabar. D. 4, P. 13, C. 20.

**III. ANCHOIS**, *Engraulis*. Ils diffèrent des autres Clupes parce que leur ethmoïde et leurs naseaux forment une pointe saillante au-dessous de laquelle leurs petits intermaxillaires sont fixes, tandis que leurs maxillaires sont droits et très-longs, leur gueule très-fendue, leurs deux mâchoires bien garnies de dents, et leurs oses plus ouvertes encore.

**L'ANCHOIS** proprement dit, *Clupea Encrasicolus*, L., Gmel., loc. cit., p. 1805; Bloch, t. 50, f. 2; Encycl. Pois., pl. 75, f. 313. Ce Poisson est beaucoup plus connu, dit judicieusement Bonnaterre, par l'usage que l'on en fait pour l'assaisonnement de la table, que par la forme du corps qu'on est rarement à portée d'observer, parce qu'elle se trouve dénaturée par la préparation qu'on lui fait subir. L'Anchois est long, étroit, dépourvu d'écaillés, remarquable par sa transparence qui n'est interrompue que vers l'épine du dos. Sa tête, dont le sommet est plat, se termine par une sorte de museau. Ses mâchoires sont luisantes et légèrement teintées de rouge; le dos est bleuâtre et le reste du corps argenté; sa taille s'étend de

deux à cinq poncees. Le nom d'*Engraulis* donné par les anciens à l'Anchois, lequel lui a été conservé comme spécifique, signifie qui a le fiel dans le crâne, et vient du préjugé où l'on étoit à cet égard. Ce petit habitant des côtes de l'Océan et surtout de la Méditerranée, est encore une richesse pour les passages qu'il fréquente. On en pêche d'immenses quantités qui, préparées et mises dans de la saumure, sont répandues par le commerce au centre des continents. Il est peu de pays où l'Anchois ne soit honorablement servi. Nous en avons vu prendre plusieurs millions dans un seul coup de filet en Malaga et Valence-Malaga lieux renommés en Espagne pour ce genre de salaison. D. 12, D. 24, E. 25, V. 7, A. 18, C. 18.

Le *Mélus* ou *Mélusier*, Duhamel, part. 2, pl. 3, f. 2; *Esox Hesperus*, L., Gmel., loc. cit., p. 1392; *Atherina Brownii*, Gmel., loc. cit., p. 1397 (par double emploi); Clupea-Raie d'argent, Lacépède, T. 7, p. 416; Stoléphore commersonien, Lacép. T. 7, p. 582, pl. 12, f. 1 (encore par double emploi); le Poisson d'argent, Encyc. Pois., pl. 73, f. 303, à laquelle cet ouvrage rapporte mal à propos la description et le nom d'*Atherina Menidia*, L. On voit que ce petit Poisson, qui se trouve dans la Méditerranée, l'Inde, les îles d'Afrique et le Brésil où Martens le mentionne sous le nom de Pitingua, a été désigné par ces mêmes auteurs sous des noms divers. C'est Olivier qui a savamment rétabli sa synonymie. D. 14, F. 12, V. 6, A. 15, C. 14.

Les *Clupes Atherinoides* de Bloch, pl. 408, f. 1; et *Malabarica* du même auteur, appartiennent encore à ce sous-genre, en y formant une section dont les caractères consistent dans la position de la dorsale qui est placée plus en arrière de la ventrale; or même vis-à-vis le commencement de l'adnale qui est longue.

Cuvier (Regn. Anim. T. 11, p. 176) pense que le Poisson Banane des Antilles, qu'il regarde comme le même

Poisson que le Clupe macrocephale de Lacépède (Pois. T. 7, pl. 14, f. 1), pourait bien appartenir au sous-genre dont il est ici question. Ce savant a, comme on l'a vu à l'article Anchois, rapporté ces synonymes à l'espèce que nous avons décrite sous le nom de *Glossodonte* ou *Bonuk*. Il paraît, d'après l'assertion de ce grand naturaliste, que le Synode Renard de Lacépède (Pois. T. 7, pl. 8, f. 2) est le même Animal, ainsi que le Butirini du même auteur. De telles incertitudes prouvent assez combien il est dangereux d'établir, dans les ouvrages classiques, des espèces et surtout des genres sur des figures qu'accompagnent des descriptions imparfaites.

IV. Les *Thrisses*, *Thrissa*, ont pour caractères des os maxillaires bien dentés se prolongeant en pointes libres au-delà de la mâchoire inférieure. L'espèce qui sert de type à ce sous-genre compose le genre *Myxus*, de Lacépède.

Le *MYSTE*, Lacép. Pois. T. 7, pl. 467, Encyc. Pois. pl. 100, f. 409; *Clupea Mystus*, L., Gmel., Syn. Nat. xiii, 17, 1 pars 2, pl. 1408. Ce Poisson est d'une forme très-singulière, fort aplatie; on dirait une lame de carton. Ses mâchoires surtout sont fort remarquables, ainsi que la longueur de l'anneau et la rondeur de la caudale, formée dans la plupart des autres Clupes. Nous paraît que le genre *Mystus* pouvait être conservé, et que son nom même, ayant été consacré par l'autorité, eût été préférable à celui de *Thrissa* appliqué déjà comme spécifique à un *Mégalope*. Quant à l'espèce, soit, le *Myste* est un Poisson de l'Inde qui n'atteint guère qu'à un demi-pied de longueur. D. 10, V. 10, E. 27-18, V. 6-7, A. 84-86, C. 21-12.

Le *Bolam* des Arabes, *Bolam* de Forskall, *Balam* ou *Balam*, Encyc. Pois. pl. 76, f. 536, est le *Clupea myxus* de Bronnsonet, avec le *Clupea myxus* de Schneider, sont encore des *Thrisses*.

† Sans ventrales.

V. ODONTOGNATHES, *Gnathobolus*,

mer. Les Russes, qui n'en apprécient pas la saveur, croient ce Poisson malsain et la rejettent de leurs filets. D. 18-19, P. 15, V. 8-9, A. 18-21, C. 18-26.

La Faimre, *Clupea fallax*, Lacép., T. V, p. 352. Cette espèce, qui a été souvent confondue avec l'Alose, est commune à l'embouchure de la Seine. On doit lui ajouter, pour compléter le sous-genre dont il est question, la Rousse, *Clupea rufa*, avec les *Clupea chinensis*, Lacép. T. V, pl. 11, f. 2, *Cl. africana* de Bloch, et le Clupanodon, Jussieu, Lacép. T. V, pl. 11, f. 3. Les *Clupea Daxab* et *Dentex* des auteurs sont des Chirocentres. Les pêcheurs de la Manche distinguent sous les noms d'Eprot et de Blanquets deux Poissons qui, mieux examinés, pourront, avec la Nadelle de Méditerranée, grossir le nombre des Clupes proprement dits.

II. MÉGALOPES, *Megalops*. Ils ont le dernier rayon de la dorsale prolongé en un long filament. Lacépède institua le premier un genre sous ce nom; mais il ne pouvait être conservé que comme une simple division.

MÉGALOPES FILAMENT, *Megalops filamentosus*, Lacép., Pois. T. V, p. 290, qui en a fait un double emploi sous le nom de *Clupea apulica*; *ibid.*, p. 464, pl. 25, f. 3; l'Apulique; Encycl. Méth., p. 287, pl. 78, f. 514; d'après Brancourt; *Clupea cyprinoides*, L., Gmel., Syn. Nat. T. XIII, 1, pars 2, 2044; Bloch, pl. 405. C'est probablement le *Canari-Pugneau* de Marcgravi et de Pison. Ce Poisson acquiert une fort grande taille, et jusqu'à douze pieds de longueur. Il a été observé dans la mer du Sud, dans celle de l'Inde, sur les côtes de Madagascar et du Brésil, dans les fleuves de ce pays et même dans un lac de l'île de Tanna. Ces divers habitats et quelques différences dans les proportions; selon les descriptions qu'on en a données, pourraient indiquer que plusieurs espèces ont été ici confondues. D. 22, A. 17, R. 15, V. 10, A. 25, C. 5-5/30.

Le CAILLON - TASSART, Encycl. Pois., p. 186, pl. 76, fig. 315; Clupanodon, Lacép., Pois. T. V, p. 472; *Clupea Thriass*, L., Gmel., loc. cit., p. 1806; Bloch, pl. 404. Ce Clupe se trouve dans les mers de la Chine, du Japon, de la Caroline et des Antilles. Il acquiert un peu plus d'un pied de longueur, a la chair exquise, mais sujette à devenir vénéneuse. Cette espèce est du nombre de celles qu'on appelait Poissons Bananes à Saint-Domingue. D. 5-7, D. 14-20, P. 16, V. 7-9, C. 21-25.

Le NASIQUE, *Clupea nasus*, Bloch, p. 429, Clupanodon, Lacép., Pois. T. V, p. 470, a les deux mâchoires également avancées, mais avec un museau plus saillant. Sa chair, qui peut être malsaine, est toute remplie de petites arêtes. On pêche ce Poisson vers l'embouchure des rivières de la côte de Malabar. D. 4, P. 13, C. 20.

III. ANCHOIS, *Engraulis*. Ils diffèrent des autres Clupes parce que leur ethmoïde et leurs naseaux forment une pointe saillante au-dessous de laquelle leurs petits intermaxillaires sont fixes, tandis que leurs maxillaires sont droits et très-longs, leur gueule très-fendue, leurs deux mâchoires bien garnies de dents, et leurs oses plus ouvertes encore.

L'Anchois proprement dit, *Clupea Encrasicholus*, L., Gmel., loc. cit., p. 1805; Bloch, t. 50, f. 2; Encycl. Pois., pl. 75, f. 515. Ce Poisson est beaucoup plus connu, dit judicieusement Bonnaterrre, par l'usage que l'on en fait pour l'assaisonnement de la table, que par la forme du corps qu'on est rarement à portée d'observer, parce qu'elle se trouve dénaturée par la préparation qu'on lui fait subir. L'Anchois est long, étroit, dépourvu d'écaillés, remarquable par sa transparence qui n'est interrompue que vers l'épine du dos. Sa tête, dont le sommet est plat, se termine par une sorte de museau. Ses mâchoires sont laisantes et légèrement teintées de rouge; le dos est bleuâtre et le reste du corps argenté; sa taille s'étend de



à cinq ponce. Le nom d'*Enchylolus* donné par les anciens à l'Annis, et qui lui a été conservé comme cithique, signifie qui a le fiel dans le crâne, et vient du préjugé où l'on était à cet égard. Ce petit ha-ut des côtes de l'Océan et surtout la Méditerranée, est encore une rissée pour les parages qu'il fréquente. On en pêche d'innombrables quantités, qui, préparées et salées dans de la saumure, sont répandues par le commerce au centre des continents. Il est d'un repos où l'Albanais ne soit honorablement surpris. Nous en avons vu vendre plusieurs millions dans un seul coup de filet entre Malaga et Valence-Malaga, lieux renommés en Espagne pour ce genre de saison. D. 14, F. 26, V. 7, A. 18, C. 18.

Le *Mélus* ou *Mélusine*, Duhamel, art. 2, pl. 3, f. 1; *Esox Hespetus*, L. Gmel., loc. cit., p. 1392; *Atherina Brownii*, Gmel., loc. cit., p. 1397 (par double emploi); Clupée-Rais d'argent, Lacépède, T. v, p. 416; Stéthophore commersonien, Lacép. T. v, p. 582, pl. 12, f. 1 (encore par double emploi); Le Poisson d'argent, Encyc. Poiss., pl. 73, f. 303, à laquelle cet ouvrage rapporte mal à propos la description et le nom d'*Atherina Menidia*, L. On voit que ce petit Poisson, qui se trouve dans la Méditerranée, l'Inde, les îles d'Afrique et le Brésil où Marcgraff le mentionne sous le nom de Pitlingua, a été désigné par ces mêmes auteurs sous des noms divers. C'est Ouvrier qui a sagement rétabli sa synonymie. D. 14, F. 12, V. 6, A. 15, C. 14.

Les *Clupes Atherinoides* de Bloch, pl. 408, f. 1; et *Malabarica* du même auteur, appartiennent encore à ce sous-genre, en y formant une section dont les caractères consistent dans la position de la dorsale qui est placée plus en arrière de la ventrale, or même vis-à-vis le commencement de l'anale qui est longue.

Cuvier (Rég. Anim. T. 21, p. 179) pense que le Poisson Barane des Antilles, qu'il regarde comme le même

Poisson que le Clupe macrocéphale de Lacépède (Pois. T. v, pl. 14, f. 1), pour-rait bien appartenir au sous-genre dont il est ici question. Ce savant a, comme on l'a vu à l'article ARGENTINE; rapporté ces synonymes à l'espèce que nous avons décrite sous le nom de *Glossodonte* ou *Bonik*. Il paraît, d'après l'assertion de ce grand naturaliste, que le Synode Renard de Lacépède (Pois. T. v, pl. 8, f. 2) est le même Animal, ainsi que le Butirini du même auteur. De telles incertitudes prouvent assez combien il est dangereux d'établir, dans les ouvrages classiques, des espèces et surtout des genres sur des figures qu'accompagnent des descriptions imparfaites.

IV. Les *THRISSES*, *Thryssa*, ont pour caractères des os maxillaires bien dentés, se prolongeant en pointes libres au-delà de la mâchoire inférieure; l'espèce qui sert de type à ce sous-genre compose le genre *Myxus*, de Lacépède.

Le *MYSTE*, Lacép. Poiss. T. v, pl. 407, Encyc. Poiss. pl. 100, f. 100, Clupée *Myxus*, L. Gmel., Syn. Nat. art. 17, pars 2, pl. 1408. Ce Poisson est d'une forme très-singulière, fort aplati; on dirait une lame de corne. Ses mâchoires surtout sont fort remarquables, ainsi que la longueur de l'anale et la rondeur de la caudale, formées dans la plupart des autres Clupes. Mais nous paraît que le genre *Myxus* pouvait être conservé, et que son nom même, ayant été consacré par l'antériorité, eût été préférable à celui de *Thryssa* appliqué déjà comme spécifique à un *Mégalops*. Quoiqu'il en soit, le *Myste* est un Poisson de l'Inde qui n'atteint guère qu'un demi-pied de longueur. D. 10, F. 25, V. 39-40, V. 6-7, A. 24-26, C. 21-22.

Le Boalam des Arabes, *Boalam* de Forskall, *Balam* ou *Béline*, Eusey, Poiss. pl. 76, f. 316, et le *Clupea yonis* de Broussonet, avec le *Clupea myxus* de Schneider, sont encore des *Thrysses*.

† Sans ventrales.

V. ODONTOGNATHES, *Gnathobolus*,

mer. Les Russes, qui n'en apprécient pas la saveur, croient ce Poisson malsain et la rejettent de leurs filets. D. 18-19, P. 15, V. 8-9, A. 18-21, C. 18-26.

**La Fainez**, *Clupea fallax*, Lacép., T. V, p. 352. Cette espèce, qui a été souvent confondue avec l'Alose, est commune à l'embouchure de la Seine. On doit lui ajouter, pour compléter le sous-genre dont il est question, la Rousse, *Clupea rufa*, avec les *Clupea chinensis*, Lacép. T. V, pl. 11, f. 2, *Cl. africana* de Bloch, et le Clupanodon, Jussieu; Lacép. T. V, pl. 11, f. 3. Les *Clupea Dorab* et *Dentex* des auteurs sont des Chirocentres. Les pêcheurs de la Manche distinguent sous les noms d'Eproët et de Blanquets deux Poissons qui, mieux examinés, pourrout, avec la Nadelle de Méditerranée, grossir le nombre des Clupes proprement dits.

**II. MÉGALOPES**, *Megalops*. Ils ont le dernier rayon de la dorsale prolongé en un long filament. Lacépède institua le premier un genre sous ce nom; mais il ne pouvait être conservé que comme une simple division.

**MÉGALOPES FILAMENTÉES**, *Megalops filamentosa*, Lacép., Pois. T. V, p. 290, qui en a fait un double emploi sous le nom de Clupea Apulike, *ibid.*, p. 664, pl. 187, f. 3; l'Apulike; Encycl. Méth., p. 187, pl. 78, f. 314; d'après M. de Lamarck; *Clupea cyprinoides*, L., Gmel., Syn. Nat. T. XII, p. 1, pars 2, 2249; Bloch, pl. 405. C'est probablement le *Canari-Pugnatu* de Margraff et de Pison. Ce Poisson acquiert une fort grande taille, et jusqu'à deux pieds de longueur. Il a été observé dans le mer du Sud, dans celle de l'Inde, sur les côtes de Madagascar et du Brésil, dans les fleuves de ce pays et même dans un lac de l'Inde. Ces divers habitats et quelques différences dans les proportions; selon les descriptions qu'en on a données, pourraient indiquer que plusieurs espèces ont été ici confondues. D. 22, A. 17, R. 15, V. 10, A. 25, C. 5-5/30.

**Le CAILLEU** - **TAGART**, Encycl. Pois., p. 186, pl. 76, fig. 315; Clupanodon, Lacép., Pois. T. V, p. 471; *Clupea Thraso*, L., Gmel., loc. cit., p. 1406; Bloch, pl. 404. Ce Clupe se trouve dans les mers de la Chine, du Japon, de la Caroline et des Antilles. Il acquiert un peu plus d'un pied de longueur, a la chair exquise, mais sujette à devenir vénéneuse. Cette espèce est du nombre de celles qu'on appelle Poissons Bananes à Saint-Domingue. B. 5-7, D. 14-20, P. 16, V. 7-9, C. 21-25.

**Le NASIQUE**, *Clupea nasus*, Bloch, p. 429, Clupanodon, Lacép., Pois. T. V, p. 470, a les deux mâchoires également avancées, mais avec un museau plus saillant. Sa chair, qui passe pour être malsaine, est toute remplie de petites arêtes. On pêche ce Poisson vers l'embouchure des rivières de la côte de Malabar. B. 4, P. 13, C. 20.

**III. ANCHOIS**, *Engraulis*. Ils diffèrent des autres Clupes parce que leur ethmoïde et leurs naseaux forment une pointe saillante au-dessous de laquelle leurs petits intermaxillaires sont fixes, tandis que leurs maxillaires sont droits et très-longs, leur gueule très-fendue, leurs deux mâchoires bien garnies de dents, et leurs oses plus ouvertes encore.

**L'ANCHOIS** proprement dit, *Clupea Encrasicholus*, L., Gmel., loc. cit., p. 1805; Bloch, t. 50, f. 2; Encycl. Pois., pl. 75, f. 313. Ce Poisson est beaucoup plus connu, dit judicieusement Bonnaterre, par l'usage que l'on en fait pour l'assaisonnement de la table, que par la forme du corps qu'on est rarement à portée d'observer, parce qu'elle se trouve dénaturée par la préparation qu'on lui fait subir. L'Anchois est long, étroit, dépourvu d'écaillés, remarquable par sa transparence qui n'est interrompue que vers l'épine du dos. Sa tête, dont le sommet est plat, se termine par une sorte de museau. Ses mâchoires sont blanches et légèrement teintées de rouge; le dos est bleuâtre et le reste du corps argenté; sa taille s'étend de

aux à cinq ponce. Le nom d'*Enerchilus* donné par les anciens à l'Anchois, et qui lui a été conservé comme euhique, signifie qui a le fiel dans le crâne, et vient du préjugé où on était à cet égard. Ce petit habitant des côtes de l'Océan et surtout la Méditerranée, est encore une ressource pour les parages qu'il fréquente. On en pêche d'innombrables quantités qui, préparées et salées dans de la saumure, sont répandues par le commerce au centre des continents. Il est si commun en Espagne qu'on ne soit habituellement accablé. Nous en avons vu vendre plusieurs millions dans un seul coup de filet entre Malaga et Vélez-Málaga, lieux renommés en Espagne pour ce genre de saison. D. 14, P. 15, V. 7, A. 18, C. 18.

Le Mélé ou Mélére, Duhamel, art. 2, pl. 3, f. 2; *Esox. Hesperus*, Gmel., loc. cit., p. 1392; *Atherina ornii*, Gmel., loc. cit., p. 1397 (par double emploi); Clupée-Raie argent, Lacépède, T. V, p. 416; Strophore commersonien, Lacép. T. V, 582, pl. 12, f. 1 (encore par double emploi); Le Poisson d'argent, Encyc. M., pl. 73, f. 303, à laquelle cet ouvrage rapporte mal à propos la description et le nom d'*Atherina Menidia*, L. On voit que ce petit Poisson, qui se trouve dans la Méditerranée, dans les îles d'Afrique et le Brésil (Maregraff le mentionne sous le nom de Pitlingua, a été désigné par ces mêmes auteurs sous des noms divers. est Cuvier qui a soigneusement rétabli synonymie. D. 14, P. 12, V. 6, A. C. 14.

Les *Clupea Atherinoides* de Bloch, 408, f. 1; et *Malabarica* du même auteur, appartiennent encore à ce sous-genre, en y formant une section dont les caractères consistent dans la position de la dorsale qui est placée en arrière de la ventrale, ou même vis-à-vis le commencement de l'aile qui est longue.

Cuvier (Rég. Anim. T. 11, p. 175) use que le Poisson Banane des Antilles, qu'il regarde comme le même

Poisson que le Clupe macrocéphale de Lacépède (Pois. T. V, pl. 14, f. 1), pourrait bien appartenir au sous-genre dont il est ici question. Ce savant a, comme on l'a vu à l'article ARGENTINE, rapporté ces synonymes à l'espèce que nous avons décrite sous le nom de *Glossodonta* ou *Bonuk*. Il paraît, d'après l'assertion de ce grand naturaliste, que le Synode Renard de Lacépède (Pois. T. V, pl. 8, f. 2) est le même Animal, ainsi que le Butirum du même auteur. De telles incertitudes prouvent assez combien il est dangereux d'établir, dans les ouvrages classiques, des espèces et surtout des genres sur des figures qu'accompagnent des descriptions imparfaites.

IV. Les THRISSÉS, *Thrissa*, ont pour caractères des os maxillaires bien dentés, se prolongeant en pointes libres au-delà de la mâchoire inférieure. L'espèce qui sert de type à ce sous-genre compose le genre *Myste*, *Mystus*, de Lacépède.

Le MYSTE, Lacép. Pois. T. V, pl. 147, Encyc. Pois. pl. 100, f. 409; *Clupea Mystus*, L., Gmel., Syn. Nat. XIV, 117, 1 pars 2, pl. 1408. Ce Poisson est d'une forme très-singulière; son corps est droit une lame de corne. Ses mâchoires surtout sont fort remarquables, ainsi que la longueur de l'aile et la rondeur de la caudale, formant dans la plupart des autres Clupes. Mais nous paraît que le genre *Myste* ne devait être conservé, et que son nom même, ayant été consacré par l'antériorité, eût été préférable à celui de Thrisse appliqué déjà comme épithète spécifique à un *Megalops*. Quoi qu'il en soit, le *Myste* est un Poisson de l'Inde qui n'atteint guère qu'un demi-pied de longueur. D. 10, P. 15, V. 6, A. C. 14.

Le Bolam des Arabes, *Bolam* de Forsk., *Belam* ou *Bélame*, (Encyc. Pois. pl. 76, f. 316, et le *Clupea yonnis* de Bonnemat, avec le *Clupea mystus* de Brander, sont encore des Thrisées.

† Sans ventrales.

V. ODONTOGNATHES, *Gnathobolus*,

Schn. On ne connaît qu'une espèce de ce sous-genre qu'a figuré Lacép. (Pois. T. II, p. 221, pl. 7, f. 2) sous le nom spécifique d'Aiguillonés, et qu'il a appelé Mucroné dans son texte. Comme elle n'a pas de ventrales et que la forme de ses mâchoires est fort étrange, on serait tenté non-seulement de conserver le genre de Lacépède, mais encore de l'éloigner de celui où l'historien du Règn. Anim. (T. II, p. 176) l'a placée. Venu de Cayenne dans de l'esprit de vin affaibli, l'individu qui a servi pour la description de Lacépède pourrait avoir été altéré, car sa tête a point un aspect naturel. P. 12, d. 6-7, A. 80, C. 19.

#### VI. PRISTIGASTER, *Pristigaster*.

Une seule espèce constituée encore ce sous-genre établi par Cuvier (Règn. Anim. T. II, p. 176), et figuré par le même auteur (*ibid.* T. IV, pl. 16, f. 2, de moitié nature); elle manque de ventrales, a son corps très-comprimé et élevé, à ventre saillant, fortement dentelé. La caudale est fourchue, et la moitié supérieure est plus grande que l'autre. Elle habite les mers d'Amérique. Il paraît que le nombre des rayons n'a pas été compté.

VII. NOTOPTÈRES, *Notopterus*. Ce sous-genre avait été établi comme genre aux dépens des Gymnotes par Lacépède qui le compose de deux espèces, tandis que Cuvier affirme qu'il n'en existe qu'une. Le premier de ces savans remarque que lorsque toutes les Gymnotes sont américaines, les Notoptères sont asiatiques. Les opercules et les joues des Poissons dont il est question sont écailleux; les mâchoires sont armées de dents fines; tandis que la langue est couverte de dents fortes et crochues. L'anne est fort longue, et s'unit à la caudale. Le dos supporte une petite nageoire molle. Les espèces mentionnées par Lacépède sont :

Le KAPBAT et non CAPBAT, comme l'écrivit Cuvier, Lacép., Pois. T. II, p. 190, Encyc. Pois., p. 57, pl. 25, f. 83; *Tigra maris* ou *Hipparis* de Bontius;

*Clupea gymira* de Schneider, *Gymnotus Notopterus*, L., Gmel. *Syst. Nat.* XIII, 1, p. 1139. Ce Poisson, d'un aspect si différent des autres Clupes, n'a guère plus de huit pouces de longueur, et habite les mers d'Amérique. B. 6, D. 7, P. 13, A. etc. 116.

L'ÉCAILLEUX, Lacép., Pois. T. II, p. 193, *Gymnotus asiaticus*, L., Gmel. *loc. cit.* p. 1140. Ce nom a été mal à propos rapporté comme synonyme du précédent par Bonnaterre, puis que Lacépède, créateur du genre, y conserve cette seconde espèce qui paraît différer de la précédente par les barbillons tronqués qui se voient au-devant des narines. La dorsale est en outre très-considérable; et s'étend presque de la tête à la queue. La tête est revêtue de grandes écailles arrondies, qui ont déterminé le nom spécifique imposé à ce Poisson. L'Écailleux devient plus grand que le Kapbat. (B.)

CLUPÉOIDE. POIS. Ce nom donné aux *Clupea Thrisa* et *Mystus* est encore celui d'un Saumon du sous-genre Ombre, et d'un Cyprin. V. ces mots. (B.)

CLUPES ou CLUPÉES. POIS. Famille fort naturelle de l'ordre des Malacoptérygiens abdominaux, formant le passage de celle des Salmones à celle des Esoces, composée des genres Clupe, Elope, Chirocentre, Erythrène, Amie, Vastres, Lépidostée et Bichir. V. tous ces mots. Ses caractères généraux consistent dans l'absence d'adipocire; dans la présence d'écailles qui le plus souvent garnissent abondamment le corps; dans la forme de la mâchoire supérieure qui est composée comme dans les Truites, au milieu par des intermédiaires sans pédicules, et sur les côtés par les maxillaires. Les Clupées sont des Poissons oblongs, généralement comprimés, essentiellement munis de dorsale, ayant le ventre argenté et le dos bleuâtre; la chair délicate et grasse, souvent remplie d'arêtes; la vie fort délicate, et habitant le plus souvent les eaux de la mer, où quelques-uns voyagent

en troupes innombrables, et fournissent à l'Homme qui les poursuit de grandes sources de richesses." (B.)

**CLUSIE.** *Clusia*. BOT. PHAN. Famille des Guttifères, Polyandrie Monogynie, L. Ce genre, établi par Plumier et Linné et adopté par Jussieu, a été récemment l'objet des recherches de notre ami et collègue Choisy qui, dans un travail sur l'arrangement méthodique des genres de la famille des Crucifères (V. Mémoires de la Société d'Hist. Nat. de Paris, T. 1, 2<sup>e</sup> partie), assigne au *Clusia* les caractères suivans : calice à quatre ou huit sépales imbriqués et colorés; corolle à quatre ou huit pétales; étamines nombreuses, rarement en nombre défini; style nul; stigmate rayonné et pelté; fleurs ordinairement polygames; dans les femelles, l'ovaire est entouré par un bractée entier ou lobé, qui représente la base monadelphée des filets des étamines, organe auquel on a donné le nom impropre et banal de Nectaire; fruit capsulaire, coriace, à cinq ou douze valves qui se séparent par le sommet; placenta triangulaires continus avec les valves rentrantes; semences tantôt fixées aux angles externes des placenta, tantôt placées dans les angles internes de ces placenta qui, réunis entre eux, forment une colonne angulaire centrale; cotylédons séparables du reste de la graine.

Ce genre, le plus considérable de la famille des Guttifères, en est en même temps un des plus singuliers. Outre l'organisation des fleurs que nous venons d'exposer, l'existence souvent parasite des Arbres qui le composent, leurs sucs jaunâtres et leurs tiges radicales en font des Végétaux très-remarquables. Willdenow a distingué génériquement sous le nom de *Xanthie* quelques espèces de *Clusies*. Cette distinction n'est pas plus admise par Choisy que celle du *Quapoya* d'Aublet; son opinion à cet égard s'appuie sur celle de feu Richard père qui a observé cette Plante sur les lieux, et a vu que, dans les *Clusia*, la forme des

nectaires et le nombre des étamines sont très-variables. Conformément à ce principe, notre auteur s'est vu forcé de faire rentrer dans le *Clusia* le *Havetia* de Kunth, quoique l'organisation bizarre de ce genre en sollicitât la séparation. V. d'ailleurs les mots HAVETIE et QUAPOYA. Par l'addition de ces deux genres et de quelques espèces nouvelles, le *Clusia* qui, dans le *Synopsis* de Persoon, ne comprenait que quatre Plantes, se trouve maintenant composé de seize espèces partagées en deux sections : la première qui a pour type les *Clusia alba*, *Cl. rosea* et autres espèces linéennes, en contient onze; la deuxième n'en a que trois seulement, savoir : les deux anciens *Quapoya* et le *Havetia laurifolia*, Kth.; ou *Clusia tetrandra*, Willd. Deux autres espèces sont trop peu connues pour que l'auteur ait pu les classer.

Il est à remarquer que toutes les *Clusies* sont indigènes de l'Amérique méridionale et des Antilles. Aucune n'est cultivée dans les jardins, et les échantillons que l'on en possède dans les herbiers sont en général très-incomplets, de sorte que leur histoire, ainsi que celle de la famille à laquelle elles appartiennent, laisse encore beaucoup à désirer.

Dans le Mémoire de Choisy, qui nous a fourni les principaux documens sur les *Clusies*, se trouve l'établissement d'un nouveau genre formé avec le *Clusia longifolia*, mentionné par Richard père dans les Actes de l'ancienne Société d'Histoire Naturelle de Paris, et rapporté de Cayenne par Leblond. Ce genre, que Choisy est parvenu à établir à l'aide des échantillons tirés des herbiers de Desfontaines, De Candolle, Kunth et Delessert, est décrit et figuré sous le nom de *Micranthera*. V. ce mot, (G., N.)

\* **CLUSIEES.** *Clusiaceae*. BOT. PHAN. Nom donné par Choisy (Mém. de la Soc. d'Hist. Nat. de Paris, 1<sup>er</sup> vol., 2<sup>e</sup> part.) à la première tribu qu'il a établie dans la famille des Guttifères, et à laquelle il s'exprime ainsi : fruit multi-

locaire à loges polyspermes; anthères introrses. Outre le *Clusia*, duquel elle tire son nom, cette tribu renferme trois autres genres : *Mahurea*, *Marila* et *Godoya*, qui, par leurs anthères allongées et adnées, vont très-bien dans les Guttifères, mais qui se rapprochent beaucoup des Hypericacées et surtout des genres *Eucryphia* et *Carpodontos* par d'autres points de leur organisation, de sorte que ces trois derniers genres forment un groupe intermédiaire dont l'existence établit de grands rapports entre les deux familles. (G.N.)

**CLUTELLE.** *Clutia*. BOT. PHAN.  
**V. CLUYTIA.**

**CLUYTIA.** BOT. PHAN. Ce nom désigne un genre de la famille des Euphorbiacées. On l'a substitué à celui de *Clusia* adopté antérieurement, mais qui présentait quelque inconvénient par sa grande ressemblance avec le mot *Clusia*, nom d'un genre de Guttifères. Les *Cluytia* présentent des fleurs droïques; leur calice est partagé en cinq divisions, avec lesquelles alternent autant de pétales ou appendices pétaloïdes, tandis que d'autres appendices beaucoup plus courts, découpés et glanduleux au sommet, leur sont opposés. Dans les fleurs mâles, cinq étamines ont leurs filets soudés inférieurement en une colonne qu'entourent à sa base cinq glandes simples ou bifides, et qui porte supérieurement un petit rudiment de pistil. Dans les femelles on observe trois styles réfléchis, bifides; un ovaire quelquefois pédicellé, à trois loges contenant chacune un ovule unique. Le fruit est une capsule à trois coques.

Les espèces de ce genre sont des Arbristes ou des Arbrisseaux à feuilles alternes, souvent étroites, courtes et rigides, munies de stipules; à fleurs axillaires, solitaires ou fasciculées, portées sur un court pédoncule, et accompagnées de bractées. Elles sont au nombre de quinze environ, originaires presque toutes du cap de Bonne-Espérance. Il paraît cependant

que ce genre se retrouve sur le continent de l'Amérique méridionale. L'espèce la plus communément cultivée dans les jardins de botanique est le *C. pulchella*.

Quant à plusieurs espèces qui habitent l'Asie, elles paraissent devoir être séparées de ce genre pour augmenter celui que Willdenow a nommé *Briedelia*. V. ce mot. (A. D. I.)

\* **CLUZELLE.** *Cluzella*. BOT. CRYPT. (*Chaodinéas*.) Nous avons dédié ce genre à Ducluseau qui, le premier, publia la belle Plante qui en deviendra le type. Cet observateur en fit une *Batrachosperme*, et De Candolle (Fl. Fr., II, p. 591) la nomma *Batrachospermum Myurus*. Ces auteurs se fondaient sans doute, pour un tel rapprochement, sur la consistance muqueuse du Végétal. C'est le *Tremella Myurus* de la Flore Danoise, t. 1604, le *Palmella Myosurus* de Lyngbye, Tenz., p. 203, pl. 68, 2. Les caractères du genre Cluzelle consistent dans l'allongement de sa substance muqueuse qui se ramifie à l'infini en expansions subulées, cylindriques, souvent assez épaisses vers leur base. Les corpuscules colorans en remplissent sans ordre la plus grande étendue, mais tendent à se coordonner sérialelement vers l'extrémité des ramules. Les touffes que forme ce singulier Végétal sont d'une couleur sordide, d'une odeur particulière, extrêmement flexibles, souvent considérables et de plusieurs pieds de longueur. Le *Cluzella Myosurus*, N., croît dans les ruisseaux des Vosges et des Cévennes; c'est particulièrement en hiver, ou du moins vers la fin de cette saison, qu'il se montre dans toute sa vigueur. L'*Ulva fatida* de Vaucher nous paraît devoir rentrer dans ce genre quand elle aura été mieux examinée. (N.)

\* **CLYMÈNE.** *Clymene*. ANNEL. Genre de l'ordre des Serpules, famille des Maldanies, établi par Savigny (Système des Annelides, p. 70, 92), et ayant, suivant lui, pour ca-

actères distinctifs : bouche inférieure : point de tentacules ; rames ventrales portant toutes des soies à crochets ; premier segment dépourvu de soies, mais terminé par une surface perçulaire. — Les Clymènes sont remarquables par leur bouche inférieure à deux lèvres transverses, saillantes et cannelées ; la lèvre supérieure est précédée d'une sorte de voile court, échanuré, marqué postérieurement, depuis l'échançure, d'un double sinus longitudinal ; la lèvre inférieure est plus ou moins avancée et reculée ; cette bouche communique à un intestin grêle sans boursoires sensibles, tout droit et dépourvu de cœcums. Le corps de ces Annélides est grêle, cylindrique, légèrement renflé dans sa partie moyenne, et même grossier aux deux bouts, composé de segments peu nombreux ; le premier segment est dilaté et tronqué obliquement d'avant en arrière pour servir d'opercule antérieur ; le dernier segment constitue un opercule postérieur, infundibuliforme, dentelé, marqué de rayons correspondants à ses dentelures, et saillans dans la cavité, au fond de laquelle est l'anus entouré d'un cercle de papilles charnues : les pieds ou appendices du premier segment sont nuls, ou du moins ne consistent qu'en une rampe supérieure et demi-circulaire de dentelures charnues qui rejoignent les bords latéraux du voile, et circonscrivent postérieurement la face perçulaire du segment qu'elles occupent ; les pieds du second segment sont de ceux qui suivent ; jusques et compris le pénultième, sont ambulatoires et de trois sortes : 1° les premiers, seconds et troisièmes pieds ont une rame dorsale pourvue d'un faisceau de soies subulées, et point de rames ventrales ; 2° les soies à crochets ; 3° les quatrième, cinquième et sixième pieds et tous les suivants, ceux des trois dernières paires de segments, présentent une rame dorsale portant de même un faisceau de soies subulées, et en outre une rame ventrale en forme de mamelon transverse, armée d'un rang de soies à cro-

chets ; 5° les pieds des trois dernières paires n'offrent aucune rame dorsale, mais ils sont munis d'une rame ventrale semblable aux précédents, avec des soies peu visibles. Il existe des soies subulées tournées en dehors terminées en pointe très-fine, et des soies à crochets minces, allongées, arquées et découpées à leur bout en trois dents inégales, dont la supérieure est plus courte. Ces Animaux sont contenus dans un tube fixé membraneux, cylindrique, ouvert également aux deux extrémités.

Le genre Clymène comprend quelques espèces, la CLYMÈNE AMPHIOTOME, *Cl. Amphiotoma*, figurée par Savigny (pl. 1, fig. 1) sur un individu recueilli dans le golfe de Suez. Elle est indigène des côtes de la mer Rouge, et habite des tubes grêles, onduleux, fragiles, composés à l'extérieur de grains de sable et de fragments de Coquilles, fixés dans les interstices des rochers, ou dans ceux des Madrépores et autres productions marines.

La CLYMÈNE URANTHE, *Cl. Uranthus*, espèce nouvelle des côtes de l'Océan, découverte par d'Orbigny.

La CLYMÈNE LOMBRICALE, *Cl. lumbricalis*, ou la *Sabella lumbricalis* d'Othon Fabricius (*Faun. Groenl.* pag. 374, n° 369). Savigny n'a pas réuni cette espèce à la précédente, parce que la description d'Othon Fabricius, suffisante pour constater l'identité du genre, ne l'est pas pour constater celle de l'espèce ; elle se trouve sur les côtes de l'Océan septentrional.

Le *Lumbricus tubicola* de Müller (*Zool. Dan.* pl. 75), ou le *Tubifex marinus* de Lamarck ; le *Lumbricus sabellaris*, également de Müller (*loc. cit.* pl. 104, fig. 5), et le *Lumbricus capitatus* d'Othon Fabricius (*loc. cit.*, n° 263), paraissent avoisiner le genre Clymène, autant qu'on en peut juger du moins par ces figures qui représentent des individus incomplets.

Ocken (Nouv. Syst. de Zoologie) a établi sous le nom de Clymène un genre qui n'est placé dans la famille des Dentales, et auquel il assigne pour

caractères : tubes entièrement calcaires, flexueux, s'entretenant les uns les autres, et contenant chacun un animal dont le corps très-grêle n'a ni mamelons ni soies; tête épaisse, entourée de tentacules longs, mous et simples, sans massue operculaire. Ce genre ne correspond aucunement à celui de Savigny, et abstraction faite de son plus ou moins d'importance et de valeur, il doit être supprimé pour éviter la confusion qu'entraînerait l'identité du nom. L'une des espèces placées par Ocheu dans les Clymènes, est la *Serpule contournée*, *Serpula contortuplicata* de Linné. Nous ne croyons pas utile de la distinguer du genre auquel on l'avait rapportée. Il en est sans doute de même de la Clymène *Filograna* ou *Serpula Filograna* de Cmelin, que nous ne connaissons pas. (AUD.)

**CLYMENUM.** BOT. PHAN. Nom employé dans Dioscoride, devenu celui d'un *Lathyrus*. (B.)

**CLYPEACÉS.** CRUST. Même chose qu'*Aspidiotes*. V. ce mot.

**CLYPEARIA.** BOT. PHAN. (Rumph.) Syn. d'*Adenantha falcata*. Ce nom s'applique aussi à un autre Arbre de l'Inde moins connu. (B.)

**CLYPEASTRE.** *Clypeaster*. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, correspondant à celui des Lépadiés. V. ce mot. (AUD.)

**CLYPEASTRE.** *Clypeaster*. ÉCHIN. Genre établi par Lamarck dans la première section de ses Radiaires Échinodermes ou Échinides, adopté par Cuvier et par tous les naturalistes. Ses caractères sont : corps irrégulier, ovale ou elliptique, souvent renflé ou gibbeux, à bord épais ou arrondi, à disque inférieur concave au centre; épines très-petites; cinq ambulacres bornés, imitant une fleur à cinq pétales; bouche inférieure, centrale; anus près du bord ou dans le bord. Les Clypeastres avoisinent sans doute les Scutelles par leurs rapports; néanmoins on les en distingue facilement, non-seulement parce que leur corps

est en général renflé en dessus, que leur forme est elliptique ou ovale dans le plus grand nombre, mais surtout parce que leur bord est épais ou arrondi, et que leur disque inférieur est presque toujours concave au centre. C'est dans la cavité du disque inférieur des Clypeastres qu'est située leur bouche. Ces Échinides, plus épaisses, plus convexes ou plus renflées que les Scutelles, ont plus souvent l'anus dans le bord qu'au-dessous, et éloigné du bord et de leur bouche, comme bilobées postérieurement, et striées d'un côté par des lames étroites et transverses.

**CLYPEASTRE ROSACÉ,** *Clypeaster rosaceus*, Lamk., Anim. sans vert. T. III, p. 14, n° 1.; Encycl. méth. pl. 145, fig. 1, 2, 5, 6; *Echinus rosaceus*, Gmel., Syst. Nat., p. 3186, n° 14. Cette espèce, une des plus communes dans les collections, varie beaucoup dans sa forme; en général, elle est ovale, elliptique, pentagone, convexe en dessus, un peu concave en dessous, avec le bord postérieur émoussé; les ambulacres sont très-larges, et figurent une Rosacée à pétales ovoïdes. Elle habite les mers de l'Inde et de l'Amérique.

**CLYPEASTRE ÉLEVÉ,** *Clypeaster altus*, Lamk., Anim. sans vert., p. 14, n° 2; Encycl. méth., pl. 146, fig. 1, 2; *Echinus altus*, Gmel., Syst. Nat., p. 31-87, n° 61. On ne connaît encore cette petite espèce qu'à l'état fossile; elle est ovale, à sommet élevé, presque conique, avec cinq ambulacres allongés; le disque inférieur est concave au centre; l'anus est petit en dessous et près du bord. Ce Fossile se trouve en Languedoc, en Italie et à Malte.

**CLYPEASTRE EXCENTRIQUE,** *Clypeaster excentricus*, Lamk., Anim. sans vert., p. 15, n° 6; Encycl. méth. pl. 144, f. 1, 2; *Echinus uniformis*, var. 7, Gmel., Syst. Nat., p. 31-87, n° 62. Espèce fossile, suborbiculaire, déprimée, un peu convexe, ornée de cinq ambulacres étroits qui partent du sommet, et qui semblent se per-



tre dans le bord. Elle se trouve à Chaumont, département de l'Oise.

**CLYPEASTRE SCUTIFORME**, *Clypeastre scutiformis*, Lamk., Anim. sans vert. T. III, p. 14, n° 4; Encycl. méth., pl. 147, f. 3, 4. Espèce peu connue, à forme elliptique, assez plane en dessus, avec le bord un peu païs; le disque inférieur est légèrement concave et marqué de cinq bandes rayonnantes, linéaires, presque lisses. On la croit originaire des bords de l'Inde.

Lamarck décrit encore les *Clypeastres* hémisphérique, Encycl. méth., t. 144, fig. 3, 4, espèce fossile dont on ignore la localité. — *Clyp.* à large bord, Scill., Corp. mar., tab. 11. Entrons de Dax. — *Clyp.* Beignet, *Echinus Loganum*, Gmel. On ne connaît point sa patrie. — *Clyp.* oviforme, *Echinus oviformis*, Gmel. Fossile des environs du Mans et de Valognes, apportée des mers australes par Péron et Lesueur. — *Clyp.* uni. Fossile des environs de Stenue. — *Clyp.* stellifère de Lamk., à localité inconnue. Il existe dans les collections un grand nombre d'espèces inédites. — Le *Clyp.* de France doit probablement appartenir à un autre genre. (LAM...X.)

**CLYPEL**. ois. Expression par laquelle Illiger désigne les écailles qui couvrent certaines parties des pieds de divers Oiseaux. (DA...Z.)

**CLYPEOLE**. *Clypeola*. BOT. PHAN. Famille des Crucifères, Tétradynamie héliocleuse, L. Tournesort et Adanson ont donné le nom de *Jonthlaspi* à ce genre que Linné a désigné ensuite sous celui qu'il porte aujourd'hui, en y introduisant des Plantes qui appartiennent à d'autres genres voisins, tels que l'*Alyssum*. Il fut réduit ensuite par Gaertner au seul *Clypeola jonthlaspi*, et le professeur De Candolle a adopté ensuite cette réduction, en lui ajoutant deux nouvelles espèces. Cet illustre botaniste donne les caractères suivants au genre *Clypeole*: lisse à sépales égaux à leur base; pétales entiers; filets des étamines munis de dents; silicule orbiculaire,

plane, un peu échancrée au sommet, indéhiscente, uniloculaire, monosperme; stigmate sessile; graine comprimée, centrale, fixée latéralement au moyen d'un funicule horizontal; cotylédons ovales, planes et accompagnés. Ce genre a été placé par De Candolle (*Syst. Veg.* T. II, p. 326) dans la seconde tribu des Crucifères, à laquelle il a donné le nom d'*Alyssinées* ou *Pleurorhizées* latiseptées. Son port est celui des *Alyssum*, et il a presque tous les caractères des *Peltaria*. Une légère différence dans la silicule en fait toute la distinction.

La **CLYPEOLE JONTHLASPI** est une petite Plante dont les tiges sont diffuses et ascendantes, qui croît sur les murs, dans les champs et les collines calcaires de l'Europe australe. Elle est assez abondante dans le Dauphiné et la plupart de nos pays méridionaux. Bory de Saint-Vincent l'a trouvée communément à Grenade sur les vieilles tours mauresques du célèbre palais de l'Alhambra. Parmi les nombreux synonymes que les auteurs ont, à l'envi les uns des autres, imposés à cette Plante, nous citerons le *Fosselinia* de Scopoli, *Alhioni* et *Medikus*. Les deux nouvelles espèces décrites par De Candolle étaient les types de deux genres nouveaux proposés par Desvieux dans le Journal de botanique, 3<sup>e</sup> vol. p. 161 et 162. Ces genres ont été conservés comme de simples sections sous leurs noms d'*Orium* et de *Bergeretia*. La première, *Clypeola eriophora*, D. C., a la silicule lanugineuse et hérissée de poils mous et très-longs. Elle habite les collines d'Aranjuez en Espagne. La seconde croît en Orient et principalement en Perse; c'est la *Clypeola echinata*, D. C., dont la silicule offre des soies roides sur l'un et l'autre disque. (G...N.)

**CLYSIE**. *Clysia*. MOLL. Dans la Zoologie Britannique de Pennant, on remarque le *Balanus striatus*, dont Leach a fait un genre en y joignant une autre espèce non décrite qu'il observa dans la collection de Savigny.

Ce genre a été caractérisé, ainsi enveloppe calcaire, composée de quatre pièces, et fermée par un opercule dont les valves, etc., sont pas divisées.

**CLYTHRE.** Clythra. Latr. (Fabricius.)  
M. G. Latr.

**CLYTHRE.** *Clythra*. M. G. Latr. de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères, établi par Laicharting (*Verzeichniss der Tyroler Insecten*) et fondé antérieurement par Geoffroy (Hist. des Ins. T. 1, p. 195) sous le nom de *Melolontha*, *Melolontha*, aux dépens des *Chrysomèles* de Linné. Il appartient (Consid. génér., p. 258) à la famille des *Chrysomélines*, et est rangé maintenant par Latreille (Règn. An.) dans celle des *Cycliques*. Ses caractères sont : antennes insérées au devant des yeux et distantes l'une de l'autre, courtes et en scie ; tête verticale, entièrement enfoncée dans le corselet. Le point d'insertion et l'écartement des antennes à leur origine éloignent les *Clythres* des *Galéruques* et des *Altises* ; ce caractère les rapproche au contraire des genres *Chrysomèle*, *Colaspe*, *Eumolpe*, *Grihouri* et *Chlamys* ; elles ont surtout les plus grands rapports avec ce dernier groupe, mais elles s'en distinguent par le manque d'une rainure sur les côtés de la poitrine ; enfin elles diffèrent de tous par les antennes en scie et par quelques autres points de leur organisation. Elles ont une tête assez large, recte verticalement dans le prothorax, supportant des antennes plus courtes que la moitié du corps, de onze articles ; leur bouche présente un labre échancré, des mandibules arquées et bidentées, une paire de mâchoires cornues, courtes, dans lesquelles on distingue deux pièces principales, l'une intérieure, petite, presque cylindrique, l'autre, extérieure, beaucoup plus grande et étalée, ces mâchoires portent chacune un palpe plus épais au milieu, de quatre articles dont le dernier est conique cylindrique ; enfin il existe une lèvre inférieure, simple, ayant aussi de un palpe de trois arti-

cles. Le prothorax est court, rebordé, presque aussi large que le clythre ; celles-ci sont dures, coriaces, aussi longues que l'abdomen ; elles recouvrent une paire d'ailes membraneuses. Les paies ont généralement une longueur moyenne ; dans quelques espèces, celles de devant sont très allongées ; les tarses ont quatre articles dont le premier, le second et le troisième sont garnis de poils ronds en forme de broches ; celui-ci est bilobé, le quatrième mince, arqué, légèrement renflé à son extrémité et muni de deux crochets assez forts.

Ces Insectes sont assez petits, leur taille ne dépasse guère cinq à six lignes. Ils sont peu agiles et on les rencontre sur les fleurs, particulièrement sur celles du Chêne. Leur larve a été plusieurs fois observée. Les espèces propres à ce genre sont assez nombreuses ; le général Dejean (Catal. des Coléopt.) en mentionne cinquante-huit. Parmi elles nous citerons :

La **CLYTHRE QUADRIPUNCTÉE** ou **QUADRILLE**, *Cl. quadripunctata*, ou la *Chrysomela quadripunctata* de Linné, qui est la même que la *Melolontha quadrille* à corselet noir de Geoffroy (*loc. cit.*, p. 195, pl. 5, fig. 4), ou la *Chrysomèle cylindrique* à quatre points noirs de Deger (*Mém. Ins. T. V, p. 529, n° 52, pl. 10, fig. 7*). Elle se trouve dans toute l'Europe sur diverses fleurs, et plus fréquemment sur celles du Chêne, de l'Aubépine, du Prunelier. Schall a décrit sa larve ; Vaudouer de Nantes a fait part à Latreille de ses observations ; suivant lui, cette larve se construit un fourreau d'une matière coriace, ridée extérieurement, presque cylindrique, fermée et arrondie postérieurement, ouvert à l'autre bout, et qu'elle traîne ainsi avec elle, comme le Limacon sa coquille, mais sans jamais sortir autre chose que ses pattes et sa tête.

La **CLYTHRE LONGUEMANE**, *Cl. longimana*, ou la *Melolontha longimana* de Geoffroy (*loc. cit.*, p. 195, n° 53), qui est la même que la *Melolontha pallens* de Housenoy (*Ann. Paris T. 1, p. 72, n° 3*). Elle se rencontre sur envi-

rons de Paris. Sa larve, dit Latreille (*Hist. des Crust. et des Ins.* T. XI, p. 556), est transformée dans un fourreau de matière terreuse agglutinée.

La *CLYTIA TRIDENTATA*, *Cl. tridentata*, pu la *Chrys. tridentata* de Linné. Elle est la même que la *Chrysomèle* bleu verdâtre à stries jaunes de Deyder (*loc. cit.*, p. 555, n° 36, pl. 10, fig. 10), et a été figurée par Schaeffer (*Icon. Ins.* Tab. 77, fig. 6). Elle est très-commune sur les fleurs de Chêne dans le midi de la France.

La *CLYTIA FUNESCENTIS*, *Cl. pubescens*, dont la larve a été observée avec beaucoup de soin et figurée par Léon Dufour (*Ann. des Sc. phys.* T. VI, p. 507, et pl. 96, fig. 1, 2, 3). Il l'a rencontrée assez fréquemment, au mois de février, sous de grosses pierres, dans les montagnes de Gironne en Catalogne. Elle est blanchâtre, presque glabre, nimbée sur elle-même, un peu ridée. Lorsque Dufour la prit, elle était immobile et paraissait en travail de métamorphose. Sa tête noire et olivâtre a deux petites antennes presque imperceptibles; derrière elle se voit un segment noir, un peu corné, indice d'un futur corselet, et tout près de là trois paires de pattes courtes et pointues. Ces larves assez nombreuses ne se trouvaient pas à nu, mais elles étaient enveloppées chacune d'une coque de terre libre et isolée, oblongue, cylindroïde, brune, d'environ sept lignes de longueur sur près de trois d'épaisseur, obtuse et fermée sur deux bouts; et ne ressemblant pas mal au premier coup d'œil à des coques de *Archis* un peu allongées. Ces coques, d'une terre homogène et fine, ont d'ant de leurs extrémités obliquement tronquées, tantôt planes, tantôt un peu bombées; l'autre, qui se termine en pointe, se termine par deux mamelons peu remarquables séparés par une échancrure. Leur surface est lisse ou avec quelques légères aspérités. Les larves sont minces et fragiles. Dufour a conservé ces coques, et il a pu obtenir l'insecte parfait. Ce n'est pas par le bout qui offre une tronçature et la

trace d'un opercule que la *Clythre* exécuta sa sortie, mais bien par le bout mamelonné qui part comme une sautoir. Cette larve est certainement très-différente de celle décrite par Neudöcker. La coque de la *Clythre* pubescente est formée d'une matière assez friable, peu susceptible d'être transportée, et de plus elle est fermée aux deux bouts; mais ce dernier trait caractéristique est peut-être particulier à l'époque à laquelle Dufour a fait son observation; et on conçoit que la coque, d'abord ouverte à une extrémité, a pu être fermée lorsque la larve a été sur le point de subir ses métamorphoses.

Pour les autres espèces, Olivier (*Encycl. Méth. et Coléopt.*), Latreille (*Genera Crust. et Ins.* T. III, p. 55), Dejean (*loc. cit.*) (A. D.)

CLYTIA. BOT. PHAN. (Caméarius.)  
Syn. de *Croton tinctorium*. (P.)

CLYTIE. *Clytia* Bory. Genre de l'ordre des Sertulariées dans la division des Polypiers flexibles; établi aux dépens des Sertulaires de Linné. Lamarck lui a donné le nom de Campanulaire. Les *Clyties* sont des Polypiers phytoides, rameux, filiformes, volubiles ou grimpons, à cellules campanulées, pédicellées, avec des pédicelles longs, ordinairement contournés. Elles forment un groupe bien distinct dans l'ordre des Sertulariées; leurs Polypes, fixés dans des cellules campanulées, peuvent chercher leur nourriture à une petite distance de la ruche pélagienne, au moyen du long pédicelle qui supporte cette petite habitation. Ce pédicelle élastique transporte dans un cercle quelquefois de quatre à cinq millimètres de rayon le Polype qui, se contournant sur lui-même à la manière des Dendrelles de Bory, imprime à l'eau un mouvement de rotation nécessaire pour attirer les Animalcules qui lui servent de nourriture. Les *Clyties* n'ont aucun rapport avec les Callariées, encore moins avec les Flustrées. Elles appartiennent aux Sertulariées pour la forme des tiges et celle des ovaires, et dif-

et des genres de cette famille par un pédoncule qui supporte les lobes, et qui les rapproche des nodosides. Ce mot. Les Serres ovifère et rugueuse de Lin- que nous avons cru devoir pla- parmi les Clyties, pourraient être former un genre parti- r; mais comme elles ont plus rapport avec ces dernières qu'avec les acaeculariées, nous avons filé ce groupe de tous ces Polypiers, de ne point nous attirer le repro- le trop multiplier les genres.

La substance des Clyties est carti- reuse; leur couleur fauve jaunâ- arie peu. Elles sont extrêmement es, quelquefois difficiles à voir à nu, et toujours parasites sur les assiophytes des différentes mers lobe.

**CYTIE VERTICILLÉE, *Clytia verti- ta*, Lamx., Hist. Polyp. p. 202, 9. — Ellis Corral. p. 39, n. 20, 1, A. —** Petit Polypier un peu ra- c, à cellules campanulées, den- droites; portées sur de longs pé- ules en partie contournés et au- ore de quatre ou cinq au plus à ue verticille. Il n'est pas rare les mers d'Europe. Nous en s reçu une variété des côtes du uland.

**CYTIE OLIVATRE, *Clytia olivacea*, x., Gen. Polyp. p. 13, t. 97, fig. —** Elle ressemble à un Arbris- toa, couvert de cellules pédi- es, subverticillées, à bord entier. ovaires rétrécis à leur base se inent en pointe aiguë. Habite e banco de Terre-Neuve. Ce Po- r, très-voisin du *Cl. verticillata*, ut peut-être former avec lui un e particulier facile à distinguer yties et des Laomédées par la e des tiges, des rameaux, des celles et des ovaires.

**CYTIE VOLUBILE, *Clytia volubilis*, x., Gen. Polyp. p. 13, t. 4, f. e, f, — Ellis Corral. p. 40, tab. 14, , fig. a, A. Sa tige est grimpante olubile, rameuse, couverte de les campanulées, dentées, épar- lutôt qu'alternes et portées sur**

de longs pédoncules entièrement con- tournés. Espèce commune sur les Hy- drophytes des mers d'Europe, et sur celles de la mer des Indes, d'après Pallas.

Ce genre est encore composé des *Cl. syringa*, Lamx., Hist. Polyp. p. 202, n. 341. Des mers d'Europe. — *Cl. umigère*, Lamx., p. 203, n. 342, pl. 5, fig. 6, A, B, C. Des mers de l'Au- tralasia. — *Cl. undulée* et à grandes cellules, rapportées des mers austra- les par Quoy et Gaimard. — *Cl. ovi- fère*, Lamx., Hist. Polyp. p. 203, n. 343, et *Cl. rugueuse*, n. 344; ces dernières espèces sont placées dans ce genre à cause de leurs rapports avec les principales espèces. Quand ces Polypiers seront mieux connus, l'on trouvera peut-être dans la forme de leurs Animaux des caractères suffisants pour établir des genres particuliers. (LAM.X.)

**CNECUS. BOT. RHAN. (Gesner.)** Syn. de Carthame des teinturiers. *V. CARTHAME* et *CNIQUE*. (B.)

**CNEKION. BOT. RHAN. (Thesco- vide.)** Syn. présumé de Marjolaine. *V. ORIGAN*. (B.)

\* **CNEMIDIUM. ois. (Illiger.)** Par- tie inférieure dénuée de plumes de la jambe de certains Oiseaux. (DR.Z.)

**CNÉMIDOTE. *Cnemidotus*. 1m.** Genre de l'ordre des Coléoptères, ainsi désigné par Illiger, et fondé par La- treille sous le nom d'*HALIPE*. *V. ce mot*. (AUD.)

**CNEORUM. BOT. RHAN.** Ce nom scientifique du genre *Camille*, *V. ce mot*, a été en outre donné comme spécifique à un *Daphné* et à un *Lise- ron*. Il paraît qu'il désigne le *Roma- rin* dans *Théophraste*. (B.)

**CNÉPOLOGOS. ois. (Vieillot.)** Syn. présumé de *Moracilla alba*. *V. BERGROHNSTET*. (DR.Z.)

**CNESTE. *Cnestis*. BOT. RHAN. A. L.** Jussieu en établissant ce genre l'a placé dans un groupe voisin de la famille des Térébinthiacées, et qui a quel- ques affinités avec les Rhamnées. Il appartient à la Décandrie Pentagynie

L. Voici les caractères que lui assigne son auteur (*Gener. Plant.* p. 574) : calice quinquépartite, cotonneux en dehors; cinq pétales; dix étamines insérées sur le réceptacle; cinq ovaires, hérissés, surmontés l'autant de styles et de stigmates; à ces ovaires succèdent cinq capsules en forme de légumes, coarctes, connues, bivalves, monospermes, garnies extérieurement et intérieurement de poils qui produisent sur la peau une vive démangeaison. Le nombre des capsules est variable par l'avortement de quelques-unes d'entre elles; souvent même une seule survit et s'isole à la maturité.

Dans ses observations sur la botanique du Congo, R. Brown place le genre *Cnestis* dans une nouvelle famille qu'il nomme CONNARACÉES, Connaracæ (*V.* ce mot), et qui est un démembrement de celle des Térébinthacées. Plusieurs espèces nouvelles et encore inédites, recueillies par le professeur Christian Smith dans le voisinage du fleuve Zaïre, ont fourni à R. Brown l'occasion d'examiner avec plus d'attention les caractères génériques. Il y a trouvé cinq ovaires qui avortent fréquemment; la graine est formée en grande partie par l'albumen, et le calice a une exsertion valvaire. Chacun de ces caractères pris isolément ne suffit certainement pas pour séparer le *Cnestis* du genre *Connarus*; mais c'est leur ensemble qui en fait la distinction; remarque assez fréquente en botanique, et de la plus grande importance sous le point de vue de la séparation des genres. R. Brown ajoute que le *Cnestis* a des affinités avec l'*Averrhoa* par son habitus et par quelques rapports de structure dans les fleurs et les graines; mais comme ce dernier n'en va pas, selon notre auteur, se placer parmi les Oxalidées, il s'en suit que le *Cnestis* est un lien qui établit le passage entre les Connaracées et cette dernière famille.

Les Plantes aux lesquelles Jussieu a attribué le genre sont deux *Ashraïmées* rapportés, l'un de Madagascar et l'autre

de l'île Mascareigne par Commerson. Le premier, *Cnestis a trilocularis* nommée *Cnestis polyphylla*, Lamk. (*Encycl. et Illustr.*, t. 687, fig. 2), a des feuilles composées d'un grand nombre de folioles ovales et légèrement obtuses, un peu veloutées en dessous; ses fleurs sont disposées en grappes cotonneuses, longues d'un décimètre et plus; les capsules sont veloutées, d'un brun roussâtre. La seconde espèce est le *Cnestis obtusa*, *Cnestis glabra*, Lamk. (*Encycl. et Illustr.*, t. 387, fig. 1). Ce petit arbre a des feuilles simples et composées d'une dizaine de folioles glabres, coriaces, entières, ovales, obtuses, portées par des pédicelles assez courts; ses petites fleurs, disposées en grappes fasciculées, ont la corolle rougeâtre, à peine plus longue que le calice. Les capsules sont rousseâtres, courbées et couvertes d'un duvet épais qui excite sur la peau de vives démangeaisons, d'où le nom vulgaire de *Pois de Pile à gratter* et celui de *Oratefle* que l'on donne aussi quelquefois à ces Plantes.

Outre ces espèces, on en trouve deux autres décrites par Lamarck dans l'*Encyclopédie*, Palisot-Beauvois, en publiant sa *Flore d'Oware* et de Benin, a encore ajouté à ce genre deux belles Plantes dont il a donné des figures (*loc. cit.*, t. 59 et 60) sous les noms de *Cnestis obliqua* et *Cnestis pinnata*. Leurs fruits ont des poils dépourvus de la propriété d'exciter ce prurit incommode qui caractérise les autres *Cnestis*. Une d'entre elles (*Cnestis pinnata*) a, comme le *Rourea* d'Alibert, deux bractées en dessous des corymbes de ses fleurs; ce qui, selon Palisot-Beauvois, doit confirmer le rapprochement de ce genre avec le *Cnestis* indiqué par Jussieu. De la transmutation du nom de *Rourea* en celui de *Robergia* par Schreber, il s'en est suivi que plusieurs espèces de *Cnestis* ont été placées dans les *Robergia* par ceux qui ont adopté les innovations inutiles de ce dernier auteur.

CNESTRON. BOT. PHAN. (Théo-

phaste.) Syn. de *Cusorum*. V. ce mot et GAMBÉE. (B.)

CNIG. BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires du *Guilandina Bonduc*. (B.)

CNICUM. BOT. PHAN. Du Dictionnaire de Dérerville. V. CNIDIUM. (G.N.)

CNICES. BOT. PHAN. Nom latin du Cnique. V. ce mot. (B.)

CNIDE. BOT. PHAN. (Hippocrate.) Syn. d'Ortie selon Adanson. (B.)

CNIDION. *Cnidium*. BOT. PHAN. Famille des Ombellifères, Pentandrie Digynie, L. Ce genre a d'abord été constitué par Casson dans les Mémoires de la Société de Médecine de Paris pour 1782. Reproduit ensuite par Moench et Hoffmann, C. Sprengel, en ces derniers temps, l'a définitivement adopté et l'a caractérisé ainsi : involucre presque nul ou monophylle ; akènes ovés, solides, présentant cinq côtes aiguës, ailées et striées. A ce genre Sprengel rapporte des Ombellifères placées auparavant dans six genres distincts, savoir : le *Selinum Monnieri*, L., l'*Athamanta chinensis*, le *Ligusticum pyrenaicum*, Gouan ; le *Seseli aristatum*, Ait., les *Peucedanum Silaus* et *Alsaticum*, L. ; enfin le *Smyrnium atropurpureum*, Lamk. De telles mutations n'ont pas encore reçu la sanction de tous les botanistes ; on y est d'autant moins disposé, qu'on voit l'un des collaborateurs de Sprengel ne pas adopter toutes les vues de ce savant dans l'ouvrage même où celui-ci a publié ses Ombellifères (V. Roem. et Schult. T. IV, p. 36). Les *Peucedanum Silaus* et *Alsaticum*, par exemple, ne doivent pas, aux yeux de Schultes, être réunis aux *Cnidium*, et seront placés plus convenablement, l'un parmi les *Oreoselinum*, et l'autre à part, devenant le type d'un genre particulier. Un monographe d'Ombellifères antérieur à Sprengel, Hoffmann, avait aussi admis le genre *Cnidium* en excluant toutefois les espèces de *Peucedanum* et de *Selinum* qu'on y avait fait entrer. Il l'avait restreint au *Cnidium apioides*, et avait formé

avec les autres Plantes un genre qu'il nommait *Cnidoselinum*, et que Sprengel réunit à son *Cnidium*. Tant d'obscurités et d'incertitudes ne se dissipent qu'après une étude approfondie de toute la famille, d'après les principes de la méthode naturelle. Les tribus proposées par Sprengel ont déjà cet avantage de réunir les Plantes d'un groupe très-vaste et très-naturel en petits groupes partiels qui faciliteront beaucoup la recherche de leurs affinités. C'est dans sa tribu des Pimpinellées qu'il a placé le genre *Cnidium*. (G.N.)

CNIPA. BOT. PHAN. (Hermann.) Syn. de Savonnier. V. ce mot. (B.)

\* GNIPOLOGOS. ORS. (Aristote.) Syn. présumé du Grimperreau, *Certhia familiaris*, L., ou du petit Epêche, *Picus minor*, L. V. GRIMPERRAU et PIC. (P.R.)

CNIQUE. *Cnicus*. BOT. PHAN. Le Carthame des teinturiers, *Carthamus tinctorius*, L., portait ce nom chez les auteurs grecs antérieurs à Plin. Tournefort le conserva en établissant un genre dans lequel il plaçait cette Plante ; mais Linné, ayant subdivisé le genre de Tournefort, réserva la dénomination de *Cnicus* au groupe dans lequel le Carthame ne se trouvait plus ; son genre *Cnicus* était composé de tous les Cirsés qui ont de larges bractées à la base de l'involucre, tels que les *Cnicus oleraceus*, *Cnicus ochroleucus*, etc. Willdenow donna ensuite ce nom à tous les Chardons à aigrette plumeuse ou au genre *Cirsium* de De Candolle. V. CIRSE. Enfin, Gaertner et Cassini, en rejetant tous les *Cnicus* des autres botanistes, ont appliqué ce mot à une seule Plante placée autrefois parmi les Centaurées. Voici un extrait des caractères donnés par Cassini : calathide composée de fleurons nombreux, égaux, presque réguliers, fertiles et entourés d'une série de fleurons neutres peu nombreux et petits ; involucre ovoidé formé d'écaillés imbriquées, coriaces et garnies d'épines pinnées à leur sommet,

entouré de bractées foliiformes; réceptacle fimbrillé; aigrette double; l'extérieure très-longue, composée de poils plumeux; l'intérieure plus courte et formée de poils qui alternent avec ceux de l'extérieure.

Le CNIQUE CHARDON BÉNI, *Cnicus benedictus*, Gaertner; *Centaurea benedicta*, L., croît dans l'Europe méridionale. Il a une tige droite, raméeuse, laineuse, portant des feuilles oblongues, sinuées ou dentées et semi-décurrentes; ses fleurs sont jaunes. Quelques médecins ont préconisé les fleurs de cette Plante, comme jouissant de propriétés toniques et sudorifiques très-actives. Le fait est qu'elles sont fort amères et douées par conséquent de propriétés énergiques que beaucoup d'autres Végétaux paragent, il est vrai, avec elles. (G.N.)

CNODALON. *Cnodalon*. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, établi par Latreille aux dépens des Hélops, et qu'il ne faut pas confondre avec le genre suivant de Fabricius. Celui des Cnodalons appartient à la section des tétromères, famille des Taxicornes, et a pour caractères : antennes insérées sous les bords latéraux de la tête, terminées par six articles plus grands, transversaux, comprimés et un peu dilatés en scie au côté interne; palpes maxillaires plus grands que les labiaux, avec le dernier article en forme de hache; corps ovale, très-concave, l'avant-sternum prolongé en arrière, en forme de pointe. Ces Insectes diffèrent des Hélops par leurs antennes; ils se distinguent aussi sous le rapport des genres Diapère, Traïscèle, Elédone et Epitragé. L'insertion des mêmes parties les éloigne des Léiodes, des Tétratomes, des Eusophes et des Orchesies; il existe aussi dans plusieurs autres parties de l'organisation des différences sensibles et qui confirment l'établissement de ce petit genre qui ne comprend encore que fort peu d'espèces. Latreille n'en comptait qu'une seule, le CNODALON noir, *Cn. viride*, qui est peut-être un *Helops morbillatus* de Fabri-

cius. Il en a donné une bonne figure (*Gener. Crust. et Ins. T. 3, tab. 10, fig. 7*). Cette espèce est originaire de Saint-Domingue d'où l'a rapportée Palisot de Beauvois. Dejean (*Catalog. des Coléopt.*, p. 69) en mentionne quatre autres auxquelles il a donné les noms de *columbinum*, *cruentum* et *ceispennæ*. Elles sont originaires de Cayenne. (A.C.D.)

CNODULON. *Cnodulon*. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères établi par Fabricius et réuni par Latreille à celui des Hélops. V. ce mot. (A.U.D.)

CNOPODIUM. BOT. PHAN. (Dioscoride.) Probablement la Renouée aviculaire. (B.)

CO. BOT. PHAN. V. KO.

COA. BOT. PHAN. (Plumier.) Syn. d'*Hippocratea volubilis*. V. HIPPOCRATÉE. On donne le même nom en Chine au *Convolvulus Batatas*. V. LISERON. (B.)

\* COACCIOU. OIS. Syn. sarde du jeune Grèbe cornu, *Colymbus obscurus*, L. V. GRÈBE. (DR..Z.)

COACH. OIS. Flacourt, dans sa Relation de Madagascar, dit que c'est la Corneille ou Corbeau de ce pays, lequel est noir sur le dos et blanc sous le ventre. (B.)

COACTO ou QUATTO. MAM. (Wosmaer.) Syn. d'Atèle Coaita. V. SAPAJOUS. (B.)

\* COAERICO. OIS. (Lachénaye-Desbois.) Syn. vulgaire du Faisan, *Phasianus colchicus*, L., aux Antilles où il a été transporté comme objet de luxe. (DR..Z.)

\* COAG. BOT. PHAN. (Surian.) Syn. caraïbe de *Mammea americana*. (B.)

\* COAGHEDDA. OIS. (Cetti.) Syn. sarde de la Mouette rieuse, *Larus cinerarius*, L., Buff., pl. enl. 969. V. MAUVE, division des Mouettes. (DR..Z.)

\* COAGULATION et COAGULUM. ZOOL. et BOT. Certains fluides organiques ont la propriété de se concréter

instantanément et de changer toutes leurs qualités physiques, soit par un simple effet de température, soit par l'action chimique d'un agent particulier. On a donné le nom de *Coagulation* à ce phénomène, et celui de *Coagulum* à son résultat. Celui-ci se présente ordinairement sous la forme d'un caillot ou d'une gelée. C'est ainsi que le Lait et l'Albumine se solidifient; mais comment s'opère cette solidification, principalement dans ce dernier corps? La cause en est très-difficile à saisir, quoique les circonstances du phénomène aient été observées avec beaucoup d'attention, et que l'on ne manque ni de données exactes sur la composition de l'Albumine, ni de notions sur ses propriétés physiques avant et après la Coagulation. Thénard l'attribue à la force de cohésion des molécules de l'Albumine; et il pense qu'une cause analogue à celle qui détermine la solidité de certaines substances minérales, produit la concrétion des fluides organiques.

Nous lisons, dans un travail récemment publié sur le sang par Prévost et Dumas, qu'il est très-probable que l'Albumine du blanc d'œuf et des fluides animaux devant sa fluidité à la présence de la Soude caustique, celle-ci, lorsque la chaleur lui est appliquée, passe à l'état de Carbonate par suite de la décomposition d'une petite quantité de matières animales, et devient incapable de tenir l'Albumine en dissolution. Quoiqu'il en soit de cette explication hypothétique, ainsi que de la précédente, il est constant que l'Albumine animale se concrète à une chaleur de soixante-dix degrés centigrades, et qu'en cet état, vue au microscope, elle présente des globules blancs analogues à ceux dont le sang est en partie composé. Les mêmes savans expliquent la Coagulation de l'Albumine, que déterminant l'Alcool et les Acides, par l'affinité de ces agens pour l'Alcali caustique; mais ceux-ci, outre leur propriété saturante, exercent encore sur elle un autre genre d'action; ils peuvent la dissoudre, et par conséquent n'occasionner aucun

précipité; c'est en effet ce qui arrive avec les Acides phosphoriques et acétique.

Dans quelques opérations de chimie minérale, on observe également des phénomènes de Coagulation: ainsi, par exemple, lorsqu'on mélange deux solutions alcalines d'Alumine et de Silice, de l'Acide hydrochlorique et du Nitrate d'Argent liquide, il y a formation d'un précipité abondant cailléboté ou gélatineux; mais on dit qu'il y a Coagulation, seulement lorsque le précipité a toutes ses parties liées entre elles et ne formant qu'une seule masse; dans tout autre cas, c'est un précipité ordinaire. *V. les mots PRÉCIPITATION et PRÉCIPITÉ.*

(G. S.)

COAITA. MAM. Espèce du genre Atèles. *V. SARAZOUS.* (A.)

\* COAK. OIS. (Gaimard.) Syn. limorien de Philédon Moine, Cuv., *Merops Monachus*, Lat. Cet Oiseau est ainsi nommé à cause de son cri; il est très-commun à Timor et à la Nouvelle-Galles du sud. (B.)

COAK. MIN. Nom que l'on donne en Angleterre à la Houille que l'on a dépouillée, par une sorte de distillation dans des fours appropriés, du Bitume et de toutes les matières volatiles qui font partie de sa composition. Parmi ces matières, l'une des plus abondantes est le Gaz hydrogène carboné dont on a fait une si heureuse application pour l'éclairage. (DR. Z.)

COAK-FISH. PISC. C'est-à-dire Poisson charbonnier. Synonyme anglais de *Gadus carbonarius*. *V. GARD.* (A.)

COANENEPILLI ou COY-TRAYEVA. BOT. PHAN. (Hernandez.) Espèce mal connue de *Passiflora*, mal à propos rapportée comme synonyme au *Passiflora normalis*, L., espèce qui paraît avoir été mal observée. Ce synonyme pourrait convenir au *Passiflora mexicana* de Jussieu. On a aussi donné le même nom à un *Phyllis*. (B.)

COAPIA. BOT. PHAN. Nom brésilien



d'*Hypericum hacciferum*, espèce du genre *Millepertuis*. (B.)

COAPOIBA. BOT. PHAN. (Marckgraff.) Syn. de Gomme gutte qu'on nomme aussi Caopia au Brésil. (B.)

COARRH ET COUARCH. BOT. PHAN. Nom bas-breton du Chanvre, que les Gallois nomment Cowareh évidemment identique, ce qui prouve que le Chanvre est connu de la plus haute antiquité dans les deux pays. (B.)

COASE. MAM. F. MOUFETTE.

\* COASSA. BOT. PHAN. F. TÉTRACÈRE.

COASSEMENT. REPT. BATR. Cris de la Grenouille et même des Crapauds qui respirent au moyen des muscles de la gorge et dont la voix se produit peu au dehors. Cette voix est le résultat du passage de l'air expiré et mis en vibration dans le larynx supérieur ainsi que dans des sacs qui ont leur entrée sous la gorge. (B.)

COATI. *Nasus*. MAM. (Storr.) Genre de Mammifères carnassiers plantigrades caractérisé par six incisives à chaque mâchoire, deux canines remarquables par leur excès relatif de grandeur, et par leur figure, non pas conique comme chez tous les autres Carnassiers, mais prismatiquement aplatie de dedans en dehors, de manière que ses bords, et surtout le postérieur, représentent deux tranchans; la face interne de la canine n'est relevée que par une arête très-peu saillante, de sorte que cette canine rappelle la figure d'une dent de Squal non dentelée sur ses bords; six molaires, dont les trois postérieures ont en haut trois tubercules pointus sur le bord externe et un seul au bord interne, excepté à la dernière; des trois fausses molaires, l'antérieure est conique en haut et en bas. Les trois tuberculeuses postérieures, quand elles sont un peu usées, ont la figure des correspondantes dans l'ours; seulement la postérieure est plus longue à proportion chez le Coati. Mais le caractère le plus remarquable, c'est la longueur et la mo-

bilité de leur nez qui dépasse de plus d'un pouce l'arc des incisives; et l'boutoir reçoit deux muscles plus forts à proportion que dans les Cochons; mais, dans le Coati, le sens du toucher ne réside pas au bout du groin même, comme dans le Cochon. Des trois branches nerveuses qui sortent du trou sous-orbitaire, la plus volumineuse, égale au nerf médian d'un enfant de huit ou dix ans, se distribue en pare d'Oie dans la peau nue qui se trouve entre le bout du boutoir et le lèvre supérieure (2<sup>e</sup> Mém. sur le Syst. nerv., Journ. de Phys., février, 1821).

Les Coatis ont cinq doigts à tous les pieds; les trois intermédiaires sont les plus longs, le pouce est le plus court de tous; ils ont à la plante des pieds des tubercules; dont un seul, très-grand, correspond aux trois doigts du milieu; une peau très-douce revêt ces tubercules ou pelotes. La pupille au soleil se rétrécit en une fente transversale; l'oreille est courte et arrondie; la cuisse est moins bombée qu'aux Civettes, mais la fosse ethmoïdale y est aussi ample; la langue est douce et fort extensible; le poil très-épais est partout de longueur uniforme. Avec les Ours, ce sont ceux des Carnassiers dont le régime est plus complètement omnivore. Leur corps est très-allongé en égard à la brièveté des jambes. La queue, aussi longue que le corps et de grosseur presque égale aux trois quarts de sa longueur, est ordinairement redressée en haut et droite comme celle de plusieurs Guenons. Leur tête est si longue, qu'en retranchant le boutoir au niveau des incisives, elle est encore aussi effilée que celle d'un Renard; la mobilité continuelle de leur boutoir, toujours frottant, retournant ou touchant tout ce qui est à leur portée, donne à la physionomie de ces Animaux un caractère de turbulence tout particulier. C'est avec le boutoir qu'ils fouissent, et point avec les pieds; aussi ne creusent-ils pas de terriers, quoi qu'on en ait dit. Il paraît plutôt que dans les forêts ils

nichant sur les Arbres. Si l'on y en surprend une troupe, dit Azzara, et que l'on fasse semblant de vouloir abattre l'Arbre, tous se laissent aussitôt tomber comme des masses. Ils y poursuivent les Oiseaux dont ils ravagent les nids. Ils descendent des Arbres la tête la première, au contraire de tous les autres Animaux. Ils le doivent peut-être à la faculté de retourner leurs pieds de derrière dont ils accrochent les ongles à l'écorce. Ils n'habitent que les forêts. L'expression *monte*, par laquelle on désigne une forêt en espagnol, a trompé ceux qui l'ont pris pour un Animal de montagne. Les Coatis vivent en petites troupes, plus nombreuses dans l'espèce brune. Il naît constamment, dans toutes les deux, plus de mâles que de femelles. Ces mâles, surnuméraires dans chaque troupe, sont obligés d'aller chercher fortune; ils rôdent ainsi seuls jusqu'à ce qu'ils en rencontrent une. Dans le pays, on appelle *Mondé* ou *Mondi* ces Coatis solitaires : ce nom, qui ne signifie qu'un accident de la vie de l'Animal, avait été pris pour spécifique avant Azzara. On les apprivoise aisément; ils aiment les caresses, mais sont incapables d'affection. Pleins de caprices dont les motifs ne peuvent être devinés, tout leur est suspect quand ils mangent. Ce ne sont pas des Animaux nocturnes : ils dorment toute la nuit, rarement le jour; vont flairer les excréments qu'ils viennent de faire; ils lappent comme les Chiens, et en buvant retroussent leur groin de peur de le mouiller. Les femelles sont de quatre ou cinq pouces moins longues que les mâles. Ils portent leurs alimens à la bouche, non pas en les empoignant par une ou deux mains, mais en les enfilant avec leurs ongles qui leur servent aussi à déchirer la viande en petits morceaux avant de la manger. Les Coatis sont les plus opiniâtres de tous les Animaux; cette persévérance rend surtout leur curiosité fort incommode : il est impossible de les laisser libres quand ils sont apprivoisés, car ils sont sans cesse suretant, fouissant,

retournant, déplaçant tout ce qu'ils atteignent. Dans la colère ils font entendre un aboiement très-aigu; dans le contentement, un petit sifflement assez doux. Ils n'ont pas l'habitude de ronger leur queue, ainsi que Buffon l'a prétendu.

Les deux espèces connues, de ce genre, habitent les forêts de l'Amérique méridionale. Il n'y a entre elles d'autre différence apparente que la couleur; néanmoins les nuances sont très-multipliées dans l'espèce brune. Parmi les nombreux individus de cette dernière qui ont vécu à la Ménagerie, F. Cuvier n'en a pas vu deux se ressembler. Il en a figuré deux (Mammif. lith.) qui présentent les extrêmes des nuances dans l'espèce brune : l'un était brun, l'autre jaune piqué de noir. Les uns avaient le museau absolument noir, les autres blanc; quelques-uns avaient la queue sans anneaux, d'autres enfin avaient le pelage gris blanchâtre. On voit donc que l'état sauvage et de liberté, sous un même climat, toujours uniforme, n'est pas une cause nécessaire de l'invariabilité des couleurs dans une espèce : l'espèce rousse paraît moins susceptible de ces variations; et quoiqu'il y ait quelquefois moins de différence apparente entre un Coati roux et un individu fauve de l'espèce brune, néanmoins une réciprocité d'antipathie manifeste bientôt des différences plus profondes. F. Cuvier mit ensemble un Coati roux et un Coati de l'espèce brune; quoique de sexes différens, ils cherchaient à se battre : mais un Coati brun et un Coati noir ont sympathisé dès qu'ils se sont aperçus, et ont vécu dans la meilleure intelligence, quoiqu'ils fussent du même sexe. D'après cette épreuve, F. Cuvier en fait deux espèces.

Le COATI ROUX, *Fiveria Nasua*, L.; F. Cuv., Mammif. lith. livraison 1<sup>re</sup>. La figure de Schreber, pl. 118, qui est copiée sur le Coati noirâtre de Buffon, est par hasard assez bonne. Toutes les parties du corps, excepté

le museau, les oreilles, les pattes de devant et les taches de la queue; ténues d'un roux vif et brillant, un peu plus sombre seulement sur le dos où les poils ont du noir sur le milieu de leur longueur; museau noir grisâtre en dessus, et gris sur les côtés; un cercle blanc autour de l'œil; mais il n'y a pas la ligne nasale qui marque le Coati brun; oreilles noires ainsi que le devant des pattes antérieures; taches transversales marron sur le dessus de la queue, la divisant en huit ou dix anneaux. Comme ces anneaux sont complets dans le Coati brun, la figure de Schreber, qui n'est qu'un Coati noirâtre enluminé, manque de ce caractère. Le pelage est très-épais et dur, à deux sortes de poils: il répand une odeur forte et désagréable. Il ne porte que sur les doigts en marchant; sa queue alors est relevée droite, et est renversée sous son ventre quand il est en repos. F. Cuvier a jugé que le goût, la vue et l'ouïe étaient fort obtus dans cet Animal qui est toujours à consulter son nez pour toucher et flairer. Azara donne cinq paires de mamelles à la femelle de cette espèce à qui il n'a trouvé que cinq petits.

Le COATI BRUN, *Viverra Narica*, L.; Buff., T. VIII, pl. 47 et 48; Encyc., pl. 85, fig. 2 et 3; Schreb., 118 et 119. Nous avons dit tout à l'heure combien variait la couleur de cette espèce dont F. Cuvier a fait représenter deux nuances extrêmes (Mammif. lith.); les caractères les plus constants de cette espèce dans toutes les nuances, c'est d'abord les rubans blancs qui bordent le noir du museau, et s'étendent de l'angle des yeux jusqu'à la naissance du groin; c'est encore d'avoir des anneaux complets à la queue, mais dont le nombre et la longueur varient beaucoup, comme le montrent les figures citées; ils s'effacent même tout-à-fait quelquefois, ainsi que le tuban blanc. Toutes ces combinaisons de couleurs ont dû fait distinguer dans cette espèce quatre variétés qui ne sont peut-être, comme pour le Renard Isatis, etc.,

que des états individuels qui peuvent se rencontrer dans des Coatis d'une même portée, sans se transmettre par la génération. Cette espèce n'a que trois paires de mamelles, suivant Azara qui ne lui a trouvé que quatre petits: le nombre des mamelles était constant chez ces Animaux, on devrait donc plutôt distinguer ces espèces par ce caractère fixe, que par celui si variable du pelage. (A. D. N.S.)

COATLI. BOT. PHAN. (Hernandez.) Syn. de bois de Campêche, *Haematoxylum*. V. ce mot. (B.)

\* COAVE. BOT. PHAN. (Rumph.) Syn. de Manguiier à Ternate. (B.)

\* COAXIHUITL. BOT. PHAN. (Hernandez.) Probablement le *Convolvulus corymbosus*, espèce de Liseron au Mexique. (B.)

\* COA-DEE-COOCH, ou, Syn., à la baie d'Hudson, du *Strix Asio*, L. V. CHOUETTE. (D. N. S.)

GOBAIE ou COCHON D'INDE.

*Anaema*, F. Cuvier; *Cavia*, Illg. Genre de Rongeurs caractérisé par la figure de ses quatre molaires qui ne ressemblent aucunement à celles des Cabiais, et encore moins des Agoutis. La coupe en est assez bien représentée (Buffon, T. VIII, pl. 4, fig. 7 et 8). C'est un seul tube d'émail plissé sur son côté interne en haut et externe en bas, de manière à y présenter deux prismes verticaux. Le côté opposé, d'ailleurs rectiligne, est creusé d'une rainure qui répond au prisme postérieur. Ce plissement d'un seul tube d'émail rappelle celui des Campagnols. Mais chez ceux-ci, les prismes sont alternes sur les deux côtés de la dent; et ici il n'y a de prismes que sur un seul côté. En outre, toutes les molaires se ressemblent. La fosse ptérigoïde, nulle chez l'Agouti, est ici très-profonde et large. L'aire en égale presque celle des arrières-narines sur le squelette. Comme dans les Campagnols, une gorge profonde règne depuis le condyle jusqu'au bord postérieur de la première molaire. L'os de la caisse est très-ren-

rocher est creusé, au-dessus l'entrée du nez, d'un ovale où se loge un petit front du cerveau, comme dans l'âne de la fosse ethmoïdale à celle du trou occipital, pas de circonvolution au de cet Animal. Les organes dans les deux sexes s'ouvrent d'une même fente de la cloison. Ils ont quatre doigts et trois derrière, comme les. La femelle n'a que deux mamelles le mâle. Cette disproportion le nombre des petits produisent en domesticité, pas dans l'état sauvage où le ne porte qu'une fois par an, eux petits, tandis qu'un d'oeuf, malgré l'inclemence apparente de la France, comparé à celui de la partie de leur les ont l'air d'autrinités moniment pour faire l'amour et leur aspect; sans pourtant er de leur postérité; car les cherchent ni à les protéger, éfendre. Elles meles allaient rejaillir, les chassent pour se ur ardeurs du mâle, et les bleus mâles, s'ils reviennent, aiment capables que d'un aiment, celui de l'amour. Ils at à jouir aussi souvent qu'à , et ils mangent à toute t jour et de la nuit. Au miusieuses femelles, les mâles t entre eux à un libertinage pris à tort pour une dépravation à cette espèce. Nous apart des crânes du Cobalt uchem du Cobalt sauvage, y avons pas trouvé de différs aux. Par là se trouve pément infus tout ce qu'a dit la cause organique de cette émité, dont les extrêmes melle part plus tranchée des deux état sauvage et de cette espèce, soit sous de la fréquence des notes paires pour le rapport de les portées et de celui des

On n'en connaît qu'une espèce indigène entre la Plata et l'Amazonie; c'est l'Apéréa. Il abonde au Paraguay, et se trouve jusqu'à Buenos Ayres. Il habite les broussailles et les pejonals (sortes de brousses du bord des eaux), sans entrer dans les bois, et sans creuser de terriers où il aime pourtant à se cacher. Le jour, il se tient caché, ne sort pour manger qu'au crépuscule du matin et du soir. En captivité, il devient très-squidier, même sans qu'on fasse rien pour l'appriivoiser.

L'Apéréa, long d'environ dix pouces, n'a pas de queue; quoiqu'il ait six vertèbres coccygiennes. La lèvre supérieure est fendue verticalement. Il est de la même couleur que notre Rat commun; il est blanchâtre en dessous; il a deux sortes de poils; le soyeux, en le regardant bien, est un peu rougeâtre à la pointe de la racine de l'ongle du doigt intermédiaire; au pied de derrière saillent des poils rudes plus longs que lui; il y en a aussi d'albinoz. D'après Garcilasso, liv. 8, chap. 17, il paraît qu'il a existé domestique au Pérou. Tout le monde connaît celui qui est domestique en Europe; il peut s'accoupler à huit ou six semaines; on a vu des femelles mettre bas à deux mois; les premières portées ne sont que de quatre ou cinq; ensuite elles vont jusqu'à dix ou douze. Elles peuvent mettre bas tous les deux mois. Avec un seul couple, on pourroit en avoir un millier en un an. (M. de B.)

COBALT. MIN. Métal d'un blanc d'Etain peu éclatant, à texture grenue, cassant et facile à pulvériser, possédant le magnétisme polaire, difficilement fusible, et soluble avec effervescence dans l'Acide nitrique. Sa pesanteur spécifique est de 8,6. Son Oxyde colore en bleu le verre de Bohême. Wenzel est le premier chimiste qui ait remarqué que les aiguilles de Cobalt pur se dirigeaient à la manière des aiguilles d'Acier. Tassart, et ensuite Vauquelin, ont obtenu, par l'analyse du Cobalt de Tunaberg, des

lots de ce Métal qui agissaient fortement sur le barreau aimanté. L'Oxide que l'on retire des minerais de Cobalt, est connu sous le nom de *Sulfate* et *Oxide*, fondu avec la Silice et la potasse, donne un verre bleu appelé *malte*, que l'on pulvérise pour en former la substance nommée *Alexandrite*, employée dans la coloration des pierres artificielles et dans la peinture sur porcelaine. L'empois bleu résulte du mélange de cette même substance avec l'Amidon. L'Oxide de Cobalt, dissous dans l'Acide hydrochloro-nitrique, fournit une encre sympathique très-curieuse en ce que ses caractères tracés avec cette encre disparaissent par la refroidissement, et redeviennent sensibles et d'une belle couleur bleue par la seule action de la chaleur. Le Cobalt n'a été trouvé jusqu'à présent qu'à l'état de combinaison avec l'Oxygène, l'Argent, le Fer et le Soufre. On distingue ses minerais en quatre espèces, qui sont le Cobalt arséniate, le Cobalt apatite, le Cobalt gris et le Cobalt oxide noir.

**Cobalt arséniate.** *Pather Erz-Cobalt*, W. Substance en aiguilles ou en masses terribles, d'un rouge violet tirant sur la couleur des fleurs de pêcher, pesant spécifiquement 4,5. Exposé au feu du chalumeau, elle répand une odeur d'Arsenic, et colore en bleu le verre de Borax. Ses principales variétés sont le Cobalt arséniate *scutellaire*, nommé par les Allemands *Kobaltblüthe* ou *Heure de Cobalt*, et le Cobalt *terreux* ou *pulvérulent*. On ne connaît pas encore d'une manière satisfaisante la composition de cette substance. Ses gemmes sont les mêmes que ceux de l'espèce suivante.

**Cobalt arsénical.** *Spätkobalt*, W. Substance d'un blanc argentin, aigre et cassante, à texture granulaire, dont les cristaux sont susceptibles d'être rapportés au cube. Sa pesanteur spécifique est de 7,73. Elle donne une odeur d'Ail par l'action du feu, colore en bleu le verre de Borax, et se dissout avec effervescence dans l'Acide nitrique. Le Cobalt arsénical de Rieselhof a donné à Stromeyer,

sur 100 parties, 74,2 d'Arsenic, Cobalt, 20,54; Fer, 5,42; Soufre, 0,89; Eau, 0,16. D'après cette analyse, le Cobalt arsénical serait un Bismutho de Cobalt, mêlé d'un peu de Bismutho de Fer, et sans Soufre. L'absence de ce dernier principe le distingue du Cobalt gris, dans lequel le Soufre est un des composants essentiels. Les variétés déterminables de Cobalt arsénical sont le cube, l'octaèdre, le cube-octaèdre et la *stichtite* solide, qui réunit le cube, l'octaèdre et le dodécèdre rhomboïdal. Les autres variétés sont le Cobalt arsénical *concrétionné*, en masses mamelonnées et quelquefois radiales, le Cobalt arsénical *pseudomorphique filiforme*, qui paraît devoir son origine à du Argent natif ramifié, et le Cobalt arsénical *massif*, qui est tantôt d'un blanc argentin et tendrillé, tantôt subissant d'un gris noirâtre.

Cette substance se trouve quelquefois en couches, mais le plus souvent en filons dans les terrains primitifs, tels que le Granite, le Gneiss, le Micassiste et le Schiste argileux dans les terrains de transition, et dans le Calcaire le plus ancien des terrains secondaires. Un exemple de la première manière d'être, à Wäitichen en Saxe, où le Cobalt arsénical se trouve dans le même Granite qui renferme la Chaux arséniate, et de la dernière à Sainte-Marie-aux-Mines et à Allmonat en France, où le même Minéral est en cristaux en cube-octaèdre dans une Chaux carbonatée grano-lamellaire. Les substances qui accompagnent le plus ordinairement le Cobalt arsénical sont le Bismuth natif, le Nickel arsénical et le Baryte sulfatée.

**Cobalt gris.** *Glanzkobalt*, W. Minéral d'un blanc d'Étain à texture très-lamelleuse, s'incrustant par choc du briquet, donnant une odeur d'Ail par l'action du feu, colorant en blanc le verre de Borax, et soluble dans l'Acide nitrique. Pour sa composition, 6,4. Son système de cristallisation est le même que celui du Nickel sulfaté commun, c'est-à-dire que ses

formes sont en rapport avec celles du dodécaèdre pentagonal et du cube. Il offre des joints très-sensibles parallèlement aux faces de ce dernier solide, que Haüy a adopté pour forme primitive. Le Cobalt gris de Skuterud en Norwège a donné à Stromeyer, sur 100 parties, 45,47 d'Arsenic, 33,10 de Cobalt, 20,08 de Soufre, et 3,25 de Fer. D'après cette analyse, Berzélius regarde cette substance comme formée d'un atome de Biaisénium de Cobalt et d'un atome de Bisulfure de Fer. Les formes régulières observées dans cette espèce sont le cube, l'octaèdre, le dodécaèdre pentagonal, l'icosaèdre et le cubo-icosaèdre. Ces cristaux sont remarquables par la netteté et la poli de leurs faces et par la grandeur du volume. Le Cobalt gris existe aussi en masse, mais c'est le cas le plus rare. On le trouve principalement dans la mine de Tunaberg, en Suède, où il est accompagné de Cuivre pyriteux et a pour gangue un Calcaire lamellaire.

**COBALT OXIDÉ NOIR**, *Schwarzer Erzkobalt*, W. Minéral d'un noir bleuâtre, qui devient assez éclatant lorsqu'on le frotte avec un corps dur, et qui colore en bleu le verre de Borax. On le trouve en masses ou en mamelons adhérens à la Chaux carbonatée et au Cuivre carbonaté bleu, à Kitzbûchel dans le Tyrol, à Saalfeld en Thuringe, à Schneeberg en Saxe, etc. Il est très-recherché pour la fabrication du bleu de Smalt.

**COBALT ARSÉNIATÉ terreux argenti-fère**, vulgairement *Mine d'Argent, merde d'Oie*. Masses terreuses composées d'Arséniate de Cobalt, d'Oxide de Cobalt, de Nickel et de Fer, et d'une certaine quantité d'Argent, et qui doivent leur nom vulgaire à la diversité des teintes de rouge, de vert et de brun qu'elles présentent. On a considéré ce mélange comme mine d'Argent dans quelques endroits où ce Métal y est en proportion sensible, comme à Schemnitz en Hongrie, et à Allemont en France, où la quantité d'Argent est quelquefois de treize parties pour cent. (G. DEL.)

**COBAYE**. MAM. Pour Cobaye. V. ce mot.

**COBBE** ou **KOBBOE**. BOT. FRAN. Espèce de Sumac de Ceylan. (S.)

**COBE**. BOT. FRAN. (Rumph.) Syn. malabare de *Bignonia grandis*. (S.)

**COBÉA**. *Cobaea*. BOT. FRAN. La connaissance de ce genre est due à Cavanilles qui l'a établi sur une belle Plante indigène du Mexique, dont les caractères sont : calice très-grand à cinq divisions orbiculées, et qui, en se réunissant par leurs bords, forment des angles saillans; corollecampaulée dont le limbe est à cinq lobes un peu inégaux et réfléchis en dehors; cinq étamines presque égales, déclinées et portant des anthères longues et oscillantes; stigmate trifide: capsule oblongue, trigone, couverte par le calice persistant, à trois valves et à trois loges séparées par une cloison triquètre dont les angles sont opposés aux valves; semences disposées sur deux rangs, membraneuses et ailées, à radicule inférieure. Ce genre de la Pentandrie Monogynie, que l'on avait d'abord placé dans les Polémoniacées, en a été retiré par Kunth pour être rangé parmi les Bignoniacées.

On n'en a décrit qu'une seule espèce, le **COBÉA GRIMPANT**, *Cobaea scandens* (Cav. Icon., t. p. 12, t. 16 et 17). Cette Plante, dont la connaissance ne remonte pas à plus de vingt années, est maintenant multipliée dans toute l'Europe, grâce à la facilité de sa culture. Elle décore, dans plusieurs villes, les murs et les fenêtres des plus humbles artisans, et ses fleurs, qui offrent le singulier phénomène de varier successivement de couleur, depuis le rouge brun jusqu'au violet intense, sont fort abondantes, et se succèdent pendant toute la belle saison. Son feuillage est aussi très-élégant, composé de folioles pari-pennées terminées par des vrilles. Il forme de beaux tapis de verdure qui s'étendent avec une prodigieuse rapidité, car l'accroissement des tiges, est tel qu'on en a vu des jets atteindre, en quelques mois,

usqu'à quinze mètres de longueur.  
(G...N.)

**COBEL** ou **COBELLE**. *Cobella*.  
REPT. OPH. Espèce du genre Couleu-  
vre. (B.)

**COBILAR**. ois. Syn. de l'Epeiche,  
*Picus major*, L., en Ukraine. (W...Z.)

**COBION** ET **COBIOS**. BOT. PHAN.  
*Cobium* de Pline, d'où peut-être  
*Cobio* des Portugais, qui signifie la  
même chose. Syn. d'*Euphorbia Cha-*  
*racias*. V. EUPHORBEE. (B.)

**COBITE**. *Cobitis*. POIS. Genre de  
l'ordre des Abdominaux de Linné, de  
la famille des Cyliindrosomes de Du-  
rôil, placé par Cuvier parmi les  
Malacoptérygiens abdominaux, fa-  
mille des Cyprins. Il fut institué par  
Artedj qui lui imposa le nom grec  
l'un Poisson indéterminé. Adopté par  
Linné, il a été divisé depuis en qua-  
tre : Anableps, Cobite, Misgurnes et  
Pantdule. Le second et le troisième  
paraissent ne pas différer suffisamment  
pour ne pas être confondus de nou-  
veau, et Cuvier a cherché vainement  
des dents qu'on attribuait à l'un d'eux  
et qui avaient motivé une distinction  
que ne confirme pas l'observation. Les  
caractères du genre dont il est ques-  
tion sont : une seule dorsale ; bou-  
che petite, garnie de barbillons et  
dépourvue de dents ; yeux rapprochés  
au sommet de la tête ; corps allongé,  
cylindracé, revêtu de très-petites  
écailles difficiles à voir, et d'une peau  
gluante. On en connaît quatre es-  
pèces indigènes de la France.

La **LOCHE FRÂNCHÉ**, *Cobitis Barba-*  
*ula*, L., Gmel., *Syst. Nat.* T. XIII,  
pars 2, p. 1348 ; Bloch, pl. 31, f.  
1 ; Encycl. Pois., pl. 61, f. 241 (mé-  
liocre). Petit Poisson qui ne parvient  
guère qu'à quatre ou cinq pouces de  
longueur, et qui vit dans les ruis-  
seaux où la bonté de sa chair le fait  
chercher. Les eaux courantes lui  
sont ennemies ; il meurt dès  
qu'on l'en ôte, ou lorsqu'on le place  
dans des vases ; cependant, à force de  
précautions, un roi de Suède, Pré-

déric I<sup>er</sup>, parvint à le faire transpor-  
ter dans ses Etats où il a été natura-  
lisé, non pour enrichir la France du  
pays, mais la table du souverain. Les  
dépouilles de la Loche franche sont  
du nombre de celles qu'on a distin-  
guement reconnues dans les empreintes  
fossiles des Schistes d'Enningen près  
de Constance. L'espèce suivante s'y  
voit aussi. La Loche franche a le dos  
et la tête d'un brun livide, les na-  
geoires grises, ornées de lignes et de  
petits points plus foncés ; le dessous  
est d'un blanc sale, la ligne latérale  
droite ; la tête lisse et aplatie est mu-  
nie de six barbillons. N. 3, D. 8 ; P. 8-  
12, V. 7-3, A. 6-8, C. 16-17.

La **LOCHE DE RIVIÈRE**, *Cobitis Ta-*  
*enia*, L., Gmel., *loc. cit.* ; p. 1349 ;  
Bloch, pl. 31, f. 2 ; Encycl. ; pl. 61,  
f. 242. La tête de ce Cobite est comme  
tronquée et penchée en avant, com-  
primée sur les côtés et marquée de li-  
gnes brunes. Elle est munie de six  
barbillons. La Loche de rivière, or-  
née de taches sur les nageoires, brune  
en dessus, jaunâtre sur les côtés du  
corps avec des marques noires, ac-  
quiert jusqu'à six pouces de longueur ;  
une sorte d'aiguillon mobile et four-  
chu, placé en avant de l'œil, la ca-  
ractérise. Elle habite entre les pierres  
et les cailloux au fond des rivières, et  
sa chair est peu estimée. N. 3, D. 7-10,  
P. 7-11, V. 7, A. 6-9, C. 16-18.

La **LOCHE DES ÉTANGS**, *Cobitis fos-*  
*silis*, L., Gmel., *loc. cit.* ; p. 1351,  
Bloch, pl. 31, f. 1 ; Misgurn fossi-  
le, Lacép., *Pois. T. v*, p. 17 ; Misgurne,  
Encycl. *Pois.*, pl. 61, f. 243. Cette  
espèce habite les eaux tranquilles, les  
étangs, les grands fossés, dans la va-  
se desquels elle s'enfonce profondé-  
ment et vit très-long-temps, soit  
que leurs eaux se gèlent ou s'épuisent.  
Lorsqu'il doit faire de l'orage, elle  
vient s'agiter à la surface où ses cou-  
leurs, sa forme et son agilité la font  
remarquer. On peut la conserver très-  
long-temps dans des vases de cristal  
où elle forme un baromètre naturel.  
Trop de jour lui est contraire, elle  
craint moins le frais que la chaleur.  
Sa figure, légèrement anguilliforme,

est rehaussée de couleurs dorées, élégamment réparties en bandes longitudinales parallèles, sur un fond brunâtre, très-foncé vers le dos. Dix barbillons, mollement agités, rayonnent autour de sa bouche en lui donnant un singulier aspect. Elle atteint jusqu'à un pied de long. Sa chair est médiocre et sent la vase; il y a des pays où l'on croit que cette chair est vénéneuse ou au moins malsaine. On prétend que le Cobito avale de l'air et qu'il le rend, par l'anus, échangé en Acide carbonique. Cette observation a été contestée. B. 3-4, D. 6-7, P. 9-11, V. 6-8, C. 15-16.

**COBITE A TROIS BARBILLONS**, *Cobitis trichrhata*, Lacép., Poiss. T. V, p. 15. Nous devons au citoyen Noël, dit le savant professeur, la connaissance de ce Cobite qui se plaît dans les ruisseaux d'eau courante et vive des environs de Rouen, et que l'on trouve, vers l'équinoxe du printemps; gros et plein d'œufs et de lait; sa partie supérieure est d'un roux brun et parsemé de taches arrondies; l'inférieure est d'un fauve clair, ainsi que les nageoires. La dorsale et la nageoire de la queue sont pointillées de noirâtre le long de leurs rayons dont Lacépède n'indique pas le nombre. (B.)

**COROLT**, nom. Pour Cobalt. V. corail.

**CO-BOUYI**, BOT. PHAN. Syn. cochinchinois de *Sphæranthus cochinchinensis*, Lour., Plante qui croît dans les jardins et dans les champs de la Chine. Son suc passe pour adoucissant. (B.)

**COBRA DE CHIAMETLA**, REPT. on? *Chamysla* est le nom d'une montagne du Chili, Cobra une contraction de Colebra, Couleuvre. On désigne sous ce nom une espèce de Serpent indéterminé de l'Amérique méridionale, aussi appelé Vico de Chiametla. On appelle Cobra de Capello le Serpent Naja. (B.)

**COBRÉSIE**, *Cobresia* et *Kobresia*. BOT. PHAN. Genre de la famille des Cypéracées et de la Monocotylée Tri-

drie, L., établi par Willdenow qui lui a donné les caractères suivants: Plante monoïque; épi formé d'éailles imbriquées renfermant des fleurs mâles et femelles mêlées, et le plus souvent géminées sous une même écaille. Dans quelques fleurs femelles l'écaille est double: l'une plane, et l'autre intérieure et renflée, enveloppant l'ovaire; trois stigmates; cariopses triangulaires, dépourvues du godet qui entoure celles des Carex. V. LAICHE.

L'auteur de ce genre lui a rapporté trois espèces dont deux sont indigènes des Alpes et des Pyrénées. L'une, qui a reçu le nom de COBRÉSIE SCIRPE, *Cobresia scirpina*, Willd., est le Carex *Bellardi* de la Flore Française, 1<sup>re</sup> édition. Outre ce synonyme, cette Plante en a reçu un grand nombre d'autres que nous ne rapporterons pas ici, d'autant plus qu'on l'a promouée, pour ainsi dire, dans plusieurs genres de Cypéracées. Nous citerons cependant l'*Elyna spicata*, nom sous lequel Schrader et Gaudin ont parlé de cette Plante, et que Ræmer et Schultes ont adopté en la plaçant dans la Triandrie Monogynie. V. ELYNE. Elle se trouve dans les prés humides des Alpes depuis la Styrie et la Bavière jusqu'en Dauphiné.

LA COBRÉSIE GAREN, *Cobresia caricina*, Willd., resterait seule dans le genre, si on admettait l'*Elyna* de Schrader. C'est une petite Plante qui a tout l'aspect extérieur d'un Carex, dont les feuilles radicales sont très-étroites, roides et un peu glauques; la hampe terminée par deux ou trois épis très-rapprochés et qui sortent chacun d'une bractée ovale, membraneuse et roussâtre. Elle croît sur le Mont-Cenis près du lac.

L'espèce exotique que Willdenow a adjointe à son genre, appartenant aux *Elaecharis*, selon Ræmer et Schultes (*Syst. Veg.* II, p. 156), s'appelle le Carex *hermaphrodita* de Jacquin. Plante qui habite les lieux humides près Caracas. (B.)

**COCA**, BOT. PHAN. Espèce fort in-



dressante, du genre *Erythroxylum*,  
ce mot. (B.)

**COCAGNE.** BOT. PHAN. V. PASTEL.

**COCALIA.** MOLL. Aristote (Hist. des Animaux, liv. 4, ch. 4) désigne sous ce nom une espèce de Mollusque à coquille qui paraît voisine du limacon, mais qu'on ne saurait rapporter avec certitude à aucune espèce connue. (G.)

**COCARDE.** *Tentaculum.* INS. Nom donné par Geoffroy et quelques entomologistes aux vésicules rouges que font sortir des parties latérales de leur corps certains Insectes du genre Malachie. (AUD.)

**COCARDE DE MER.** ÉCHIN. Les pêcheurs des départemens de l'ancienne Normandie donnaient ce nom aux Astéries plates à bords presque entiers, principalement à l'*Asteria membranacea* de Linné. (LAM. X.)

**COCARDEAU.** BOT. PHAN. Variété à très-grandes fleurs doubles de Jukenne (B.)

**COCASSE.** BOT. PHAN. Variété de laitue cultivée. (B.)

**COCATRE.** ORN. Nom du Coq auquel on a retranché un testicule. (DR. Z.)

\* **COCATTI COZTIC.** BOT. PHAN. Hernandez.) Syn. de Tagète. V. ce mot. (B.)

\* **COCCALON.** BOT. PHAN. L'un des noms que Dalechamp donne aux cônes du Pin. (B.)

\* **COCCHOU.** POIS. (Rondelet.) L'un des noms vulgaires du Rouget sur les côtes des États romains. V. TRIGLE. (B.)

**COCCIGRUE.** BOT. CRYPT. Nom vulgaire donné à diverses Pezizes, Helvelles, etc., et appliqué par Paulet à un groupe de Champignons qui renferme les Plantes les plus différentes; ainsi sous le nom de Coccigrues proprement dites, il réunit des Helvelles, des Pezizes, des Mérules et le genre

Nidulaire de Bulliard (*Cyathus*, Pers.) Les deux premiers appartiennent aux Champignons à membrane fructifère supérieure; les Mérules ont cette membrane en dessous, et les Nidulaires n'appartiennent même pas à la vraie famille des Champignons, mais aux Lycoperdacées. (AD. B.)

**COCCIMELEA.** BOT. PHAN. Selon Bauhin, c'est ainsi qu'on a désigné le *Prunus amygdalina* cité par Pline; lequel semble être une variété du *Prunus domestica*, L. (B.)

**COCCINELLE.** *Coccinella.* INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Trimères, établi par Frisoh, adopté ensuite par Linné, Geoffroy, Fabricius et tous les entomologistes. Lestrie le plaça d'abord (*Gener. Crust. et Ins.* T. III, p. 74, et Considér. génér. p. 340) dans la famille des Coccinellides, et le rangea plus tard (Règn. Anim. de Cuv.) dans celle des Aphidiphages, en lui assignant pour caractères: tête petite et placée dans une échancrure ou cavité; antennes courtes, composées de onze articles dont le premier gros, les autres grêles, les trois derniers un peu en massue; bouche composée de deux lèvres dont la supérieure arrondie, coriace, et l'inférieure avancée, de deux mandibules courtes, cornées, simples, de deux mâchoires cornées, ciliées; et de quatre palpes inégaux, dont les maxillaires sont terminés par un article très-grand, sécuriforme; corset convexe plus étroit que les élytres; celles-ci très-convexes, coriaces, légèrement rebordées et recouvrant deux ailes membraneuses repliées; trois articles aux tarses, dont les deux premiers en cœur et garnis de bristles; corps hémisphérique. — Ces Insectes se distinguent essentiellement des Chrysomèles et des Euryctes par le nombre des articles des tarses, qui ne s'élève pas au-delà des trois. Elles partagent ce caractère avec les Eumorphes, les Endomyques et les Dasyctères, mais elles en diffèrent par la brièveté de leurs antennes, par la forme de leur corps et aussi par la

développement du dernier article des palpes, ainsi que des cornues.

Ces deux genres ont des caractères des Coccinelles, à part d'une idée de leur forme extérieure. Elles ont une forme hémisphérique, ce qui est dû à la convexité des élytres qui se joignent exactement par les bords en contact; au contraire la face inférieure de leur corps est exactement plane; les pattes sont très-courtes et ne dépassent guère pendant la marche la circonférence du corps; dans le repos, elles se replient exactement contre le corps; si on les inquiète, elles laissent suinter par les articulations des pattes une humeur jaunâtre, ressemblant au sucrumen des oreilles par l'amertume, ainsi que par la couleur, et ayant une odeur spéciale assez semblable à celle de la Pomme de terre crue. Latreille suppose qu'il doit exister au dedans de la jointure une ouverture pour la sortie de ce liquide. Cette présomption n'a pu être encore vérifiée. Nous devons à Léon Dufour des observations curieuses et très-exactes sur la composition anatomique de la Coccinelle. Ce savant entomologiste a découvert dans une espèce de ce genre (*Coccinella septempunctata*) un appareil salivaire composé de trois paires de vaisseaux diaphanes, d'une ténuité plus que capillaire, plus ou moins entortillés et se portant de l'arrière-bouche jusque dans l'abdomen, où flottent leurs extrémités. Malgré toute l'attention et la patience dont nous le connaissons capable, il n'a pu y découvrir aucune grappe, aucune glande, aucun organe essentiellement sécréteur. Soumis à une forte lentille du microscope, ces tubes ou vaisseaux flottans présentent une structure très-analogue à celle des conduits salivaires des Hémiptères et des Diptères. Ainsi l'on aperçoit à travers les parois pellucides du vaisseau un sac tubuleux, linéaire, semblable à celui des sécrétions excrémentielles des Carabiques. Le conduit digestif dépasse à peine la longueur du corps; il est par conséquent presque droit. L'œsophage est ren-

fermé dans la tête, de manière que pour le mettre en évidence, il faut tirailler en arrière le tube alimentaire. L'estomac n'est précédé d'aucun gésier ni jabot. Il est bilobé à son origine qui touche à la tête et reçoit l'œsophage dans l'échancrure formée par ces lobes. Plus long que tout le reste du tube, il est très-fine et dilatable. Dufour l'a trouvé rempli d'une pulpe tantôt noirâtre, tantôt jaune. A l'endroit de sa terminaison, on voit des vaisseaux biliaires au nombre de six. Assez grosses, vu la petitesse de l'Insecte, leurs insertions à l'estomac comme au cœcum, sont toutes six distinctes et isolées. Ces vaisseaux d'un aspect très-varié ont toujours paru diaphanes. Après la première insertion des vaisseaux biliaires, qui indique la limite de l'estomac, on voit un intestin fort court suivi d'un cœcum légèrement renflé et d'un rectum bien marqué. Les larves des Coccinelles vivent de Pucerons. On les rencontre sur toutes les Plantes qui servent de nourriture à ces petits Animaux. À l'état parfait, elles passent l'hiver en se blottissant dans des fentes ou encoignures de murailles, et s'accouplent au printemps. Les mâles paraissent s'unir avec des femelles d'espèces différentes. On ne sait pas encore ce qui résulte de ces accouplements, et s'il en naît des Hybrides. C'est un point de recherche qui ne laisserait pas que d'offrir quelque intérêt, et qui, s'il était convenablement examiné, conduirait certainement à d'importans résultats. Les œufs sont ordinairement jaunes, et répandent une odeur assez désagréable. Les Coccinelles les pondent indifféremment sur toutes les Plantes qu'elles habitent. Au bout de peu de temps, il en naît des larves que Réaumur (Mém. Ins. T. III, p. 394, tab. 31, fig. 14-19) a étudiées dans leurs métamorphoses. Nous emprunterons à ses Mémoires et à l'Encyclopédie méthodique (T. VI, p. 37) une partie des détails qui vont suivre. Les larves sont très-différentes de l'Insecte parfait, et ne ressemblent à rien moins qu'à une portion de

hère. Leur corps est plat, c'est-à-dire qu'il a bien plus de largeur que d'épaisseur. Sa partie postérieure le termine presque en pointe, et il en sort souvent un mamelon charnu et assez gros, que l'animal applique sur l'opercule postérieur, et qui lui sert de patte avant-droite. On compte douze anneaux qui sont tantôt raboteux à cause des tubercules épineux qui les garnissent, tantôt simplement épineux, et d'autres fois tout-à-fait lisses. La tête unie de petites antennes présente une bouche composée de deux lèvres, et deux mâchoires et de quatre barbillons. Les pattes, au nombre de six, sont assez rapprochées de la tête; elles ont très-remarquables; d'abord en ce que chacune est recourbée en arc, dont le plan se trouve dans celui d'un anneau, la convexité étant en dehors du corps, et ensuite parce qu'elles offrent une organisation toute particulière. Elles ont trois articles : le premier ou celui de la base est court et gros, le second est long et cylindrique; le troisième est semblable au précédent en grosseur et à peu près en longueur. Le bout de la patte est aussi gros que le reste, et terminé par un crochet unique. Sur les second et troisième articles des pattes, il y a plusieurs poils, les uns longs et les autres courts; et ce qu'il y a de très-remarquable, c'est que les petits poils qui se trouvent en grand nombre vers l'extrémité de la patte et à son côté interne, sont plus gros au bout que dans leur étendue, et qu'ils paraissent terminés en une petite masse allongée. Les poils en massue servent sans doute à l'Animal pour se fixer; toujours est-il certain qu'il adhère très-fortement aux corps sur lesquels il marche. Les Pucerons sont l'unique nourriture des Coccinelles; elles les saisissent avec les deux pattes antérieures, et les portent à la bouche. Lorsque les larves ont acquis leur grandeur, elles se collent par le derrière contre quelque feuille, se dépouillent et se transforment en une nymphe dont la figure est déjà plus raccourcie que n'était celle du Ver. L'extrémité de l'abdo-

man de cette nymphe reste ordinairement engagée dans la dépouille; enfin la nymphe se transforme au bout de six, huit, dix, quatorze et même quinze jours, en Insecte parfait. Toutes les parties du corps sont d'abord incolores, molles et flexibles, mais elles ne tardent pas à s'endurcir et à se colorer.

Les larves des Coccinelles sont très-communes et très-utiles à l'agriculture par la destruction prodigieuse qu'elles font des Pucerons. A l'état parfait, elles sont communes vulgairement sous le nom de *Bête à Dieu*, *Varcho à Dieu*, *Bête de la Pierge*, etc. Elles ne vivent plus alors qu'aux dépens des feuilles des Plantes, et peuvent nuire; à raison de leur nombre, aux produits des récoltes. On cite comme dévorant quelquefois les Luzernes, celles à cinq points et à vingt points. Bosc a vu en Amérique la Coccinelle boréale ne laisser que les nervures des feuilles dans les plantations de Melons. Le nombre très-grand des espèces a engagé quelques auteurs à les grouper dans plusieurs divisions qui ont pour base la couleur des élytres ou la forme de tout le corps. Linné a établi trois sections : la première comprend les espèces qui ont les élytres rouges ou jaunes, sans taches ou avec des taches noires; la seconde embrasse toutes celles dont les élytres sont pareillement ou rouges ou jaunes, avec des taches blanches ou d'un jaune très-clair. Dans la troisième sont placées les espèces à élytres noires, sans taches ou avec des taches rouges, jaunes ou blanches. Illiger établit quatre familles : 1<sup>o</sup> les *Seymnes* d'Herbst, dont les élytres sont velues et très-petites; 2<sup>o</sup> les *Oblongues* qui sont lisses, déprimées, avec le corset arrondi et plus étroit que les élytres; 3<sup>o</sup> les *Hémisphériques* ou bombées, à côtés du corset distincts du bord postérieur tronqué en travers; 4<sup>o</sup> les *Cassidées* qui sont lisses, dont le corset est court, transverse, en croissant, et dont les élytres sont en cœur, non bordées et échancrées en devant, pour recevoir

volet. Toutes ces divisions sont bien faibles, mais il faut observer qu'elles sont très-utiles pour arriver à une plus déterminée. Nous nous bornons à citer quelques espèces : *COCINELLE BIFIDOCOLLE* (Cocc. bif. de Linné et de tous les auteurs), cette espèce est représentée par nous (les. cit. T. III, pl. 61, 6).

*COCINELLE CINQ POINTS*, *Cocc. punctata* des auteurs, ou la petite rouge à cinq points noirs effacés (Hist. des Ins. T. I, p. n.º 2). (Mém. de l'Acad. des Sciences, 1758, p. 679, n.º 11).

*COCINELLE TRIMONTEÉE*, *Cocc. trimontea* de Linné et de Geoffroy (Mém. de l'Acad. des Sciences, 1758, p. 679, n.º 11). Pour les autres espèces; Fabrie (Olivier) (Encycl. méthodique, I, p. 49, et Hist. Nat. des Coq. T. VI, p. 990), Dejean (Catal. des Coq., p. 130), Paykull (Fauna Entom., Illiger (Ins. Prus.), et (Géogr. Entom.), Panzer (Fauna Germ.), etc. (A. D.)

*CCISUS*. BOT. FRAN. Trois Plant. orient. vulgairement ce nom à l'Inde ou leur racine est oyée comme vomitif. La plus rare paraît être le *Ruellia tuberosa*. (B.)

*CCISUS*. ORS. Pour *Coccysus*. mot.

*CCIX*. ZOOL. V. QUEUE et LETTE.

*COCCO*. POIS. (Rondelet.) Nom de la *Trigla Lucerna* sur quelques parties des côtes de la Méditerranée. TRIGLE. (B.)

*CCO*. BOT. FRAN. Syn. de Gouet amaique. (A.)

*COCCOTPSILE*. *Coccotpsila*. BOT. Et non *Coccolpium*. BOT. Famille des Rubiacées de la Tétrandrie Monogynie, ce genre a été fondé par Pavon dans ses Plantes de la Jamaïque, et adopté par Linné, Jussieu, et tous les botanistes modernes auteurs de la Flore du Pérou, et Pavon, l'ont reproduit sous le nom de *Conzalia*, qui a été

transporté à d'autres Plantes. Il faut donc aussi transporter ce genre de Pavon d'Amblet au *Bellardia de Schomburgk*, ainsi que le *Lyginum de Linné* à celle de du Rois, d'opinion de Kunth qui a décrit deux espèces de ce genre (*Mém. de l'Acad. des Sciences, 1758, p. 679, n.º 11*). *Nov. Gener. Plant. exquir. 3, p. 405*, et auquel nous empruntons les caractères génériques suivants. Dans un thésaurus récent sur la famille des Rubiacées, le professeur Al. J. de Jussieu n'adopte pas la réunion du *Conzalia*, et encrevoit celle de *Fernalia*, Gussone, et propose pour Willdenow. En effet, ces deux genres, si distingués par la forme inférieure de son fruit, la grandeur des corolles et les tiges arborescentes ou surplis, nous allons exposer les caractères du *Coccolpium* tels que Kunth les a exprimés; par leurs descriptions, avec ceux des autres genres voisins, ils serviront à établir le jugement que l'on doit porter sur la réunion de chacun d'eux, beaucoup mieux que ne le ferait la citation des opinions divergentes de tous les auteurs : calice adhérent, quadripartite et persistant; corolle infundibuliforme ou hypocratériforme, à limbe quadrifidé; quatre étamines insérées sur la gorge de la corolle, et incluses ou à peine exsertes. (C'est ici une des différences de ce genre avec le *Fontana*; mais ne doit-on pas considérer, comme une inexactitude du peintre, l'exsertion des étamines dans la figure qu'Amblet a donnée du *Fontana guianensis*?) Style unique terminé par un stigmate bifide; baie ovée couronnée par le calice persistant de la figure d'un d'un pois et de couleur blanche ou blanchâtre; les loges polyépimées; sometimes non botellées, anguleuses et entières. (A. D.)

Les Plantes de ce genre sont herbacées et rampantes. Elles ont des fleurs en capitules, axillaires ou terminales, involuées et pédonculées. Elles sont indigènes de l'Amérique du sud, des Antilles, et principalement du Pérou. Aucune espèce ne se fait remarquer par ses usages ou par les agréments qu'elle procure. (O. N.)

ix aquatiques et montueux de l'Europe, depuis l'Angleterre jusque dans le midi de la France. Ses feuilles radicales sont très-grandes (semblables à celles de la Patience aquatique), longues et créées, et celles de la tige sont lancéolées, dentées ou incisées. On la cultive dans les jardins potagers et médicaux, sous les noms de **PORT SAUVAGE**, **CRAN DE BRETAGNE**, etc. Sa racine, qui est très-grosse et charnue, contient, en grande abondance, le principe volatil particulier aux Crucifères, et dans lequel résident toutes leurs vertus. Les pharmaciens l'emploient en grande quantité dans leurs préparations antiscorbutiques; ils en font la base du sirop antiscorbutique, de l'Alcool ou du puit de Cochlearia, et de plusieurs autres. C'est aussi un assaisonnement populaire, et un stimulant comme la Moutarde.

Dans la troisième section, la plus nombreuse de toutes, puisqu'elle renferme dix-huit espèces, se trouve la *Cochlearia officinalis*. De Candolle lui a donné le nom de *Cochlearia*, en la caractérisant par sa silicule ovée ou allongée, non échancrée au sommet, surmontée par le stigmaté presque sessile. Le **COCHLEARIA OFFICINALIS**, *Cochlearia officinalis*, L., a les silicules ovées, de la moitié plus courtes que les pédicelles, les feuilles radicales pétiolées, cordées en forme de cuiller (d'où le nom d'**HERBE AUX CUILLES**), dans que porte vulgairement la Plante; celles de la tige sont ovales, dentées et anguleuses. Ces feuilles possèdent, au plus haut degré, les propriétés toniques et antiscorbutiques des Crucifères; elles sont sialagogues, et stimulent particulièrement la membrane muqueuse des organes gastriques. Cette Plante croît naturellement sur le littoral des mers de l'Europe septentrionale; on dit aussi qu'elle se trouve dans le Jura et sur les monts Crapacks. Malgré cette vulgarité du *Cochlearia officinalis*, il n'est pas certain que nous ayons une description très-fidèle de son type; la culture de cette Plante pouvant bien, selon De Can-

dolle, avoir entraîné la confusion de plusieurs espèces voisines. Les autres *Cochlearias* de cette section, parmi lesquels nous ne ferons que nommer les *Cochlearia anglica*, *C. danica* et *C. pyrenaica*, indigènes de la France, sont répandus dans les contrées boréales de l'ancien continent; et principalement dans la Sibérie.

La quatrième section (*Ionopsis*, D. C.) ne renferme qu'une seule espèce, la *Cochlearia acaulis*, Desf., Plante dont la silicule est presque ronde et échancrée obtusément au sommet, et les fleurs de couleur rose lilas. Elle est fréquente en Portugal, près Lisbonne, et dans l'Afrique septentrionale. Cette section a des caractères qui rapprochent les *Cochlearias* des *Thlaspi*, et établissent ainsi un passage des *Alyssagées* aux *Thlaspidées*.

Enfin, De Candolle range les cinq espèces restantes à la fin du genre, parmi les *Cochlearias* trop peu connus pour être caractérisés. (C. N.)

**COCHLEARIIUS.** oia. (Brisson.) Syn. de Savacou, *Cancroma Cochlearia*, L. F. SAVACOU. (DR. 2.)

\* **COCHLIDIIUM.** ROT. CRÉT. (*Fougères.*) Kaulfuss a décrit, sous ce nom, dans le Journal de Pharmacie de Berlin (*Berlin. Lehrbuch für pharmaz.* XX-XXI), un genre de Fougères. Nous ne connaissons ni ses caractères ni les Plantes qu'il renferme, n'ayant pas pu nous procurer cet ouvrage à Paris. (AD. B.)

**COCHLITES.** MOLL. FOSS. F. **COCHILITES.**

\* **COCHLOHYDRE.** *Cochlohydra*, MOLL. Lamarck, en établissant, pour l'*Helix pectus* de Linné et pour quelques autres espèces, son genre *Amphibulime*, avait bien senti les différences qui séparaient ces Coquilles des autres *Helices* avec lesquelles on les avait confondues. Avant Linné, on les plaçait parmi les *Buccins*. C'est ainsi que Lister (*Anim. Angl.* pag. 140, tab. 2, fig. 24) et Gualtieri (*Ind.*, pag. et tab. 5, fig. 4) lui donnèrent d'abord cette dénomination. Linné, considérant sans doute la forme des tentacules et la manière de

vivre de l'Animal, les plaça dans le genre *Helix* sous le nom d'*Helix pectris* (Lin., Gmel., p. 3659, n° 135). Müller (*Verm. terres. et fluvi.*, pars 2, pag. 97, n° 296) la nomma *Helix succinea*, et Geoffroy (Conchy. pag. 60, n° 22) lui donna le nom d'*Amphibie* ou d'*Ambrée*. Bruguière (Encycl., p. 508, n° 18) fut le premier qui les sépara du genre *Helix* pour les placer dans son genre *Bulime*, où ils ne se trouvaient pas en rapport avec le plus grand nombre de Coquilles placées dans ce genre. Lamarck, avant de connaître le genre *Amphibulime* de Draparnaud, avait établi sous ce même nom le genre dont il s'agit pour l'abandonner plus tard (Anim. sans vert. T. VI, pars 2, p. 154) et adopter le nom générique d'*Ambrette*, *Succinea*, Drap. (*Hist. Moll. terr. et fluvi.*, pag. 24 et 58). Férussac (*Tah. Syst. des Moll.*, p. 26) remit les *Ambrettes* dans le genre *Helice* pour en faire son sous-genre *Cochlohydre* qui peut être caractérisé ainsi : Animal plus gros que sa coquille, muni de quatre tentacules dont les supérieurs plus longs sont oculés au sommet; les inférieurs très-courts, à peine visibles; coquille ovale ou ovale-conique; ouverture simple, entière, plus longue que large, à bord droit, tranchant, non rétréci, s'ouvrant inférieurement à une columelle lisse, amincie, tranchante en filet solide; point d'opercules.

Férussac (Hist. des Moll.) a fait connaître plusieurs espèces nouvelles qu'il a fait figurer avec une rare perfection, pl. XI, A, fig. 1, 4, 5, 6, et pl. XI, fig. 11, 12, sous les noms suivans : *Helix* (*Cochlohydra*) *tigrina*, *ovalis*, *australis*, *campestris*, *angularis*, *sulcata*. Nous renvoyons à l'ouvrage même de ce savant pour toutes ces espèces, ne voulant en caractériser que trois dont deux se trouvent en France, et une autre plus généralement répandue dans les collections.

**AMBRÉE** (**AMBRETTE**). *Succinea amphibolia*, *Helix pectris*, Lin. (Gmel. p. 3659, n. 135); l'*Ambrée*, Geoffroy

(Conchy. pag. 60, n. 22); *Bulim succineus*, Brug. (Encycl., n. 18); *Helix pectris*, Férussac (Hist. des Moll., pl. XI, fig. 4 & 5 et 13, et pl. XI, A, fig. 7 & 10). Draparnaud avait fait connaître seulement trois variétés de cette espèce; Férussac en a été le nombre à neuf qui sont toutes figurées dans son ouvrage, et qui viennent des différentes régions du globe. Malgré ces nombreuses variétés, on peut néanmoins distinguer cette espèce, car la coquille est ovale oblongue, extrêmement valve, perlucide, d'une belle couleur ambre: la spire est courte, de trois tours seulement; l'ouverture est presque verticale, élargie inférieurement; le péristome est simple; elle est longue de neuf lignes et quelquefois plus. On la trouve dans les lieux frais, au bord des eaux douces, dans presque toutes les parties d'Europe, l'Amérique septentrionale, le Transjordan, etc., etc. **AMBRÉE** (**AMBRETTE**). *Succinea oblonga*. Cette espèce a été décrite pour la première fois par Draparnaud (Hist. des Moll., p. 26). Férussac (*loc. cit.*) l'a nommée *Helix oblonga*. Elle se distingue de la précédente par un tour de spire de plus, par ses sutures profondes, son ouverture ovale; ses stries longitudinales; elle est presque opaque dans toute son étendue, et d'un blanc grisâtre; l'animal présente aussi la même couleur; le péristome est simple, quelquefois garni d'un petit bourrelet intérieur. Cette espèce, longue de onze lignes, se trouve au bord des fontaines et des ruisseaux, dans le midi de la France. **AMBRÉE** (**AMBRETTE**). *Succinea stellata*. Cette espèce que Bruguière (Encycl., n. 18) avait décrite fut connue sous le nom de *Bulim patula*, fut indiquée de nouveau par Lamarck (Ann. du Mus., vol. VI, pl. 56, fig. a, b, c) sous le nom d'*Amphibulime stellata*, et Férussac (Hist. des Moll., pl. XI, fig. 14 & 16 et pl. XII, A, fig. 12, 13, 14) l'a rendu le nom spécifique de Bruguière. On la met dans son genre *Helix*, *Helix patula*. Coquille plus grande

e les deux précédentes, ayant une ouverture très-grande et oblique, ornée de stries obliquement transverses; la spire est courte et rouge, le reste de la coquille est jaunâtre; péristome simple; elle est longue de quatorze lignes et large de neuf; ces dimensions donnent une idée de l'ampleur de l'ouverture. On la trouve à la Guadeloupe dans les lieux frais. (D. H.)

**COCHLOIDES.** *Cochlostylis*. MOLL. Brug. divise le genre *Helix* en deux parties bien distinctes. La première renferme toutes les Coquilles dont les tours sont enveloppans (*Volutes*), les *Helicoides*; la seconde toutes celles dont la spire est plus ou moins allongée (*Evolutes*), les *Cochloides* qui comprennent :

Les **COCHLOSTYLES**, *Cochlostyla*, divisées en deux groupes : 1° le péristome réfléchi, les *Lomastomes* dont quelques espèces se rapportent au genre *Maillois* de Draparnaud et *Bulime* de Brug. ; 2° le péristome simple, les *Aplustomes* qui renferment également des espèces du genre *Bulime* de Brug.

Les **COCHLITOMES**, *Cochlitoma*, divisées en deux groupes : 1° les *Rugosans*; 2° les *Agathines* qui sont comprises des *Bulimes* de Brug. et des *Agathines* de Montf. et de Lamk.

Les **COCHLICOPES**, *Cochlicopa*, auxquelles il avait donné le nom de *Cochloides*, et qui renferment dans deux groupes les *Polyphèmes* de Montf. *Bulimes* de Brug. et les *Styloides*, dont le *Bulimus acicula* fait partie.

Les **COCHLICELLES**, *Cochlicella*, qui renferment parmi les *Bulimes* de Brug. et de Draparn., les espèces dont le dernier tour est moins long que tous les autres réunis; tels sont les *Bulimus ventricosus*, *acutus*, *decollatus*, etc.

Les **COCHLAGENES**, *Cochlagena*, qui sont encore comprises des genres *Bulime* de Brug. et *Auricule* de Lamk.; distinguées des précédentes en ce que le dernier tour est plus grand que tous les autres réunis. Elles sont divisées en six groupes : les *Ombilicifères*, comme le *Bulimus Kambei*; les *Perfor-*

rées, comme le *Bulimus guadalupensis*; les *Lomastomes* qui renferment plus particulièrement le genre *Bulime* de Lamk., comme les *Bulimus citrinus*, *inversus*, *Colamba*, *interruptus*, etc.; les *Helicifères* qui sont presque toutes des espèces nouvelles rapportées des îles Sandwich; les *Stomatoides* qui renferment encore des *Bulimes* de Brug. et les *Auricules* de Lamk.; comme le *Bulimus Auris Lapoffi*, *Auris Silex*, etc.; enfin, les *Dontostomes* qui sont des *Maillois* de Draparn., des *Bulimes* de Brug., comme les *Bulimus Pupa*, *tridens*, *quadridens* de Brug. (*Pupa*, *Drap.*, *Lamk.*).

Les **COCHLODONTES**, *Cochlodonta*. Les Coquilles de ce sous-genre se distinguent de celles du précédent par la forme de la bouche qui est généralement aussi haute que large, et par les dents ou lames qui sont placées sur son pourtour; le péristome non continu. Ces caractères conviennent aux *Maillois* de Lamk. qui y rentrent presque tous. Les *Cochlodontes* sont partagées en deux groupes, les *Maillois* et les *Grenailles* qui sont encore des *Maillois* dont la coquille est plus fusiforme.

Les **COCHLODONES**, *Cochlodona*. Ce quatorzième sous-genre est caractérisé surtout par une lambe operculaire élastique, qui se trouve à l'intérieur de la coquille, fixée sur la columelle (*Clausillum*, Draparn.); ainsi que par les dents ou les lames qui sont à l'entrée de la bouche; le péristome est continu, bisonné dans la plupart, et toujours présentant un sinus soit supérieur soit inférieur. Ce sous-genre renferme quatre groupes : 1° les *Pupoides*; 2° les *Tracheloides* (*Cyclostomes* de Lamk.); 3° les *Anomales* dont le *Pupa fragilis* de Drap. fait partie; 4° les *Clausillies* ou se rangent presque toutes les espèces données sous ce nom générique par Draparnaud et Lamk. (D. H.)

**COCHLOPES** (Hertw.) *Syn.* de la Perroche jaune, *Bass.* *Peritacus Garabau*; Le grand Perroquet Crick à tête bleue; *Psittacus autumnalis*,

**COCHENILLE.** *Coccus*, Linn. Grand genre de l'ordre des Hémiptères, section des Homoptères, famille des Gallinsectes, établi par Linné et adopté par Latreille (Regn. Anim. de Gov.) qui lui donne pour caractères : tarses d'un article, terminés par un seul crochet; mâles dépourvus de bec, n'ayant que deux ailes qui se recouvrent horizontalement sur le corps, avec l'abdomen pourvu à son extrémité de deux soies; femelles aptères, munies d'un bec; antennes filiformes ou sétacées, composées de onze articles.

Geoffroy, Réaumur et Olivier, se basant sur ce que plusieurs individus femelles de ce genre perdent leur forme d'insecte après s'être fixés, prennent celle d'une galle et ne présentent aucune apparence d'anneaux, ont établi, pour ces espèces, le genre Kermès que Réaumur désigne sous le nom de *Gallinsectes*, et ils ont rangé dans les Cochenilles proprement dites toutes les espèces dont les femelles, après s'être fixées et même après leur mort, ne ressemblent pas à des galles, et conservent encore la forme d'insectes. Réaumur a nommé celles-ci *Progallinsectes* ou *Faux Gallinsectes*. Il est possible qu'à l'aide de l'observation on parvienne à trouver des caractères propres à confirmer la division des Gallinsectes et des Progallinsectes; mais, jusqu'à présent, les différences entre ces deux genres n'étant tirées que des femelles, et les mâles étant absolument semblables, nous présenterons ce genre tel que Linné l'a établi, et tel qu'il a été adopté par Latreille, en considérant simplement comme deux divisions, et non comme deux genres, les Gallinsectes ou Kermès, et les Progallinsectes ou Cochenilles de cet auteur (*Gener. Crust. et Ins.* T. III, p. 176).

D'après notre manière de voir, il eût été convenable de traiter ici les deux groupes; mais afin de ne pas donner trop d'étendue à cet article, et, pour nous conformer en quelque sorte à l'usage, nous ne considé-

rons ici que les Cochenilles proprement dites, et nous renverrons pour l'autre division au mot KERMÈS. Nous serons aussi observer que les insectes auxquels Geoffroy, Réaumur et Olivier ont donné le nom de Kermès, sont différens de ceux que Linné appelle *Chermes*. Ceux-ci sont, pour ces auteurs et pour Latreille, des Psylles. V. ce mot.

Les Cochenilles proprement dites ou Progallinsectes sont des insectes aussi singuliers par leur forme et leurs habitudes, que difficiles à observer. Leur histoire a été long-temps inconnue, et l'on a d'abord cru que la Cochenille employée dans le commerce était une graine. Ce n'est qu'en 1692 que le P. Plumier reconnut que c'était un insecte, et nous devons à Réaumur la connaissance précise de leurs métamorphoses et de leur génération.

Les larves des mâles et des femelles, au sortir de l'œuf, sont très-agiles, courent sur les branches et les feuilles de la Plante qu'elles habitent, et sont si petites qu'on ne peut guère les apercevoir qu'à l'aide d'une loupe. Elles sont plates, ovalaires, aptères, avec des antennes courtes, à articles peu distincts au nombre de onze. Les mâles n'ont point d'organes de la manducation : les femelles ont un petit bec presque conique, très-court, inséré entre les premières et secondes pattes, presque perpendiculaire, formé d'une graine de quatre articles et d'un suçoir de trois soies. C'est avec cette trompe qu'elles pompent la sève des feuilles et des jeunes branches. Ces larves se fixent plusieurs fois pour changer de peau : lorsqu'elles ont pris un certain accroissement, elles se fixent définitivement et choisissent de préférence les bifurcations des branches où elles pratiquent un petit nid qu'elles tapissent d'un duvet cotonneux. Ces Cochenilles, arrivées alors à l'état d'insectes parfaits, sont aptères et prennent un accroissement considérable; leur tête est un demi-cercle; leur bouche est toujours formée du bec qu'elles



vaient à l'état de larves, et leurs yeux sont petits. On distingue difficilement un corselet appliqué contre l'abdomen qui est composé d'anneaux distincts; on voit à la partie postérieure du dernier de ces anneaux une petite fente ouverte. Quand l'Insecte a terminé sa croissance, son abdomen se remplit d'œufs très-petits.

Les larves des mâles, beaucoup plus rares, mais encore fort nombreuses, se fixent également sur les branches, sans prendre de nourriture: leur peau se durcit et devient une coque dans laquelle s'opère la transformation en nymphes, lesquelles sont remarquables en ce que leurs pattes antérieures, au lieu d'être dirigées en arrière, comme dans les chrysalides des autres Insectes, le sont en avant. Vers le commencement du printemps, la coque s'ouvre à sa partie postérieure, et l'on en voit sortir un reculeon l'Insecte parfait: il est

longé; sa tête ronde, avec deux petits yeux et deux antennes assez longues, composées de onze articles distincts; il n'a aucun organe de la manducation; son corselet est arrondi et sert d'attache à deux longues ailes couchées horizontalement l'une sur l'autre et ayant des nervures très-fines; l'abdomen est sessile, conique, terminé par une pointe bivalve, renfermant l'organe générateur qui est un crochet recourbé; le dernier anneau porte en outre deux filets longs et divergens. Le mâle est beaucoup plus petit que la femelle, assez agile, quoique faisant peu usage de ses ailes. Aussitôt qu'il est né, il cherche à s'accoupler: pour cela il monte sur la femelle, et s'y promène en cherchant l'ouverture postérieure dont nous avons parlé plus haut; quand il la trouve, il y introduit l'organe mâle, féconde les œufs renfermés dans le ventre volumineux de celle-ci, et meurt bientôt. La femelle ne tarde pas à pondre. Les œufs sortent du ventre et restent adhérens au-dessous de son corps; elle ne change point de place, et cette ponte n'est point apparente extérieurement; à mesure

que le ventre se vide, la partie inférieure se rapproche de la supérieure, et forme sous le corps de la mère une cavité assez grande où sont nés les œufs. Bientôt après elle meurt, son corps se dessèche, mais la peau coriace de son cadavre sert toujours de coque aux œufs fécondés; ces œufs ne tardent point à éclore, et les larves sortent de dessous leur coque par l'ouverture postérieure.

Plusieurs *Cochenilles* *vermeilles*, lorsqu'on les écrase, un suc rouge; nous allons parler de cette couleur en décrivant la *Cochenille* du Nopal. Il n'y a qu'une espèce de *Cochenille* employée dans les arts; les autres ne sont que trop communes par le tort qu'elles font à plusieurs végétaux utiles. Ce genre comprend environ trente espèces presque toutes propres à l'Europe. Les principales sont:

La *Cochenille* du Nopal, *Coccus Cacti*, L. (pl. 3, 27, 9), mâle et femelle). Le mâle est très-petit; ses antennes sont moins longues que le corps qui est d'un rouge foncé, allongé et terminé par deux soies divergentes et assez longues; les ailes sont grandes, blanches croisées et couchées sur l'abdomen; les pattes sont assez longues. La femelle est le double plus grosse que le mâle; quand elle a pris tout son accroissement, elle est de la grosseur d'un petit pois et d'une couleur brune foncée, avec tout le corps couvert d'une poussière blanche. Les antennes sont courtes; le corps est aplati en dessous, convexe en dessus, bordé, avec les anneaux assez visibles; les pattes sont courtes. Cette espèce, originaire du Mexique, sert à faire la belle teinture écarlate; et le carmin si généralement employé dans les arts et la peinture. Elle était cultivée depuis long-temps par les Mexicains avant la conquête de leur pays. On en distingue deux espèces dans le commerce: la *Cochenille fine*, qui porte aussi le nom de *Météque*, parce qu'on la récolte à Météques dans la province de Honduras, et la *Cochenille syl-*

Gmel., au Mexique. *V. PIANOQUET.*

(DR..Z.)

**COCHOLOTE.** (Azzara.) Syn. de l'Ani Guiraçanlara, *Cuculus Guira*, Lath., au Paraguay. *V. ANI.* (DR..Z.)

**COCHON.** *Sus*, MAM, Genre de Pachydermes que Cuvier (Règn. Anim. T. 1) caractérise ainsi: ils ont à tous leurs pieds deux doigts mitoyens grands et armés de forts sabots, et deux extérieurs beaucoup plus courts et ne touchant presque pas à terre; des incisives en nombre variable, mais dont les inférieures sont toujours couchées en avant; des canines sortant de la bouche et se recourbant l'une et l'autre en haut. La tête du Sanglier (Cuv., Ossem. Foss. T. II, pl. 1, fig. 1 et 2) représente presque une pyramide quadrangulaire dont la face palatine serait à peu près perpendiculaire à l'occiput pris pour base; la tempe est bien marquée par une crête pariétale à concavité extérieure telle que l'écartement, dans le même sens de l'arcade zygomatique, donne presque un tiers de la largeur de la tête à la fosse temporale, et mesure ainsi la force musculaire qui sert à mouvoir la mâchoire. L'aire de la coupe de la cavité cérébrale n'est que la moitié de celle du crâne, ce qui tient à l'écartement des deux tables de tous les os du crâne par d'immenses cellules où se propagent les sinus du frontal en haut et du sphénoïde en bas. Nous avons déjà, à l'article BOEUF, décrit une pareille structure en parlant du Buffle du Cap. L'aire de tout le crâne égale à peine celle de la face, et comme presque tout le volume de celui-ci est occupé par les cornets ethmoïdaux et maxillaires, on voit quelle est l'énorme prédominance de l'organe de l'odorat dans cet Animal. C'est effectivement l'Animal où il est le plus considérable, et où son énergie est plus active. Un autre indice de son développement, c'est la grandeur des os du nez qui occupent presque la moitié de la longueur de la tête, et dont la pointe est presque au niveau du sommet de l'arc des inter-maxil-

laires. Les seuls Rhinocéros offrent cette prééminence de l'os nasal, mais ils se portent moins en arrière; aussi chez eux, le développement de cet os est-il principalement relatif au support qu'il donne à la corne. L'os du boutoir repose inférieurement sur les inter-maxillaires au-devant des trois incisifs, et supérieurement ils appuient, au moins par l'intermédiaire d'un cartilage, sur la pointe des naseaux; cet os supporte un appareil fibro-cartilagineux intérieurement et termine en avant par une surface circulaire, nue, pleine de follicules crypteux, où la derme a ses mailles développées en une sorte de tissu érectile dans lequel se divisent et s'entrelacent une grande quantité de vaisseaux sanguins et de nerfs. L'on peut juger de l'énergie tactile de cet appareil par la proportion du volume de ces nerfs. A la sortie du trou sous-orbitaire, la deuxième branche de la cinquième paire, dans le Cochon de Siam, égale au moins le nerf sciatique de l'Homme à la sortie du bassin. Trois pouces plus loin, les six cordons de cette branche s'épanouissent dans un tissu presque pareil à celui du gland de la verge, sous une surface qui n'excede pas dix-huit lignes carrées (*V. notre deuxième Mém. sur le Syst. nerv. Jour. de Phys., février, 1821, et Bullet. des Sc., par la Soc. Philom., décembre, 1820*). Ce boutoir doit sa mobilité à deux gros muscles à peu près pyramidaux, implantés, le supérieur sous la ligne courbe qui borne la fosse canine en haut, l'inférieur occupant le reste de l'espace de cette fosse jusqu'au bord alvéolaire. Les tendons de ces muscles se terminent par un grand nombre de languettes dirigées dans tous les sens, insérées sous les angles, et dont quelques-unes entourent des arcs plus ou moins étendus. Ces languettes se fixent au tissu fibro-cartilagineux qui unit les os du boutoir aux cartilages des ailes nasales, et lui donnent cette mobilité si variée qu'on lui connaît. Comme le muscle n'est pas tracé perpendiculairement à l'axe de la tête, mais oblique-

animale particulière ; 3° d'une substance grasse, composée de Stéarine, d'Elaine et d'un Acide odorant ; 4° enfin de plusieurs Sels qui sont du phosphate de Chaux, Carbonate de Chaux, Hydrochlorate de Potasse, phosphate de Potasse, et de la Potasse unie avec un Acide organique. La Cochenille sylvestre, moins grosse que la fine, a le corps bordé de poils et tout couvert d'une matière cotonneuse qui adhère tellement sur la plante, quand elle s'y est fixée définitivement, qu'il en reste une partie lorsqu'on veut en détacher l'insecte. Les Indiens élèvent aussi cette Cochenille sur le Nopal des jardins, quoiqu'elle croisse naturellement sur un Cactier épineux, parce que la récolte en est plus facile, et qu'en un jour un seul homme peut en recueillir de quoi en faire trois livres quand elle est sèche, tandis que, sur un Cactier épineux, le meilleur ouvrier ne peut pas, dans le même temps, en faire plus de deux onces. On trouve encore un avantage à l'élever sur le Nopal des jardins, c'est qu'elle y parvient à la grosseur de la Cochenille fine. Cette espèce se trouve dans plusieurs cantons de nos colonies, et les espèces de Nopal dont nous venons de parler y croissent. Il serait fort à désirer que les colons se livrassent à la culture, afin de se former une nouvelle branche de commerce.

La COCHENILLE DU FIGUIER, *Coccus ficus* Carracé, Oliv. (Encycl. méth.). Elle est cendrée, d'une forme ovale, convexe, et a sur le dos un cercle rayonné, noirâtre. Son mâle est inconnu. Ces Insectes vivent sur le Figuier dans le midi de l'Europe et dans tout le Levant, et sont appelés Pous par les gens de la campagne : ils multiplient d'une manière prodigieuse et s'établissent tellement les Arbres qui n'en sont infestés, que ceux-ci finissent par périr. On a essayé plusieurs moyens pour s'en débarrasser ; mais jusqu'à présent ils ont tous été insuffisants. Quelques cultivateurs ont cru pouvoir les faire périr en frottant les branches avec un mélange de vinaigre

et d'huile, mais ce moyen n'a pas eu de succès. Ce n'est qu'en hiver que l'on pourrait les détruire en frottant tomber les feuilles remplies d'écaille, au moyen d'un grattoir en bois. Cette opération ne serait pas fort coûteuse, et serait alors plus facile, parce que la Cochenille tient peu à l'Arbre. Celles qui s'attachent aux Figuiers croissent plus rapidement que les autres.

La COCHENILLE DE L'ORANGER, *Coccus hesperidus*, L., Fabr., Geoff. Elles attaquent, dans nos jardins, des Orangers et les autres Arbres de cette famille, et leur nombre est quelquefois si considérable, qu'elles nuisent aux productions de ces Arbres.

La COCHENILLE DE L'OLIVIER, *Coccus olea-olii*, Bern. Elle attaque l'Olivier, mais jamais le fruit. On emploie encore de bons moyens pour arrêter la multiplication des trop nombreux individus, pour les autres, Geoffroy, Bérton, Mur, Olivier, Fabricius et Latreille, qui en décrivent un grand nombre d'espèces. On emploie dans les arts une autre Cochenille ; mais quand elle entre dans la division qui concerne le genre Kermès, nous y reviendrons. V. ce mot.

COCHENILLE DE PROVENCE. INS. et BOT. PHAN. V. KERMES.

COCHENILLIER. BOT. PHAN. Nom vulgaire du Nopal qui nourrit la Cochenille.

COCHE-PIERRE. ois. Syn. vulgaire du Gros-Bec, *Laxia Coccyzus*, L. V. GROS-BEC.

COCHER. ois. Espèce du genre Chaetodon. V. ce mot.

COCHEVIER. ois. Même espèce que Cochelerieu. V. ce mot.

COCHEVIS. ois. Espèce du genre Alouette, *Alauda cristata*, L. V. ALOUETTE.

COCHIBI. bot. PHAN. (Sarcoc.) Nom caraïbe du *Justicia laurina* de Richard. V. JUSTICIA.

COCHICAT. ois. Par contraction de Cochitacat. V. ce mot.

Gmel., au Mexique. *V. PARROQUET.*

(DR..Z.)

**COCHOLOTE.** (Azzara.) Syn. de l'Ani Guiraçantara, *Cuculus Guira*, Lath., au Paraguay. *V. ANI.* (DR..Z.)

**COCHON.** *Sus. NAM.* Genre de Pachydermes que Cuvier (Rég. Anim. T. I) caractérise ainsi : ils ont à tous leurs pieds deux doigts mitoyens grands et armés de forts sabots, et deux extérieurs beaucoup plus courts et ne touchant presque pas à terre ; des incisives en nombre variable, mais dont les inférieures sont toujours couchées en avant ; des canines sortant de la bouche et se recourbant l'une et l'autre en haut. La tête du Sanglier (Cuv., Ossem. Foss. T. II, pl. 1, fig. 1 et 2) représente presque une pyramide quadrangulaire dont la face palatine serait à peu près perpendiculaire à l'occiput pris pour base ; la tempe est bien marquée par une crête pariétale à concavité extérieure telle que l'écartement, dans le même sens de l'arcade zygomatique, donne presque un tiers de la largeur de la tête à la fosse temporale, et mesure ainsi la force musculaire qui sert à mouvoir la mâchoire. L'aire de la coupe de la cavité cérébrale n'est que la moitié de celle du crâne, ce qui tient à l'écartement des deux tables de tous les os du crâne par d'immenses cellules où se propagent les sinus du frontal en haut et du sphénoïde en bas. Nous avons déjà, à l'article **BOEUF**, décrit une pareille structure en parlant du Buffle du Cap. L'aire de tout le crâne égale à peine celle de la face, et comme presque tout le volume de celle-ci est occupé par les cornets ethmoïdaux et maxillaires, on voit quelle est l'énorme prédominance de l'organe de l'odorat dans cet Animal. C'est effectivement l'Animal où il est le plus considérable, et où son énergie est plus active. Un autre indice de son développement, c'est la grandeur des os du nez qui occupent presque la moitié de la longueur de la tête, et dont la pointe est presque au niveau du sommet de l'arc des inter-maxil-

laïres. Les seuls Rhinocéros offrent cette prééminence de l'os nasal, mais ils se portent moins en arrière ; aussi chez eux, le développement de cet os est-il principalement relatif au support qu'il donne à la corne. L'os du boutoir repose inférieurement sur les inter-maxillaires au-devant des trois incisifs, et supérieurement ils appuient, au moins par l'intermédiaire d'un cartilage, sur la pointe des nasales ; cet os supporte un appareil fibro-cartilagineux intérieurement et termine en avant par une surface circulaire, nue, pleine de follicules cryptes, où le derme a ses mailles développées en une sorte de tissu érectile dans lequel se divisent et s'entrelacent une grande quantité de vaisseaux sanguins et de nerfs. L'on peut juger de l'énergie tactile de cet appareil par la proportion du volume de ces nerfs. A la sortie du trou sous-orbitaire, la deuxième branche de la cinquième paire, dans le Cochon de Siam, égale au moins le nerf sciatique de l'Homme à la sortie du bassin. Trois pouces plus loin, les six cordons de cette branche s'épanouissent dans un tissu presque pareil à celui du gland de la verge, sous une surface qui n'exerce pas dix-huit lignes carrées (*V. notre deuxième Mém. sur le Syst. nerv., Jour. de Phys., février, 1821, et Bullet. des Sc., par la Soc. Philom., décembre, 1820*). Ce boutoir doit sa mobilité à deux gros muscles à peu près pyramidaux, implantés, le supérieur sous la ligne courbe qui borne la fosse canine en haut, l'inférieur occupant le reste de l'espace de cette fosse jusqu'au bord alvéolaire. Les tendons de ces muscles se terminent par un grand nombre de languettes dirigées dans tous les sens, insérées sous les angles, et dont quelques-unes courbent des arcs plus ou moins étendus. Ces languettes se fixent au tissu fibro-cartilagineux qui unit les os du boutoir aux cartilages des ailes nasales, et lui donnent cette mobilité à laquelle on lui connaît. Comme le muscle n'est pas tronqué perpendiculairement à l'axe de la tête, mais oblique-

lieux aquatiques et montueux de l'Europe, depuis l'Angleterre jusque dans le midi de la France. Ses feuilles radicales sont très-grandes (semblables à celles de la Patience aquatique), oblongues et créneées, et celles de la tige sont lancéolées, dentées ou incisées. On la cultive dans les jardins potagers et médicaux, sous les noms de **RAIFORT SAUVAGE**, **CRAN DE BRETAGNE**, etc. Sa racine, qui est très-grosse et charnue, contient, en grande abondance, le principe volatil particulier aux Crucifères, et dans lequel résident toutes leurs vertus. Les pharmaciens l'emploient en grande quantité dans leurs préparations antiscorbutiques; ils en font la base du sirop antiscorbutique, de l'Alcool ou esprit de Cochlearia, et de plusieurs teintures. C'est aussi un assaisonnement populaire, et un stimulant comme la Montarde.

Dans la troisième section, la plus nombreuse de toutes, puisqu'elle renferme dix-huit espèces, se trouve la Cochlearia officinal. De Candolle lui a donné le nom de *Cochlearia*, en la caractérisant par sa silicule ovée ou oblongue, non échancrée au sommet, surmontée par le stigmate presque sessile. Le **COCHLEARIA OFFICINAL**, *Cochlearia officinalis*, L., a les silicules ovées, de la moitié plus courtes que les pédicelles, les feuilles radicales pétiolées, cordées en forme de cuiller (d'où le nom d'**HERBE AUX CUIL- LERS** que porte vulgairement la Plante); celles de la tige sont ovales, dentées et anguleuses. Ces feuilles possèdent au plus haut degré, les propriétés toniques et antiscorbutiques des Crucifères; elles sont sialagogues, et stimulent particulièrement la membrane muqueuse des organes gastriques. Cette Plante croît naturellement sur le littoral des mers de l'Europe septentrionale; on dit aussi qu'elle se trouve dans le Jura et sur les monts Crapacks. Malgré cette vulgarité du Cochlearia officinal, il n'est pas certain que nous ayons une description très-fidèle de son type; la culture de cette Plante pouvant bien, selon De Can-

dolle, avoir entraîné la confusion de plusieurs espèces voisines. Les autres Cochlearias de cette section, parmi lesquels nous ne serons que nommer les *Cochlearia anglica*, *C. danica* et *C. pyrenaica*, indigènes de la France, sont répandus dans les contrées boréales de l'ancien continent, et principalement dans la Sibérie.

La quatrième section (*Ionopsis*, D.C.) ne renferme qu'une seule espèce, le *Cochlearia acaulis*, Desf., Plante dont la silicule est presque ronde et échancrée obtusément au sommet, et les fleurs de couleur rose lilas. Elle est fréquente en Portugal, près Lisbonne, et dans l'Afrique septentrionale. Cette section a des caractères qui rapprochent les Cochlearias des Thlaspi, et établissent ainsi un passage des Alysées aux Thlaspidées.

Enfin, De Candolle range les cinq espèces restantes à la fin du genre, parmi les Cochlearias trop peu connus pour être caractérisés. (G.-N.)

**COCHLEARIIUS.** ois. (Brisson.) Syn. de Savacou, *Canceroma Cochlearia*, L. V. SAVACOU. (DR. 2.)

\* **COCHLIDIUM.** BOT. CRYPT. (*Fougères.*) Kaulfuss a décrit sous ce nom, dans le Journal de Pharmacie de Berlin (*Berlin. Lehrbuch für pharmaz.* xx-xxi), un genre de Fougères. Nous ne connaissons ni ses caractères ni les Plantes qu'il renferme, n'ayant pas pu nous procurer cet ouvrage à Paris. (AD. B.)

**COCHLITES.** MOLL. FOSS. V. COCHILITES.

\* **COCHLOHYDRE.** *Cochlohydra*. MOLL. Lamarck, en établissant, pour l'*Helix pectus* de Linné et pour quelques autres espèces, son genre Amphibulime, avait bien senti les différences qui séparaient ces Coquilles des autres Hélices avec lesquelles on les avait confondues. Avant Linné, on les plaçait parmi les Buccins. C'est ainsi que Lister (*Anim. Ang.* pag. 140, tab. 2, fig. 24) et Gualtieri (*Ind.* pag. et tab. 5, fig. 4) lui donnèrent d'abord cette dénomination. Linné, considérant sans doute la forme des tentacules et la manière de

Gmel., au Mexique. *V. PRANOQUET.*

**COCHOLOTE.** (Azzara.) Syn. de l'Ani Guiraçanlara, *Cuculus Guira*, Lath., au Paraguay. *V. ANI.* (DR..Z.)

**COCHON.** *Sus*, MAM, Genre de Pachydermes que Cuvier (Règn. Anim. T. 1) caractérise ainsi: ils ont à tous leurs pieds deux doigts mitoyens grands et armés de forts sabots, et deux extérieurs beaucoup plus courts et ne touchant presque pas à terre; des incisives en nombre variable, mais dont les inférieures sont toujours couchées en avant; des canines sortant de la bouche et se recourbant l'une et l'autre en haut. La tête du Sanglier (Cuv., Ossem. Foss. T. II, pl. 1, fig. 1 et 2) représente presque une pyramide quadrangulaire dont la face palatine serait à peu près perpendiculaire à l'occiput pris pour base; la tempe est bien marquée par une crête pariétale à concavité extérieure telle que l'écartement, dans le même sens de l'arcade zygomatique, donne presque un tiers de la largeur de la tête à la fosse temporale, et mesure ainsi la force musculaire qui sert à mouvoir la mâchoire. L'aire de la coupe de la cavité cérébrale n'est que la moitié de celle du crâne, ce qui tient à l'écartement des deux tables de tous les os du crâne par d'immenses cellules où se propagent les sinus du frontal en haut et du sphénoïde en bas. Nous avons déjà, à l'article BOEUF, décrit une pareille structure en parlant du Buffle du Cap. L'aire de tout le crâne égale à peine celle de la face, et comme presque tout le volume de celle-ci est occupé par les cornets ethmoïdaux et maxillaires, on voit quelle est l'énorme prédominance de l'organe de l'odorat dans cet Animal. C'est effectivement l'Animal où il est le plus considérable, et où son énergie est plus active. Un autre indice de son développement, c'est la grandeur des os du nez qui occupent presque la moitié de la longueur de la tête, et dont la pointe est presque au niveau du sommet de l'arc des inter-maxil-

laire. Les seuls Rhinocéros offrent cette prééminence de l'os nasal, mais ils se portent moins en arrière; aussi chez eux, le développement de cet os est-il principalement relatif au support qu'il donne à la corne. L'os du boutoir repose inférieurement sur les inter-maxillaires au-devant des trois incisifs, et supérieurement ils appuient, au moins par l'intermédiaire d'un cartilage, sur la pointe des naseaux: cet os supporte un appareil fibro-cartilagineux intérieure et terminée en avant par une surface circulaire nue, pleine de follicules cryptes, ou le derme a ses mailles développées en une sorte de tissu érectile dans lequel se divisent et s'entrelacent une grande quantité de vaisseaux sanguins et de nerfs. L'on peut juger de l'énergie tactile de cet appareil par la proportion du volume de ces nerfs. A la sortie du trou sous-orbitaire, la deuxième branche de la cinquième paire, dans le Cochon de Siam, égale au moins le nerf sciatique de l'Homme à la sortie du bassin. Trois pouces plus loin, les six cordons de cette branche s'épanouissent dans un tissu presque pareil à celui du gland de la verge, sous une surface qui n'excede pas dix-huit lignes carrées (*V. notre deuxième Mém. sur le Syst. nerv. Jour. de Phys., février, 1821, et Bullet. des Sc., par la Soc. Philom., décembre, 1820*). Ce boutoir doit sa mobilité à deux gros muscles à peu près pyramidaux, implantés, le supérieur sous la ligne courbe qui borne la fosse canine en haut, l'inférieur occupant le reste de l'espace de cette fosse jusqu'au bord alvéolaire. Les tendons de ces muscles se terminent par un grand nombre de languettes dirigées dans tous les sens, insérées sous toutes les angles, et dont quelques-unes entourent des arcs plus ou moins étendus. Ces languettes se fixent au tissu fibro-cartilagineux qui munit le boutoir aux cartilages des ailes nasales et lui donnent cette mobilité si variée qu'on lui connaît. Comme le muscle n'est pas tronqué perpendiculairement à l'axe de la tête, mais oblique

que les deux précédentes, ayant une ouverture très-grande et oblique, ornée de stries obliquement transverses; la spire est courte et rouge, le reste de la coquille est jaunâtre; péristome simple; elle est longue de quatorze lignes et large de neuf; ces dimensions donnent une idée de l'ampleur de l'ouverture. On la trouve à la Guadeloupe dans les lieux frais. (D. R.)

**COCHLOIDES.** *Cochloides*. MOLL. Férussac divise le genre Hélix en deux parties bien distinctes. La première renferme toutes les Coquilles dont les tours sont enveloppans (*Trochutata*), les Hélicoïdes; la seconde toutes celles dont la spire est plus ou moins allongée (*Evolutate*), les Cochloïdes qui comprennent :

Les COCHLOSTYLES, *Cochlostyla*, divisées en deux groupes : 1° le péristome séséchi, les *Lomastomes* dont quelques espèces se rapportent au genre Maillet de Draparnaud et *Bulime* de Brugnière; 2° le péristome simple, les *Allostomes* qui renferment également des espèces du genre *Bulime* de Brugnière.

Les COCHLITOMES, *Cochlitoma*, divisées en deux groupes : 1° les *Ruhans*; 2° les *Agathines* qui sont composés des *Bulimes* de Brug. et des *Agathines* de Montf. et de Lamk.

Les COCHLICOPES, *Cochlicopa*, auxquelles il avait donné le nom de *Cochlicoides*, et qui renferment dans deux groupes les *Polyphèmes* de Montf. (*Bulimes* de Brug.) et les *Syloïdes*, dont le *Bulimus acicula* fait partie.

Les COCHLICELLES, *Cochlicella*, qui renferment parmi les *Bulimes* de Brug. et de Draparn., les espèces dont le dernier tour est moins long que tous les autres réunis; tels sont les *Bulimus ventricosus*, *acutus*, *decollatus*, etc.

Les COCHLAGENES, *Cochlagena*, qui sont encore répartis des genres *Bulime* de Brug. et *Auriculo* de Lamk.; distingués des précédentes en ce que le dernier tour est plus grand que tous les autres réunis. Elles sont divisées en six groupes : les *Ombilicoides*, comme le *Bulimus Kambei*; les *Perfor-*

rées, comme le *Bulimus guadalupensis*; les *Lomastomes* qui renferment plus particulièrement le genre *Bulime* de Lamk., comme les *Bulimus citrinus*, *inversus*, *Colamba*, *interruptus*, etc.; les Hélicètes qui sont presque toutes des espèces nouvelles rapportées des îles Sandwich; les *Stomatoides* qui renferment encore des *Bulimes* de Brug. et les *Auricules* de Lamk., comme le *Bulimus Auris Leporis*, *Auris Sileni*, etc.; enfin, les *Dontostomes* qui sont des *Maillois* de Draparn., des *Bulimes* de Brug., comme les *Bulimus Pupa*, *tridens*, *quadridens* de Brug. (*Pupa*, Drap., Lamk.).

Les COCHLODONTES, *Cochlodonta*. Les Coquilles de ce sous-genre se distinguent de celles du précédent par la forme de la bouche qui est généralement aussi haute que large, et par les dents ou lames qui sont placées sur son pourtour; le péristome non continu. Ces caractères conviennent aux *Maillois* de Lamk. qui y rentrent presque tous. Les *Cochlodontes* sont partagées en deux groupes, les *Maillois* et les *Grenailles* qui sont encore des *Maillois* dont la coquille est plus fusiforme.

Les COCHLODINES, *Cochlodina*. Ce quatorzième sous-genre est caractérisé surtout par une lame operculaire élastique, qui se trouve à l'intérieur de la coquille, fixée sur la columelle (*Clausulum*, Draparn.), ainsi que par les dents ou les lames qui sont à l'entrée de la bouche; le péristome est continu, biséché dans la plupart, et toujours présentant un sinus soit supérieur soit inférieur. Ce sous-genre renferme quatre groupes : 1° les *Pupoides*; 2° les *Tracheloides* (*Cyclostomes* de Lamk.); 3° les *Anomales* dont le *Pupa fragilis* de Drap. fait partie; 4° les *Clausilles* ou se rangent presque toutes les espèces données sous ce nom générique par Draparnaud et Lamk.

COCHLOPES (Hernandez) Syn. de la Perforée, comme le *Bulimus Perforatus*, L.; et du Perforé, Orick à tête bleue, *Politicus autumnalis*,

Gmel., au Mexique. *V. PARROQUET.*

(DR. Z.)

**COCHOLOTE.** (Azzara.) Syn. de l'Ani Guiraçantara, *Cuculus Guira*, Lath., au Paraguay. *V. ANI.* (DR. Z.)

**COCHON.** *Sus.* MAM. Genre de Pachydermes que Cuvier (Rég. Anim. T. 1) caractérise ainsi : ils ont à tous leurs pieds deux doigts mitoyens grands et armés de forts sabots, et deux extérieurs beaucoup plus courts et ne touchant presque pas à terre ; des incisives en nombre variable, mais dont les inférieures sont toujours couchées en avant ; des canines sortant de la bouche et se recourbant l'une et l'autre en haut. La tête du Sanglier (Cuv., Ossem. Foss. T. II, pl. 1, fig. 1 et 2) représente presque une pyramide quadrangulaire dont la face palatine serait à peu près perpendiculaire à l'occiput pris pour base ; la tempe est bien marquée par une crête pariétale à concavité extérieure telle que l'écartement, dans le même sens de l'arcade zygomatique, donne presque un tiers de la largeur de la tête à la fosse temporale, et mesure ainsi la force musculaire qui sert à mouvoir la mâchoire. L'aire de la coupe de la cavité cérébrale n'est que la moitié de celle du crâne, ce qui tient à l'écartement des deux tables de tous les os du crâne par d'immenses cellules où se propagent les sinus du frontal en haut et du sphénoïde en bas. Nous avons déjà, à l'article BOEUF, décrit une pareille structure en parlant du Buffle du Cap. L'aire de tout le crâne égale à peine celle de la face, et comme presque tout le volume de celle-ci est occupé par les cornets ethmoïdaux et maxillaires, on voit quelle est l'énorme prédominance de l'organe de l'odorat dans cet Animal. C'est effectivement l'Animal où il est le plus considérable, et où son énergie est plus active. Un autre indice de son développement, c'est la grandeur des os du nez qui occupent presque la moitié de la longueur de la tête, et dont la pointe est presque au niveau du sommet de l'arc des inter-maxil-

laïres. Les seuls Rhinocéros offrent cette prééminence de l'os nasal, mais ils se portent moins en arrière ; aussi chez eux, le développement de cet os est-il principalement relatif au support qu'il donne à la corne. L'os du boutoir repose inférieurement sur les inter-maxillaires au-devant des trois incisifs, et supérieurement ils s'appuient au moins par l'intermédiaire d'un cartilage, sur la pointe des nasaux. Cet os supporte un appareil fibro-cartilagineux intérieurement et termine en avant par une surface circulaire nue, pleine de follicules crypteux, ou le derme a ses mailles développées en une sorte de tissu érectile dans lequel se divisent et s'entrelacent une grande quantité de vaisseaux sanguins et de nerfs. L'on peut juger de l'énergie tactile de cet appareil par la proportion du volume de ces nerfs. A la sortie du trou sous-orbitaire, la deuxième branche de la cinquième paire, dans le Cochon de Siam, égale au moins le nerf sciatique de l'Homme à la sortie du bassin. Trois pouces plus loin, les six cordons de cette branche s'épanouissent dans un tissu presque pareil à celui du gland de la verge, sous une surface qui n'expose pas dix-huit lignes carrées (*V. notre deuxième Mém. sur le Syst. nerv. Jour. de Phys., février, 1821. C. Bullet. des Sci., par la Soc. Philom., décembre, 1820*). Ce boutoir doit sa mobilité à deux gros muscles à peu près pyramidaux, implantés, le supérieur sous la ligne courbe qui borne la fosse canine en haut, l'inférieur occupant le reste de l'espace de cette fosse jusqu'au bord alvéolaire. Les tendons de ces muscles se terminent par un grand nombre de languettes dirigées dans tous les sens, insérées sous les angles, et dont quelques-unes entourent des arcs plus ou moins étendus. Ces languettes se fixent au tissu fibro-cartilagineux qui unit l'os du boutoir aux cartilages des ailes nasales, et lui donnent cette mobilité si variée qu'on lui connaît. Comme le muscle n'est pas tronqué perpendiculairement à l'axe de la tête, mais oblique



ment en bas et en arrière, et comme il n'y a que l'arc supérieur du boutoir relevé en un gros bourrelet calcaireux qui ouvre et divise la terre sur laquelle le dessous du museau jusqu'au nez agit à la manière d'un soc de charrue, il en résulte, qu'en fouissant, les quatre cinquièmes au moins de la surface nue et humide du boutoir ne subissent pas de frottement et restent disponibles pour le toucher le plus délicat qui existe peut-être. L'ouïe, qui paraît le plus actif de leurs sens, après l'odorat et le toucher, ne doit pas être bien énergique, car la caisse n'est qu'un tubercule osseux fort saillant en pointe au-devant de l'apophyse mastoïde, dont la cavité est fort petite et dont le volume apparent ne répond qu'à un tissu cellulaire osseux : d'après Cuvier (*loc. cit.*), la caisse est beaucoup plus grande dans le Babiroussa que dans ses congénères. — La figure des dents est plus constante que leur nombre dans les espèces de ce genre. Dans les Sangliers, la canine supérieure, grosse, canique, et coudée, se recourbe en dehors et en dessus, en sorte qu'elle se troppe obliquement à sa face antérieure par le frottement contre celle d'en bas. Celle-ci, en forme de pyramide triangulaire à faces lisses, est aussi recourbée en dehors et en haut, mais aiguise sa pointe au lieu de l'émousser. Les fausses molaires sont toutes tranchantes, lobées et crénelées à la mâchoire inférieure; mais à la supérieure, la troisième et la quatrième sont larges et à trois collines crénelées. Les deux arrière-molaires en haut et en bas ont deux paires de collines et un petit talon; les inférieures sont plus étroites, et la dernière d'entre celles-ci a une paire de collines de plus, comme son analogue dans le Mastodonte à dents étroites (*V. Mastod. et Ossom. Foss. de Cuv. T. II*, d'où nous avons extrait ce qui concerne la dentition et l'ostéologie). Dans tous les Cochons, les six incisives d'en bas, dont la grandeur décroît à partir des intermédiaires, sont obliques en avant, mais beau-

coup plus inclinées que dans les Maxis, etc. Les molaires en s'usant perdent leurs tubercules et ne présentent plus, comme les dents de l'Homme, qu'une surface lisse où l'émail enveloppe la substance osseuse.

Chez toutes les espèces l'œil est relativement très-petit; le pupille circulaire; il n'y a pas de troisième paupière; il n'y a pas d'inter-pariétal distinct après la naissance. Or, Serres a montré, comme nous l'avons dit ailleurs, que la grandeur et la persistance de cet os en général, dans les Mammifères, sont en rapport direct avec le développement de l'appareil optique : aussi ces Animaux ne paraissent guère consulter l'œil. Tous ont la peau dure, épaisse; le derme très-serré, recouvrant, comme chez les Cétacés et les Phoques, une épaisse couche adipeuse, appelée lard. Par compensation, il y a bien moins de tissu cellulaire graisseux dans les intervalles ou dans l'épaisseur même de leurs muscles que chez les autres Mammifères. Ils n'ont absolument qu'une seule sorte de poils : connue de tout le monde sous le nom de soie; ces soies sont plus longues et plus nombreuses le long de l'échine où elles sont récurrentes, et autour des oreilles où elles se redressent dans la colère. — Les pieds de devant ont quatre doigts dans toutes les espèces; les deux doigts postérieurs, quoique bien garnis de sabots, ne touchent pas à terre sur un plan uni, mais servent à l'Animal pour ne pas enfoncer dans la vase des marécages; il n'y a que trois doigts aux pieds de derrière des Pécariis. Le nombre des mamelles varie d'une à six paires. — Dans tous, excepté quelques races domestiques, les oreilles sont médiocres et droites. Leur tête longue et lourde, leur cou ramassé, épais et court, leur corps tout d'une venue, sur des jambes minces et courtes, caractérisent leur physiognomie.

Dans les deux continents, ces Animaux habitent les forêts humides dans le voisinage des rivières et des maré-

cages, qu'on les trouve athétiques. Vivant de l'eau et de plantes, ils ne peuvent déterminer ces terres, dans un sol malsain et humide. On a trouvé des Cochons partout, et trop dans le nord des deux continents et dans l'Australasie. Néanmoins, les espèces de ce genre ne sont pas nombreuses; on n'en connaît positivement que cinq, car le Phacochère (*K. ce*) nous paraît, par la figure et le nombre très-inférieur de ses dents, constituer un genre à part. De ces cinq espèces, deux sont particulières à l'Amérique méridionale au nord du Tropique. Les trois autres sont de l'ancien continent : l'une, propre à l'archipel Asiatique, l'autre à l'Afrique et à ses îles; la troisième, le Sanglier ordinaire, paraît commune à l'Europe, à l'Afrique, à l'Asie et à ses îles. Néanmoins, comme les Cochons domestiques, dans les diverses parties de l'ancien continent, sont très-dissimilaires entre eux, et comme ces dissimilitudes persistent, même lorsque les races ont subi pendant une longue durée l'influence d'un climat et d'un régime nouveaux, il n'est pas invraisemblable que ces différences sont primitives. Il est donc probable que quand on aura pu comparer au nôtre les Sangliers ou Cochons sauvages de l'est et du midi de l'Asie, on trouvera que la même espèce n'est pas ainsi répandue d'une de ses extrémités à l'autre.

Les réflexions préliminaires à l'histoire du Cochon, dans Buffon, sont un prodige d'antithèses et de subtilités. Nous croyons devoir ici trancher le mot pour prévenir contre les erreurs que l'autorité de son nom ou le charme de son éloquence peut propager encore aujourd'hui. Par haine de toutes ces idées fausses, où conduisent le tiraillement et l'exagération de l'analogie, il s'est jeté dans un autre extrême. Il ne voyait plus d'analogie, il ne voyait que quelques identités peu nombreuses. Enfin telle était l'aberration de Buffon, au sujet du Cochon, qu'il trouvait que par la fécondité et la structure des ovaires de la femelle, cet Animal semblait faire l'extrémité des

espèces vivipares et s'approcher des ovipares. Pour en revenir aux réalités qui concernent ces Animaux, la considération, chez les Pécaris, de deux incisives de moins en haut, de deux molaires de moins à chaque mâchoire; de la soudure en un vrai canon des deux os métacarpiens et métatarsiens de chaque pied, de l'absence de doigt externe aux pieds de derrière, etc., sépare des Cochons, pour en faire un sous-genre, les deux espèces américaines.

**1<sup>er</sup> SOUS-GENRE.** — Les Cochons PROPREMENT DITS ont sept mâchoires partout, six incisives en haut et en bas; les deux doigts postérieurs de chaque pied ont des sabots bien détachés, et qui, en s'écartant en arrière, peuvent les soutenir dans la vase des marécages.

1. Le SANGLIER COMMUN, *Sus Scrofa*, L., Buff., T. v, pl. 14; F. Cuv., Mamm. lith. liv. 30; Encycl. pl. 37, f. 5 et 4; le Marcassin. — D'un noir brunâtre sur tout le corps, à soies dures et roides tout le long de l'échine; yeux très-petits; oreilles très-mobiles; ayant douze mamelles. Il met cinq ou six ans à croître; aussi parvient-il à une taille supérieure à celle de nos plus grands Cochons. Il vit une trentaine d'années; mais dès la fin de la première, commence le rut qui est bien établi à la seconde année, durant laquelle il peut engendrer. Les premières portées, à la vérité, sont moins nombreuses. Le rut vient en janvier et février. A cette époque, les troupes se dispersent; chaque mâle se retire dans quelque fourré bien épais avec la femelle qu'il s'est attachée de gré ou de force, et souvent après l'avoir disputée à des rivaux. Pendant environ trente jours, il ne la quitte pas. La femelle porte quatre mois, et met bas, selon l'âge, de quatre à dix Marcassins qu'elle soustrait, avec la plus grande précaution, à la connaissance des mâles, qu'elle nourrit pendant trois ou quatre mois, et que, long-temps après, elle guide, instruit et défend avec un courage intrépide. Ces petits restent fort

achés à leur mère, ce qui implique une intelligence supérieure à celle qu'on a bien voulu leur reconnaître; quelquefois une Laie est suivie par ses sans de deux et trois ans. Ces jeunes pugliers se, nomment *Bêtes de compagnie*. Souvent plusieurs Laies se réunissent avec leurs familles de plusieurs années, et forment des troupes redoutables, soit par leur dévastation dans les champs, soit pour le chasser surpris ou assaillant témérairement. Les vieux vont ordinairement seuls. Comme la vue est assez peu sûre, la langue chez ces Animaux, et comme ils se guident surtout d'après les indices de l'odorat, c'est à la chute du jour et la nuit qu'ils vont fourrager, pour faire face au danger. Ils se forment en cercle, mettent les plus faibles au centre, intrépides à se défendre, si quelque coup de fût atteint le puglier au milieu d'une meute qui le harcèle, il perce droit à travers, et, quelque éloigné que soit le chasseur, est sur lui qu'il foudroie d'un coup de dent pour se venger. Certes, cette vengeance réfléchie suppose un jugement et une conscience morale, supérieure à l'abrutissement qu'on a attribué aux espèces de ce genre. F. Cuvier, qui en a observé un grand nombre, dit (*loc. cit.*) qu'ils s'approprient aisément, aiment avec reconnaissance ceux qui les soignent, qu'ils savent apprendre des gesticulations grotesques, pour complaire et obtenir quelque friandise.

F. Cuvier a déjà énoncé le doute que tous les Cochons domestiques connus descendent d'une seule et même espèce sauvage. À la vérité, toutes les races domestiques d'Europe produisent avec le Sanglier, mais on sait d'ailleurs que ce n'est pas là une preuve d'unité d'espèce. L'un de ces Cochons domestiques qui autorisent principalement ce doute, c'est le Cochon de Chine (fig. Mam. lith. liv. 24). Son corps est épais; son museau, raccourci et concave supérieurement, contraste avec son front bombé; c'est presque comme chez le Dogue. Les poils sont soyeux, roides, très-frisés sur les joues et à la mâchoire infé-

rieure. Sous ces poils, la peau est noire, excepté au ventre; à la face interne des cuisses et à l'extrémité des pieds de devant, où elle est blanche. F. Cuvier a dépeint et figuré (liv. 25) le Cochon du cap de Bonne-Espérance; il n'est pas plus grand que notre Cochon d'un an: à poils noirs ou marron, foncé, durs et rares; ses oreilles sont droites, sa queue pendante et terminée, comme au précédent, par une meche ou flocon de soies. Cette race est probablement la même que celle connue sous le nom de Cochon de Siam ou de Chine, aujourd'hui assez commun en France. Le Cochon de Siam paraît répandu sur tous les rivages méridionaux de l'ancien continent; mais il est douteux que ce Cochon soit le même qui existe sauvage, en si grande abondance, dans l'archipel des Papous, au nord des Moluques et à l'ouest de la Nouvelle-Guinée. Il paraît même qu'il en existe dans les îles Célèbes deux espèces sauvages, indépendamment du Babiroussa: l'une plus grande, propre aux grandes îles, *Babeo-Ootan* des Malais; l'autre plus petite, qui leur est commune avec l'archipel des Papous, et dont les troupes passent souvent à la nage de l'une à l'autre. Quoi qu'il en soit, il est bien plus plausible de faire dériver de l'espèce sauvage papoue, ces Cochons si nombreux par toute l'Océanie, que de les rattacher à une espèce du continent. Si donc, comme il est probable, on découvre dans l'Indo-Chine, une espèce particulière de Sanglier, qui soit la souche du Cochon de Siam et de celui de la Chine, y compris ces deux espèces indiquées par Forrest (Voyage à la Nouv.-Guinée), cela sera au moins trois espèces nouvelles à ajouter. En attendant, nous croyons pouvoir fixer à l'archipel des Papous, l'origine des Cochons sauvages de l'Océanie. Ces déterminations sont, certes, conjecturales, mais elles serviront à diriger les recherches ultérieures des voyageurs. Or, d'après ce que nous savons des lois de la distribution géographique des Vertébrés, nous ne doutons pas que ces conjec-

tures ne soient vérifiées, à quelques degrés terrestres près, pour la limite des régions que nous venons d'indiquer.

Nous ne décrivons pas les nombreuses de nos Porcs domestiques. Elles sont en général plus belles dans les zones tempérées, et le froid leur est nuisible. C'est de ces races que viennent ceux qui existent aujourd'hui domestiques ou redevenus sauvages dans les deux Amériques. Les Cochons sauvages de l'archipel des Papous habitent les marécages et les plages très-basses. On ne peut les approcher à terre qu'en se glissant à travers les roseaux ou en s'enveloppant de boue. Plus ordinairement on les chasse en pirogue, et surtout dans leurs traversées d'une île à l'autre. (V. Forrest, Voyag.)

5. SANGLIER À MASQUE, *Sus larvatus*, R. Cuv., figuré par Samuel Daniels. (*Afric. Scenerys*, pl. 21). À arcades zygomatiques plus convexes extérieurement que dans le Sanglier; caractérisé surtout par une grosse apophyse élevée au-dessus de l'alvéole de la canine, et remontant obliquement de manière à laisser un canal entre elle et l'os maxillaire. Cette apophyse se termine par un gros tubercule raboteux; de l'os du nez, s'élève vis-à-vis un autre tubercule semblable: c'est sur ces deux tubercules qu'adhère le mamelon qui donne à cet Animal une figure si hideuse. A peu près de la grandeur de notre Sanglier, il en a toutes les proportions, et ne s'en distingue que par les deux protubérances de sa face qui lui forment une sorte de masque. Commerson l'avait indiqué à Buffon, et Daubenton en a décrit la tête; mais Buffon paraît l'avoir confondu avec le Phacochoère. Il semblerait, par la figure citée de Daniels, que ce Sanglier aurait encore sous les yeux deux autres excroissances à surface rugueuse et irrégulière. Il paraît que c'est un Animal sauvage et dangereux; il n'a encore pour patrie authentique que l'intérieur du Cap.

5. BABIROUSSA, *Sus Babyroussa*,

Recherches des Malais, Valentyn, Descrip. des Ind. Orient. T. III, partie première, pag. 283. E. Cuv., Buff., Suppl. T. III, p. 283. A quatre incisives, cinq molaires en bas et six en haut; encore le nombre est-il rarement complet dans les adultes, dit Cuvier (Oss. Foss. T. II). Les canines supérieures, sortant d'un alvéole ouvert sur le museau, et se recourbant en dans - perle vers les yeux; les inférieures sont arquées, aiguës et triangulaires comme au Sanglier; d'ailleurs son crâne est plus long encore à proportion du museau que dans le Cochon de Chine. Ses parietaux sont surtout plus étendus; l'os de la caisse est aussi beaucoup plus bombé. Plus d'un os du crâne, le désigne, avec obscurité, comme les Andicones, en parle plus clairement sous le nom de *Amur* ou Cochon, Carle et de *Baror* et en avoir mangé, Valentyn et Robtius et Séba, l'ont successivement figuré. Ses formes sont, un peu moins lourdes que celles de ses congénères; sa couleur générale est un cendré roussâtre; son poil est court et laineux; sa peau est mince et n'est pas doublée d'une couche de lard; son crâne n'est pas rempli de sinus qui coiffent le cerveau comme dans le Sanglier. Il en résulte que l'encéphale du Babiroussa est presque double en volume de celui du Sanglier. Il ne se mêle jamais avec les Sangliers sauvages; ce qui confirme l'existence d'espèces particulières à cet archipel, et autres que le Babiroussa, espèces dont nous avons parlé ci-dessus. Il habite les Philippines, les Molles, Bornéo, et sans doute l'archipel des Papous. Pour suivi, il se jette à la mer et plonge fort bien. Le Babiroussa, s'apprivoise aisément. Valentyn dit qu'il ne fouille pas, et qu'il se nourrit d'herbes et de feuilles. Il n'est pas certain qu'il se trouve sur le continent de l'Inde; mais ce qu'il y a de bien sûr, c'est qu'il n'est pas la souche des Cochons de l'Océanique.

II<sup>e</sup> SOUS-GENRE. — Les PÉCARIS,

*Dicotyles*, entre les caractères par lesquels nous les avons déjà séparés des cochons proprement dits, s'en distinguent essentiellement au premier coup d'œil par l'absence du doigt interne au pied de derrière, et surtout par une poche à paroi glanduleuse, située sur l'échine au-dessus de la première ou deuxième vertèbre lombaire, et dont nous avons trouvé la structure pareille à celle du larmier des cerfs; enfin par la brièveté de leur queue qui n'a pas un pouce de long, est large et plate. Le train de devant est à proportion plus gros que celui de derrière. Le crâne des Pécaris, pour sa brièveté, ressemble plus encore à celui du Babiroussa qu'à celui du cochon de Siam; il en diffère en outre par un caractère auquel son influence sur le régime alimentaire donne une grande importance; c'est que la facette glémoïde du temporal est cernée devant et derrière par des sailles qui encastront la tête du conchyle, et ne permettent à la mâchoire que de très-obscurs mouvements de latéralité, tandis que cette surface est plane dans les Cochons de l'ancien continent. Les six molaires des Pécaris sont aussi plus semblables entre elles que dans les Cochons. Dès la première en haut et la seconde en bas, il y a deux paires de collines mamelonnées. La dernière d'en bas a le plus un talon mamelonné. Le cunéus est aussi soudé au radius plus tôt et plus complètement que dans les Cochons. L'ensemble de ces caractères exclut donc toute vraisemblance d'unité d'origine entre les Pécaris et les Cochons. Les Pécaris sont propres au Nouveau-Monde entre les tropiques. Linné a confondu les deux espèces sous le nom de *Sus Tajassu*. Cette confusion a régné sous des noms différents dans chaque auteur jusqu'à Azzara.

4. PÉCARI À COLLIER, *Sus Tajassu*, L.; *Pecari* de Buffon, *Tayietou* du Paraguay, Azzara (*Quadrup.*, p. 31); Cuv. (*Mam. lith.* 6<sup>e</sup> livrais. 5). Long le deux pieds six pouces entre l'anus et le boudoir; hauteur au garrot, un

piéd six pouces; à la croupe, un piéd huit pouces; à pupilles rondes. Les poils épais et rudes, anneés alternativement de noir et de blanchâtre, lui donnent un fond tiqueté de ces deux couleurs; et, comme le blanc des anneaux domine au cou, il en résulte une sorte de collier. Les pieds sont tout-à-fait noirs; la peau est partout d'un blanc livide; cette espèce n'a que deux mamelles, presque pas de queue, et sa poche exhale une forte odeur d'ail. L'odorat est le plus actif de leurs sens; dans la peur, ils poussent un cri fort aigu; ils témoignent leur contentement par un grognement léger; ils redressent aussi les soies de l'échine dans la colère; ces soies sont plus serrées et plus rudes que dans l'espèce suivante. Azzara dit aussi que l'humeur de sa poche répand une odeur musquée qui manque à l'autre. Il est évident que la couleur des Pécaris ne tient pas au climat, car les Cochons européens du Paraguay sont aussi blancs qu'à leur arrivée, et au contraire, ils sont noirs à Buenos-Ayres. Buffon, trompé par le mot *monte*, par lequel, en Amérique, les Espagnols désignent les forêts, a dit que les Pécaris habitent les montagnes. Le fait est que ces Animaux habitent les forêts, quel qu'en soit le niveau. La Borde a désigné, et Buffon après lui, le Pécari à collier sous le nom de *Pastira* de Cayenne, mais en lui supposant longitudinale sur le dos la bande qu'il a en travers du cou. Cette espèce vit par couple dans les bois. Ils s'appriivoient aisément. Le gouverneur La Luzerne avait commencé de les naturaliser à Saint-Domingue avant la révolution. Ils s'étaient déjà multipliés à la Gonave.

5. Le TAGNICATI (en Guaraní, mâchoire blanche), *Dicotyles labiatus*, Cuv. (*Mam. lith.* 27<sup>e</sup> livraison). Plus grand que le précédent; à soies plus longues où les anneaux blancs sont beaucoup plus petits; aussi, excepté à la croupe, est-il d'un brun noirâtre pur; sa tête diffère de celle du Pécari par la concavité de son chanfrein; entre les oreilles, il a des

seins de quatre pouces et demi de long; elles règnent tout le long de l'échine, en devenant de plus en plus longues; elles ont six pontes et demi aux hanches et diminuent ensuite vers le bas de la croupe; entre la tête et les épaules, elles forment une sorte de crête par leur verticalité. Toute la machoire inférieure est blanche, ainsi que les lèvres, dont la supérieure l'est d'une nuance plus pure. En naissant, le poil est noir à la racine, blanchissant vers la pointe; en grandissant, la couleur noire devient dominante, de sorte que, dans sa première année, le Tagnicati ressemble, pour la couleur, au Pécaré. D'après Azzara, la femelle a deux mamelles de plus que dans le Pécaré.

Sous le nom de Cochon marron, Buffon a pris cette espèce pour la postérité des Porcs européens naturalisés en Amérique par les Espagnols: les caractères, qu'il assigne à ces Cochons marrons, conviennent parfaitement au Tagnicati; c'est aussi à cette espèce que doit s'appliquer ce qu'il dit à tort des Pécaris, qu'ils vont par troupes ordinairement de deux ou trois cents, qu'ils se secourent mutuellement, et blessent souvent les Chiens et les chasseurs. A cet égard, Azzara observe, qu'en frappant avec les canines, ce n'est pas de bas en haut comme le Sanglier, mais par un mouvement contraire. D'ailleurs, les Pécaris ont la même démarche, les mêmes goûts, la même manière de manger, de boire et de fouir que les Cochons. Ils diffèrent tous deux du Sanglier par leur facilité à s'appriivoiser; ils s'approchent des passans pour se faire gratter: quoique les deux espèces habitent les forêts, on ne les trouve jamais dans les mêmes bois; et jamais on ne voit un individu ni une paire de Taytetsous dans une troupe de Tagnicatis. Ceux-ci savent se défendre avec la même résolution que les Sangliers, et quoique plus petits, ils sont aussi dangereux par leur nombre.

On ne trouve déjà plus les espèces de ce sous-genre qu'en petit nombre

dans les environs des lieux habités; car, comme ils ravagent les plantations de Patates, de Manioc, de Maïs et de cannes à Sucre, on en détruit autant qu'on peut. Ces Animaux sont les Sangliers de Garcillazo, liv. 8, cap. 18.

On ne connaît pas d'espèce fossile de ce genre. Les débris de Sanglier qu'on a trouvés en différens endroits, par leur figure et leurs gissemens, appartiennent à notre Sanglier vivant. L'un de ces restes est une défense trouvée avec des ossemens de Chevaux, des débris de bateaux et d'autres objets travaillés, en creusant une des culées du pont d'Iéna. Cuvier (Ossem. Foss.) indique aussi une portion de mâchoire des tourbières du département de l'Oise. Il parle de deux autres morceaux, mais dont on ne donne pas les gissemens. L'un est une mâchoire inférieure d'un jeune individu, où la première arrière-molaire commence à paraître, et trouvée au val d'Arno; l'autre est une moitié inférieure d'humérus, déterrée dans le Hartz. L'absence des Cochons dans les couches d'une formation antérieure à l'état actuel de nos continens, est extrêmement remarquable par son opposition avec le grand nombre de genres de Pachydermes voisins qui existaient à cette époque, et dont pas une espèce n'a survécu. (A. D. Ns.)

On trouve dans diverses relations de voyages et dans plusieurs autres livres le nom de Cochon donné à des Animaux du genre qui vient de nous occuper, ou de genres différens, avec les épithètes suivantes:

COCHON D'AMÉRIQUE, le Pécaré.

COCHON BAS, même chose que Cochon de Siam.

COCHON DES BLÉS ou PETIT COCHON, le Hamster.

COCHON DES BOIS, à la Guiane, le Pécaré.

COCHON CERR, le Babiroussa.

COCHON DE CHINE ou CHINOIS, le Babiroussa.

COCHON CORNU, variété présumée du Cochon domestique.

COCHON CUIRASSÉ, le Tatou.  
 COCHON D'EAU, le Cabiais.  
 COCHON DE FER, le Porc-Épic.  
 COCHON DE GUINÉE et COCHON  
 DE, le Cobié.  
 COCHON DES INDES, le Cochon de  
 m.  
 COCHON DE LAIT, le petit du Co-  
 chon domestique.  
 COCHON MARIN, le Lion marin,  
 ou *Porcina* (Molina, Hist. Nat.  
 Chili).  
 COCHON MARRON, le Cochon do-  
 mestic redevenu sauvage dans les  
 colonies européennes. Dans  
 Ton, c'est le Tagnicati.  
 COCHON DE MER, le Cabiais et le  
 rsouin.  
 COCHON NOIR, le Pécari.  
 COCHON ROY, une race de Cochon  
 nestique commun en Italie.  
 COCHON SANGLIER, le Sanglier  
 plusieurs provinces de France.  
 COCHON SAUVAGE, le Cochon mar-  
 in.  
 COCHON DE SIAM, une race de Co-  
 chon domestique particulière et fort  
 mée.  
 COCHON DE TERRE, le Myrméco-  
 ge du Cap. (B.)  
 COCHON MARIN ou COCHON  
 MER. pois. Syn. de *Trigla Cu-*  
*us*, d'Ostracion trigone et de Cen-  
 ie. V. ce mot, OSTRACION et TRI-  
 z. (B.)  
 COCHOU. BOT. PHAN. (Gaimard.)  
 d'une variété de *Dioscorea*, à  
 de Guam dans l'archipel des Ma-  
 nes. (G.)  
 COCHOUAN ou COCHUAN. ois.  
 vulgaire de la Marouette, *Rallus*  
*ana*, L. V. GALLINULE.  
 (DR..Z.)  
 COCIOLCOS. ois. (Buffon.) Es-  
 du genre Perdrix, *Perdix borea-*  
 L. V. PERDRIX. (DR..Z.)  
 COCIPSILE. BOT. PHAN. Ce mot  
 é formé par contraction de *Coc-*  
*psilum*, la seule désignation légi-  
 d'un genre de Rubiacées établi  
 P. Browne. Ce serait trop laisser à  
 traire que d'admettre une déno-  
 tation ainsi dénaturée sous le vain  
 exte que celle de l'auteur est dis-

sonnée ou même barbare pour nous  
 autres Français. Nous nous croyons  
 donc autorisés à rejeter la mutation  
 du nom de *Cococypsilum*, et nous  
 n'en changeons que la terminaison.  
 V. COCOCYPSELE. (G..N.)

COCKADORE, COCKATOO et  
 COCKATOU. ois. Syn. de Kaka-  
 toë. V. PERROQUET. (DR..Z.)

COCKATRICE. REPT. SAUR. Syn.  
 de Basilic. V. ce mot. (B.)

COCKRECOS. ois. (Dampier.)  
 Nom brésilien d'un Râle qui n'a pas  
 encore été parfaitement déterminé.  
 (DR..Z.)

COCLEZ. BOT. PHAN. Vieux nom  
 français de l'*Anemone hortensis*. (B.)

COCLITES. MOLL. FOSS. Pour Co-  
 chilités. V. ce mot.

COCNOS. ois. Syn. persan du  
 Courlis, *Scolopax arcuata*, Gmel. V.  
 COURLIS. (DR..Z.)

COCO. ois. Syn. syriaque du Cour-  
 cou gris, *Cuculus Canorus*, L. V.  
 COUCOU. (DR..Z.)

COCO. pois. Syn. de Bagre Pimé-  
 lode à Cayenne. (B.)

COCO. Cocos. BOT. PHAN. On ap-  
 pelle ainsi le fruit du Cocotier com-  
 mun, *Cocos nucifera*, L. V. COCO-  
 TIER. On donne aussi ce nom à une  
 espèce de Tulipier. (A. R.)

COCOCHATL. ois. (Hernandez.)  
 Nom mexicain d'un Oiseau qui pa-  
 rait être congénère du Chardonne-  
 ret. (DR..Z.)

COCO DES MALDIVES. BOT.  
 PHAN. On a long-temps ignoré à  
 quelle espèce de Palmier on devait  
 rapporter ce fruit remarquable par  
 sa forme et sa grosseur. Labillardière  
 en a fait un genre nouveau qu'il a  
 nommé *Lodoicea*. V. ce mot. (A. R.)

COCODRILLE. ois. Nom vul-  
 gaire donné au Proyer, *Emberiza mi-*  
*liaria*, L. (G.)

COCOÏ. ois. Syn. brésilien de  
 Héron huppé de Cayenne. (DR..Z.)

COCOIN. ois. Même chose que  
 Cochouan. V. ce mot.

soies de quatre pouces et demi de long; elles règnent tout le long de l'échine, en devenant de plus en plus longues; elles ont six pouces et demi aux hanches et diminuent ensuite vers le bas de la croupe; entre la tête et les épaules, elles forment une sorte de crête par leur verticalité. Toute la mâchoire inférieure est blanche, ainsi que les lèvres, dont la supérieure l'est d'une nuance plus pure. En naissant, le poil est noir à la racine, blanchissant vers la pointe; en grandissant, la couleur noire devient dominante, de sorte que, dans sa première année, le Tagnicati ressemble, pour la couleur, au Pécari. D'après Azzara, la femelle a deux mamelles de plus que le mâle Pécari.

Sous le nom de Cochon Buffon a pris cette espèce pour l'identité des Porcs européens en Amérique par les caractères, qu'il assigne à des marrons, conviennent au Tagnicati; c'est ainsi que doit s'appliquer des Pécari, qu'ils ordinairement de qu'ils se secourent de Ternate. (B.) Blessent souvent les chasseurs. A ce ve, qu'en France n'est pas Sanglier, contraire la même la même et de rent fac

COUCON ou COQUE. général ce nom à l'ensemble de ce genre Bombyce, et qui de denieure pendant l'état de chrysalide. Tout le monde connaît le Cocon du Bombyce de Nidus, *Bombyx Mori*, qui fournit les vers. Quelques Arachnides sont aussi une Coque; mais son usage est assez différent; elle contient les œufs et les abrite. (Aur.)

COCORLI. ois. Espèce de Bécassine. (B.)

COCOSTOL. ois. Pour Xochitl. (B.) ce mot. C'est aussi le nom mexicain de plusieurs Oiseaux qui appartiennent aux genres Gros-Bec et Troupiale. (DR. M.)

dans les environs de car, comme ils tions de Patates et de cannes à tant qu'on p Sangliers

On ne sile de glie droi me

elles sont placées en des sous se rencontre presque ment dans les Plantes mar- quées, où elle favorise singulièrement la fécondation; les premiers ont un calice régulier, un peu coriace, à six divisions très-prolongées, dont trois intérieures plus minces et plus étroites sont considérées comme une corolle par quelques auteurs. Sa

étamines, dont les anthères sont à deux loges et sagittées, s'insèrent à la paroi interne du calice. Le centre de la fleur est occupé par un pistil rudimentaire et avorté. Dans les fleurs femelles, le calice est le même que dans les fleurs mâles; il est coriace et persistant. L'ovaire est sessile, globuleux ou à trois angles obtus, à trois loges contenant chacune un seul ovule dressé. Le sommet naît un style trifide dont chaque division porte un stigmate.

Les fruits varient beaucoup quant à leur forme, leur grosseur et leur couleur, suivant les divers pays. Ils sont en général assez gros, à trois angles peu marqués, accompagnés à leur base par le calice. Ils contiennent une drupe ou noix plus ou moins dure, contenant un noyau très-dur, uniloculaire et monosperme, suite d'un avortement constant. Le noyau, qui est ovoïde, plus ou moins



est basé de trois  
membres, la  
contient un, eu-  
es-volumineux,  
sérieux qui est  
et laiteux  
agréable  
ement  
dans

laires que nous y avons fait re-  
quér. Les spathes naissent de l'ail-  
des feuilles inférieures; leur long-  
est de quinze à vingt pouces;  
sont comprimées, pointues à  
deux extrémités, et s'ouvrent  
seul côté par une fente longitudi-  
pour laisser sortir les fleurs, qu'  
renferment; ces fleurs forment  
régime; on spadice très-samé;  
s'allonge beaucoup lorsqu'il s'e-  
vage de la spathe qui le recou-  
en soit d'une couleur jaune.  
fleurs femelles qui, moins

occupent la partie inférieure de la capsule, les ovules sont globuleux, obtriangulaires, indéchissables.

nant ou dépassant même le volume de la tête d'un homme, ombiliqueux à leurs deux extrémités, dont l'inférieure, qui est plus grosse, est accablée du calice, tandis que la supérieure, en général plus ou moins turrescente, offre une petite cicatrice, le point de naissance du style. La surface de ces fruits, connus sous le nom de Coccolisse, d'une teinte verdâtre ou rosée, qui, à l'époque de la maturité, devient d'un brun plus ou moins terne; ces fruits sont de table; les noix ou drupes sèches offrent la structure suivante: la pellicule externe ou épiscarpium mince, sèche, très-résistante, cette pellicule et le noyau osseux occupent le centre du fruit; ce noyau est une sorte de bourse ou de filasse formée de fibres très-dures, entremêlées en tous sens; d'abord résistants, ces filaments s'évaporent et disparaissent à l'époque de la parfaite maturité. On fait des cordages et des grossiers avec cette filasse. Le fruit est plus ou moins volumineux et d'une extrême dureté; il offre des lignes saillantes et longitudinales; la base est percée de trois trous fermés par une membrane; dans son intérieur qui est creux, on trouve une seule drupe dressée, remplissant exactement la cavité, et qui se compose d'une partie propre, mince et parse-

originaire des Indes, aujourd'hui naturalisé dans les contrées équatoriales du continent. Il croît aussi dans un grand nombre d'épaves au milieu de l'océan. Il joint l'élégance à la simplicité : son tronc cylindrique, sur un pied et demi de diamètre, s'élève droit comme une colonne marquée de cicatrices circulaires provenant de la chute des feuilles couronné à son sommet d'une couronne de palmes dirigées dans les sens. Ces palmes ou feuilles, quelquefois jusqu'à douze et quinze pieds de longueur sur une largeur d'environ trois pieds ; les folioles qui les composent sont placées des deux côtés du pétiole commun, qui est nu dans sa partie inférieure où il est élargi et membraneux. Au centre de ces feuilles on trouve sur le sommet du stipe un bourgeon énorme et conique qui porte le nom de CROU-PALMIER, et qui se compose de feuilles dont le développement doit s'opérer plus tard, à mesure que les inférieures se défont et tombent, en laissant sur le stipe les cicatrices circu-

\* **COCOINIERES.** *Cocoina*. BOT. PHAN. Kunth (*Nov. Genes. et Species Orb. Nov.*, 1, p. 241) a donné ce nom à un groupe très-considérable de l'ordre des Palmiers, qui est caractérisé par un ovaire trilobulaire; par ses loges monospermes dont deux avortent souvent, et par la superficie des fruits non couverts d'écaillés imbriquées. Il y a placé les genres *Cocos*, L.; *Bactris*, Jacq.; *Kunthia*, Humb. et Bonpl.; *Alphanea*, Willd.; *Oreodoxa*, Willd.; *Martinezia*, R. et Pav.; *Alphonsia*, Kunth; *Ceroxylon*, H. B.; *Jubaea*, Kth., et *Attalea*, Kth. D'un autre côté, R. Brown (*Botany of Congo*, p. 37) a restreint ce nom de *Cocoina* aux Palmiers dont le fruit, originairement trilobulaire, a ses cellules, lorsqu'elles sont fertiles, percées dans le point opposé à la radicule de l'embryon; et quand il y en a d'avortées, elles sont indiquées par des trous qui ne traversent pas entièrement les parois du fruit (*foramina caeca*), ainsi qu'on peut l'observer dans la noix de Coco. (G..N.)

**COCOJA.** BOT. PHAN. (Rumph.) Nom de pays d'un Vaqueois rampant des îles de Banda et de Ternate. (B.)

**COCOLOBIS.** BOT. PHAN. (Plin.) Une variété de Raisin d'Espagne. (B.)

**COCON, COUCON** ou **COQUE.** On donne en général ce nom à l'enveloppe que se construisent certaines Chenilles du genre Bombyce, et qui leur sert de demeure pendant l'état de nymphe ou de chrysalide. Tout le monde connaît le Cocon du Bombyce du Mûrier, *Bombyx Mori*, qui fournit la soie. *V. LARVES.* Quelques Arachnides filent aussi une Coque; mais son usage est assez différent; elle contient les œufs et les abrite. (AUD.)

**COCORLI.** OIS. Espèce de Bécasseau. *V. ce mot.* (B.)

**COCOSTOL.** OIS. Pour Xochitl. *V. ce mot.* C'est aussi le nom mexicain de plusieurs Oiseaux qui appartiennent aux genres Gros-Bec et Troupiale. (DR..M.)

**COCOTIER.** *Cocos*. BOT. PHAN. Parmi les genres qui composent la famille des Palmiers, le Cocotier est sans contredit un des plus intéressans, par la beauté des espèces qui le composent, les usages variés auxquels leurs diverses parties peuvent être employées et les services qu'elles rendent aux habitans des contrées tropicales. Les caractères auxquels on reconnaît ce genre sont : des fleurs unisexuées, c'est-à-dire mâles et femelles, portées sur un même régime, et sortant d'une vaste spathe monophylle, qui se fend latéralement et se tarde point à tomber lorsque les fleurs sont épanouies; les fleurs mâles occupent la partie supérieure des ramifications du régime; elles sont beaucoup plus nombreuses que les femelles qui sont placées en dessous, position qui se rencontre presque constamment dans les Plantes monoïques, où elle favorise singulièrement la fécondation; les premières ont un calice régulier, un peu coriace, à six divisions très-profondes, dont trois intérieures plus minces et plus étroites sont considérées comme une corolle par quelques auteurs. Six étamines, dont les anthères sont à deux loges et sagittées, s'insèrent à la paroi interne du calice. Le centre de la fleur est occupé par un pistil rudimentaire et avorté. Dans les fleurs femelles, le calice est le même que dans les fleurs mâles; il est coriace et persistant. L'ovaire est sessile, globuleux ou à trois angles obtus, à trois loges contenant chacune un seul ovule dressé. De son sommet naît un style trifide dont chaque division porte un stigmate.

Les fruits varient beaucoup quant à leur forme, leur grosseur et leur couleur, suivant les diverses espèces. Ils sont en général assez gros, à trois angles peu marqués, accompagnés à leur base par le calice. Ils ont souvent une drupe ou noix plus ou moins sèche, contenant un noyau très-dur, uniloculaire et monosperme par suite d'un avortement constant. Ce noyau, qui est ovoïde, plus ou moins

longé, est percé à sa base de trois trous fermés par une membrane; la rainure qu'il renferme contient un endosperme charnu, très-volumineux, souvent creux à son intérieur qui est plein d'un liquide blanc et laiteux; d'une saveur douce et agréable. L'embryon est très-petit relativement à la masse de l'amanide, et placé dans une petite cavité qui occupe la partie inférieure de l'endosperme.

Toutes les espèces de Cocotiers sont des Arbres plus ou moins élevés, dont le stipe ou tronc est simple, et couronné à son sommet d'une touffe de grandes feuilles palmées, du milieu desquelles naissent les régimes de fleurs. Toutes croissent sous les tropiques. Nous mentionnerons ici comme les plus intéressantes :

Le **COCOTIER ORDINAIRE** ou **COCOTIER DES INDES**, *Cocos nucifera*, L., *Amer.*, t. 168. L'un des plus beaux et des plus intéressants de ce genre, ce Palmier, originaire des Indes Orientales, est aujourd'hui naturalisé dans toutes les contrées équatoriales du nouveau continent. Il croît aussi en Afrique, et dans un grand nombre des îles éparses au milieu de l'océan Pacifique. Il joint l'élégance à sa majesté : son tronc cylindrique, l'environ un pied et demi de diamètre, s'élève droit comme une colonne, marqué de cicatrices circulaires provenant de la chute des feuilles, et couronné à son sommet d'une touzaine de palmes dirigées dans tous les sens. Ces palmes ou feuilles ont quelquefois jusqu'à douze et quinze pieds de longueur sur une largeur d'environ trois pieds; les folioles qui les composent sont placées les deux côtés du pétiole commun, qui est nu dans sa partie inférieure ou il est élargi et membraneux. Au centre de ces feuilles on trouve sur le sommet du stipe un bourgeon énorme et conique qui porte le nom de **CHOU-LA-MISTRE**, et qui se compose de feuilles dont le développement doit s'opérer plus tard, à mesure que les inférieures se détachent et tombent, en laissant sur le stipe les cicatrices circu-

laire que nous y avons fait remarquer. Les spathe naissent de l'aisselle des feuilles inférieures; leur longueur est de quinze à vingt pouces; elles sont comprimées, pointues à leurs deux extrémités, et s'ouvrent d'un seul côté par une fente longitudinale, pour laisser sortir les fleurs qu'elles renferment; ces fleurs forment un régime ou spadice très-sensuel qui s'allonge beaucoup lorsqu'il s'est débarrassé de la spathe qui le recouvrait; elles sont d'une couleur jaune terne; aux fleurs femelles qui, moins nombreuses, occupent la partie inférieure des ramifications du spadice, succèdent des fruits globuleux, oblongs, souvent triangulaires, indurés, ayant ou dépassant même le volume de la tête d'un homme, ombiliqués à leurs deux extrémités, dont l'inférieure, qui est plus grosse, est accompagnée du calice, tandis que la supérieure, en général plus ou moins pointue, offre une petite cicatrice provenant du style. La surface de ces fruits connus sous le nom de **Cocos**, est lisse, d'une teinte verdâtre ou violacée; qui, à l'époque de la parfaite maturité, devient d'un brun plus ou moins terne; ces fruits sont de véritables noix ou drupes sèches, qui offrent la structure suivante : leur pellicule externe ou écorce est mince, sèche, très-résistante. Entre cette pellicule et le noyau osseux qui occupe le centre du fruit, on trouve une sorte de bourre ou de filasse formée de fibres très-dures, entrecroisées en tous sens; d'abord remplies de sève qui s'évaporent et disparaissent à l'époque de la parfaite maturité. On fait des cordages et des toiles grossières avec cette filasse. Le noyau est plus ou moins volumineux; épais et d'une extrême dureté; il offre trois lignes saillantes et longitudinales; et sa base est percée de trois trous qui sont fermés par une membrane noire; dans son intérieur qui est uniloculaire, on trouve une seule graine dressée, remplissant exactement la cavité, et qui se compose d'une tégument propre, mince et parsemé de

\* **COCOINÉES.** *Cocoinae.* BOT. PHAN. Kunth (*Nov. Genes. et Species Orb. Nov.*, 1, p. 241) a donné ce nom à un groupe très-considérable de l'ordre des Palmiers, qui est caractérisé par un ovaire triloculaire, par ses loges monospermes dont deux avortent souvent, et par la superficie des fruits non couverts d'écaillés imbriquées. Il y a placé les genres *Cocos*, L.; *Bactris*, Jacq.; *Kunthia*, Humb. et Bonpl.; *Alphanea*, Willd.; *Oreodoxa*, Willd.; *Martinezia*, R. et Pav.; *Alphansia*, Kunth; *Ceroxylon*, H. B.; *Jubaea*, Kth., et *Attalea*, Kth. D'un autre côté, R. Brown (*Botany of Congo*, p. 37) a restreint ce nom de *Cocoinae* aux Palmiers dont le fruit, originairement triloculaire, a ses cellules, lorsqu'elles sont fertiles, percées dans le point opposé à la radicule de l'embryon; et quand il y en a d'avortées, elles sont indiquées par des trous qui ne traversent pas entièrement les parois du fruit (*foramina caeca*), ainsi qu'on peut l'observer dans la noix de Coco. (G.N.)

**COCOJA.** BOT. PHAN. (Rumph.) Nom de pays d'un Vaquois rampant des îles de Banda et de Ternate. (B.)

**COCOLOBIS.** BOT. PHAN. (Plin.) Une variété de Raisin d'Espagne. (B.)

**COCON, COUCON, ou COQUE.** On donne en général ce nom à l'enveloppe que se construisent certaines Chenilles du genre Bombyce, et qui leur sert de demeure pendant l'état de nymphe ou de chrysalide. Tout le monde connaît le Cocon du Bombyce du Mûrier, *Bombyx Mori*, qui fournit le soie. V. LARVAE. Quelques Arachnides filent aussi une Coque; mais son usage est assez différent; elle contient les œufs et les abrite. (AUD.)

**COCORLI.** ORS. Espèce de Bécasseau: V. ce mot. (B.)

**COCOSTOL.** ORS. Pour Xochitol. V. ce mot. C'est aussi le nom mexicain de plusieurs Oiseaux qui appartiennent aux genres Gros-Bec et Troupiale. (DR..S.)

**COCOTIER.** *Cocos.* BOT. PHAN. Parmi les genres qui composent la famille des Palmiers, le Cocotier est sans contredit un des plus intéressans, par la beauté des espèces qui le composent, les usages variés auxquels leurs diverses parties peuvent être employées et les services qu'elles rendent aux habitans des contrées tropicales. Les caractères auxquels on reconnaît ce genre sont : des fleurs unisexuées, c'est-à-dire mâles et femelles, portées sur un même régime, et sortant d'une vaste spathe monophylle, qui se fend latéralement et tarde point à tomber lorsque les fleurs sont épanouies; les fleurs mâles occupent la partie supérieure des ramifications du régime; elles sont beaucoup plus nombreuses que les femelles qui sont placées en dessous. position qui se rencontre presque constamment dans les Plantes monoïques, où elle favorise singulièrement la fécondation; les premières ont un calice régulier, un peu coriace, à six divisions très-prolongées, dont trois intérieures plus minces et plus étroites sont considérées comme une corolle par quelques auteurs. Sur étamines, dont les anthères sont à deux loges et sagittées, s'insèrent à la paroi interne du calice. Le centre de la fleur est occupé par un pistil rudimentaire et avorté. Dans les fleurs femelles, le calice est le même que dans les fleurs mâles; il est coriace et persistant. L'ovaire est sessile, globuleux ou à trois angles obtus, à trois loges contenant chacune un seul ovule dressé. De son sommet naît un style trifide dont chaque division porte un stigmate.

Les fruits varient beaucoup quant à leur forme, leur grosseur et leur couleur, suivant les diverses espèces. Ils sont en général assez gros, à trois angles peu marqués, accompagnés à leur base par le calice. Ils sont tantôt une drupe ou noix plus ou moins sèche, contenant un noyau très-dur, uniloculaire et monosperme par suite d'un avortement constant. Ce noyau, qui est ovoïde, plus ou moins

longé, est percé à sa base de trois trous fermés par une membrane; la racine qu'il renferme contient un endosperme charnu, très-volumineux, souvent creux à son intérieur qui est rempli d'un liquide blanc et laiteux; son goût est d'un agréable embryon est très-petit relativement à la masse de l'axe, et placé dans une petite cavité qui occupe la partie supérieure de l'endosperme.

Toutes les espèces de Cocotiers sont des Arbres plus ou moins élevés, dont le tronc ou le stipe est simple, et couronné à son sommet d'une touffe de grandes feuilles palmées, du milieu desquelles naissent les régimes de fruits. Toutes croissent sous les tropiques. Nous mentionnerons ici comme les plus intéressantes :

Le COCOTIER ORDINAIRE ou COCOTIER DES INDES, *Cocos nucifera*, L., Jacq., *Amer.*, t. 168. L'un des plus beaux et des plus intéressants de ce genre, ce Palmier, originaire des Indes orientales, est aujourd'hui naturalisé dans toutes les contrées équatoriales du nouveau continent. Il croît aussi en Afrique, et dans un grand nombre des îles éparses au milieu de l'Océan Pacifique. Il joint l'élégance à la majesté; son tronc cylindrique, d'environ un pied et demi de diamètre, s'élève droit comme une colonne, marqué de cicatrices circulaires provenant de la chute des feuilles, et couronné à son sommet d'une couronne de palmes dirigées dans tous les sens. Ces palmes ou feuilles ont quelquefois jusqu'à douze et quinze pieds de longueur sur une largeur d'environ trois pieds; les folioles qui les composent sont placées sur les deux côtés du pétiole commun, qui est nu dans sa partie inférieure et il est élargi et membraneux. Au milieu de ces feuilles on trouve sur le sommet du stipe un bourgeon énorme et conique qui porte le nom de CHOU-ALMISTE, et qui se compose de feuilles dont le développement doit s'opérer plus tard, à mesure que les inférieures se séchent et tombent, en laissant sur le stipe les cicatrices circu-

lairement que nous y avons fait remarquer. Les spathe naissent de l'aisselle des feuilles inférieures; leur longueur est de quinze à vingt poises; elles sont comprimées, pointues à leurs deux extrémités, et s'ouvrent d'un seul côté par une fente longitudinale, pour laisser sortir les fleurs, qu'elles renferment; ces fleurs forment un régime ou spadice très-souple qui s'allonge beaucoup lorsqu'il s'est dégagé de la spathe qui le recouvrait; elles sont d'une couleur jaune terne; aux fleurs femelles qui, moins nombreuses, occupent la partie inférieure des ramifications du spadice, succèdent des fruits globuleux, obscurément triangulaires, indurés, ayant ou dépassant même le volume de la tête d'un homme, ombiliqués à leurs deux extrémités, dont l'inférieure, qui est plus grosse, est accompagnée du calice, tandis que la supérieure, en général plus ou moins pointue, offre une petite cicatrice provenant du style. La surface de ces fruits connus sous le nom de Cocos, est lisse, d'une teinte verdâtre ou violacée; qui, à l'époque de la parfaite maturité, devient d'un brun plus ou moins terne; ces fruits sont de véritables noix ou drupes sèches, qui offrent la structure suivante: leur pellicule externe ou épisperme est mince, sèche, très-résistante. Entre cette pellicule et le noyau osseux qui occupe le centre du fruit, se trouve une sorte de bourre ou de filasse formée de fibres très-dures, entremêlées en tous sens; d'abord remplies de sève qui s'évaporent et disparaissent à l'époque de la parfaite maturité. On fait des cordages et des toiles grossières avec cette filasse. Le noyau est plus ou moins volumineux; épais et d'une extrême dureté; il offre trois lignes saillantes et longitudinales; et sa base est percée de trois trous qui sont fermés par une membrane noire; dans son intérieur qui est uniloculaire, on trouve une seule graine dressée, remplissant exactement la cavité, et qui se compose d'un tegument propre, mince et parsemé de

\* COCOINÉES. *Cocoinae*. BOT.

PHAN. Kunth (*Nov. Genes. et Species Orb. Nov.*, 1. p. 241) a donné ce nom à un groupe très-considérable de l'ordre des Palmiers, qui est caractérisé par un ovaire trilobulaire, par ses loges monospermes dont deux avortent souvent, et par la superficie des fruits non couverts d'écaillés imbriquées. Il y a placé les genres *Cocos*, L.; *Bactris*, Jacq.; *Kunthia*, Humb. et Bonpl.; *Alphanea*, Willd.; *Oreodoxa*, Willd.; *Martinezia*, R. et Pav.; *Alphansia*, Kunth; *Ceraptylon*, H. B.; *Jubaea*, Kth., et *Attalea*, Kth. D'un autre côté, R. Brown (*Botany of Congo*, p. 37) a restreint ce nom de *Cocoinae* aux Palmiers dont le fruit, originairement trilobulaire, a ses cellules, lorsqu'elles sont fertiles, percées dans le point opposé à la radicule de l'embryon; et quand il y en a d'avortées, elles sont indiquées par des trous qui ne traversent pas entièrement les parois du fruit (*foramina caeca*), ainsi qu'on peut l'observer dans la noix de Coco. (G. N.)

## COCOJA. BOT. PHAN. (Rumph.)

Nom de pays d'un Vaquois rampant des îles de Banda et de Ternate. (B.)

## COCOLOBES. BOT. PHAN. (Pline.)

Une variété de Raisin d'Espagne. (B.)

## COCON, COUCON ou COQUE.

On donne en général ce nom à l'enveloppe que se construisent certaines Chenilles du genre Bombyce, et qui leur sert de demeure pendant l'état de nymphe ou de chrysalide. Tout le monde connaît le Cocon du Bombyce du Mûrier, *Bombyx Mori*, qui fournit le soie. V. LARVES. Quelques Arachnides filent aussi une Coque; mais son usage est assez différent; elle contient les œufs et les abrite. (AUD.)

## COCORLI. ORS. Espèce de Bécasseau. F. de mot. (B.)

COCOSTOL. ORS. Pour Kochhol. F. ce mot. C'est aussi le nom mexicain de plusieurs Oiseaux qui appartiennent aux genres Gros-Bec et Troupiale. (DR. A.)

COCOTIER. *Cocoe*, BOT. PHAN.

Parmi les genres qui composent la famille des Palmiers, le Cocotier est sans contredit un des plus intéressans, par la beauté des espèces qui le composent, les usages variés auxquels leurs diverses parties peuvent être employées et les services qu'elles rendent aux habitans des contrées tropicales. Les caractères auxquels on reconnaît ce genre sont : des fleurs unisexuées, c'est-à-dire mâles et femelles, portées sur un même régime, et sortant d'une vaste spathe monophylle, qui se fend latéralement et se tarde point à tomber lorsque les fleurs sont épanouies; les fleurs mâles occupent la partie supérieure des ramifications du régime; elles sont beaucoup plus nombreuses que les femelles qui sont placées en dessous, position qui se rencontre presque constamment dans les Plantes monoïques, où elle favorise singulièrement la fécondation; les premières ont un calice régulier, un peu coriace, à six divisions très-prolongées, dont trois intérieures plus minces et plus étroites sont considérées comme une corolle par quelques auteurs. Six étamines, dont les anthères sont à deux loges et sagittées, s'insèrent à la paroi interne du calice. Le centre de la fleur est occupé par un pistil rudimentaire et avorté. Dans les fleurs femelles, le calice est le même que dans les fleurs mâles; il est coriace et persistant. L'ovaire est sessile, globuleux ou à trois angles obtus, à trois loges contenant chacune un seul ovule dressé. De son sommet naît un style trifide dont chaque division porte un stigmate.

Les fruits varient beaucoup quant à leur forme, leur grosseur et leur couleur, suivant les diverses espèces. Ils sont en général arrondis, à trois angles peu marqués, accompagnés à leur base par le calice. Ils contiennent une drupe ou noix plus ou moins sèche, contenant un noyau très-dur, uniloculaire et monosperme par suite d'un avortement constant. Ce noyau, qui est ovoïde, plus ou moins

longé, est percé à sa base de trois trous fermés par une membrane; la rainure qu'il renferme contient un endosperme charnu, très-volumineux, souvent creux à son intérieur qui est plein d'un liquide blanc et laiteux; d'une saveur douce et agréable. L'embryon est très-petit relativement à la masse de l'amande, et placé dans une petite cavité qui occupe la partie inférieure de l'endosperme.

Toutes les espèces de Cocotiers sont les Arbres plus ou moins élevés, dont le stipe ou tronc est simple, et couronné à son sommet d'une touffe de grandes feuilles palmées, du milieu desquelles naissent les régimes de leurs. Toutes croissent sous les tropiques. Nous mentionnerons ici comme plus intéressantes :

Le *COCOTIER ORDINAIRE* ou *COCOTIER DES INDES*, *Cocos nucifera*, L., Jacq., *Amér.*, t. 168. L'un des plus beaux et des plus intéressants de ce genre, ce Palmier, originaire des Indes Orientales, est aujourd'hui naturalisé dans toutes les contrées équatoriales du nouveau continent. Il croît aussi en Afrique, et dans un grand nombre des îles éparses au milieu de l'Océan Pacifique. Il joint l'élégance à la majesté; son tronc cylindrique, d'environ un pied et demi de diamètre, s'élève droit comme une colonne, marqué de cicatrices circulaires provenant de la chute des feuilles, et couronné à son sommet d'une touffe de palmes dirigées dans tous les sens. Ces palmes ou feuilles ont quelquefois jusqu'à douze et quinze pieds de longueur sur une largeur d'environ trois pieds; les folioles qui les composent sont placées les deux côtés du pétiole commun, qui est nu dans sa partie inférieure ou il est élargi et membraneux. Au centre de ces feuilles on trouve sur le sommet du stipe un bourgeon énorme et conique qui porte le nom de *Craou* ou *ALMISTE*, et qui se compose de feuilles dont le développement doit s'opérer plus tard, à mesure que les inférieures se séchent et tombent, en laissant sur le stipe les cicatrices circu-

laires que nous y avons fait remarquer. Les spathe naissent de l'aisselle des feuilles inférieures; leur longueur est de quinze à vingt pouces; elles sont comprimées, pointues à leurs deux extrémités, et s'ouvrent d'un seul côté par une fente longitudinale, pour laisser sortir les fleurs qu'elles renferment; ces fleurs forment un régime ou spadice très-nombreux qui s'allonge beaucoup lorsqu'il s'est dégagé de la spathe qui le recouvrait; elles sont d'une couleur jaune-terre; aux fleurs femelles qui, moins nombreuses, occupent la partie inférieure des ramifications du spadice, succèdent des fruits globuleux, oblongs, triangulaires, indurés, ayant ou dépassant même le volume de la tête d'un homme, ombiliqués à leurs deux extrémités, dont l'inférieure, qui est plus grosse, est accompagnée du calice, tandis que la supérieure, en général plus ou moins pointue, offre une petite cicatrice provenant du style. La surface de ces fruits connus sous le nom de *Cocos*, est lisse, d'une teinte verdâtre ou violacée; qui, à l'époque de la parfaite maturité, devient d'un brun plus ou moins terne; ces fruits sont de véritables noix ou drupes sèches, qui offrent la structure suivante: leur pellicule externe ou épicarpe est mince, sèche, très-résistante. Entre cette pellicule et le noyau osseux qui occupe le centre du fruit, se trouve une sorte de bourse ou de flaque formée de fibres très-dures, entrecroisées en tous sens; d'abord remplies de sèves qui s'évaporent et disparaissent à l'époque de la parfaite maturité. On fait des cordages et des toiles grossières avec cette flaque. Le noyau est plus ou moins volumineux; épais et d'une extrême dureté; il offre trois lignes saillantes et longitudinales; et sa base est percée de trois trous qui sont fermés par une membrane noire; dans son intérieur qui est uniloculaire, on trouve une seule graine dressée, remplissant exactement la cavité, et qui se compose d'un tégument propre, mince et parsemé de

\* **COCOINÉES.** *Cocoina*, BOT. PHAN. Kunth (*Nov. Gener. et Species Orb. Nov.*, 1, p. 241) a donné ce nom à un groupe très-considérable de l'ordre des Palmiers, qui est caractérisé par un ovaire trilobulaire; par ses loges monospermes dont deux avortent souvent, et par la superficie des fruits non couverts d'écaillés imbriquées. Il y a placé les genres *Cocos*, L.; *Bactris*, Jacq.; *Kunthia*, Humb. et Bonpl.; *Alphantes*, Willd.; *Oreodoxa*, Willd.; *Martinezia*, R. et Pav.; *Alphonsia*, Kunth; *Ceraxylon*, H. B.; *Subaca*, Kth., et *Attalea*, Kth. D'un autre côté, R. Brown (*Botany of Congo*, p. 37) a restreint ce nom de *Cocoina* aux Palmiers dont le fruit, originairement trilobulaire, a ses cellules, lorsqu'elles sont fertiles, percées dans le point opposé à la radicule de l'embryon; et quand il y en a d'avortées, elles sont indiquées par des trous qui ne traversent pas entièrement les parois du fruit (*foramina caeca*), ainsi qu'on peut l'observer dans la noix de Coco. (G..N.)

**COCOJA.** BOT. PHAN. (Rumph.) Nom de pays d'un Vaguois rampant des îles de Banda et de Ternate. (B.)

**COÇOLOBIS.** BOT. PHAN. (Plin.) Une variété de Raisin d'Espagne. (B.)

**COCON, COUCON ou COQUE.** On donne en général ce nom à l'enveloppe que se construisent certaines Chenilles du genre Bombyce, et qui leur sert de demeure pendant l'état de nymphe ou de chrysalide. Tout le monde connaît le Cocon du Bombyce du Mûrier, *Bombyx Mori*, qui fournit la soie. *V. LARVES.* Quelques Arachnides filent aussi une Coque; mais son usage est assez différent; elle contient les œufs et les abrita. (AUD.)

**COCORIL.** OIS. Espèce de Bécasseau: *V. de mot.* (B.)

**COCOSTOL.** OIS. Pour Xochtol. *V. de mot.* C'est aussi le nom mexicain de plusieurs Oiseaux qui appartiennent aux genres Gros-Bec et Tropicale. (DA..M.)

**COCOTIER.** *Cocot*, BOT. PHAN.

Parmi les genres qui composent la famille des Palmiers, le Cocotier est sans contredit un des plus intéressans, par la beauté des espèces qui le composent, les usages variés auxquels leurs diverses parties peuvent être employées et les services qu'elles rendent aux habitans des contrées tropicales. Les caractères auxquels on reconnaît ce genre sont : des fleurs unisexuées, c'est-à-dire mâles et femelles, portées sur un même régime, et sortant d'une vaste spathe monophylle, qui se fend latéralement et ne tarde point à tomber lorsque les fleurs sont épanouies; les fleurs mâles occupent la partie supérieure des ramifications du régime; elles sont beaucoup plus nombreuses que les femelles qui sont placées en dessous, position qui se rencontre presque constamment dans les Plantes monoïques, où elle favorise singulièrement la fécondation; les premières ont un calice régulier, un peu coriace, à six divisions très-profondes, dont trois intérieures plus minces et plus étroites sont considérées comme une corolle par quelques auteurs. Ses étamines, dont les anthères sont à deux loges et sagittées, s'insèrent à la paroi interne du calice. Le centre de la fleur est occupé par un pistil rudimentaire et avorté. Dans les fleurs femelles, le calice est le même que dans les fleurs mâles; il est coriace et persistant. L'ovaire est sessile, globuleux ou à trois angles obtus, à trois loges contenant chacune un seul ovule dressé. De son sommet naît un style trifide dont chaque division porte un stigmate.

Les fruits varient beaucoup quant à leur forme, leur grosseur et leur couleur, suivant les diverses espèces. Ils sont en général assez gros, à trois angles peu marqués, accompagnés à leur base par le calice. Ils ont une texture d'une drupe ou noix plus ou moins sèche, contenant un noyau très-dur, uniloculaire et monosperme par suite d'un avortement constant. Ce noyau, qui est ovale, plus ou moins



longé, est percé à sa base de trois trous fermés par une membrane; la rainure qu'il renferme contient un endosperme charnu, très-volumineux, souvent creux à son intérieur qui est plein d'un liquide blanc et laiteux; une saveur douce et agréable. L'embryon est très-petit relativement à la masse de l'amande, et placé dans une petite cavité qui occupe la partie inférieure de l'endosperme.

Toutes les espèces de Cocotiers sont les Arbres plus ou moins élevés, dont le stipe ou tronc est simple, et couronné à son sommet d'une touffe de grandes feuilles palmées, du milieu desquelles naissent les régimes de fruits. Toutes croissent sous les tropiques. Nous mentionnerons ici comme les plus intéressantes :

Le *COCOTIER ORDINAIRE* ou *Cocotier des Indes*, *Cocos nucifera*, L., acq., *Amer.*, t. 168. L'un des plus beaux et des plus intéressants de ce genre, ce Palmier, originaire des Indes Orientales, est aujourd'hui naturalisé dans toutes les contrées équatoriales du nouveau continent. Il croît aussi en Afrique, et dans un grand nombre des îles éparses au milieu de l'océan Pacifique. Il joint l'élégance à la majesté : son tronc cylindrique, l'environ un pied et demi de diamètre, s'élève droit comme une colonne, marqué de cicatrices circulaires provenant de la chute des feuilles, et couronné à son sommet d'une touzaine de palmes dirigées dans tous les sens. Ces palmes ou feuilles ont quelquefois jusqu'à douze et quinze pieds de longueur sur une largeur d'environ trois pieds; les folioles qui les composent sont placées des deux côtés du pétiole commun, qui est nu dans sa partie inférieure et qui est élargi et membraneux. Au centre de ces feuilles on trouve sur le sommet du stipe un bourgeon énorme et conique qui porte le nom de *Crown* ou *ALMISTE*, et qui se compose de feuilles dont le développement doit s'opérer plus tard, à mesure que les inférieures se séchent et tombent, en laissant sur le stipe les cicatrices circu-

laire que nous y avons fait remarquer. Les spathes naissent de l'aisselle des feuilles inférieures; leur longueur est de quinze à vingt pouces; elles sont comprimées, pointues à leurs deux extrémités, et s'ouvrent d'un seul côté par une fente longitudinale, pour laisser sortir les fleurs qu'elles renferment; ces fleurs forment un régime ou spadice très-rameux qui s'allonge beaucoup lorsqu'il s'est débarrassé de la spathe qui le recouvrait; elles sont d'une couleur jaune terne; aux fleurs femelles qui, moins nombreuses, occupent la partie inférieure des ramifications du spadice, succèdent des fruits globuleux, obscurément triangulaires, indurés, ayant ou dépassant même le volume de la tête d'un homme, ombiliqués à leurs deux extrémités, dont l'inférieure, qui est plus grosse, est accompagnée du calice, tandis que la supérieure, en général plus ou moins pointue, offre une petite cicatrice provenant du style. La surface de ces fruits connus sous le nom de *Cocos*, est lisse, d'une teinte verdâtre ou violacée; qui, à l'époque de la parfaite maturité, devient d'un brun plus ou moins terne; ces fruits sont de véritables noix ou drupes sèches, qui offrent la structure suivante : leur pellicule externe ou épicarpe est mince, sèche, très-résistante. Entre cette pellicule et le noyau osseux qui occupe le centre du fruit, se trouve une sorte de bourre ou de filasse formée de fibres très-dures, entremêlées en tous sens; d'abord remplies de sève qui s'évaporent et disparaissent à l'époque de la parfaite maturité. On fait des cordages et des voiles grossières avec cette filasse. Le noyau est plus ou moins volumineux, épais et d'une extrême dureté; il offre trois lignes saillantes et longitudinales; et sa base est percée de trois trous qui sont fermés par une membrane noire; dans son intérieur qui est uniloculaire, on trouve une seule graine dressée, remplissant exactement la cavité, et qui se compose d'un tegument propre, mince et parsemé de

vaisseaux ramifiés, se détachant facilement lorsque le fruit est récent. L'endosperme est très-gros, charnu, blanc, creusé à son centre d'une grande cavité pleine d'une sorte d'émulsion blanche, douce, un peu sucrée, et très-agréable. L'embryon est petit et placé dans une seconde cavité beaucoup plus petite, et occupant la partie inférieure de l'endosperme. Cette amande est la partie la plus précieuse du Cocotier. Elle sert de nourriture aux peuples qui habitent les contrées où croît ce bel Arbre. Sa saveur est douce, et ressemble beaucoup à celle des Amandes ou des Noisettes fraîches. Le lait que contient sa cavité est une boisson aussi saine qu'agréable, très-recherchée dans les climats brûlans où vivent les Cocotiers. Lorsque l'on coupe l'extrémité supérieure des spathes avant l'épanouissement des fleurs, il en sort en abondance un fluide aqueux et sucré que l'on recueille avec soin. Au bout de quelques heures, cette liqueur a pris une saveur légèrement aigrelette qui en fait une boisson délicieuse, et que l'on connaît sous le nom de *Souva* ou vin de Palmier. On peut par la distillation en retirer un Alcool assez bon, ou, en le faisant réduire sur le feu et y ajoutant un peu de craie, obtenir une sorte de sirop ou de conserve qui se prend en masse et cristallise confusément. Les habitans peu fortunés s'en servent pour conserver toutes sortes de fruits.

Quelquefois on cueille les Cocos avant leur maturité : leur amande, qui est alors peu consistante, est plus délicate, et plus recherchée, quand elle est parfaitement mûre, on peut en préparer des émulsions semblables à celles que l'on fait en Europe avec les Amandes douces ou les Noisettes. Si les Cocos ont été conservés pendant quelque temps, leur amande est moins agréable ; elle devient rance à cause de la grande quantité d'huile qu'elle contient ; cette huile que l'on obtient par expression est très-douce et fort recher-

chée dans l'Inde où on l'emploie à une foule d'usages domestiques.

Le bois du tronc est très-dur, très-résistant, et les constructions où on l'emploie sont extrêmement solides et durables ; enfin leur noyau sert à faire différens vases et ustensiles de ménage. Il est d'une dureté extraordinaire, et susceptible du poli le plus fin.

Outre les avantages que nous venons d'énumérer rapidement, le Cocotier en présente un non moins précieux, celui de s'accommoder des terrains les plus maigres et les plus sablonneux, de ceux enfin où tout autre Végétal ne peut vivre. C'est surtout dans le voisinage de la mer, sur les plages basses et humides, que ce bel Arbre croît avec le plus de rapidité, et qu'il parvient à la hauteur la plus grande.

Le **COCOTIER DU BRÉSIL**, *Cocos butyracea*, L., Suppl. Cette espèce est, selon plusieurs naturalistes voyageurs, plus belle et plus grande que la précédente. Elle croît dans diverses parties de l'Amérique méridionale, et principalement au Brésil. Son fruit est moins gros, plus succulent que celui du Cocotier des Indes ; son noyau est simplement cartilagineux, et non dur et osseux ; les habitans des régions où il croît écrasent les coques de ses fruits avec leurs amandes, les jettent dans des vases pleins d'eau, et en retirent, par ce procédé simple et peu dispendieux, une huile épaisse et ayant à peu près la consistance du beurre frais. Cette huile, très-douce lorsqu'elle est récente, est employée aux divers usages domestiques.

Gaertner a décrit et figuré (de *Fruct.* T. VI) une espèce de Cocotier qu'il nomme *Cocos lapidea*. On ne la connaît encore que par ses fruits qui sont moins gros que ceux du Cocotier commun, mais dont le noyau a les parois beaucoup plus épaisses et assez souvent à deux ou même à trois loges. On ignore sa patrie, quoiqu'on le trouve assez communément dans le commerce. Il est extrêmement probable qu'il vient de l'Inde. On

dit avec son noyau de petits vases, es coquetiers, des pommes de canes, des verres à liqueurs et divers ornemens. (A.R.)

**COCOTIER DE MER.** BOT. PHAN. Nom vulgaire du *Borassus flabelliformis*, L. *V.* BORASSUS. (B.)

**COCOTLI.** ois. (Hernandez.) Syn. mexicain de la petite Tourterelle de Saint-Domingue, Buff., *Columba passerina*, Gmel. *V.* PIGEON. (DR..Z.)

**COCOTZIN.** ois. Qu'il ne faut pas confondre, comme on le fait dans le Dictionnaire de Dérivillé, avec Cocotli. Espèce du genre Pigeon, Tourterelle Cocotzin, *Columba Passerina*, Lath., Buff., pl. enl. 243. *V.* PIGEON. (DR..Z.)

**COCOTZON.** ois. (Lachênaye-Des-ois.) Pour Cocozton. *V.* ce mot. (B.)

**COCOUAN.** ois. Syn. vulgaire de Marouette, *Rallus Porzana*, L. *V.* GALLINULE. (DR..Z.)

**COCOXUIHITL.** BOT. PHAN. (Hernandez.) Syn. mexicain de *Boccone frutescente*. (B.)

**COCOZTON.** ois. Hernandez donne ce nom à un petit Oiseau du Mexique, qu'il dit avoir quelque ressemblance avec le Chardonneret. (DR..Z.)

**COCQ-LÉZARD.** REPT. SAUR. On quelquefois donné ce nom à l'Iguane. (B.)

\* **COCQUAR.** BOT. PHAN. Variété de la Rose de Provins extrêmement oubliée, dans le midi de la France. (B.)

**COCQUARD ou COCQUAR.** ois. On donne au métis provenu du Faucon mâle avec la femelle du Coq. (DR..Z.)

**COCRÈTE et COCRISTE.** BOT. PHAN. Syn. vulgaires des genres Alec-nolophe et Rhinanthé. *V.* ces mots. (G.N.)

\* **COCROOTES.** BOT. PHAN. Nom de pays du fruit du *Bactris*. (B.)

**COCTANA.** BOT. PHAN. (Pline.) Variété de Figues. (B.)

\* **COCTEN.** BOT. PHAN. Syn. d'*Ethuse*. *V.* ce mot. (B.)

**CO-CU.** BOT. PHAN. Syn. cochinois de *Cyperus rotundus*, L. *V.* SOUCHET. (B.)

**COCU.** ois. Vieux nom français du *Cuculus Canorus*, L. *V.* ce mot. (B.)

**COCU ou COUCOU.** BOT. PHAN. Le *Primula veris* dans quelques provinces de France. (B.)

**COCUE.** BOT. PHAN. Vieux nom français de la Ciguë. (B.)

**COCUJUS.** INS. (Mouffet.) Syn. d'*Elatér noctilucus*, par corruption de *Cucujus*. (G.)

**COCUT.** ois. Syn. catalan du Coucou gris, *Cuculus Canorus*, L. *V.* COUCOU. (DR..Z.)

**CO-CUT-LON.** BOT. PHAN. Nom du *Lamium garganicum* en Cochinchine. (B.)

\* **COD.** rois. Syn. de Cabillaud, dans les langues d'origine saxonne, d'où *Cod-Fisch*, *Cod-Lingue*, etc., en anglais. (B.)

**CODAGAM ou CODAGEN.** BOT. PHAN. (Rhéede, *Mal.* 10, t. 46.) Syn. d'*Hydrocotyle asiatica*, L. (B.)

**CODAGAPALA.** BOT. PHAN. (Rhéede.) Aussi nommé Conossi. Syn. de *Nerium antidysentericum*, L. *V.* WRIGHTIA. (B.)

**CODAGEN.** BOT. PHAN. *V.* CODAGAM.

\* **CODAIPILLOU.** BOT. PHAN. Syn. d'*Andropogon* à la côte de Coromandel. (B.)

\* **CODALANCEA.** ois. Syn. romain du Pilet, *Anas acuta*, L. *V.* CANARD. (DR..Z.)

**CODALIAN.** BOT. PHAN. Syn. gallois d'*Atropa Belladonna*. *V.* BELLADONE. (B.)

**CODA-PAIL, CQDO-PAIL ou CAPO-CAPO.** BOT. PHAN. Syn. de *Pistia Stratiotes*, L. *V.* PISTIA. (B.)

**CODA-PILAVA.** BOT. PHAN. *V.* CADA-PILAVA.

\* **CODARIUM** ou **CODARION**. *Codarium*. BOT. PHAN. Le genre *Diatium* de Willdenow comprenait une espèce qui, à la vérité, en présentait les caractères extérieurs, mais dont Vahl a reconnu la distinction générique. Ce nouveau genre, auquel il a donné le nom de *Codarium*, offre les caractères suivans : calice à cinq folioles ; un seul pétale linéaire, lancéolé, inséré sur le tube du calice ; deux étamines ayant la même insertion ; style unique ; gousse libre, pédicellée, uniloculaire, renfermant deux ou trois semences dans une pulpe farineuse. Si ces caractères sont exacts, c'est une singulière anomalie que cette corolle d'un seul pétale linéaire ; nous ne savons pas si une pareille organisation a son analogue dans les autres Dicotylédones, à moins qu'on ne la compare à la corolle du *Cissampelos* femelle, cas pour lequel Link a créé le terme exact, quoique peu grammatical, de *Flor unipetalis* (F. D. C. ; Théor. élém., 2<sup>e</sup> édit., p. 128).

Ce genre appartient à la Diandrie Monogynie L., mais sa place dans l'ordre naturel n'est pas encore déterminée. Il renferme deux espèces indigènes de la Guinée : le **CODARION LYMAN**, *Codarium nitidum*, Vahl, *Diatium guineense*, Willd. ; et le **CODARION A FEUILLES OBTUSES**, *Codarium obtusifolium*, Vahl. Ce sont deux Arbres de grandeur médiocre, à feuilles ailées, et ne possédant qu'un petit nombre de fleurs. (G. N.)

**GODA-TREMOLA**. ors. Syn. italien de la Lavandière, *Motacilla alba*, L. F. BERGERONNETTE. (DR. Z.)

**GODDA - PANNA**. BOT. PHAN. (Rhéde.) Syn. de *Corypha umbraculifera*, L. (B.)

**CODDAM - PULLI**. BOT. PHAN. (Rhéde.) Syn. de *Cambogia gutta*. F. GUTHRIE. (B.)

\* **CODDEL-CAUKA**. ots. (Pétiver.) Syn. de Coupeur d'eau, *Rhynchos nigræ*, L., à Madras. F. DEC-ENCISEAU. (DR. Z.)

\* **CODDI-MODDY**. ors. Syn. vul-

gaire en Angleterre de Mouette d'hiver, Buff. ; *Larus hybernus*, L. F. MAUVE. (DR. Z.)

\* **CODETTA**. ors. Syn. romain de la Bergeronnette grise, *Motacilla alba*, L. On nomme *Codetta-gialla* la *Motacilla flava*. F. BERGERONNETTE. (DR. Z.)

**CODIÆUM**. BOT. PHAN. Le *Croton variegatum* de Linné a été séparé de ce genre par Loureiro qui l'a appelé *Phyllaurea*, à cause de ses feuilles panachées de jaune. Tout en conservant le genre de Loureiro, il semble qu'à son nom, d'Étymologie moitié grecque, moitié latine, il convient de préférer celui de *Codicum* cité plus anciennement par Rumph, pour désigner le même Végétal. Ses fleurs sont monoïques. Dans les mâles, le calice présente cinq divisions profondes et réfléchies, avec lesquelles alternent cinq écailles plus courtes, tandis que cinq glandes rangées sur un cercle encore plus intérieur leur sont opposées. Les filets nombreux s'insèrent au réceptacle, et leur sommet aplati et dilaté légèrement porte sur ses côtés les deux loges de l'anthere. Les fleurs femelles ont un calice quinquéfide, trois styles simples, allongés, réfléchis. L'épave qu'environnent cinq écailles à sa base est à trois loges contenant chacune un ovule unique. Le fruit légèrement charnu renferme trois coques.

Le *Codium variegatum* est un Arbre ou un Arbrisseau à feuilles alternes, entières, glabres, luisantes, à fleurs en épis axillaires ou terminaux, les uns entièrement mâles, les autres entièrement femelles. Il croît aux Indes, à la Cochinchine, dans les îles Moluques et dans celles du Japon. On se plaît à l'y multiplier à cause de l'élégance de son feuillage et de l'usage fréquent qu'on en fait dans les fêtes et les cérémonies : aussi en compte-t-on de nombreuses variétés.

On doit réunir à ce genre un Arbre ou Arbrisseau de Tabor, qui en offre tous les caractères, si ce n'est que la consistance de son fruit est un peu plus sèche. (A. D. J.)

**CODIA-MINUM** ET **CODIA-M.** BOT. PHAN. (Plèbe.) Plante bulbeuse indéterminée qu'on a rapportée à Narcisse sans Narcisse et au Colchique. (B.)

**CODI-AVANACU.** BOT. PHAN. non *Avenacu*. Syn. malabare de *Agia Chamalea*. (B.)

**CODIBO.** BOT. PHAN. Même chose que *Codium*. V. ce mot, à Ternate. (B.)

**CODIBUGNOLO.** ois. Syn. italien de la Mésange à longue queue, *Urus camellus*, L. V. Mésange. (B.)

**CODICE - KARANDEI.** BOT. PHAN. (Burm.) Syn. de *Sphaeranthus amaranthoides*. (B.)

**CODIE.** *Codia*. BOT. PHAN. Ce genre a été fondé par Forster, (*Character. Generum Plantarum*, p. 59, t. 30), adopté ensuite par Linné fils, et par L'abbé qui, sans déterminer ses affinités naturelles, ont ainsi exposé ses caractères : calice à quatre sépales elliptiques dressés ; corolle formée de quatre pétales linéaires, à onglets filiformes ; huit étamines insérées à leur base, du double plus longues que le calice, et à anthères globuleuses ; ovaire unique, petit, supérieur, à quatre ovules surmontés de deux styles subulés, de la longueur des étamines et terminés par deux stigmates simples. Le fruit est inconnu ; les fleurs sont réunies dans un involucre commun composé de folioles oblongues. Elles ont une apparence globuleuse (d'où le nom générique qui en est dérivé signifie globule), comme dans quelques espèces de *Brunia* avec lesquelles Lussan compare ce genre, quoiqu'il l'ait relégué parmi les *infructuosa sedis*. Cependant d'autres botanistes lui ont trouvé des rapports avec *H. einmannia*, et le placent dans la famille des Cunoniacées.

La seule espèce de ce genre qui ait été publiée, est le *Codia monnina*, Forst. et L. F., Arbrisseau de la Nouvelle-Hollande, à feuilles entières opposées et très-glabres, à

fleurs en capitales axillaires ou terminales. (C. N.)

**CODIGI.** BOT. PHAN. La Plante de la Triandrie de Linné, que Rhéede décrit sous ce nom et comme une espèce de Pulmonaire, croît aux lieux sablonneux de la côte de Malabar, à ses feuilles en cœur, sa corolle tripartite, et n'est encore que trop imparfaitement connue pour qu'on puisse la classer. (B.)

**CODIHÔ-TSJINA.** BOT. PHAN. (Rumph.) Espèce indéterminée du genre *Nerium*, originaire de la Chine, et cultivée dans les jardins à Amboine. (B.)

**CODILE LAITEUSE.** BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires du *Tortillium latifolium*, L. (B.)

**CODINHO.** BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires donnés à Ternate au *Croton variegatum* dont Loureiro a fait son genre *Phyllaurea*. V. *CODRUM*. (B.)

**CODINZINZOLA.** ois. Syn. Italien de la Lavandière, *Motacilla alba*, L. V. BERGERONNETTE. (B.)

**CODION.** BOT. PHAN. (Gernert) Espèce de Campanule, selon Martius. (Dict. de Deterville.) V. GOUTTEAU. Ruell donne ce nom comme celui de la fleur du *Codia-minum* de Plèbe. (B.)

**CODI-ROSSO.** ois. Syn. romain de Rossignol de murailles, *Motacilla Phœnicurus*, L. V. Bec-Fin.

**CODIROSSO MAGGIORE.** On appelle encore ainsi en Italie le Merle de roche, *Lanius infestus*, L. V. MERLE. (B.)

**CODISONA.** REPT. ORN. (Laurenti.) Syn. de *Crotale*. V. ce mot. (B.)

**CODIUM.** BOT. ORN. (*Hydrophytes*.) Stackhouse a donné ce nom à un genre encore mal connu, nommé *Lamarckia* par Olivi ; *Agardhia* par Cabrera ; *Spongodium* par Lamouroux. V. ce mot. Agardh a adopté le genre *Codium* dans son *Synopsis Algarum Scandinavica*.

vica. Il n'est pas certain que le Codium de Beauvois soit celui dont il est ici question. Les caractères donnés par cet auteur pour les Cryptogamies aquatiques sont si vagues qu'on n'y peut rien reconnaître. (B.)

**CODJA-JANTI** ou **COD-JANTI**. BOT. PHAN. *V. GAJATI*.

**COD-LINGUE**. POIS. *V. COD*.

\* **CODO-BIANCO**. OIS. Syn. romain du Motteux, *Motacilla Enanthe*, L. *V. TRAQUET*. (DR. Z.)

\* **CODOCAYPU**. BOT. PHAN. (Ruiz et Pavon.) Syn. chilien du *Myoschilos* de la Flore du Pérou. *V. ce mot*. (B.)

**CODOCK**. MOLL. Pour *Codok*. *V. ce mot*. (B.)

**CODOK**. MOLL. (Adanson, Hist. Natur. du Sénégal, p. 223, pl. 36, 3.) Syn. de *Cytherea tigerina*, Lamk., *Venus tigerina*, L. *V. CYTHÈRE*. (D. H.)

**CODOMALO**. BOT. PHAN. (Belon.) Syn. de *Mespilus Amelanchier*, L. (B.)

**GODON**. *Codon*. BOT. PHAN. Une Plante du cap de Bonne-Espérance, figurée par Andrews (*Reposit.* t. 325) sous le nom de *Codon Royeni*, constitue ce genre dont on ignore la famille naturelle. Il appartient à la Décandrie Monogynie, L. Son calice est monosépale, persistant, à dix lanières très-étroites. Sa corolle est monopétale, régulière, campanulée, également à dix lobes. Le nombre des étamines est le même que celui des lobes de la corolle; à la base de chacune d'elles on trouve une écaille. Le fruit qui a été figuré par Gaertner (2, t. 95) est une capsule ovoïde à deux loges, contenant plusieurs graines anguleuses et hérissées, dont l'embryon est cylindrique et placé au centre d'un grand endosperme. Cette capsule s'ouvre en deux loges qui entraînent chacune avec elles la moitié de la cloison.

Le *Codon Royeni* est une Plante vivace dont les tiges sont cylindriques, rameuses, cotonneuses, d'un pied de

hauteur, munies d'un grand nombre d'aiguillons et portant des feuilles alternes ovales, rudes au toucher, pétioles. Les fleurs naissent solitaires un peu au-dessus de l'aisselle des feuilles.

Plusieurs caractères semblent rapprocher ce genre des Solanées. Jussieu pense que le *Thuraria* indiqué par Molina dans son Histoire Naturelle du Chili, doit être réuni à ce genre. (A. R.)

\* **CODON**. BOT. PHAN. L'un des noms du Coing dans quelques parties méridionales de la France, qui de même que *Codonero* espagnol, signifiant le même fruit, vient évidemment du latin. (B.)

\* **CODONG-SERUNI**. BOT. PHAN. (Rumph.) Nom javanais d'une Plante qui paraît voisine du *Verbesina biflora*, si elle n'est la même. (B.)

**CODONIUM**. BOT. PHAN. Rohr et Vahl (*Act. Soc. Nat. Hafn.* T. II, p. 206; et *Symb.* 3, p. 361) ont ainsi nommé un nouveau genre que Schreber et Willdenow ont désigné ensuite sous le nom de *Schœphia*. Les botanistes ayant adopté cette dernière dénomination, malgré sa postériorité, mais parce qu'ici la consonance du mot *Codonium* avec celui de *Codon*, genre précédemment établi, aurait pu faire commettre des erreurs, nous traiterons de ce genre au mot *SCHœFFIE*. (G. N.)

**CODOPAIL**. BOT. PHAN. *V. CIAM-BAN* et *CODA-PAIL*.

**CODORNIZ**. OIS. Syn. espagnol et portugais de la Caille, *Tetrax Coturnix*, L. *V. PERDRIX*. (DR. Z.)

\* **CODOYONS**. BOT. PHAN. Même chose que *Codon* et *Codonero*. *V. ces mots*. (B.)

**CODRE**. *Codrus*. INS. Genre de l'ordre des Hyménoptères, section des Térébrans, famille des Pupivores, tribu des Oxyures (Règn. Anim. de Cuv.), établi par Jurine (Classif. des

ménoptères, p. 508), et correspond au genre *Proctotrupe* de Latreille. ce mot. (AUD.)

**CODUCO-AMBADO.** BOT. PHAN. m brame d'une espèce de *Spon-* is. K. ce mot. (B.)

**CODUVO.** BOT. PHAN. (Burmann.) n. indien de Grenadier. (B.)

**CODWARTH.** BOT. PHAN. L'un s noms gallois de la Belladone. (B.)

**COECILIE.** *Cæcilia*. REPT. OPH. nre fort singulier dont la place ne ira être rigoureusement déterminée lorsque les mœurs et le mode génération des espèces qu'il forment seront mieux connus. Cuvier en sa troisième et dernière famille des pens auxquels il donna l'épithète nus. Oepel, sur l'indication de méri qui observa le premier com- n les *Cœcilies* ont de rapports avec Anoures, en a fait sa famille des naciens apodes. Linné avait d'abord tit l'espèce qui sert de type au re en plaçant celui-ci à la fin de *Amphibia Serpentes*. Si les *Cœci-* éprouvent des métamorphoses, doute qu'elles ne doivent se ran- à la suite des Protées et des Syrè- . Ces mots. Les caractères de genre consistent dans le corps qui a peu près cylindrique, nu, dé- uvu d'écaillés, recouvert de glan- plus ou moins distinctes destinées sser transsuder une humeur vis- euse analogue à celle dont se re- ivrent les Limacés et les Anguil- : ayant les côtés transversalement sés; queue nulle; tête peu dis- te, conique en avant; mâchoire ériente un peu proéminente; che peu tendue; narines assez arentes; yeux à peine visibles ca- s sous la peau.

Le nom de *Cœcilia* est celui que les ens donnaient à l'Orvet, enco- ujourd'hui appelé vulgairement gle, de l'idée où l'on était que vet n'avait pas d'yeux, encore l'en ait de fort beaux. Ce nom ci mieux appliqué; car les Ani- x auxquels l'ont imposé les mo-

dernes paraissent n'y voir guère, ou du moins les organes de la vision sont chez eux peu développés.

Cuvier a donné sur les *Cœcilies*, jusqu'à lui peu connues, des détails anatomiques importants que nous croyons devoir transcrire. Le corps est rond; situé vers l'extrémité du corps; les côtes sont trop courtes pour entourer le tronc, et paraissent comme rudimentaires; les vertèbres s'articulent par des facettes en quereux rempli d'un cartilage gélati- neux comme dans les Poissons; le crâne s'unit à la première vertèbre par deux tubercules, comme il arrive dans les Batraciens et l'Amphibien qui offre seul la même conformation parmi les Ophidiens; les os maxillai- res couvrent l'orbite qui n'y est percée que comme un très-petit trou, et ceux des tempes couvrent la fosse tempo- rale, de sorte que la tête ne présente en dessus qu'un bouclier osseux con- tinu; les dents maxillaires et palati- nes sont aiguës et recourbées en ar- rière; elles ressemblent cependant à celles des Serpens proprement dits; mais la mâchoire inférieure n'a pas de pédicule mobile, attendu que l'os tympanique est enchâssé avec les au- tres os dans le bouclier de crâne. L'oreille du cœur n'est pas divisée assez profondément pour être regar- dée comme double; le deuxième pou- mon est fort petit. Il paraît que les *Cœcilies* pondent des œufs à écorce membraneuse et réunis en longues chaînes; leurs oreilles n'ont pour tout osselet qu'une petite plaque sur la fenêtre ovale.

D'après leurs rapports anatomiques, les *Cœcilies* sont donc placées par la nature au point de contact des Batra- ciens, des Sauriens, des Ophidiens et même des Poissons. Leurs espèces sont toutes du Nouveau-Monde, et même de la Guiane, quoique Séba en eût décrit une, comme originaire de Ceylan. On en connaît quatre.

L'IBLARE, Encyc., Serp., pl. 34, f. 1; *Cæcilia ibiara*, Daud., Buff., Rept.; *Cæcilia tentaculata*, L., Gmel., Syst. Nat., XIII, pars 2, pl. 1124; Lac.,

Serp. t. 21, f. 2. Cette espèce, qui atteint à plus d'un pied de longueur sur un pouce de diamètre, est noirâtre; sa bouche, située transversalement sous le museau, l'a fait comparer à un Squal; trente-cinq plis transversaux sur chaque côté la caractérisent, ainsi que deux verrues qu'on a comparées à des tentacules, et qui sont situées en avant des narines. L'Ibiare est assez commune à Suriname et au Brésil. Pison dit qu'on l'appelle Ibiaram dans cette dernière contrée.

Le VISCQUEUX, Encycl. Serp., pl. 34, fig. 2; *Cacilia gelatinosa*, L. Gmel., loc. cit., p. 1126; *Serpens Cacilia Ceylanica*, Séba, T. II, tab. 28, f. 2. Cette espèce fut la première connue et décrite par Linné dans le musée du prince Adolphe-Frédéric. Son corps est allongé, grêle, cylindrique, brunâtre, marqué d'une ligne latérale, un peu épaissi en arrière, avec trois cent quarante plis de chaque côté. Elle a plus d'un pied de longueur, et l'épaisseur du petit doigt. Sa patrie est l'Amérique méridionale, et non l'Inde, comme l'ont dit les auteurs induits en erreur par Séba.

Le VENTRE BLANC, *Cacilia albiventris*, Daudin, T. VII, pl. 42, fig. 1. Cette singulière espèce, que Levaillant tenait de Surinam, a son corps entouré de plis rayonnés; le corps grêle, cylindrique, noirâtre, avec l'abdomen tacheté de blanc ou de jaunâtre par grandes plaques irrégulières; l'ouverture de la bouche est inférieure; les dents sont très-courtes et très-aiguës.

Le Lombascoide, *Cacilia Lumbrioides*, Daud., ibid., fig. 2; *Cacilia gracilis*, Shaw. Le corps de cette *Cacilia* est proportionnellement le plus long et le plus grêle; sa couleur est noirâtre; les tubercules de sa peau sont presque microscopiques; l'anus est rayonné; les narines sont lisses. Cet Animal atteint jusqu'à deux pieds de longueur sur quatre lignes de diamètre. On dit qu'il habite les lieux humides à Surinam, et s'y creuse

des trous en terre comme les Lombries. Son *scelus* nous semble indiquer un habitant des eaux. (A.)

COEFFE. ZOOL. et BOT. V. COIFFE. COEG-BENNOG. POIS. SYD. gallois de Sardine. V. CLUPE. (B.)

GOELACHNE. *Coelachne* FOR. PHAN. Une petite Plante de la famille des Graminées, ayant le port d'une Brizée et qui croît à la Nouvelle-Hollande; forme ce genre auquel Robert Brown, son auteur, attribue les caractères suivans: la lépionne est bilobée, composée de deux valves presque égales, obtuses et ventrues à leur partie inférieure. Les deux fleurs qu'elle renferme sont matiques. L'inférieure est hermaphrodite, la supérieure est pédicellée, plus petite et femelle. Dans la fleur hermaphrodite, les étamines sont au nombre de trois; l'ovaire est surmonté de deux styles qui se terminent par deux stigmates filiformes. Le fruit est allongé, cylindrique, terminé en pointe à ses deux extrémités, et non enveloppé dans les écailles florales.

La seule espèce de ce genre, *Coelachne pulchella*, Brown, est une petite Graminée entièrement glabre, dont le chaume, rameux inférieurement, porte des feuilles planes, lancéolées, dépourvues de ligule. Les fleurs sont très-petites, disposées en une panicule étroite. (A.)

COELAT-SAGU. BOT. SYD. Syn. malais de *Cycas circinalis*. (B.)

COELESTINE. MIN. Pour Célestine. V. STRONTIANE.

\* COELESTINE. *Coelastina* FOR. PHAN. Famille des Synanthérées; tribu des Corymbifères de Jussieu; section des Eupatorées de Kunth; Syn. génésie égale, L. Ce genre est établi par H. Cassini et adopté par Rostk Schmidt dans son *Synopsis Plant. Orustow*, T. II, p. 458; en a simplifié les caractères: à savoir, un cylindre, hémisphérique; polyphylle et en briques; réceptacle très-court; fleurs tubulaires; très-nombreuses et tous hermaphrodites; anthers in-



luses; stigmate saillant à deux branches très-longues et divergentes; à l'apex cinq angles tronqués au sommet, et couronnés d'un rebord membraneux. Séparé par son auteur du genre *Ageratum*, ce nouveau genre ne semble pas, aux yeux de Kunth, avoir une organisation bien différente. La structure de l'aigrette est le seul caractère qui l'en distingue; mais encore cette structure n'est-elle, ainsi que dans *Stevia*, qu'une légère modification de celle de l'*Ageratum*; de sorte que si l'on accordait une grande valeur à un organe si susceptible de varier, pour la distinction des Syanthérées, on constituerait presque autant de genres qu'il y a d'espèces connues.

La **COELASTINE AZURÉE**, *Coelastina cerulea*, Cassini, *Ageratum coelastinum*, Sims., Plante très-élégante à fleurs d'un bleu rougeâtre, nombreuses, et disposées en corymbes, est maintenant cultivée en pleine terre et répandue dans les jardins de Paris. La Plante décrite par Kunth (*loc. cit.*) sous le nom de *Coelastina ageratoides*, et qui habite la Nouvelle-Espagne, a les plus grands rapports avec la précédente. (G.N.)

\* **COELIFLORUM**, **COELIFLOS**, **COELIFOLIUM**. BOT. CRYPT. V. NOSTOC.

**COELIOXYDE**, *Coelioxys*. INS. Genre de l'ordre des Hyménoptères, section des Porte-Aiguillons, famille des Mellifères, tribu des Apiaires, V. ce mot, section des Dasygastres, établie par Latreille, et ayant, suivant lui (Mém. sur les Abeilles, Zool. du Voy. de Humboldt), pour caractères propres: palpes maxillaires de deux articles, dont le premier une fois au moins plus long que le second; mandibules étroites et peu fortes dans les deux sexes (écusson pinné, abdomen conique, point ou peu soyeux en dessous); les Corollides se rapprochent beaucoup des Mégachiles, mais, elles en diffèrent par la longueur relative des palpes, par la faiblesse des mandibules, et par l'abdomen peu ou point soyeux.

Ces Insectes déposent leurs œufs dans le nid des Abeilles-maçonnes, qui sont des Apiaires-solitaires. Ils-mêmes appartiennent à cette division, et ont, par conséquent, des pieds postérieurs, sans corbille aux jambes ni bras au côté interne du premier article des tarses. L'abdomen des femelles est plus long que celui des mâles, ce qui est dû au développement du dernier anneau prolongé en poittet. Cette différence est telle que la plupart des auteurs ont regardé chaque sexe comme des espèces distinctes. On peut considérer comme type du genre:

La **COELIOXYDE CONIQUE**, *Coel. conica*, Latr., ou l'*Apis conica* et *quadridentata* de Linné et Fabricius. Le premier de ces noms appartient à la femelle et le second au mâle. Panzer (*Faun. Ins. Germ.*, fasc. 59, tab. 7) a représenté la femelle qu'il place à tort dans le genre Anthidie. On la trouve communément dans toute l'Europe.

La **COELIOXYDE ACANTHURE**, *Coel. acanthura* ou l'*Acanthura* d'Illiger, dont le mâle paraît avoir été figuré par Panzer (*loc. cit.*, fasc. 55, fig. 13) sous le nom d'*Apis quadridentata*, se rencontre aussi en Europe.

La **COELIOXYDE TRIDENTÉE**, *Coel. tridentata*, ou l'*Anthophore tridentata* de Fabricius, est originaire des Antilles. (AUD.)

**COELIROSA**. BOT. PHAN. Espèce du genre *Agrostemma*. (B.)

\* **COELIT-PAPEDA**. BOT. PHAN. Non malais qui désigne probablement un *Weinmannia*. V. ce mot. (B.)

\* **COELMAES**. ojs. Syn. hollandais de la Mésange charbonnière, *Parus major*, L. V. MÉRANGE. (DE.Z.)

**COELOGENUS**. MAN. V. PACA.

\* **COELOMITRA** et **COELOMORUM**. BOT. CRYPT. C'est-à-dire *Mitre* et *Mère creuss*. Noms proposés par Paulet pour désigner les Hétéryllis et les Morilles. (B.)

**COELORACHIS**. BOT. PHAN. Es-

pece du genre *Roiboella* qui croît à Ternate. (B.)

\* **COELORHINQUE.** *Cœlorhincus*. ROIS. Espèce du genre *Lépidolepre* de Risso. V. ce mot. (B.)

\* **COELOSPOURIUM.** BOT. CRYPT. (*Mucédinées*.) Link a proposé de séparer, sous ce nom, le *Dematium articulatulum* qu'il avait rapporté avec quelques autres espèces au genre *Helmisporium*. Il croit avoir observé, dans cette espèce, que les sporules sont percées d'un petit trou assez distinct. V. *HELMISPORIUM*. (AD. B.)

\* **COEMBURA.** BOT. PHAN. (*Plukenet*.) Syn. présumé d'*Heritiera* à Caylan. (B.)

**GOENDOU.** *Coendus*. MAM. Genre de l'ordre des Rongeurs, réuni par Cuvier aux Porc-Épics. V. ce mot. (B.)

\* **COENOGONIUM.** BOT. CRYPT. (*Lichens*.) Ehrenberg a donné ce nom à un genre de Lichens qu'il a décrit dans les *Horæ Berlinenses*, p. 119, et caractérisé ainsi : fronde formée de fibres filiformes, cylindriques, rameuses, translucides et entrecroisées; apothécies orbiculaires, portées sur un court pédicelle, entourées d'un rebord peu distinct, à disque coloré, convexe.

Ehrenberg a observé dans les apothécies de ce genre la même structure que dans la membrane fructifère des *Pezizés* et autres Champignons, c'est-à-dire que la surface des apothécies était formée par des capsules allongées, pédicellées, renfermant des sporules, et ne portait pas des sporules nues comme Acharius l'a prétendu. Il a observé cette même organisation dans d'autres Lichens et pense qu'elle est commune à toute cette famille; la seule espèce connue du genre *Cœnogonium*, le *Cœnogonium Linkii*, croît sur l'écorce des Arbres à l'île Sainte-Catherine au Brésil; sa fronde est plane, presque orbiculaire, d'un vert glauque. Son bord est frangé par les extrémités libres des filamens du thallus; les apothécies sont d'un beau rouge. (AD. B.)

**COENOMYIE.** *Coenomyia*. INSECT. Genre de l'ordre des Diptères, famille des Tanystomes, fondé par Latreille, et ayant, suivant lui, pour caractères : antennes de trois pièces, dont la dernière plus longue, conique, de huit anneaux ou petits articles; trompe saillante, courte, terminée par deux grandes lèvres, renfermant un sucoir de quatre soies; palpes extérieurs; ailes couchées sur le corps; écusson à deux épines. On peut ajouter comme un développement de ces caractères que les *Coenomyies* ont une tête moins élevée et moins large que le thorax, supportant des yeux à facettes très-développées dans le mâle; trois petits yeux lisses et des antennes rapprochées à leur origine, de trois articles, dont le premier est cylindrique, le second en cône renversé, et le troisième de huit petits articles qui vont en diminuant insensiblement de grosseur. La bouche consiste en une trompe membraneuse, avec deux grandes lèvres et deux palpes relevés. Les ailes, couchées parallèlement sur le corps, se rapprochent, par la disposition de leurs cellules, de celles des *Taons*, et les balanciers sont à découvert comme dans les *Stratiomys*. Les pattes sont assez fortes, et il existe trois pelotes et deux crochets à l'extrémité des tarses; le corps est ovale, oblong et pubescent. — Ce genre, que Fabricius a désigné sous le nom de *Sicus*, assez voisin des *Taons* et des *Stratiomys*, n'en diffère essentiellement que par la composition de la trompe.

On considère comme type du genre la *COENOMYIE FERRUGINEUSE*, *Can. ferruginea*. Elle varie beaucoup, et plusieurs auteurs, Fabricius en particulier, l'ont décrite sous des noms différens; on en jugera par la synonymie suivante : *Tabanus bidentatus* de Linné et de Fabricius (*Spec. Insect. T. II, p. 459*). — *Tab. bipincoens* du même (*Loc. cit.*, p. 459, n. 26). — *Stratiomys errans* du même (*Entom. Syst. T. IV*). — *Sicus ferrugineus, bicolor, errans*, du même (*Suppl.*, p. 55, n. 2, 3, 4). — Mouche arande

odorante de Battaille (Tabl. élém. de l'Hist. des Animaux). — *Seslione* (Distribution de Pennet (Faun. Ind. Germ. fasc. 9, fig. 307). — *Seslione* (Distribution du même (loc. cit. fasc. 11, fig. 30). — *Seslione* (Distribution du même, fasc. 36, fig. 17). Meigen (Descript. syst. des Dipt. d'Europe, T. II, pag. 16) décrit cette petite *Ctenomyia* qu'on a connue sous un si grand nombre de noms, et y réunit une seconde espèce qu'il paraît avoir distinguée dans un précédent ouvrage, et que Battaille (Dict. d'Hist. Nat.) désigne encore sous le nom d'*unicolor*. On la trouve assez communément dans le département du Calvados. Elle répand une odeur de Mâle très-prononcée. (AUD.)

**COENOPTERIS**, BOT. CRYT. (Fougères.) Bergius a donné ce nom au genre de Fougère nommé *Darea* par Justus Swartz, et Thunberg ont adopté le nom de Bergius; depuis, R. Brown a réuni le genre *Darea* aux *Asplenium*. V. ces mots. (AD. B.)

**COENURE**, *Caninus*, INTER. V. CENURE.

**COERANDJE**, BOT. PHAN. Syn. japonais de *Dialium*. V. ce mot. (B.)

**COEREBE**, ois. (Marcgraaff.) Syn. brésilien de *Certhia cyanea*. Ce nom est devenu scientifique dans Vieillot pour désigner un démembrement du genre *Certhia*, dont cet auteur a fait son genre Guir-Guir. V. ce mot.

**COERI-ULOSEN**, BOT. PHAN. L'un des synonymes kalouches de *Papulus zige*. (B.)

**COERULEUS**, ois. (Gesner.) Syn. parisien du Merle bleu, *Turdus Cyanus*, L. V. MERLE. (DR. Z.)

**COESCOBS** ou **CEUSOS**, MAM. Syt. de Pline l'ancien. V. ce mot. (A. D. NS.)

**COESDOES**, MAM. On prononce *Condous*: Espèce d'Antilope qu'on dit être la même que le Condoma. V. ANTILOPE. (B.)

**COESIE**, BOT. PHAN. Pour *Cesie*. V. ce mot.

**COESIOMORE**, POIS. V. CESIO-MORE.

**COESION**, POIS. V. OMSIO.

**\* COESPIPHYLIS**, BOT. PHAN. Dans la nouvelle nomenclature de Du Petit-Thouars (Histoire des Orchidées des îles australes d'Afrique), c'est le nom d'une espèce de *Phyllorchis*. Il répond au *Bulbophyllum* ou *Cymbidium caespitosum* de Swartz. Cette Plante est figurée pl. 102, dans l'ouvrage de Du Petit-Thouars. (C. N.)

**\* COESTICHIS**, BOT. PHAN. Nom générique-spécifique proposé, dans la nouvelle nomenclature de Du Petit-Thouars (Hist. des Orchidées des îles australes d'Afrique), pour une Plante qui appartient au genre *Malaxis* de Swartz. C'est son *Stichorchis Coestichis*, figuré pl. 89. (C. N.)

**\* COETY**, BOT. PHAN. (Nicolson.) Espèce indéterminée d'*Amaranthus* épineuse de Saint-Domingue. (B.)

**COEUR**, ANAT. Vrai moteur du sang et l'un des rouages les plus indispensables à la vie, dans les organisations déjà compliquées, le Cœur n'existe pas chez tous les Animaux. Il se trouve placé, quand il existe, entre les vaisseaux veineux et artériels dont il forme la démarcation la plus précise. Il suppose toujours, non-seulement l'existence du sang et la présence d'un tube digestif où ce fluide a sa source, mais encore un organe spécial, des poumons ou des bronchies, chargé de redonner au sang les qualités qu'il a perdues en parcourant la longue série des organes. Nous ne pouvons donner ni la description minutieuse du Cœur, organe si différent dans les diverses classes d'Animaux, ni l'histoire de ses mouvements que beaucoup de circonstances font varier, et qui, à leur tour, modifient les principales fonctions de la vie. Il ne s'agit ici que d'une esquisse fort imparfaite.

Une masse charnue, extrêmement irritable, revêtue de membranes de tous les côtés, traversée par des nerfs, arrosée par des vaisseaux, protégée par une enveloppe ordinairement fort résistante, offrant à son centre des

excavations variables pour le nombre et la configuration, communiquant avec des vaisseaux de deux espèces et des organes respiratoires circonscrits, envoyant du sang à toutes les parties, leur fournissant à toutes les principes nécessaires à la nutrition, et présidant ainsi à toutes les fonctions : voilà quelles idées principales on attache au Cœur, puissant agent qui se trouve lié directement ou par sympathie avec tout ce qu'il y a d'essentiel dans l'organisation; qui est toujours insoumis à la volonté, et chez lequel l'habitude ne détermine de modification d'aucun genre; organe enfin qui agit sans repos depuis le commencement de l'existence, et qui souvent continue de battre long-temps après qu'elle a totalement cessé.

Propre aux seuls Animaux, nous avons dit que le Cœur n'existe pas chez tous. Sa présence n'est constante, et ses fonctions ne paraissent nécessaires que là où se trouvent des organes spécialement destinés à la respiration. Le Cœur ne paraît, dans les êtres organisés, qu'à partir des Crustacés et des Araignées; il n'existe d'aucune manière dans les Animaux placés plus bas, de même aussi que ces Animaux des classes inférieures ne présentent point de sang proprement dit : c'est que le même organe qui nécessite un Cœur est aussi l'organe qui compose du sang. Cette loi pourtant semble éprouver une exception pour les Annelides, espèce de Vers doués de branchies et pénétrés d'un sang véritable, possédant des vaisseaux sanguins manifestement de deux espèces, et qui, nonobstant tout cela, sont néanmoins dépourvus d'un Cœur.

Ni les Polypes, ni les êtres équivoques si bien décrits et figurés par Bory de Saint-Vincent, ni les Annelides, ni les Insectes, n'ont de Cœur véritable. Ces derniers Animaux ont au lieu de Cœur un grand vaisseau nommé *dorsal*, espèce de canal central où du sang imparfait séjourne presque immobile et toujours également coloré. Aussi ces Animaux n'ont-ils ni pour-

mons, ni branchies, ~~par~~ au lieu de ces organes, des ~~espèces de canaux~~ ou de trachées irrégulièrement disséminées dans tout leur corps (Latreille et Marcel de Saussure). Le Cœur dans les Annelides et les Crustacés est déjà très-sensible. Il a jusqu'à trois portions séparées dans quelques Mollusques, et il est très-compliqué chez plusieurs autres. Il forme toujours au moins deux loges, un ventricule et une oreillette dans les Poissons et les Reptiles, et toujours sans exception, quatre cavités, réduites à trois dans le fœtus, chez les Oiseaux et les Mammifères.

Ces quatre cavités du Cœur de Mammifères et des Oiseaux agissent alternativement deux par deux : les deux oreillettes ensemble et 2 même pour les deux ventricules. Ces mouvemens du Cœur consistent à se laisser remplir et distendre par le sang, et ensuite à envoyer ce fluide à des destinations assignées d'avance par la distribution naturelle des vaisseaux qui en émanent. Et en vertu de l'alternative dont nous avons déjà fait mention, les deux ventricules se dilatent et s'emplissent à l'instant où les deux oreillettes se vident et se contractent : merveilleuse association de mouvemens sans laquelle la circulation du sang ne pourrait plus avoir lieu.

Trois veines principales rapportent dans l'oreillette droite tout le sang devenu inhabile à nourrir et à exciter convenablement les organes : ces vaisseaux, les deux veines caves et la veine du Cœur, ont bientôt versé dans cette oreillette assez de sang pour la remplir et la dilater : ainsi distendue, cette première cavité du Cœur se resserre sur le sang qu'elle contient et auquel une communication, alors entièrement libre, permet d'aller remplir le ventricule droit qui, se contractant à son tour, pousse avec énergie dans l'artère pulmonaire un sang qui va se répandre et se régénérer dans le tissu des poumons, où la présence d'un air incessamment renouvelé et les mouvemens alternatifs

il suppose, reçoivent au sang toutes ses qualités vitales, et loin de le entraver, font qu'il accélère son cours. On voit donc, ainsi, dans les cavités du Cœur, et, par un mécanisme en tout semblable à celui des artères droites, ce fluide se trouve réuni et réparti, au moyen de l'ordre de ses nombreuses divisions, dans les organes même les plus éloignés. Le Cœur, qui par-là, est tout vivement agité en même temps qu'imprimé de sucs nutritifs de vie et de chaleur.

Le Cœur n'est pas l'unique agent de la circulation : les artères et l'élasticité dont elles sont douées, les veines et les valves qu'elles présentent, les muscles et leurs contractions diverses, les mouvemens alternatifs, continuellement imprimés aux poumons ou aux branchies, sont autant d'auxiliaires du Cœur pour l'accomplissement de la circulation. Cette action n'est ni aussi compliquée, ni aussi parfaite dans les Reptiles et les Poissons, qu'elle l'est dans les mammifères. Ces Animaux, en effet, possèdent qu'un ventricule et une oreillette où du sang noir et du sang rouge sont doublement mêlés et confondus ; car l'oreillette reçoit toutes les veines du corps en même temps que les veines des poumons, et le ventricule à son tour envoie du sang à la fois dans les poumons et dans la grande artère du corps. Du reste, le mécanisme du Cœur est toujours le même, à cela près de la complication des cavités et de leurs mouvemens (Haller, Cuvier, Blainville, Levaige).

On était persuadé jusqu'à ces derniers temps, que la diastole du Cœur était aussi bien active que la systole ; mais le docteur Vaust de Liège a démontré par des expériences intéressantes que la dilatation du Cœur était entièrement passive, et que l'erreur où l'on était tombé à ce sujet venait uniquement de ce que l'on avait confondu avec la diastole les effets naturels de la systole, prenant ainsi pour une vraie dilatation, du Cœur, la gonfle-

ment qui résulte toujours de sa contraction et de son resserrement. On croyait aussi, et l'on a cru fort longtemps que le Cœur recevait des nerfs le principe de ses mouvemens (Willis, etc.) ; voyant ensuite son action continuer après la section complète des nerfs, on annonça, en hésitant toutefois, que le Cœur avait en lui-même le principe de ses battemens ; mais ce sang était le stimulant nécessaire (Haller, Godwin) ; enfin, et toujours en procédant par des expériences, on décida que la moëlle de l'épine recevait le principe des mouvemens du Cœur (Legallois). Mais on serait le sujet de cette action chez les Animaux qui manquent de moëlle de l'épine ; d'ailleurs, puisqu'on voit le Cœur continuer de palpiter après son entière séparation du corps, et alors même qu'il est totalement débarrassé du sang qui remplissait ses cavités, n'est-ce pas une preuve que le Cœur agit de lui-même, indépendamment du sang, des nerfs et de la moëlle épinière ?

Avec un Cœur se trouvent conjointement un foie, des polimons ou des ouies, des nerfs et de la chaleur ordinairement indépendante, surtout chez les Animaux dont le Cœur a quatre cavités bien séparées. L'entière soustraction du Cœur n'est suivie de la mort que chez les Animaux les plus parfaits et les plus chéres. La vie des Poissons et des Reptiles n'est pas dans une dépendance aussi grande de cet organe. Haller et Brullmann ont vu vivre des Reptiles longtemps après avoir été privés du Cœur, et ils ont vu battre celui-ci de quarante à cinquante heures après sa séparation totale du corps. Mais toute vie disparaît chez les Oiseaux et les Mammifères après que cette séparation du Cœur a eu lieu ; cependant Bacon et Haller ont été des Hommes où la vie avait encore persisté après cette horrible opération ; Haller a tout dit, comme les ayant vus ; de trois conspireurs dont l'un continua de vivre, la deuxième de contempler, et l'autre de parler après que le Cœur leur eut

été arraché. Mais sans récuser le moins du monde le témoignage de Haller, si respectable à nos yeux, nous croyons que l'autorité même de l'académie la plus célèbre ne pourrait dissiper tous les doutes qu'une pareille observation fait naître. Diemerbroëck, qui ne doute de rien, cite des observations encore plus extraordinaires.

Le Cœur est susceptible de s'ossifier, mais jamais dans toute son épaisseur ; après l'Homme, les Daims, devenus vieux, sont le plus souvent affectés de cette altération. La membrane interne et les portions fibreuses qui occupent les ouvertures du Cœur ou qui forment ses tendons, sont les seules parties aptes à se pénétrer de sels calcaires : on assure que le Cœur du pape Urbain VIII offrait un exemple de cette espèce d'ossification.

S'il nous eût été possible d'entrer dans quelques détails sur la structure du Cœur, nous n'aurions pas manqué de parler des travaux récents où Wolf de Saint-Petersbourg et surtout le docteur Gerdy ont fort éclairé cette partie de son histoire ; nous aurions dû indiquer la durée et les limites de l'action du Cœur, ce qui l'excite, ce qu'elle exige, ce qui l'augmente ou l'entrevoit, et ce qu'elle peut faire cesser (1). Nos Considérations physiologiques sur la vie et la mort. Nous aurions voulu pouvoir rappeler les expériences des Harvey, des Haller, des Spallanzani, des Bichat ; celles des docteurs Legallois et Magendie, et celles qui nous sont personnelles sur la circulation. Nous aurions voulu examiner comment le Cœur agit sur les organes, comment les organes agissent sur lui ; comment de cette réciprocité d'action, toujours dans la même harmonie et le même équilibre, résultent la santé et la vie ; si le Cœur est le premier formé et le plus âgé des organes, s'il en est le plus important ; si, c'est par lui que commence et que finit la vie ; s'il est plus essentiel au cerveau que le cerveau ne lui est nécessaire ; enfin s'il est le

siège des passions, ou si elles peuvent être ébranlées par elles.

Dans notre Histoire de la génération, nous avons eu l'occasion de le docteur Prévost d'étudier la formation du Cœur. Vers la vingt-septième heure de l'incubation, on aperçoit dans le Poulet considéré par sa surface antérieure, et précisément au point où se termine la membrane qui vient se rabattre au-devant de la tête, un petit nuage transversal qui s'étend à ses deux extrémités et va se perdre insensiblement sur l'aire transparente. Ce sont les premiers indices de l'auricule, et nous verrons plus tard les deux ailes de cet appareil se prolonger avec rapidité pour donner naissance aux vaisseaux qui ramènent au Cœur le sang qui vient de traverser l'aire veineuse. Trois heures plus tard, le centre de l'auricule se trouve surmonté d'un vaisseau droit qui se dirige vers la tête en passant au-dessus du repli antérieur. C'est le ventricule gauche du Cœur que l'on voit bientôt se partager, à son sommet, en deux ou trois petites ramifications fort délicates. Ce sont elles qui vont ensuite se réunir en un petit renflement duquel part l'aorte descendante. Au bout de trente-six heures, le fœtus commence à s'incliner et il ne tarde pas à se coucher sur le côté gauche. Pendant cet intervalle le Cœur s'est rétréci d'une manière remarquable, il s'est allongé et présente alors une courbe très-décidée. Un rétrécissement sépare l'auricule du ventricule gauche, c'est le canal auriculaire. Un autre distingue le bulbe de l'aorte de ce même ventricule, c'est le *Præcordium* de Haller. Mais tous ces détails sont encore plus manifestes à la trente-neuvième heure, et la flexion du Cœur elle-même est plus prononcée. Sa convexité est tournée en avant, et l'auricule commence à remonter vers le sommet de l'appareil en glissant derrière le ventricule. A cette époque le Cœur bat, et la circulation se distingue sans la moindre difficulté. Le sang passe au travers du ventricule.

rive dans le bulbe de l'aorte qui le pousse à son tour et le force à pénétrer dans les deux ou trois divisions qui en partent. Celles-ci l'amènent au tronc de l'aorte descendante qui chemine vers la partie inférieure du fœtus, mais qui ne tarde pas à se partager en deux vaisseaux égaux qu'on voit à chaque côté de la colonne vertébrale. Vers le milieu de celle-ci ils se recourbent subitement à angle droit, sortent du corps du fœtus et se dirigent en se ramifiant vers l'aire ventreuse à laquelle ils amènent le sang. Celui-ci parcourt le vaisseau auriculaire terminal d'une manière assez singulière, puisque, si on le coupe par un diamètre perpendiculaire à la direction du fœtus, les points qui en seront traversés seront véritablement les parties dans lesquelles le sang hésite incertain du chemin qu'il préférera. Au-dessus, il se dirige en haut; au-dessous, il chemine vers la partie inférieure. Mais dans l'un et l'autre demi-cercle, à l'endroit où les courans droits et gauches viennent se rencontrer, il se trouve un vaisseau, quelquefois deux, qui reprennent le sang et le ramènent vers le Cœur. Ils passent en dehors du corps du fœtus jusqu'à l'endroit où ils atteignent l'auricule dans laquelle ils pénètrent, au moyen de deux embranchemens que nous avons reconnus dès les premiers instans de la formation du Cœur.

Rolando a commis une inadvertance relativement à la formation de l'aorte, et n'a pas vu les ramifications qui, partant du bulbe, se réunissent de nouveau pour former ce vaisseau, disposition extrêmement remarquable et qui jette le plus grand jour sur la manière dont se produit la veine-porte, seul exemple analogue que nous ayons d'une semblable division dans le trajet d'un vaisseau. A quarante-deux heures, l'on commence à remarquer sur le bord convexe du Cœur un point saillant, situé dans sa partie moyenne. Il formera un angle toujours plus prononcé, et ne tardera pas à devenir la pointe du Cœur. Les

rétrécissemens du bulbe de l'aorte et du canal auriculaire, loin de s'allonger, sont devenus plus courts. Les stries du sang deviennent d'un rouge plus vif, et désignent d'autant mieux la direction des artères du cercle veineux. A quarante-huit heures, le Cœur a continué à se développer; son bord convexe se prolonge en avant, le concave devient moins prononcé par l'ascension progressive de l'auricule et le raccourcissement des détroits auriculaire et aortique. Entre les troisième et quatrième jours, on distingue nettement le ventricule droit. Il se montre sous la forme d'une petite poche qui est placée en avant du ventricule gauche, et communique librement avec la cavité de l'auricule. A chaque contraction de celle-ci, une gouttelette de sang y est poussée, et l'on peut reconnaître, au moyen de cette injection passagère, le vaisseau qui en sort de l'autre côté, et qui deviendra plus tard l'artère pulmonaire. A l'époque où nous l'observons, le ventricule droit est lié d'une manière intime au gauche par les fibres musculaires qui les enveloppent tous deux; de telle sorte qu'on croirait qu'il s'est développé réellement entre ces mêmes fibres. Cependant il n'en est pas ainsi d'après Rolando. Le ventricule droit est d'abord un vaisseau délié qui part de la portion droite de l'auricule, et qu'on peut apercevoir, passant au-devant du ventricule gauche dès la cinquante-huitième heure. Ce vaisseau se soude avec lui au moyen des fibres musculaires qui les enlacent. Sa partie moyenne se dilate et devient le ventricule droit, tandis que son extrémité effilée se dirige vers le lieu qu'occuperont les poumons. Dès le troisième jour, la cavité de l'auricule commence à se bilober d'une manière fort tranchée, et cette disposition résulte évidemment du tiraillement que lui font éprouver les veines qui s'y insèrent. Le pli moyen qui en est la conséquence, se rétrécit en forme d'anneau, et peu à peu divise la cavité en deux parties séparées. C'est à

ce resserrement que l'on doit le développement du ventricule droit, à cause de la difficulté que le sang éprouve à passer de la partie droite, où il aborde, dans la gauche qui communique avec le ventricule correspondant. Au sixième jour, l'artère pulmonaire est divisée en deux rameaux, un pour chaque poumon, et ceux-ci se prolongent dans l'aorte descendante après avoir fourni la branche pulmonaire. Plus tard cette prolongation s'oblitére, et l'artère pulmonaire n'offre plus aucune division.

A cette époque, la circulation est parfaitement établie et ne variera plus pendant tout le reste de l'existence fœtale. En effet, les artères qui vont à l'aire veineuse donnent des rameaux plus nombreux et plus forts, et l'on aperçoit un second système de vaisseaux qui ramène le sang parallèlement à elles. Ce système est celui de la veine-porte, et il acquiert successivement une plus grande importance à mesure que le sinus terminal s'oblitére. Celui-ci disparaît peu à peu. Dès le huitième jour, il semble étranger au mouvement du sang, et vers le quatorzième il devient presque impossible de le retrouver.

Après avoir décrit les organes de la circulation dans le fœtus, voyons comment le mouvement du sang s'y établit. C'est vers la trente-neuvième heure que le Cœur commence à battre. Il ne contient pas de sang alors, mais, comme toutes les cavités à cette époque, il est distendu par un sérum incolore. L'auricule se contracte, et l'on voit au même moment le canal qui forme le ventricule gauche du Cœur et le bulbe de l'aorte se distendre indubitablement par l'effet du liquide qui y est refoulé. A cette contraction succède celle du ventricule, et dans ce mouvement le liquide ne peut plus retourner en arrière au travers de l'auricule qui est contractée, et est poussé dans le bulbe de l'aorte. Celui-ci se contracte à son tour, et chasse les liquides dans les vaisseaux qui lui font suite, d'où il gagne de proche en proche les divisions de

l'artère mésentérique qui se portent au cercle veineux. Lorsque le bulbe de l'aorte a disparu, le mouvement du Cœur se simplifie, et nous ne voyons plus que les contractions alternatives de l'oreillette et du ventricule.

On n'aurait qu'une idée bien inexacte de tous ces phénomènes, si nous n'ajoutions à cette histoire du Cœur quelques mots relativement à la formation du sang lui-même, afin de fixer l'opinion sur la question longtemps agitée de leur influence réciproque et de leurs droits à la priorité.

Le Cœur paraît le premier, si l'on considère comme Cœur la trace des auricules qui se peut distinguer à la vingt-septième heure de l'incubation. Mais déjà, dès la trentième et la trente-troisième heures, la membrane vitelline commence à s'épaissir en certains points qui présentent d'abord une teinte d'un beau jaune. Bientôt cette couleur devient orangée, puis rouge pâle, et enfin, dès la quarante-troisième heure, la circulation peut se suivre dans les plus petits détails, cause du ton décidé qu'ont pris les globules sanguins. Mais il faut bien observer en ceci que le sang se crée indépendamment du Cœur, qui montre loin de celui-ci fort avant l'époque où il commencera à battre, que ce n'est point par conséquent le Cœur qui détermine la production du sang, ni le sang qui stimule le Cœur pour l'obliger à se contracter.

On peut faire à ce sujet une remarque assez singulière. Le système nerveux sous la forme de rudiment du moelle épinière paraît le premier entre tous les organes du fœtus. Le Cœur vient beaucoup plus tard, mais il est de tous les muscles celui qui entre en fonction le premier, et l'époque où il commence à battre, les irritations galvaniques ne produisent aucun effet sur l'Animal, ce qui prouve l'absence des muscles ou leur incapacité à se contracter. Quel que soit l'opinion qu'on adopte, il est évident que le Cœur agit avant tous les autres sur les muscles.



et que de toutes les parties qui le composent c'est l'auricule qui se met la première en mouvement. Observons maintenant ce qui se passe aux approches de la mort. Toute action des muscles volontaires disparaît avant que le Cœur ait cessé de se contracter. L'auricule montre encore des pulsations évidentes bien long-temps après que celles des ventricules se sont arrêtées. Lorsqu'enfin ce pouvoir est entièrement éteint, le système nerveux reste encore susceptible d'être ébranlé et de manifester les effets d'une excitation étrangère, ce qui démontre assez que son organisation est la dernière qui soit altérée, et que la vie se réfugie en lui comme dans son extrême retranchement. Mais si le Cœur est étranger à la formation du sang, comme nous venons de le démontrer, quel est donc l'organe qui préside à cette création ? Nous allons discuter ce point avec quelque soin à cause de l'intérêt qu'il présente pour la physiologie générale. A l'époque où le liquide rouge orangé commence à se bien distinguer dans les isles de la membrane vasculaire, il est aisé de se convaincre qu'il n'existe encore aucun organe sécréteur propre à l'Animal adulte. Le Poulet ne se compose réellement que d'une moelle épinière emboîtée dans les membranes du canal rachidien, et terminée en avant par quelques renflements vésiculaires qui correspondent aux diverses parties de l'encéphale. Le sang se sécrète cependant, et la circulation s'établit. Nous avons vu que ces phénomènes se passaient à une distance qui exclut toute influence particulière du Cœur, et que celui-ci ne présentait réellement aucun rapport apparent avec les places déterminées qui servent de point de ralliement aux premières gouttelettes sanguines. Nous avons d'ailleurs toute raison de penser qu'un organe musculaire comme le Cœur est incapable de produire une sécrétion aussi délicate que celle des globules du sang. Il est donc probable que le siège de la sécrétion se trouve alors

véritablement situé dans la membrane vasculaire même, et que cet appareil, tout transitif qu'il soit, doit être considéré comme l'agent de la sanguification. A cette époque, les globules du sang sont circulaires et aplatis; leur centre est occupé par une sphère moins colorée que la zone extérieure, et par conséquent ils ressemblent en tout point à ceux qui caractérisent la classe des Mammifères. Ils diffèrent par cela même des globules propres aux Oiseaux et aux Animaux à sang froid dont nous avons soigneusement déterminé la forme dans nos Mémoires sur cet objet. Nous les avons toujours vus elliptiques, et la Poule est, parmi les Oiseaux que nous avons cités, l'un de ceux chez lesquels on remarque la différence la plus prononcée entre le petit diamètre et le grand. Nous possédons ainsi le moyen le plus net pour distinguer les globules du fœtus de ceux de l'adulte, et nous allons suivre pas à pas la marche de la sanguification, afin de saisir la liaison qui doit exister entre ces deux phases de la vie.

Au second jour, le sang est entièrement formé de globules circulaires. Il n'en contient pas d'autres aux troisième, quatrième et cinquième jours. Vers le sixième, on commence à rencontrer çà et là des globules elliptiques, et leur nombre augmente si rapidement pendant les septième et huitième jours, que le sang d'un Poulet du neuvième ne montre plus que des molécules elliptiques. Si l'on compare cette série avec les changements survenus dans la membrane vasculaire du jaune, on voit qu'elle correspond précisément à l'époque où ses vaisseaux se sont oblitérés et où elle a perdu cette circulation riche et abondante qui montrait assez l'importance des fonctions dont elle était chargée. Mais quel est le nouvel organe dans lequel s'est transporté le siège de la sanguification ? Le Poulet en a formé plusieurs pendant l'intervalle que nous venons de parcourir. En effet, le Cœur a pris toutes les

parties qui lui sont propres, et nous offre en petit l'organisation de l'adulte. Mais nous avons déjà montré que ce n'est pas lui qui forme les globules du sang, et nous sommes forcés de chercher ailleurs l'agent de cette métamorphose importante qu'il prouve la matière alimentaire. Serait-ce le poulmon? mais les tubercules qui en sont les premiers rudimens ne sont encore doués d'aucune fonction respiratoire. Enfin, nous avons la membrane de la vésicule ombilicale, qui, dès le troisième jour, a commencé à paraître, et qui, vers le quatrième ou cinquième, a déjà pris une extension considérable et est devenue l'appareil manifeste de l'artérialisation: Elle a par conséquent remplacé sous ce rapport la membrane vasculaire du jaune qui remplissait auparavant cette fonction. Mais il est bien évident que l'apparition des globules elliptiques ne date pas de celle de la vésicule ombilicale, et qu'elle ne coïncide pas même avec le moment où elle commence à suffire toute seule aux besoins du jeune Animal: Il est donc très probable que ce soit elle qui devienne le siège de la formation des nouveaux globules. Mais en même temps que le poulmon s'est manifesté, le foie lui-même a commencé à paraître sous la forme d'un tubercule rougeâtre. Vers le cinquième jour, il a pris un développement notable, et dès les sixième et septième, ses fonctions ont pu s'apprécier distinctement. Il se trouve donc précisément dans les conditions correspondantes à la production des molécules elliptiques; et l'on ne peut s'empêcher de lui attribuer l'importante fonction de la sanguification chez l'adulte; puisqu'à dater de cet instant il continue à jouir des facultés qu'il montre à l'époque où nous l'examinons, et que la forme des globules reste la même pendant tout le cours de la vie de l'Animal. Il se produirait donc à la fois dans le même organe la matière rouge des molécules du sang et la substance verte qui caractérise la bile. Ces deux fonctions

seraient simultanées et probablement liées, de telle sorte que l'une d'elles serait la conséquence de l'autre.

Examinons si cette déduction est d'accord avec les autres phénomènes de la vie animale, et s'il nous sera possible de la corroborer par des observations d'un autre ordre. Nous observerons d'abord qu'en même temps que le sang se produit dans la membrane vasculaire, la couleur jaune du vitellus s'altère et qu'elle ne tarde pas à devenir verdâtre. Ce phénomène a frappé tous les observateurs qui se sont occupés de l'histoire des Poulets, sans qu'ils aient pu fixer leur opinion sur la cause à laquelle ils devaient l'attribuer. La même circonstance se retrouve avec plus d'évidence encore sur les fœtus de Mammifères, et tous les anatomistes ont remarqué l'abondante production de matière verte qui se dépose sur les membranes près des vaisseaux qui s'y viennent répandre. Il manquait, pour rattacher ce fait au précédent, un examen attentif des circonstances du phénomène, et nous en avons fait une étude spéciale. Les détails dans lesquels nous serions obligés d'entrer, nous interdisent une discussion qui serait ici déplacée, et nous nous bornerons à dire que parmi les membranes du fœtus mammifère, il en est une que sa position désigne comme l'analogue de la membrane vasculaire du Poulet, et qui reçoit précisément les mêmes vaisseaux. C'est sur elle, et d'abord dans les parties contiguës au placenta, que l'on voit paraître les premiers indices de la matière verte. Celle-ci ne tarde pas à devenir de plus en plus abondante, jusqu'au moment où le foie du fœtus entre lui-même en fonction. Alors elle disparaît successivement, et plus tard on n'en retrouve aucun indice. Il est probable qu'elle est absorbée par les vaisseaux de la mère. En plaçant dans le foie la fonction de l'hématose, nous avons réalisé les pressentimens de Bichat, qui ne pouvait se résoudre à penser que cet appareil énorme n'était d'autre but

ne de sécréter la bile. Nous lui avons attribué d'ailleurs un emploi bien lus en harmonie avec la généralité de son existence dans tous les êtres qui possèdent du sang, et avec l'importance de son action pour l'entretien de la santé.

Cet article est extrait d'un ouvrage plus considérable, qui nous est communiqué avec notre ami le docteur Prévost, et nous devons observer en outre, qu'en ce qui concerne les fonctions du foie, le docteur Edwards, que nous venons de citer, dans sa nouvelle Théorie de la respiration, place à elle seule au premier rang parmi les physiologistes de notre époque, était parvenu, de son côté, par d'autres considérations, au même résultat que nous. Lorsque nous lui avons fait connaître nos recherches, nous a lui-même communiqué les idées ingénieuses par lesquelles il s'était dirigé. La sanction d'un homme aussi versé que lui dans l'étude de l'économie animale, donne le plus grand poids à l'opinion que nous vous en faisons, et permet de penser qu'elle sera bientôt justifiée par les nouvelles expériences que nous exécutons sur ce sujet. (D.)

**COEUR. MOLL.** Il a suffi qu'une coquille bivalve ait les crochets proéminents et recourbés, et se rapprochant de cela même plus ou moins de la forme d'un cœur de carte à jouer, pour qu'on lui consacrait vulgairement ce nom et qu'il fût conservé par les marchands. C'est principalement parmi les espèces du genre *Bucarde*, qu'on a trouvé plus facilement à faire de ces applications; aussi le *Cardium Carassia*, L., prit le nom de Cœur de éneus; le *Cardium retusum*, celui de Cœur de Diane; le *Cardium hemiostrum*, celui de Cœur en soufflet; le double Cœur de Vénus. Le *Cardium succarda* fut nommé le Cœur de euf tuilé; le *Cardium echinatum*, Cœur épineux; le *Cardium ciliare*, Cœur armé de cils; le *Cardium tuberculatum*, Cœur de Bœuf à grosses rilles ou Cœur de l'Hoppe; le *Cardium edule*, Cœur de Canard; le *Car-*

*dium rusticum*, Cœur de Marmara; le *Cardium pectinatum*, Cœur de Janus à deux faces; le *Cardium elongatum*, Cœur allongé de Carthage; le *Cardium serratum*, Cœur d'Autriche ou Cœur allongé de la Méditerranée; le *Cardium laevigatum*, Cœur couleur d'Orange ou Cœur de Bélér; le *Cardium flavum*, Cœur de Mouton; le *Cardium muricatum*, Cœur de Cerf ou Cœur jaune; le *Cardium latum*, Cœur enflé. Dans d'autres genres, l'*Isocardia* Cor fut nommé Cœur de Bœuf ou Cœur à volutes; parmi les Arches, l'*Arca senilis*, Cœur de la Jamaïque; l'*Arca fusca*, Cœur des Indes; l'*Arca antiquata*, Cœur en arche, et l'*Arca Noe*, Cœur en carène. Enfin, parmi les Mactres, la *Mactra stultorum* fut nommée Cœur de Singe. (B.)

Les anciens conchyliologues ou oryctographes donnaient aussi généralement le nom de Cœur à tous les moules des Coquilles bivalves bombées; ils les nommaient aussi Boucardite. V. ce mot. (D. H.)

\* **COEUR D'ANGUILLE. ÉCHIN.** Plusieurs Oursins portent ce nom dans les auteurs anciens. (LAM. X.)  
**COEUR DE BŒUF. BOT. PHAN.** Fruit de l'*Anona glabra*, L., dans les colonies françaises. V. ANONE. (B.)

**COEUR DEHORS. BOT. PHAN.** (Présontaine.) Arbre indéterminé de Cayenne qui est fort employé dans les constructions et pour l'usage de la ferme. (B.)

**COEUR DE SAINT-THOMAS.** BOT. PHAN. Les créoles des Antilles désignent sous ce nom ce que les Caraïbes appellent Calembaba. V. ce mot. (B.)

**COEUR DES INDES. BOT. PHAN.** Syn. de *Cardiosperme*. V. ce mot. (B.)

**COEUR MARIN. ÉCHIN.** L'*Echinus purpureus* de Linné, Spatangue Cœur de mer de Lamarck, porte ce nom dans le Catalogue de Davila. (LAM. X.)

**COFAR. MOLL.** Nom qu'Adanson (Histoire Naturelle du Sénégal, pl. 9, fig. 12) a donné à une grande Coquille de la mer du Sénégal qu'il a

rangée parmi ses Pourpres, mais qui doit faire partie des Rochers proprement dits. Lamarck n'a pas probablement reconnu cette Coquille en la nommant *Rocher angulaire*, car il n'en donne la synonymie qu'avec doute; et, en effet, la Coquille d'Adapson a huit pouces de long, tandis que celle de Lamarck n'a que dix-neuf lignes.

(D. H.)

**COFASSUS.** BOT. PHAN. (Rumph.) Probablement une Echite dont le bois jaune est employé aux Moluques dans diverses sortes d'ouvrages. (B.)

**COFFEA.** BOT. PHAN. *V.* CAFÉIER.

**COFFER.** BOT. PHAN. (Læssing.) Syn. de *Symplacos martinicensis*. (B.)

\* **COFFO.** BOT. PHAN. Espèce ou variété de Bananier dont les feuilles donnent un fil très-fin et propre à confectionner des étoffes précieuses. Son fruit est fort aimé des Cîrettes et sert d'appât pour les prendre. Les habitants de Mandado tirent de la gaine des feuilles un fil plus grossier et plus dur, dont ils font leurs hamacs. *V.* BANANIER. (B.)

\* **COFFOLI.** BOT. PHAN. (Dalechamp.) Syn. d'Arec. *V.* ce mot. (B.)

**COFFRE.** POIS. Nom vulgaire donné aux Poissons du genre *Ostracodon*. *V.* ce mot. (B.)

**COG.** ois. Syn. sarde du Coq, *Phasianus Galus*; L. Le même nom s'applique en Norwège au *Cuculus Canorus*. *V.* COUCOU. (DR..Z.)

\* **COGADO D'AGOA.** REPT. CHEL. Même chose que Gurura. *V.* ce mot. (B.)

**COGGYRIA.** BOT. PHAN. Pour Coccygria. *V.* ce mot.

**CO GOGO.** ois. (Azzara.) Nom donné au Paraguay à une espèce de Fauvette qui a de la ressemblance avec le Figuier à gorge noire, *Motacilla gularis*; L. (DR..Z.)

**COGOL.** POIS. L'un des noms vulgaires du *Scomber Scolias* dans la Méditerranée. (B.)

\* **COGOLLOS.** BOT. PHAN. Qu'on prononce *Cogullus*, Nom espagnol des ognons du *Scilla maritima*, dont

la quantité est si considérable sur une montagne des environs de Grenade, que celle-ci en a pris le nom de *Sierra de Cogollos*. (B.)

**COGOMBRO, COHOMBRO ET PEPINO.** BOT. PHAN. Syn. de Concombre chez les Espagnols, qui nomment, par diminutif, COGOMBRILLOS, le *Peganum Harmala* et le *Momordica Elaterium*. (B.)

**COGSRAN.** ois. Syn. gallois du Choucas, *Corvus Monedula*; L. *V.* CORBEAU. (DR..Z.)

\* **COGSWELLIA.** BOT. PHAN. Nom donné par Sprengel au genre *Lomatium* de Rafinesque. *V.* ce mot. (G. N.)

\* **COGUILLUOQUI, COGUIL-VOCHI.** BOT. PHAN. (Rum et Pavon.) Noms de pays du genre *Larditabale*; on trouve *Coguil-Boquil* dans l'Herbier de Dombey. (B.)

**COGUJADA MARINA.** POIS. La Coquillade sur les côtes d'Espagne. *V.* BLENNIE. (B.)

\* **COGUL.** ois. Syn. vulgaire, en Catalogne, du Coucou gris, *Cuculus Canorus*; L. *V.* COUCOU. (DR..Z.)

\* **COHAYELLI.** BOT. PHAN. Même chose que Chichina-Moatrou. *V.* ce mot. (B.)

\* **COHESION.** Adhërence réciproque des molécules des corps. La force de Cohésion se mesure ordinairement par la difficulté que l'on éprouve à rompre l'aggrégation des molécules, à opérer leur séparation. *V.* MATIÈRE. (DR..Z.)

**COHINE.** BOT. PHAN. L'un des synonymes vulgaires de *Crescentia*. *V.* ce mot. (B.)

**COIATA.** MAM. Même chose que Coaita au Atèle. *V.* SARAFOU. (B.)

\* **COICLINAT.** BOT. PHAN. Syn. d'*Angelica Archangelica* au pays de Cornouailles. *V.* ANGIÉLICA. (B.)

**GOIFFE ou COFFRE.** BOT. CRYPT. (*Mousses*). On donne ce nom à une enveloppe membraneuse

qui environne d'abord de toutes parts l'ovaire on la capsule non développée les Mousses. Cette enveloppe, que Linné avait regardée comme un calice, se divise transversalement par suite de l'allongement de la capsule; une partie reste à la base du pédicelle, et porte le nom de *Gaine* ou de *Gaîne* (*Vagina*, *Vaginula*). L'autre est soulevée par la capsule, et persiste plus ou moins long-temps sur elle: c'est la *Coiffe*. Cette Coiffe présente plusieurs caractères propres à distinguer les divers genres de la famille des Mousses: ainsi, tantôt elle est tronquée à sa base comme un opercule ou une cloche, à bord entier ou laciné; c'est ce qu'on nomme Coiffe campanulée, *Calyptra mitriformis*; et tantôt elle se fend latéralement et se détache obliquement; on dit alors qu'elle est fendue latéralement, ou en forme de capuchon, *Calyptra cucullata*, *dimidiata*. Ce caractère sert à distinguer plusieurs genres, et donne des coupes en général très-naturelles. Ainsi le *Gymnostomum* et l'*Anisotarium*, le *Neesia* et le *Grinnia*, le *Zygodon* et l'*Orthotrichum*, le *Neckera* et le *Dakota*, le *Leskea* et le *Hookeria*, ne diffèrent l'un de l'autre, que par ce caractère; les premiers de ces genres ont la Coiffe fendue latéralement, les seconds l'ont campanulée; à grandeur même de la Coiffe a servi à établir quelques genres, tels que l'*Encatypia* et le *Potia*. Enfin, on avait voulu employer comme caractère générique la présence ou l'absence des poils sur la Coiffe, dans les *Orthotrichum*, dans les *Polytrichum*, etc. Mais on a été obligé d'abandonner ces caractères, qui ne diffèrent souvent que du plus au moins; cependant cette singularité, d'avoir la Coiffe velue ou hérissée, est presque uniquement propre à ces deux genres, et il ne peut être employé en première ligne, il donne néanmoins un bon caractère secondaire pour certains genres. (AD. H.)

**COIFFE DE CAMBRAI.** MOLLE. Un des noms vulgaires et marchands de l'Argonaute papyracé. (B.)

**COIFFE - JAUNE.** ois. (Buffon.) Nom donné à certains Troupiales qui ont la tête ou partie de la tête jaune. (DR..Z.)

**COIFFE-NOIRE.** ois. (Buffon.) Espèce du genre Tangara, *Tanagra pileata*, L. V. TANGARA. (DR..Z.)

**COIGNASSIER.** *Cydonia*. BOR. PHAN. Famille des Rosacées, section des Pomacées. Ce genre établi par Tournefort avait été réuni par Linné au genre *Pyrus*, dont il ne diffère en effet que par le nombre des graines qu'il contient dans chacune des cinq loges de son fruit. Les auteurs modernes ont de nouveau distingué le genre Coignassier des véritables Poiriers. Voici quels sont ses caractères: un calice turbiné à sa base, divisé supérieurement en cinq lanières lancéolées; une corolle de cinq pétales larges et obtus; des étamines nombreuses, attachées à la gorge du calice, en dedans des pétales; cinq styles distincts dans leur partie supérieure, soudés inférieurement. Le fruit est une Melonide ordinairement pyriforme, quelquefois arrondie, à cinq loges, dont les parois sont cartilagineuses, et qui contiennent chacune de huit à dix graines; tandis qu'il n'y en a jamais que deux dans toutes les espèces de Poiriers.

On compte aujourd'hui trois espèces dans ce genre; ce sont des Arbrisseaux plus ou moins élevés, dont les feuilles sont simples et alternes. Les fleurs roses ou d'un rouge écarlate sont axillaires, solitaires ou diversement groupées. Les espèces sont:

Le COIGNASSIER COMMUN, *Cydonia vulgaris*, Lamk., *Pyrus Cydonia*, L. Arbrisseau dont la tige tortueuse s'élève à une hauteur de douze à quinze pieds, en se divisant en branches nombreuses. Ses feuilles alternes et simples sont ovales, pétiolées, entières, très-cotonneuses, surtout à leur face inférieure, et molles au toucher. Ses fleurs sont très-grandes, d'un blanc légèrement lavé de rose, placées seules à seules à l'extrémité des jeunes rameaux. Leur calice est très-coton-

naux en dehors; les pétales sont ar-  
rondis, très-larges et un peu ondu-  
lés. Les fruits sont pyriformes, de la  
grosseur du poing et au-delà, ordi-  
nairement cotonneux, d'une couleur  
jaune claire. Leur chair est dure,  
très-âpre, même à l'époque de leur  
parfaite maturité, elle a une odeur  
aromatique extrêmement marquée.  
Les fruits sont mûrs vers la fin d'oc-  
tobre. Le Coignassier est origi-  
naire de l'île de Crète et de l'A-  
le-Mineure. Il est aujourd'hui natu-  
ralisé dans toute l'Europe tempérée  
où on le cultive en pleine terre. On  
en distingue plusieurs variétés qui  
diffèrent à la largeur des feuilles, à la  
forme et à la grosseur du fruit. La  
plus estimée est celle que l'on désigne  
sous le nom de COIGNASSIER A LARGES  
FEUILLES ou COIGNASSIER DE POR-  
TUGAL. Ses fruits sont fort gros, re-  
levés de côtes très-saillantes. On cul-  
tive peu le Coignassier dans les jar-  
dins fruitiers du nord de la France,  
parce que généralement ses fruits ne  
sont pas très-estimés; mais dans le  
midi c'est un Arbre fort répandu,  
parce qu'on en fait des marmelades,  
des gelées, des pâtes qui sont fort  
délicates. Dans le bassin de la Ga-  
ronne particulièrement, les paysans  
mises font du Coing ce qu'ils nomi-  
ment *Cotignac* ou *Codognac*, qui est  
la confiture des campagnes. Les phar-  
maciens en préparent un sirop légè-  
rement astringent, que l'on prescrit  
assez souvent dans les diarrhées re-  
belles. Ses pepins contiennent une  
très-grande quantité de mucilage,  
que l'on obtient par leur immersion  
dans l'eau. Aussi cette eau mucil-  
agineuse est-elle employée comme  
émolliente, surtout dans l'inflam-  
mation des paupières ou de la con-  
jonctive.

Les Coings, *Cydonia Mala*, étaient  
en honneur chez les anciens; ils les  
avaient consacrés à Vénus. Plusieurs  
auteurs pensent même que les fameu-  
ses Pommes du jardin des Hespérides,  
que l'on regarde généralement com-  
me les fruits de l'Oranger, devaient  
être ceux du Coignassier, puisque se-

lon Galesio, qui a récemment écrit  
un traité sur les Orangers, ces der-  
niers Arbres étaient inconnus des  
Grecs, et qu'ils ne croissaient pas natu-  
rellement dans les lieux où ils plaçaient le jardin des  
Hespérides.

Quoiqu'on rencontre assez rare-  
ment le Coignassier dans les jardins  
fruitiers des environs de Paris, ce-  
pendant les pépiniéristes le cultivent  
en abondance. En effet, les jeunes  
individus de cet Arbre servent de  
sujets pour greffer toutes les varié-  
tés de Poiriers que l'on veut élever  
en quenouille, en espalier ou en  
buisson. L'amateur y trouve plu-  
sieurs avantages; d'abord, greffés  
ainsi sur Coignassier, les Poiriers  
peuvent porter du fruit au bout de  
deux à trois ans, tandis qu'il leur  
en faut dix lorsque la greffe a été  
faite sur Poirier; en second lieu le  
Coignassier croissant plus lentement  
et s'élevant moins haut, les sujets  
greffés sont plus faciles à conduire et  
à tailler. On multiplie le Coignas-  
sier par trois procédés différents. 1° par le  
moyen des graines; ce procédé est le  
plus long et le moins employé, puis-  
qu'il faut au moins cinq à six ans pour  
que les individus soient bons à greffer;  
2° par boutures: elles se font au mois  
de mars, dans une terre légère et un  
peu humide; on peut les enlever  
l'année suivante; 3° mais le procédé  
le plus fréquemment en usage con-  
siste à séparer les rejets des vieux  
pieds. Pour en obtenir un plus grand  
nombre, on coupe ras de terre quel-  
ques vieux individus. Il s'élève alors  
de la souche un grand nombre de re-  
jets, que l'on sépare à la fin de  
l'hiver et que l'on plante en pépinière.  
Les pieds provenus de cette manière  
peuvent être greffés en écusson dès  
la fin de l'année suivante.

Le Coignassier n'est pas très-dif-  
ficile sur la nature du terrain; cepen-  
dant il pousse mieux et donne de  
fruits de meilleure qualité, dans une  
terre légère, un peu sablonneuse et  
humide. Dans un terrain sec, les  
fruits sont petits, durs et coriaces.

ais il demande toujours une bonne position.

Le COIGNASSIER DE LA CHINE, *Cydonia sinensis*, Thouin, Ann. Mus. XIX, p. 144, tab. 8 et 9. Cette espèce, originaire de la Chine, n'est guère connue que depuis une centaine d'années, et ce n'est qu'en 311 que cet Arbrisseau a fleuri à Paris pour la première fois. Il s'élève, comme le précédent, à une hauteur de quinze à vingt pieds, et porte des feuilles courttement pétiolées, ovales, longées, terminées en pointe et finement dentées. Leurs deux surfaces sont d'un vert clair, glabres et entièrement lisses. Au sommet des jeunes ramifications de la tige naissent de grandes et belles fleurs roses dont les calices sont glabres. Les fruits sont pyriformes, semblables à ceux de l'espèce précédente pour la forme, la grosseur, la couleur et l'odeur. Leur bois est dur, grenu et presque sec. Chaque loge contient une très-grande quantité de graines fort petites. Le bel Arbrisseau commence à se répandre dans les jardins d'agrément, et on le cultive en pleine terre. Il résiste très-bien à un froid de neuf à dix degrés. Ses fruits n'ont point encore assez bien mûri, pour qu'on puisse en apprécier la qualité. Cependant ils paraissent avoir la plus grande analogie avec les Coings ordinaires. On le multiplie facilement le boutures et de marcottes, ou en le greffant sur Poirier ou sur le Coignassier commun.

Le COIGNASSIER DU JAPON, *Cydonia japonica*, Pers., Synops.; Herb. Amat. 2, t. 73. Moins élevée que les deux autres, cette espèce a ses branches armées d'épines, ses jeunes rameaux tomenteux, garnis de feuilles oblongues pétiolées, finement dentées, glabres et luisantes à leur face supérieure. Les fleurs, d'un rouge écarlate ou blanches dans une variété, sont réunies plusieurs ensemble et forment un petit bouquet terminal; leur calice est glabre; les divisions de son limbe sont obtuses et ciliées, les

fleurs sont quelquefois semi-doubles. Cette espèce, introduite depuis peu d'années dans les jardins de Paris, y est encore assez rare. Elle se multiplie par les mêmes procédés que la précédente, et comme elle passe l'hiver en pleine terre. (A. B.)

COIGNIER. BOT. PHAN. Même chose que Coignassier. V. ce mot.

COLLANTHE. BOT. PHAN. Sous-genre de Gentiane établi par Reichenow, dont l'espèce appelée *putana* était le type. (B.)

COILOPHYLLUM. BOT. PHAN. Morison nommait ainsi le genre de Plantes que plus tard Linné désigna sous le nom de *Sarracenia*. V. ce mot. (A. B.)

COILOTAPALUS. BOT. PHAN. (Brown.) Syn. de *Cecropia peltata*. (B.)

COING. BOT. PHAN. Fruit du Coignassier. V. ce mot. (B.)

COING DE MER ou COTOGNIA MARINA. POLYP. L'*Alcyonium cydonium* est ainsi nommé par les Italiens. Ce Polypier appartient maintenant à l'ordre des Alcyonées de la division des Polypiers sarcoides. Lamarck le classe parmi les Lobulaires de Savigny sous le nom de *Lobularia conoidea*; est-ce bien le *Cotognia marina* des Italiens? (LAM. X.)

COINS ou CROCHETS. HÉR. V. DENT.

COIPATLIS. BOT. PHAN. (Hernandez.) Nom mexicain d'une Syngénèse qui paraît être une Santoline. (B.)

COIPOU ou COYPO. MAM. Nom de pays d'une espèce du genre *Hydromis* de Geoffroy. (B.)

COIRCE. BOT. PHAN. Nom gallois de l'Avoine. (B.)

\* COIRON. BOT. PHAN. (Nées.) Nom de pays de *Selinum spinosum* de Cavanilles. (B.)

COITE. BOT. PHAN. (Dioscoride.) Syn. de Ciguë. V. ce mot. (B.)

COIWA, BOT. PHAN. V. KORIVA.

**COLIX.** *Coix.* BOT. PHAN. L'organisation de ce genre de la famille des Graminées et de la Monocécie Triandrie, L., présente des particularités assez remarquables pour que nous croyons devoir la décrire avec quelques détails, d'autant plus qu'elle ne l'a été que d'une manière fort incomplète dans la plupart des ouvrages, même ceux d'agrostographie. Les fleurs sont constamment monoïques; de la gaine de chacune des feuilles supérieures naissent plusieurs pédoncules inégaux, dressés ou arqués, portant à leur sommet un involucre ovoïde épais, resserré à son sommet qui est percé d'une ouverture latérale. Il contient une fleur femelle, et de plus un petit rameau saillant couvert de fleurs mâles, et qui naît de son fond. Ce rameau porte trois ou quatre petits glomérules composés chacun de deux ou trois épillets. Chacun de ces derniers est billore. La lépicée est formée de deux valves membraneuses un peu coriaces, concaves, dont l'externe, un peu plus grande, a son sommet tantôt entier, tantôt tridenté. Les deux fleurs sont sessiles; l'externe est plus grande que l'interne. Les paillettes qui composent leur glume sont minces, lancéolées, un peu concaves, terminées en pointe. La glumelle consiste en deux paléoles charnues, épaisses, turbinées, tronquées et planes à leur sommet, immédiatement appliquées l'une contre l'autre par leur côté interne. Les filets des trois étamines naissent entre ces deux paléoles. L'involucre d'où naît le rameau portant les fleurs mâles est ovoïde, allongé, rétréci vers son sommet, qui quelquefois se prolonge en une languette plus ou moins longue. Il offre un sillon longitudinal peu profond, et contient intérieurement une fleur femelle et deux ou trois appendices claviformes, allongés, de la même hauteur que celle-ci, et quelquefois plus longs, naissant comme elle d'un petit support qui part du fond de l'involucre. Ces appendices nous paraissent être autant de fleurs avortées et réduites à l'état

rudimentaire. La fleur fertile est sur l'un de ses côtés creusée d'un sillon longitudinal profond, dans lequel sont contenus les appendices et le pédoncule commun des fleurs mâles. Les écailles de la fleur femelle qui constituent la lépicée et la glume sont au nombre de cinq, allant en décroissant de grandeur depuis la première ou la plus externe jusqu'à la cinquième. Elles sont toutes glabres, très-concaves, arrondies, longuement acuminées à leur sommet qui est aigu. La plus intérieure de ces cinq écailles, qui est aussi la plus petite, pourrait être considérée comme une glumelle unipaléolée. Autour de l'ovaire on trouve trois étamines avortées, rudimentaires et à peine de la hauteur de cet organe. Celui-ci est sessile, arrondi, glabre, un peu comprimé sur ses faces. De son sommet naît un style court, cylindrique, qui bientôt se termine par deux stigmates très-longs, filiformes, poilus, glanduleux et saillans par l'ouverture de l'involucre. Le fruit se compose de l'involucre qui a pris un peu de développement, et qui est devenu dur, osseux, lisse, luisant, et d'une couleur gris de perle comme le fruit de certaines espèces de *Lithospermum*. Dans son intérieur on trouve les cinq écailles, au milieu desquelles est placée une cariopse irrégulièrement globuleuse, marquée sur un côté d'une gouttière profonde.

Les espèces de ce genre, au nombre de cinq seulement, sont originaires des Indes-Orientales. Leurs racines sont annuelles ou vivaces; leurs étamines fermes et assez élevées; leurs feuilles plus ou moins larges. Le *Coix Lacryma* DE JOB, *Coix Lacryma*, L., Lamk. Ill. tab. 750, est une plante annuelle. On la cultive dans les jardins. On l'a avec ses fruits, de même qu'avec ceux des autres espèces, des bracelets, des colliers et d'autres ornemens. On prétend qu'ils contiennent une farine assez nutritive, et que dans les temps de disette on en a fait du pain en Espagne et en Portugal, où on la cultive plus fréquemment et où Bory de



uint-Vincent l'a trouvée comme naturalisée.

Les anciens donnaient aussi le nom : COLX à un Palmier. (A. R.)

\*COJACAI. ois. (Stedam.) Syn. su-namois du Toucan à gorge jaune du Brésil, *Rhamphastos Tucanus*, Lat. TOUCAN. (DR..Z.)

\*COJO. BOT. PHAN. Syn. de Ba-nier à Ternate. (B.)

\*COJOLT. MAM. Le Mammifère car-nassier de la Nouvelle-Espagne, dé-igné sous ce nom par Nieremberg, e peut être reconnu. (B.)

COJUMERO. MAM. Nom du La-tantin parmi les Espagnols de la Guiane. (B.)

\*COK-BLACK. ois. Nom écossais u *Tetrao hybridus*, L. V. TÉTRAS. (DR..Z.)

COL. BOT. PHAN. Syn. de *Gossy-pium indicum* en Syrie. V. COTON-NIER. (B.)

COL. GÉOL. V. MONTAGNES.

COLA ET COLAC. POIS. Et non *Colac* ou *Coulas*. Syn. d'Alose sur es rives de la Garonne et de la Dor-logne. V. CLUPE. (B.)

\*COLA, COLES, KILA ET GO-LA. BOT. PHAN. Fruit qui, dans les premiers voyages des Européens à la Côte de Benin, avait une certaine cé-lébrité comme stomachique, et que Beauvois a reconnu provenir d'une espèce de *Sterculier*.

Selon R. Brown (*Botany of Con-go*, p. 48), c'est la graine du *Stercu-lia acuminata* qui est désignée sous ce nom dans la narration des voya-geurs au Congo; et il est à remarquer qu'on se sert de la même expression dans la Guinée, la Sierra-Leone et toute la côte ouest de l'Afrique. L'u-sage de ces graines est d'ailleurs très-général, et précieux pour ces climats brûlans, s'il est vrai qu'elles jouissent de la propriété de rendre potables les eaux les plus fétides. V. Beauvois. Pl. d'Oware, p. 45. (B.)

\*COLADITI-MANOORA. BOT. PHAN. Syn. d'*Hydrocotyle asiatica* à Ternate. (B.)

\*COLAGUALA. BOT. CHY. (Per-netty.) Pour Calaguala. V. ce mot. (B.)

\*COLAHATHILL. ois. (Laché-naye-Desbois.) Pour Colcanathill. V. ce mot. (DR..Z.)

COLAPHONIA ET COLOPHO-NION. BOT. PHAN. (Dioscoride.) Syn. de Scamonee, espèce du genre Lise-ron. V. ce mot. (B.)

COLARIS. ois. L'espèce à laquelle Aristote a donné ce nom est un Pas-sereau selon les uns, une Pie-Grièche selon d'autres. Cuvier a ainsi appelé scientifiquement le genre Rolle. V. ce mot. (B.)

COLAS. ois. Syn. vulgaire du Geai, *Corvus glandarius*, L., dans certains cantons, et de la Corbaine, *Corvus Corone*, L., dans d'autres. V. CORBEAU. (DR..Z.)

COLASPE. *Colaspis*. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères, établi par Fabricius et adopté par la plupart des entomolo-gistes. Latreille le place (Règn. Anim. de Cuv.) dans la famille des Cycliques, et le rapporte à la division des Chrysomèles qui, dans les précédents ou-vrages (*Gener. Crust. et Ins.* et *Considér. génér.*), formait une famille. Ses caractères sont : tête presque ver-ticale; antennes insérées au-devant des yeux, plus longues que le protho-rax, terminées par quatre à cinq ar-ticles plus allongés que les précé-dens et de forme un peu différente; mandibules subitement arquées et ré-trécies vers l'extrémité, terminées par une pointe très-forte; palpes filifor-mes avec le dernier article presque conique; corps arrondi et court. Les Colaspes ont la plus grande analogie avec les Eumolpes, et ne s'en distin-guent guère que par leurs palpes. Elles se rapprochent des Chrysomèles par la forme de leur corps; mais elles en diffèrent par leurs antennes et leurs mandibules. Enfin, sous plusieurs rapports, elles avoisinent les genres Galérusque, Altise, Criocère, Hispe et Casside, dont elles s'éloignent cep-endant par la position des antennes

devant des yeux. Le genre *Col* ou *Colaspide* de Duméril est nombreux en espèces. On ne sède aucune observation sur leurs us; presque toutes sont originaires de l'Amérique. Dejean (Catal. Coléopt. p. 124) en mentionne cinquante-huit. Parmi elles, nous citons la *COLASPE FLAVICORNE*, *Col. icornis* ou la *Chrysomela occidentalis* de Linné, décrite et figurée par Deér (Mém. sur les Ins. T. V, p. 7, t. 16, fig. 14) et par Olivier (Ép. T. V, p. 881, pl. 1, fig. 1, 5). Elle peut être considérée comme le type du genre; on la trouve à enne. La *COLASPE TRÈS-NOIRE*, *atra*, Oliv. (loc. cit. p. 887, t. 2, 22) ou la *Col. barbara* de Fabricius (Syst. Eleuth. T. 1, p. 415, 15) est originaire de la Barbarie, duugal et de la France méridionale. abricius a compris dans le genre *Colaspide* des espèces sauteuses qui appartiennent à celui des *Altises*. *V.* ce (AUP.)

**OLASSO. BOT. PHAN.** Syn. indou *Sesleria longifolia*. (B.)

**COLBERTIE. Colbertia. BOT.** N. Un savant Anglais, Salisbury *radis*. Londin., n. 73), a acquitté cette des botanistes français en dédiant ce genre à la mémoire de l'illustre Colbert, ministre dont toute l'ambition se partageait entre la gloire de servir son pays et celle de promouvoir les sciences, qui enrichit par ses faits le Jardin du Roi à Paris, et même y fit planter les espèces les rares à la place des Vignes dont le terrain était couvert. Les caractères du genre consistent en un calice composé de cinq sépales persistans et que arrondis; une corolle de cinq lobes caducs; étamines en nombre fini dont dix intérieures beaucoup plus longues que les autres, à anthères très-longues; cinq ovaires libres et se changeant en un péricarpe globuleux à cinq loges: cinq styles divergens, rigides selon Roxburgh, ou capités au sommet d'après Brown (in Hort. Kew., éd. 2, v.

3, p. 328'); un grand nombre de semences réniformes dans chaque loge, immergées dans une pulpe gélatineuse et transparente.

La Plante sur laquelle ce genre a été fondé est un Arbre des vallées de la côte de Coromandel, qui fleurit aux mois de mars et d'avril, dont les feuilles sont oblongues, acuminées, dentées en scie, à nervures pennées au nombre de trente et plus, et portées sur de courts pétioles; les pédicelles sont très-nombreux, uniflores, et sortent de bourgeons écailleux placés près des nœuds de l'année précédente; il n'y a point de stipules, et les fleurs sont jaunes. La *COLBERTIE DE COROMANDEL*, *Colbertia coromandeliana*, D. C., est figurée sous le nom de *Dillenia pentagyna* dans Roxburgh (Flor. Coromand. 1, p. 21, t. 20). Elle appartient à la famille des *Dilleniacees*, tribu des *Dilléniées* de De Candolle, et à la Polyandrie Polygynie, L. (G. N.)

\* **COLCA. OIS.** (Sibbald.) Syn. écossais de l'Eider, *Anas mollissima*, L. *V.* CANARD. (DR. Z.)

**COLCANAUTHLI. OIS.** (Hernandez.) Syn. présumé de la *Barcelle* rousse à longue queue, *Anas Dominica*, L., au Mexique. *V.* CANARD. (DR. Z.)

**COLCANAUTHLICIOATL. OIS.** (Hernandez.) Et non *Colcanauthtlicioatl*. Espèce de Canard du Mexique, qui n'a pas encore été déterminée exactement. (DR. Z.)

**COLCHICACÉES** ou **COLCHICÉES. Colchicaceæ. BOT. PHAN.** Les genres qui composent cette famille avaient été placés autrefois parmi les *Joncées* dont ils s'éloignent par le port et par plusieurs caractères assez importants; Mirbel le premier les en a séparés, et en a formé un ordre distinct sous le nom de *Mérendérées* que De Candolle, dans la troisième édition de la Flore Française, a changé en celui de *Colchicacées*, rappelant le genre le plus notable de ce groupe. Enfin, c'est le même groupe pour lequel Robert Brown (Prod. Fl. Nov.-Holland.) a pro-

ose la dénomination de Mélanthiacées.

La famille des Colchicacées fait partie de la classe des Monocotylédones dont les étamines sont pérygones. Elle se compose de Plantes herbacées dont la racine est fibreuse ou tubéreuse; leur tige est simple ou rameuse, portant des feuilles alternes, engainées par leur base, et dont la figure est très-variable; les fleurs sont terminales, hermaphrodites ou unisexuées et polygames ou dioïques; leur calice est coloré, pétaloïde; à six divisions égales, quelquefois assez profondes pour former six sépales distincts; les autres fois le calice se prolonge à sa base en un tube long et grêle. On compte constamment six étamines insérées soit au sommet du tube calicinal, soit à la base et en face de chaque sépale, quand le calice est orné de pièces distinctes; leurs filets sont constamment opposés aux lobes ou aux sépales du périanthe; leurs anthères sont tournées en dehors. Les ovaires sont au nombre de trois dans chaque fleur; tantôt presque entièrement libres et distincts, tantôt plus ou moins intimement soudés entre eux de manière à former un ovaire à trois loges contenant chacune plusieurs graines attachées à l'angle interne de la loge, tantôt sur deux rangées longitudinales, tantôt confusément. Le sommet de chaque ovaire porte un style quelquefois très-long et très-grêle, qui se termine par un stigmate glabreux. Dans quelques genres, les trois styles sont soudés par leur base, et constituent un style profondément partagé; d'autres fois enfin les trois stigmates sont assés sur le sommet de l'ovaire. Le fruit se compose de trois capsules uniloculaires, distinctes, s'ouvrant par une fente longitudinale et interne; d'autres fois ces trois capsules se soudent; et forment une capsule à trois loges simplement rapprochées ou intimement unies; dans ce cas la capsule, à l'époque de la maturité, se sépare en trois capsules uniloculaires, et la déhiscence des

loges a lieu par une fente interne et longitudinale, comme dans le premier cas. Les graines sont plus ou moins nombreuses dans chaque loge, et attachées à un trophosperme saillant qui se sépare en deux lors de la déhiscence de la capsule. Elles ont un tégument propre, membraneux et quelquefois réticulé, surmonté vers le hile d'un tubercule plus ou moins volumineux, très-apparent, par exemple, dans le Colchique. Dans l'intérieur du tégument propre est un endosperme charnu qui contient un embryon très-petit, cylindrique, placé vers le point opposé au hile.

Cette famille est assez naturelle, quoique formée de genres dont le port soit loin d'être le même. En effet, il existe sous ce rapport une très-grande différence entre le genre Colchique, par exemple, qui a le calice longuement tubuleux à sa base, et les autres genres de cette famille où il est étalé et entièrement dépourvu de tube. Les Colchicacées tiennent le milieu entre les Joncées dont ils faisaient jadis partie, et les Asphodélées dont ils se rapprochent principalement par le port. Elles se distinguent surtout des Joncées par leur calice pétaloïde, leur capsule dont les valves ne portent jamais les cloisons sur le milieu de leur face interne. Ce dernier caractère distingue également la famille qui nous occupe de celle des Asphodélées; il faut y joindre aussi la nature du tégument propre de leur graine qui est membraneux, et les trois styles et les trois stigmates qui surmontent leur ovaire. Nous ne partageons donc pas l'opinion du célèbre Rob. Brown (*Prodr. Fl. Nov. Holl.*) qui place dans cette famille les deux genres *Anguillaria* et *Schelhammeria* dont la capsule est loculicide, c'est-à-dire s'ouvre en trois valves septifères sur leur face interne, ni celle du savant auteur du *Genera Plantarum*, qui pense que l'on doit faire entrer dans les Colchicacées le genre *Aselia* de Brown, dont l'ovaire offre trois trophospermes pariétaux, et dont le fruit est uné baie.

Les Colchicacées nous paraissent être rigoureusement caractérisées par l'union de ces trois signes : 1° trois styles ou trois stigmates distincts ; 2° trois capsules libres s'ouvrant par le côté interne, ou une capsule à trois loges s'ouvrant en trois valves par la séparation des cloisons en deux lames ; 3° des graines attachées à l'angle interne de chaque loge, et recouvertes d'un tégument membraneux ni noir ni crustacé. Par ces trois caractères réunis, cette famille se distingue assez nettement des autres familles monogylédonées à étamines périgynes. Nous plaçons dans la famille des Colchicacées les genres suivans :

*Colchicum*, L.; *Merendera*, Raymond; *Xerophyllum*, Richard in Michx; *Helonias*, L.; *Nolius*, Rich.; *Narthécium*, Juss.; *Veratrum*, L.; *Zygadenus*, Rich.; *Melanthium*, L.; *Pleea*, Rich.; *Burchardia*, R. Brown; *Peliosanthus*, Andrews; *Bulbocodium*, L. (A. R.)

**COLCHIQUE.** *Colchicum*. BOT. FRAN. Ainsi que nous l'avons vu dans l'article précédent, ce genre fait partie de la famille des Colchicacées à laquelle il a donné son nom, et de l'Hexandrie Trigynie. Il est facile à reconnaître à sa racine surmontée d'un tubercule charnu ou bulbe solide, à ses fleurs dont le calice est terminé inférieurement par un tube très-long et très-grêle. Le limbe est campanulé à six segmens égaux; les étamines insérées au haut du tube, ayant les anthères allongées et vacillantes; les trois ovaires sont soudés par leur côté interne et inférieur, libres seulement du côté externe; les trois styles sont grêles et de la longueur du tube calicinal; les stigmates sont pointus et recourbés en crochets; la capsule est renflée, marquée de trois sillons longitudinaux très-profonds, tricorne à son sommet, à trois loges polyspermes, s'ouvrant par le côté interne. Dans toutes les espèces qui sont herbacées et vivaces, les fleurs généralement roses sont enveloppées avant leur épanouissement

dans des espèces de gaines, ou de spathe membraneuses; tantôt les fleurs se montrent avant les feuilles, et semblent naître immédiatement du bulbe; tantôt elles se développent en même temps que la tige, et que les feuilles. Nous distinguerons parmi les espèces de Colchique les suivantes :

**Le COLCHIQUE D'AUTOMNE.** *Colchicum autumnale*, L., Bull. Herb., t. 19, que l'on connaît sous les noms vulgaires de Safran bâtard, de Tue-Chien, de Veilleuse ou Veillote, etc. Il croît en abondance dans les prairies humides de presque toute la France où, dans l'automne, il attire les regards par ses longues fleurs qui sortent immédiatement de terre sans être accompagnées de feuilles. Ces fleurs, au nombre de quatre à cinq, sont environnées à la base de leur tube par des spathe membraneuses, et naissent d'un petit prolongement qui termine le jeune bulbe à son sommet, et doit devenir la tige en s'allongeant. Cette plante présente dans le développement et le renouvellement annuel de son bulbe des particularités fort remarquables. Sur un des côtés, et à la partie inférieure du bulbe, qui l'année précédente a donné naissance aux feuilles, à la tige et aux fleurs, se développe un tubercule charnu, d'abord très-petit, recouvert extérieurement d'une gaine d'abord close à son sommet; renfermant à son intérieur plusieurs autres gaines emboîtées les unes dans les autres, et dont les plus internes sont les feuilles qui doivent se développer après l'évolution des fleurs. Celles-ci sont réunies au centre de ces feuilles; et naissent du sommet d'un petit prolongement du tubercule, et qui n'est rien autre chose que la tige en raccourci. Lorsque ces différentes parties commencent à se développer, la gaine la plus externe dont nous avons parlé se fend à sa partie supérieure et latérale, pour laisser sortir les parties qu'elle contient. Bientôt les fleurs dont le tube s'allonge d'autant plus que le bulbe est plus profondément enfoncé dans la

terre (ce qui a lieu graduellement chaque année, le nouveau bulbe se développant toujours un peu au-dessous de celui de l'année précédente); les fleurs, disons-nous, se montrent es premières au-dessus de la surface du sol. A la fin de l'automne elles se fanent, et au commencement du printemps suivant, la tige dont nous avons parlé s'allonge ainsi que les feuilles qui l'embrassent, et vient élever le jeune ovaire fécondé qui a passé l'hiver sous terre, et qui atteint alors sa maturité parfaite au-dessus du sol.

Les bulbes solides du Colchique sont blancs et presque entièrement composés d'amidon; mais ils contiennent en outre une certaine quantité d'un suc laiteux excessivement acre et vénéneux pour l'Homme et les Animaux, et pouvant occasioner des accidens les plus graves et même la mort. On remédie à ces accidens par l'usage des vomitifs administrés pour expulser la substance toxique, et ensuite par des adoucisans, des scilules ou des cordiaux, lorsque le poison est chassé hors du corps. La nature chimique du principe délétère des Colchiques a été déterminée par Pelletier et Caventou. Ces chimistes lui ont reconnu les caractères d'un Alkali végétal, pour lequel ils ont proposé le nom de VÉRATRINE, parce qu'ils l'ont trouvé en plus grande abondance dans le *Veratrum Sabatilla*. Malgré son action puissante et délétère, Stoecker a essayé d'introduire le Colchique dans la thérapeutique médicale. Il tenta sur lui-même ses premiers essais. Un des effets les plus constants de l'administration de ce remède, c'est l'activité qu'il communique aux organes sécréteurs de l'urine. Le Colchique est compté parmi les médicamens énergiquement diurétiques. Aussi est-ce contre les hydropisies passives qu'on l'a employé avec le plus de succès. Cependant n'en fait fort rarement usage.

Quelques variétés de cette Plante ont cultivées dans les jardins. Il y en a une à feuilles panachées, une

autre à fleurs doubles, une troisième et une quatrième à fleurs blanches et à fleurs roses. On cultive également le COLCHIQUE PANACHÉ, *Colchicum variegatum*, L., figure par Redouté dans ses Liliacées, pl. 238. Il croît naturellement dans l'Archipel de la Grèce, et se distingue par ses fleurs marquées de taches carrées analogues à un damier. Il demande l'orangerie, et ne peut passer l'hiver en pleine terre.

Outre le Colchique commun, on trouve encore en France deux autres espèces : le Colchique de montagne, *Colchicum montanum*, L., qui croît dans les Alpes, est plus petit de moitié que le Colchique d'automne, et pousse en même temps ses feuilles et ses fleurs, et le Colchique des Alpes, *Colchicum alpinum*, De Cand., Fl. Fr., dont le bulbe pousse une seule fleur d'un lilas tendre plus petite que celle du Tue-Chien, et au printemps suivant des feuilles linéaires. Cette dernière espèce, qu'on avait confondue avec le Colchique de montagne, et que De Candolle a le premier bien distinguée, est plus commune que ce dernier dans les Alpes de la Suisse et de l'Italie. (A. R.)

\* COLCHUS. INTEST. Nom donné par Zéder à un genre de Vers intestinaux, nommé depuis, par Rudolphi, Liorhynque. *V.* ce mot. Zéder l'avait proposé pour le *Cuculenus ascarioides* de Linné. (LAM. X.)

COLCOTAR FOSSILE. GÉOL. On donne ce nom à un Oxyde de fer provenant de la décomposition de conches pyriteuses qui ont demeuré quelque temps exposées à l'air. (G.)

COLCUICULTIC. OIS. (Hernandez.) Écrit *Colcuicuiltu* dans Détéville. Caille du Mexique qui paraît n'être qu'une variété d'âge du *Perdix borealis*, Temm. *V.* PERDRIX. (DR. Z.)

COLDÉNIE. *Coldenia*. BOT. PHAN. Genre de la famille des Borraginées et de la Pentandrie Monogynie de Linné, fondé par cet illustre naturaliste qui lui assigne pour caracté-

tères; calice quadripartite; corolle infundibuliforme à limbe étalé; quatre étamines; ovaire quadrilobé, à quatre styles et à quatre stigmates; fruit composé de quatre capsules hérissées, rapprochées et monospermes. Ces caractères établis d'après l'inspection d'une seule Plante, avaient d'abord fait placer le genre dans la Tétrandrie Tétragynie; cependant, comme rien n'est moins fixe que le nombre dans l'organisation des fleurs, il a bien fallu le reporter dans la Pentandrie, près des autres genres voisins de Borraginées, quand on eut découvert une autre espèce pentandre et monogyn. A.-L. de Jussieu avait déjà indiqué cette espèce comme congénère du *Coldenia*, et il en avait conclu qu'il serait plus rationnel de considérer ce genre comme appartenant à la Pentandrie. Lehmann, dans un travail sur les Asperifoliées, a donc réformé le caractère générique du *Coldenia*, et n'a eu aucun égard au nombre des étamines. Le caractère qu'il lui donne, est une petite description des organes floraux, capable de le faire distinguer, soit des *Lithospermum*, soit des autres genres voisins. On n'a décrit que deux espèces de *Coldenias*: la plus anciennement connue est le *Coldenia procumbens*, L. Plante tétrandre indigène des Indes-Orientales. La seconde est le *Coldenia dichotoma*, Lehmann, qui constituait le genre *Tiquillia* de Persoon. Cette Plante habite le Pérou, où elle avait été trouvée par Dombey, et communiquée à Jussieu qui fit sur elle l'observation importante que nous venons de citer. Elle est figurée dans la Flore du Pérou (vol. 2, p. 5, t. III) sous le nom de *Lithospermum dichotomum*. (G. N.)

**COL D'OR.** ois. Espèce du genre Sylvie, *Sylvia auraticollis*, Levaill., Ois. d'Afrique, pl. 119. V. SYLVIE, (DR. Z.)

**COLÉ.** BOT. PHAN. Du Dict. de DeCaiville. V. COLEUS.

**COLEANTHE.** *Coleanthus*. BOT. PHAN. C'est une opinion assez géné-

ralement répandue qu'il ne reste plus guère de formes nouvelles à connaître dans les organes reproducteurs des Plantes européennes, ou, en d'autres termes, que tous les jours l'espoir s'affaiblit de trouver en Europe des Plantes nouvelles constituant de nouveaux genres. Les cadres sont tracés à peu près tous, il n'y a plus qu'à les remplir, et c'est ce qui arrive encore assez fréquemment quand les botanistes qui se vouent à la connaissance des Végétaux de la Flore européenne découvrent de nouvelles espèces. On doit donc attacher une grande importance à la connaissance de ces Plantes, lorsqu'elles sont entièrement nouvelles sous l'un et l'autre point de vue. Le genre dont nous allons parler, est du nombre de ceux qui ont échappé aux recherches de nos infatigables collecteurs, et pourtant c'est dans le centre de l'Europe, au milieu des marais de la Bohême, que Seidel et Presel en ont fait la découverte. Il appartient à la Triandrie Digynie, L., et sa place dans les familles naturelles n'est pas encore bien positivement déterminée, car il tient le milieu entre les Graminées et les Cyperacées. Néanmoins ses rapports avec les genres *Crypsis* et *Zoysia* le font davantage incliner vers les premières. Voici les caractères tracés sur le vivant par Seidel: l'épécène bivalve, à valves inégales, l'extérieure plus grande, ovale, lancéolée, aristée au sommet, l'intérieure ovale, aiguë, hérissée sur le bord et extérieurement; glume univalve, ovale, aiguë et mutique; trois étamines dont les filets capillaires sont plus longs que la glume, à anthères oblongues et légèrement bifides aux deux extrémités; deux styles filiformes, de la longueur des étamines, à stigmates nus et simples, non plumeux comme dans la plupart des Graminées; cariopse unique, ovale, oblongue, en partie recouverte par les organes accessoires persistans, et couronnée par les débris des styles.

Le **COLEANTHUS EXIOU**, *Coleanthus subtilis*, Seidl., est une très-petite Herbe dont le chaume offre vers sa partie

oyenne un renflement spatulacé; les  
 uilles sont plus courtes que le cha-  
 u. Les fleurs sont disposées en une  
 nicule tellement serrée qu'elle a la  
 me d'un capitule; leur axe est  
 ongé et flexueux. Elle est fort abon-  
 nte dans les étangs desséchés du  
 maine de Zbirow autour de Wos-  
 ck en Bohême. Tratinick, dans la  
 ore d'Autriche, fascic. 1, t. 451,  
 figuré cette Plante et l'a décrite  
 us le nom de *Schmidtia*; mais cette  
 nomination a été rejetée par plu-  
 urs botanistes allemands, à cause  
 de la difficulté où ils sont de la dis-  
 aguer dans la prononciation d'avec  
 lle de *Smithia* très-anciennement ad-  
 ise pour un autre genre. D'ailleurs le  
 om de *Coleanthus* a été proposé par  
 idel, celui auquel appartient tout  
 honneur de la découverte. (G.N.)

COLEBRILLA. ANNEL. C'est-à-  
 ire, en espagnol, *Petite Couleuvre*.  
 e Vers de Guinée à Curaçao. V.  
 ORDUS. (LAM.X.)

COLEBROOKÉE. *Colebrookia*.  
 OT. PHAN. Après avoir démontré que  
 e genre *Colebrookia* de Donn devait  
 tre réuni au *Globba*, Smith a dé-  
 rit, dans l'*Exotic Botany*, p. III, un  
 genre nouveau qu'il a dédié à H. Tho-  
 nas Colebrooke, magistrat respecta-  
 ble du Bengale, et l'un de ceux qui  
 ont le plus éclairci l'histoire des  
 Plantes de cette contrée. Ce genre,  
 le la Didymie Gynospormie, L.;  
 appartient, selon Smith, à la 2.<sup>e</sup> sec-  
 tion des Verbénacées, où il le pla-  
 ce à côté du genre *Selago*. Voici  
 ses caractères essentiels : calice régulier  
 à cinq petites dents qui, après la  
 maturité, deviennent plumbeuses, et  
 forment une sorte d'ailes à la graine,  
 destinées à son transport dans les lieux  
 éloignés. Cette graine, ou plutôt ce  
 fruit qui est enveloppé par la base du  
 calice, est toujours solitaire. Le limbe  
 de la corolle est à cinq lobes, dont  
 un plus grand que les autres.

La COLEBROOKÉE A FEUILLES OP-  
 POSÉES, *Colebrookia oppositifolia*, est  
 un Arbrisseau dont la tige est bran-  
 chue et carrée, les feuilles aromati-  
 ques, elliptiques-lancéolées, pointues

et dentées en scie. Ses fleurs sont ex-  
 tièrement petites et nombreuses, dis-  
 posées en chatons dont le sommet est  
 pendant. Ces chatons, composés de  
 fleurs densément agglomérées, sont  
 terminaux ou axillaires. Elle est figu-  
 rée t. 115 de l'*Exotic Botany*, sous  
 le nom de *Buchanania oppositifolia*,  
 parce que Smith l'avait d'abord ap-  
 pelée ainsi en l'honneur du docteur  
 Buchanan qui l'avait rapportée du  
 Népal. Dans le second supplément  
 du Dictionnaire encyclopédique, Poi-  
 ret affirme que le *Colebrookia* de  
 Smith doit être rapporté au genre  
*Elsholtzia* de Willdenow. C'est pro-  
 bablement encore une erreur que  
 cette rectification de la prétendue  
 erreur de Smith, car il nous semble  
 difficile de croire que cet auteur ait  
 pu décrire une Labiée comme appar-  
 tenant aux Verbénacées. (G.N.)

COLEBROOKIA. BOT. FRAN. Sous  
 le nom de *Colebrookia bulbifera*, Ja-  
 mes Donn (*Hort. Cantabrig.*) avait  
 décrit une superbe Plante, trouvée  
 au Bengale par Roxburgh, et qui a  
 fleuri dans les jardins d'Angleterre.  
 Mais, d'après Smith (*Exot. Bot.* p.  
 85), cette Plante est une espèce du  
 genre *Globba*, dont il donne une  
 belle figure (*loc. cit.*, t. 103); et qu'il  
 appelle *Globba marantina*. V. GLOBBA.  
 (G.N.)

\* COLEFISH. POIS. V. COAX-  
 FISH.

COLEMEL, COLEMELLE ou  
 COULEMELLE. BOT. CRYPT. Noms  
 vulgaires de l'Agaric élevé. (B.)

COLEMOUSE. OIS. Syn. anglais  
 de la petite Charbonnière, *Falco ater*,  
 L. V. MÉSANGE. (BR.Z.)

COLENICUI. OIS. Syn. du Coccy-  
 cas, *Perdix borealis*. V. PERDRIX.  
 (BR.Z.)

COLENICULTIC. OIS. (Hérnan-  
 dez.) Syn. présumé du Colin Ho-  
 houï, *Perdix mexicana*, L. V. PER-  
 DRIX. (BR.Z.)

COLEOPTÈRES. INS. *Coleoptera*,  
 L.; *Eleutherata*, Fabr. Cinquième  
 ordre de la classe des Insectes dans  
 la méthode de Latreille (Règ. Anim.  
 de Cuv.); ayant pour caractères es-

sentiels : quatre ailes, dont les deux supérieures en forme d'étuis ; des mandibules et des mâchoires ; ailes inférieures pliées seulement en travers ; étuis ou élytres crustacés et à suture droite. Ce petit nombre de caractères tranchés suffit pour distinguer les Coléoptères de tous les autres ordres. Personne ne les confondra avec les Névroptères, les Lépidoptères, les Hyménoptères et les Diptères ; ils ressemblent cependant sous plusieurs rapports aux Hémiptères et surtout aux Orthoptères que Linné leur avait associés, mais l'organisation de la bouche, plusieurs autres particularités et le mode de métamorphose détruisent ce rapprochement. Les Coléoptères forment un groupe très-naturel, et les individus qui le composent présentent tous une telle analogie dans le *facies*, qu'il devient très-aisé de les reconnaître, et qu'on pourrait supposer que rien n'est plus simple que d'embrasser ces Insectes dans une même pensée et de réduire à un petit nombre de propositions générales ce que l'on sait de leur organisation et de leurs habitudes. Ce résultat n'est cependant pas aussi facile à obtenir qu'on pourrait le croire. En effet, l'esquisse d'un semblable tableau ne saurait être tracée largement et à grands traits ; elle veut de nombreux détails, et nous n'en possédons encore que fort peu ; elle nécessite en outre une liaison étroite entre tous les faits, et la science nous les offre pour la plupart isolés. Nous croyons donc utile, malgré les observations que nous avons faites sur une multitude de genres, de restreindre provisoirement notre cadre et de n'aborder qu'avec réserve les généralités sur les Coléoptères. Ce n'est d'ailleurs ni le cas ni le lieu de présenter des observations nouvelles qu'on ne viendrait pas chercher ici et qui trouveront bien plus naturellement leur place dans des Mémoires spéciaux ou dans un ouvrage général.

Considérés à l'extérieur et dans l'état parfait, le corps des Coléoptères peut, comme celui de tout In-

secte, être divisé en trois parties très-distinctes, la tête, le thorax et l'abdomen. — La tête, qui varie singulièrement par sa forme et son volume, supporte deux antennes de figure quelquefois semblable dans toute une famille, d'autres fois variables suivant les genres et même selon les sexes, mais généralement composées de onze articles ; elle n'offre jamais d'yeux lisses, mais constamment des yeux à facette, ovales, arrondis ou figurés en croissant, en général très-globuleux dans les espèces carnassières ; enfin, elle présente un chaperon ou épistome de Latreille, et une bouche proprement dite, formée d'un labre ou lèvres supérieure transversale, mobile, plus ou moins large et fixée à la partie antérieure de l'épistome ; d'un sous-labre ou épipharynx constamment caché et constituant le palais de la cavité buccale ; d'une paire de mandibules de consistance ordinairement cornée, mais quelquefois membraneuses et très-petites dans les espèces qui ne prennent aucune nourriture, qui vivent du suc des fleurs et sucent le liquide des matières animales excrémentielles ou en putréfaction ; d'une paire de mâchoires plutôt molles que coriaces, nues ou garnies tantôt de poils, tantôt de dents, presque toujours bifides, ou partagées en deux lobes dont l'extérieur, plus grand et terminal, est articulé à la mâchoire, près de l'origine des palpes, et dont l'intérieur solide a quelquefois la consistance d'une mandibule ; le lobe extérieur est susceptible de plusieurs modifications ; il est transformé dans plusieurs Insectes, tels que les Coléoptères carnassiers et lamellicornes, en un palpe de deux articles. L'autre palpe ou l'intérieur ne présente jamais plus de quatre articulations ; enfin, on observe à la bouche une lèvre inférieure, divisée en deux parties, le menton et la languette, portant une paire de palpes de quatre articles, mais dont le premier est généralement très-petit et peu apparent.

Le thorax est divisible, de même



que celui des autres insectes hexapodes, en trois segments qui ont un degré de développement particulier; ils sont thoraciques très-étroits, tandis que le mesothorax et le métathorax ont un volume considérable; c'est là un des caractères les plus importants que présente le squelette des Coléoptères. Le prothorax, toujours libre, exécute des mouvements assez étendus; les deux autres sont constamment unis entre eux et à peu près immobiles. Par cela même que le mesothorax est très-peu développé, toutes les pièces qui entrent dans sa composition sont restées rudimentaires; cette particularité est principalement sensible dans l'écusson qui, bien que fort petit dans plusieurs cas, n'en existe pas moins, et est toujours composé de quatre pièces: l'écu antérieur, *prescutum*; l'écu, *scutum*; l'écusson, *scutellum*; l'écusson postérieur, *postscutellum*. Les éléments sont, à la vérité, réunis intimement entre eux, mais dans certains genres, les soudures se voient parfaitement. Nous entrerons, au sujet du THORAX, dans quelques détails qui, si tous les placions ici, ne seraient pas compris. Le prothorax supporte seulement la première paire de pattes; le mesothorax la seconde et les élytres; elles-ci sont plus ou moins consistantes et plus ou moins développées. Ordinairement elles égalent l'abdomen en longueur, mais dans quelques espèces, elles sont excessivement courtes, et n'en recouvrent guère que le quart. En général elles sont libres et s'étendent dans l'action du vol; quelquefois cependant elles sont soudées l'une à l'autre sur la ligne moyenne; cet état particulier se trouve en rapport constant avec l'absence des secondes ailes; le métathorax donne attache à la troisième paire de pattes et aux ailes proprement dites; celles-ci manquent lorsque les élytres sont soudées entre elles; quand elles existent, elles sont reliées constamment sur elles-mêmes, et cette disposition est propre aux Insectes de cet ordre. Elles sont mem-

braneuses et opèrent le vol presque seules; les élytres n'en étant que les ailes secondaires. Les pattes ont un développement variable; les antérieures ou celles du prothorax sont très-souvent remarquables par quelques particularités propres aux mâles, et par la forme et le nombre différents des articles des tarses. On les avait crues composées de cinq pièces: la hanche, le trochantér, la cuisse, la jambe et le tarse. Nous avons démontré, dans notre travail sur le Thorax, qu'il existait une sixième pièce mobile très-importante, cachée constamment dans l'intérieur du thorax et qui sert à l'articulation de la hanche avec l'épipimère. Nous avons appliqué à cette pièce, jusqu'ici inconnue, le nom de *Trochantin*, par opposition à *Trochanter*.

L'abdomen des Coléoptères se rétrécit rarement à la base, il est sessile, c'est-à-dire uni au métathorax par son plus grand diamètre transversal; sa partie inférieure, ou le ventre proprement dit de quelques auteurs, est moins étendue dans le sens longitudinal que la supérieure, et cette différence est due au développement du sternum du métathorax qui se prolonge en arrière et envahit ainsi la place que l'abdomen devrait occuper. Cette disposition est surtout sensible dans les Copris, où les anneaux du ventre sont extrêmement réduits; les uns sur les autres. Dans quelques espèces, le premier anneau est divisé en deux parties par le sternum qui se place entre elles sur la ligne moyenne. Inférieurement l'abdomen a toujours une consistance cornée; à la partie supérieure, il est toujours mou; lorsque les élytres existent; mais s'il arrive que celles-ci soient plus courtes que l'abdomen, ou qu'elles manquent complètement, la partie supérieure devient aussi solide que l'inférieure. Les Staphylins et plusieurs genres voisins peuvent être cités comme exemples.

L'anatomie interne des Coléoptères a été éclairée, dans ces derniers temps, par les travaux importants de

Ramdohr, et tout récemment par Léon Dufour qui a fait de cet ordre d'Insectes une étude toute spéciale. Il a passé en revue la plupart des familles, et il a déduit de ce travail, avec une sagacité admirable, quelques propositions générales très-satisfaisantes. Nous laissons à notre ami le plaisir de les publier lui-même; on pourra d'ailleurs, en recourant au mot CARABIQUE et à quelques genres de l'ordre dont il est question, prendre une idée de l'excellent esprit qui a présidé à ces recherches.

Les sexes, outre qu'ils sont distingués par les organes générateurs, présentent assez souvent des différences extérieures, soit dans les antennes, soit dans les pattes ou dans quelques autres parties; toutes ces différences, lorsqu'on les connaîtra, seront mentionnées à chaque genre en particulier. L'accouplement, dont la durée varie de quelques heures à un ou deux jours, ne paraît avoir lieu qu'une seule fois. La copulation achevée, le mâle ne tarde pas à périr, et la femelle meurt immédiatement après la ponte des œufs. Ces œufs, qui varient en volume, en forme, en couleur et en consistance, sont déposés dans des lieux et des substances très-différentes, suivant le genre de vie de la larve qui doit en naître. Quelques espèces les pondent dans les eaux tranquilles; d'autres les placent sur certaines Plantes; plusieurs les introduisent dans des matières animales, dans les cadavres en putréfaction, et un grand nombre les enfouissent dans la terre. Les larves qui en naissent diffèrent singulièrement entre elles; en général elles ressemblent à un Ver mollassé ayant la tête et la partie supérieure des trois anneaux qui la suivent écailleuses, elles sont munies de six pattes: les yeux, qui seront un jour à facettes, ne présentent encore que des petits corps granuleux, souvent au nombre de six de chaque côté. Leur bouche est pourvue d'instrumens en rapport, pour la forme, le développement et la consistance, avec leur manière de vi-

vre; les mandibules sont très-fortes et cornées dans les espèces qui rongent les substances ligneuses; elles sont coriaces dans celles qui se nourrissent de feuilles, et presque membraneuses dans le grand nombre de larves qui vivent dans les matières cadavériques ou en putréfaction. Les antennes sont ordinairement très-courtes, cylindriques ou coniques, et composées d'un petit nombre d'articles. Il est impossible, dans l'état actuel de la science, de présenter des généralités plus complètes sur l'organisation des larves; cependant on a observé quelques faits communs relatifs à leurs mœurs, et que nous transcrivons d'après Olivier et Latreille. Les Coléoptères vivent bien plus long-temps dans l'état de larve que dans celui d'Insecte parfait, et la durée de cette première forme varie singulièrement suivant les genres; leur accroissement est d'ailleurs d'autant plus prompt que leur nourriture est plus abondante et que la température est plus élevée. Quelques-unes passent l'hiver sans presque manger et sans croître d'une manière sensible; mais dès que la chaleur s'est fait sentir, elles se gorgent de nourriture et croissent rapidement. On a remarqué que les larves qui vivent de feuilles, telles que les Criocères, les Altises, les Chrysomèles, ne restent guère plus d'un mois dans cet état, et qu'au contraire celles qui se nourrissent des racines des Plantes y demeurent deux, trois années et même plus. L'observation apprend encore que les Coléoptères qui passent l'hiver sous la forme d'œuf sont ceux qui vivent peu de temps à l'état de larve; ils naissent, croissent, se reproduisent et périssent dans le courant de la belle saison, tandis que les Coléoptères qui passent l'hiver dans l'état de larve ou de nymphe, sont ceux qui vivent long-temps sous ces deux formes. — C'est principalement à l'état de larve que les Coléoptères font de grands torts à l'agriculture et l'industrie. Tout le monde connaît par leurs ravages celles des Bruches, des Charançons, des

Calandres, des Hanneçons, des Cétoines, des Criocères, des Chrysomèles, des Clairons, des Anthrenes, et des Dermestes. Et ces mots. Les larves des Coléoptères changent ordinairement trois fois de peau, et quelques-unes de celles qui vivent dans la terre construisent une sorte de coque dans laquelle elles se métamorphosent en nymphes; sous cette forme elles ne prennent aucune nourriture, ne manifestent aucun mouvement et restent plus ou moins longtemps dans cet état.

Linné, Fabricius, Geoffroy, Olivier, Latreille, Dumeril, etc., ont établi dans l'ordre des Coléoptères des divisions plus ou moins naturelles. Geoffroy ayant observé que les Coléoptères d'un même genre et d'une même famille ont toujours un nombre égal d'articles aux tarses, et que les différences que ces parties présentent sont constamment liées à quelques rapports généraux d'organisation, a eu l'heureuse idée de baser sur les caractères tirés des tarses les premières grandes divisions : ainsi il a partagé les Coléoptères en quatre sections de la manière suivante :

I. Cinq articles à tous les tarses.

PENTAMÈRES.

II. Cinq articles aux quatre tarses antérieurs, quatre aux deux derniers.

HÉTÉROMÈRES.

III. Quatre articles à tous les tarses.

TÉTAMÈRES.

IV. Trois articles à tous les tarses.

TRIMÈRES.

Latreille n'ayant aperçu chez certains Insectes que deux articles à tous les tarses, les avait rapportés à une cinquième section qu'il nommait Dimères ; depuis, il s'est convaincu que ce groupe rentrait dans celui des Trimères. Nous n'offrirons ici aucun autre détail sur la classification des Coléoptères ; elle sera exposée d'une manière générale à l'article ENTOMOLOGIE, et on trouvera les divisions secondaires à chacune des quatre sections. V. PENTAMÈRES, etc., etc.

Les Coléoptères se rencontrent sous les pierres, les écorces d'Arbres, les

mousses, dans le tronc des Arbres morts ou vivans, dans les bois de construction, dans les cadavres en putréfaction, dans les fientes d'Animaux, sur les Fleurs, etc. Ils sont répandus sur toute la terre, mais non pas également. Latreille, qui le premier s'est occupé de la distribution géographique des Animaux articulés, nous a transmis sur ce sujet des observations importantes que nous croyons devoir faire connaître, parce qu'elles trouvent ici naturellement leur place. « Les Coléoptères d'Europe ont une grande affinité avec ceux de l'Asie occidentale et du nord de l'Afrique. Ces traits de parenté se prononcent d'autant plus que les qualités, l'exposition du sol et la température étant à peu près identiques, l'on se rapproche davantage du tropique boreal. C'est ainsi que, sous le quarante-quatrième degré de latitude, commencent à se montrer des espèces de quelques genres de la famille des Carnassiers, de celle des Lamellicornes, de la section des Hétéromères, et de la tribu des Charansonites propres aux climats chauds. Là apparaissent encore des espèces sensiblement plus grandes que leurs congénères observées plus au nord. Quelques genres ont disparu, et d'autres remplissent ces lacunes dans leurs familles respectives. La domination des Carabes proprement dits, si puissante dans les contrées septentrionales et tempérées de l'Europe et de la portion de l'Asie la plus occidentale, cesse vers le trente-cinquième degré de latitude nord. Les Anthies et les Graphiptères leur succèdent. Sous des rapports d'entomologie, l'Europe s'étend beaucoup plus à l'est que dans nos divisions géographiques, puisque les Insectes du Levant, et même de la Perse, ont une physionomie européenne. Aussi l'Autriche et la Hongrie, par leur situation plus centrale et d'autres circonstances locales, semblent-elles plus riches numériquement en espèces que les pays occidentaux de l'Europe. Ceux-ci néanmoins en possèdent qui leur sont ex-

cluisivement propres, et dont les races, peut-être à raison du voisinage de l'Océan et de son influence, se prolongent assez loin du nord au sud. L'Europe nous paraît offrir un mélange nombreux et varié de Coléoptères carnivores et herbivores. Les espèces de la famille des Carnassiers, de celle des Brachelytres et des Clavicornes, les Aphodies, les Méloës, les Callidies, les Leptures, les Chrysomèles, les Lixes, etc., y sont proportionnellement plus nombreuses que dans les autres parties du monde. Les Coléoptères herbivores dominent dans l'Amérique méridionale, mais les Oiseaux, les Reptiles, et même les Quadrupèdes insectivores, y abondent et rétablissent l'équilibre. Plusieurs espèces des contrées boréales du même continent se rapprochent beaucoup des nôtres; quelques-unes même sont communes aux deux hémisphères. Parmi celles-ci, il en est qui, habitant les climats les plus septentrionaux de la Suède, du Groenland et des îles adjacentes, ont pu gagner cette partie de l'Amérique. Les autres, étant presque toutes xylophages, ont pu y être transportées au moyen du bois employé à la construction des vaisseaux. Nonobstant ces rapports, les Coléoptères du nord du Nouveau-Monde ont plus d'affinité avec ceux de ses contrées méridionales qu'avec les nôtres. Nous n'avons point, par exemple, une seule espèce de Cétoine à corslet lobé postérieurement, de Galérite, de Tétraxonix, de Parandra, etc., Insectes répandus dans toute l'Amérique; mais aussi on n'y a pas encore découvert d'espèces de certains genres dont nous sommes en possession. On remarque toutefois entre l'Amérique septentrionale et l'Europe cette conformité, qu'on y trouve aussi plusieurs Coléoptères de la famille des Carnassiers, inconnus dans les régions équatoriales, et que les proportions de grandeur des espèces analogues se maintiennent de part et d'autre dans les mêmes limites. »

L'ordre des Coléoptères est très-

nombreux. De tous dont la collection est une des plus riches de notre époque, en possède six mille. On comptait quarante-deux espèces) suivant son catalogue imprimé en 1811. Ce nombre est depuis singulièrement accru. Aucun de ces Insectes n'est utile aux arts; la médecine n'emploie, jusqu'à présent, que la Cantharide vésicatoire et le Mylabre de la Chicorée qui, en Chine et dans tout le Levant, sert aux mêmes usages. Les Romains servaient sur leurs tables plusieurs larves de Coléoptères appartenant, à ce qu'on croit, aux genres Lucane et Capricorne; ils les nourrissaient avec de la farine. Les Indiens et les Américains mangent avec délice les larves du Charanson palmiste. (A. R.)

**COLÉOPTILE.** *Coleoptila*. BOT. PHAN. Dans les Végétaux dicotylédons, on sait que la gemmule, c'est-à-dire le petit bourgeon qui renferme les premières feuilles de la Plante, est placée entre les deux cotylédons, et qu'on l'aperçoit facilement en écartant ces deux corps l'un de l'autre. Il n'en est pas ainsi dans les Plantes monocotylédones. Ici, en effet, la gemmule est toujours renfermée dans une sorte de gaine ou d'étui parfaitement clos, qu'elle est obligée de percer pendant la germination pour pouvoir développer les feuilles qui la composent. C'est à cette espèce de gaine que Mirbel donne le nom de Coléoptile. Mais nous avons observé que cette Coléoptile, considérée par cet habile observateur comme un organe particulier qui ne se rencontre que dans un certain nombre de Monocotylédons, leur appartient à tous, et qu'il n'est rien autre chose que le véritable cotylédon de ces Végétaux. (A. R.)

**COLÉOPTILÉS.** BOT. PHAN. Mirbel nomme ainsi les embryons pourvus d'une coléoptile. (A. R.)

**COLÉORAMPHE.** *Coleoramphe*. OIS. V. CHIONIS.

**COLÉORHIZE.** *Coleorhiza*. BOT. PHAN. De même que la coléoptile

V. ce mot ?; la Coleorhize existe dans tous les embryons monocotylédons, et en forme un des caractères les plus tranchés. C'est une espèce de petite poche continue avec la masse de l'embryon; et recouvrant entièrement la radicule qui se trouve ainsi intérieure. Dans les Dicotylédons, au contraire, la radicule est toujours nue et dépourvue de Coleorhize. C'est après cette considération que le professeur Richard a divisé les Végétaux phanérogames en deux grandes sections; les Endorhizes qui ont la radicule intérieure, c'est-à-dire recouverte par une Coleorhize qu'elle est obligée de percer pour se développer et devenir la racine; et les Exorhizes dont la radicule est nue et sans enveloppe. La première de ces deux sections correspond exactement aux monocotylédons, et la seconde aux dicotylédons. Cette classification a sur l'autre l'avantage d'offrir moins d'exceptions. En effet on sait qu'il y a certains Végétaux dont le nombre des cotylédons n'est pas rigoureusement limité; et d'autres qui en présentent constamment plus de deux. La famille des *Conifères* en offre plusieurs exemples. Les objections faites contre cette classification sont peu fondées. Ainsi l'on a dit que la grande Capucine, qui est évidemment une plante dicotylédone, avait sa radicule coleorhizée, et était par conséquent endorhize. Ce fait n'est pas exact. En effet dans la Capucine il n'y a pas de Coleorhize; mais la radicule; peu de temps après son premier développement, se flétrit à son extrémité, tombe et pousse une nouvelle racine. Mais ici il n'y a pas d'être renfermé la radicule avant la germination, et formant une véritable Coleorhize. Il en est de même de la graine des *Raphanus*. Henri Cassini a prétendu que les deux oreillettes que l'on remarque au collet de la racine dans les Raves, les Radis, étaient les débris de la Coleorhize qui enveloppait la radicule. Cette assertion est fautive. Nous avons étudié avec soin tous les degrés de germination des *Raphanus*, nous avons

analysé leurs graines à l'état de repos, et elles ne nous ont offert aucune trace de Coleorhize. Les deux oreillettes ne se forment qu'un long-temps après la germination et par une sorte de déortication qui sépare la partie corticale de la partie interne. Ainsi ces deux objections sont nulles contre la division des Végétaux en endorhizes et en exorhizes. (A. R.)

#### \* COLEOSANTHE. *Coleosanthus*.

BOT. PHAN. Ce genre de la famille des Synanthérées, et de la Synopsis égale, L., a été fondé par Cassini qui lui a assigné, entre autres caractères, les suivans : calathide sans rayons, composée de fleurons nombreux et fertiles; involucre formé d'écaillés un peu imbriquées, lancéolées, membraneuses sur leurs bords; réceptacle plane, hérissé de poils courts; ovaire cylindroïde, hispide, surmonté d'une aigrette plus longue que la corolle et légèrement plumée; corolle à peu près cylindrique, rétrécie à sa partie supérieure; une zone épaisse de poils laineux entoure la base du style. V. pour plus de détails le Bulletin de la Société Philomatique (avril 1817). Nous devons ici nous borner à dire que ce genre a été placé par son auteur dans la tribu des Eupatoriées et qu'il se compose d'une seule espèce, le *Coleosanthus Cavanillesii*, que Cassini a décrit d'après un échantillon envoyé à Jussieu par Cavanilles sans indication de localité, mais seulement avec une petite note dans laquelle on apprend que la Plante a six pieds de haut, que la tige est glabre, cylindrique, etc. (G. N.)

#### COLERETTE ou COLLERETTE.

BOT. PHAN. Quelques auteurs appellent ainsi l'involucre qui accompagne l'ombelle dans les Plantes de la famille des Umbellifères. V. INVOLUCRE. (A. R.)

#### \* COLES. BOT. PHAN. V. COLA.

COLETTA VEETLA. BOT. PHAN. Syn. malabara de *Baeria Prionitis*. (B.)

COLEUS. BOT. PHAN. Ce genre

établi par Loureiro ( *Fl. Coshinch.*, éd. Willd. 2, p. 451 ) a été réuni au *Plectranthus* de l'Héritier par Rob. Brown ( *Prodr. Fl. Nov.-Holl.*, p. 506 ) dans ses annotations sur ce dernier genre. Il suffit, en effet, de jeter les yeux sur la figure de cette Plante donnée par Rumph ( *Herb. Amboin.*, c. 8, t. 102 ) pour se convaincre de la réalité de ce rapprochement. Le caractère d'avoir les filets des étamines réunis en gaine inférieure-ment, se trouve également dans le *Plectranthus ocymoides* et dans le *Plectranthus crassifolius* de Vahl ; dès-lors il ne peut servir comme distinction générique. *V. PLECTRANTHE.*

L'espèce qui a servi à constituer ce faux genre est une Plante indigène des îles de l'archipel Indien. Elle abonde surtout à Banda et à Amboine, où Rumph dit qu'on la sème sur les murs des édifices, moins peut-être comme Plante d'ornement que pour des usages superstitieux, comme, par exemple, pour les préserver des enchantemens que redoutent singulièrement les peuples de ces îles. On l'emploie aussi à des usages économiques. Ainsi les femmes mettent ses feuilles dans le linge pour lui donner une bonne odeur ; on les fait cuire avec des feuilles de Laitue et de la viande de Chèvre, et de cette manière se compose un mets fort au goût des Indiens. Quant aux propriétés médicales, il est inutile de répéter ce qu'on a dit de ses vertus fébrifuges ; de même que toutes les Labiées odoriférantes, elle peut être utile dans les maladies nerveuses, telles que les spasmes, les convulsions, l'asthme, etc. (G.N.)

**COLEUVRÉE.** BOT. PHAN. Pour Couleuvrée. *V.* ce mot. (B.)

**COLFISH.** POIS. C'est-à-dire *Poisson-Charbon*. Variété de Morue que sa préparation médiocre met à la portée des matelots et autres classes peu aisées de la population hollandaise et anglaise. (B.)

**COLGRAVE.** ois. Syn. vulgaire

du Corbeau, *Corvus Corax*, L. *V. CORBEAU.* (DR.Z.)

**COLHERADO.** ois. (Marcozaff.) Syn. portugais de la Spatule rose, *Platalea Ajaja*, L. *V. SPATULE.*

(DR.Z.)  
\* **COLL.** ois. (Paulin.) Syn. vulgaire dans l'Inde de la femelle du Coq, élevée en domesticité. *V. Coq.* (DR.Z.)

**COLIADE.** *Colias.* ins. Genre de l'ordre des Lépidoptères établi par Fabricius et rangé par Latreille (Rég. Anim. de Cuv.) dans la famille des Diurnes. Ses caractères sont : antennes courtes et finissant graduellement en une massue allongée et obconique ; palpes inférieurs très-comprimés ; leur dernier article beaucoup plus court que le précédent ; ailes postérieures sans concavité et sans échancrure à leur bord interne, prolongées sous l'abdomen, et lui formant une gouttière ; six pates propres à la marche dans les deux sexes ; crochets des tarses unidentés, ou bifides. Les Insectes de ce genre ont six pieds égaux, et avoisinent par-là les Papillons proprement dits, les Thaïs et les Paruassiens ; ils s'en éloignent cependant par la disposition des ailes postérieures. Leurs palpes extérieures velus et la saillie des crochets de leurs tarses empêchent de les confondre avec les Polyommates et les Erycines. Enfin ils se distinguent des Pœrides, auxquels on devrait rigoureusement les réunir, par leurs antennes et leurs palpes inférieurs. Le genre Coliade comprend la quatorzième famille des Papillons d'Ochsenheimer, celle qu'il nomme les *Danaïdes jaunes*. Les chenilles n'ont point de tentacules ; elles sont cylindriques ou bien comprimées postérieurement. On remarque une raie longitudinale sur chaque côté de leur corps. Le dessous du ventre est plus pâle, et c'est à cause de cela que quelques auteurs les ont désignés sous le nom de Chenilles à ventre pâle (*Pallidi ventres*). Les chrysalides sont allongées, anguleuses, avec l'une et l'autre extrémité terminées en pointe.

Elles sont fixées à la manière de celles des Papillons. Ce genre est assez nombreux en espèces; parmi elles nous citerons : la *COLIADE CITRON*, *Papilio Rhamni* de Linné, ou le Citron de Geoffroy (Hist. des Ins. T. II, p. 33), figuré par Engramelle (Pap. d'Europe, pl. 33, n. 10, A, C). Cette espèce qu'on peut considérer comme type du genre est remarquable par l'angle curviligne de chacune des ailes. Ce caractère spécifique a paru d'une grande valeur au docteur Leach qui a fondé pour cette espèce et quelques autres un nouveau genre qu'il a nommé *Gonopteryx*, c'est-à-dire ailes anguleuses. La chenille vit sur le Nerprun purgatif (*Rhamnus catharticus*) et la Bourdaine (*Rhamnus Frangula*.)

La *COLIADE SOUCI*, *Colias edusa* ou le *Papilio edusa* de Fabricius, décrit par Geoffroy (*loc. cit.* p. 75) sous le nom de Souci, variété A, B, figuré par Hubner sous le nom d'Héce, et par Engramelle (*loc. cit.* pl. 54, g. 5, A, E, et pl. 79, Suppl. T. XXV, g. 5, f, g). La chenille vit sur plusieurs espèces de Trèfles. (AUD.)

**COLIART. ROIS.** L'un des noms vulgaires du *Raya Batis*. V. RAIE. (B.)

**COLIAS. ROIS.** Espèce du genre nombre. V. ce mot. (B.)

**COLIAS. INS. V. COLIADE.**

**COLIBELLE. BOT. PHAN.** (De Canille.) Syn. de *Cucubalus Behen* dans environs de Perpignan. (B.)

**COLIBRI. Trochilus. OIS.** Genre de l'ordre des Anisodactyles. Caractères : bec plus long que la tête, droit chez un certain nombre d'espèces, arqué chez les autres, tulle, déprimé à la base qui est de la largeur du front et où l'arête est distincte, acéré à la pointe; mandibule inférieure presque cachée par les doigts de la supérieure; langue extensible, longue, cylindrique à la base, bifide à l'extrémité; narines situées près de la base du bec, marginales, couvertes par une membrane

arrondie, ouvertes en avant; pieds très-courts, impropres à la marche; quatre doigts presque entièrement divisés, dont un derrière; tarses plus courts que le doigt intermédiaire; ailes longues; toutes les rémiges uniformément étagées; la première la plus longue.

Si la nature a départi à l'Aigle la force et la majesté, à l'Autruche une taille gigantesque avec la rapidité de la course, au Cygne l'élégance et la douceur, au Paon la richesse du plumage, elle a comblé d'autres bienfaits la famille nombreuse des plus petits êtres que l'on admire parmi les Oiseaux. Rien ne peut surpasser, en éclat et en magnificence, la robe qui pare la majeure partie des Colibris; l'or y semble répandu avec profusion; les reflets, que lance leur plumage, surpassent en pureté, en brillant et étincelle fugitive qui s'échappe de la pierre de Golconde. Chaque plume et même chacune de ses barbules sont autant de réflecteurs merveilleux, qui, suivant l'angle d'incidence sous lequel tombe la lumière, décomposent ce fluide et renvoient alternativement plusieurs de ses rayons colorés. Les Colibris habitent les contrées les plus chaudes du nouveau continent; quelques espèces voyageuses s'en éloignent au plus fort de l'été pour aller visiter diverses parties de l'Amérique septentrionale, mais elles y retournent aussitôt qu'elles sentent la température s'affaiblir. En vain a-t-on essayé mainte fois d'apporter vivans, en Europe, ces élégans Américains; la jouissance de posséder ces charmans Oiseaux, d'un caractère peu sauvage, très-susceptibles d'éducation, nous est refusée : quelques-uns y sont arrivés, ont langui quelques jours et sont morts de froid. Répandus en très-grand nombre dans leur pays natal, les Colibris y aiment le voisinage des habitations; ils sont presque constamment dans les jardins, voltigeant avec une rapidité incroyable de fleur en fleur et s'arrêtant ordinairement d'un vol stationnaire devant l'une d'elles, jusqu'à ce qu'ils

aient trouvé la branche favorable sur laquelle ils pussent se poser, et d'où il leur soit facile d'élancer leur langue fourchue et enfilée dans le nectaire où s'élève le miel qui paraît être leur nourriture favorite. Ils sont peu défians, se laissent approcher très-près; mais ils partent comme un trait, et en jettent un cri, lorsqu'on fait mine de les vouloir saisir. Leurs petits pieds si grêles, si délicats, sont peu favorables à la marche; c'est sans doute pour cela qu'on ne les rencontre jamais à terre. Ils se battent avec acharnement entre eux. Ils sont courageux, audacieux même; quand il s'agit de défendre leur couvée, on les voit alors résister à des Oiseaux beaucoup supérieurs en taille et en force, et parvenir assez souvent à les mettre en fuite. Ce courage qu'ils montrent à protéger, à garantir leur famille naissante, est un gage de la tendresse qu'ils ont pour elle; en effet, cette tendresse éclate déjà dans les soins qu'ils apportent à préparer le berceau qui doit recevoir les fruits de leurs amours; les deux sexes s'en occupent avec une commune ardeur, et la délicatesse de sa construction rivalise avec sa solidité: c'est une espèce de sentre de soie et de coton artistement tissé et revêtu à l'extérieur de Lichens et de très-petites buchettes encastrées de sucs gommeux. Ce nid a la forme d'une capsule qui serait suspendue à une branche, à une feuille et même souvent à un brin du chaume qui recouvre les habitations. La ponte est de deux œufs blancs, dont le volume quelquefois surpasse à peine celui d'un pois ordinaire; le mâle et la femelle les couvent avec beaucoup de constance pendant douze à treize jours; les petits, en naissant, ont à peu près la grosseur d'une Mouche commune; ils éprouvent, à mesure qu'ils avancent en âge, des mues successives, auxquelles il faut attribuer la confusion qui a long-temps régné dans la désignation des espèces du genre Colibri, et qui, peut-être, n'est pas encore entièrement dissipée. Les couvées se répètent, à ce que

l'on assure, jusqu'à quatre fois dans l'année.

Plusieurs ornithologistes, d'après Lacépède, ont divisé les Colibris en deux genres, et ont placé dans le second, sous le nom d'Orthorhynques ou Oiseaux-Mouches, les espèces qui ont le bec droit; mais, comme plusieurs d'entre elles forment une transition insensible du bec droit au bec arqué, il en est résulté qu'à cet égard la division devenait, pour ainsi dire, impossible. Or, il est préférable, ainsi qu'il l'ont fait Vieillot et Temminck, de ne rendre la division que sectionnaire du genre; alors l'erreur, si on en commet, n'entraînera à aucune conséquence.

† *Bec arqué.* — COLIBRIS PROPREMENT DITS.

**COLIBRI ACUTIPENNE**, *Trochilus caudacutus*, Vieill. Parties supérieures d'un vert doré; rémiges d'un noir bleuâtre; rectrices bleues à reflets verts, très-pointues, étagées, les intermédiaires plus courtes que les latérales qui sont fort étroites; gorge et haut du cou blancs, marqués de petits points noirs; bas du cou et poitrine bleus à reflets; bec noir. Longueur, cinq pouces quatre lignes. Du Paraguay.

**COLIBRI D'AMBOINE**. *V. SOUMANGA D'AMBOINE*.

**COLIBRI ARLEQUIN**, *Trochilus multicolor*, Lath., Vieill., Oiseaux dorés, pl. 69. Parties supérieures, gorge, devant du cou et poitrine verts; partie du dos et croupion bruns ou mêlés de brun; une bande blanche entre l'œil et la nuque, et plus bas une tache irrégulière noire; rémiges et rectrices d'un brun passant au violet; ventre et tectrices caudales intérieures rouges. Longueur, quatre pouces.

**COLIBRI AZZARA**, *Trochilus Azzara*, Vieill. Parties supérieures d'un vert bleuâtre à reflets dorés; sommet de la tête mordoré; les côtes bruns; les deux rectrices latérales terminées de blanc; devant du cou et poitrine d'un brun roussâtre avec un trait longitudinal blanc; des reflets dorés sur les



tés et les flancs. Longueur, quatre  
pouces cinq lignes. Du Paraguay.

**COLIBRI A BANDE BLANCHE.** *V. COLIBRI AZZARATI.*

**COLIBRI A BANDE NOIRE.** *Trochilus tricapillus*, Vieill. Parties supérieures d'un vert doré avec les plumes franches de rousâtre; celles de la tête ont noirâtres; un point blanchâtre à chaque côté de la tête; une bande un noir velouté bordée de blanc étend depuis le bec jusqu'à la queue; rectrices intermédiaires vertes; les autres d'un violet rougeâtre; tachées de bleu vers l'extrémité qui est blanche; bec assez gros et peu courbé. Longueur, quatre pouces quatre lignes. Du Paraguay.

**COLIBRI BLEU.** *Trochilus Cyaneus*, Lath., *Trochilus venustissimus*, Gmel.

**COLIBRI GRÉNAT.**

**COLIBRI BLEU DU MEXIQUE.** *V. CIT-GUIT.*

**COLIBRI DU BRÉSIL.** *V. COLIBRI A SIX PIEDS VÉTUS.*

**COLIBRI BRIN BLANC.** *Trochilus pertiliosus*, L., Vieill. Oiseaux dorés, pl. 17 et 18; Colibri à longue queue de Cayenne; Buff., pl. enl. 10, f. 5. Parties supérieures d'un vert olive doré; deux traits blancs de chaque côté de la tête; rémiges et tectrices alaires d'un violet noirâtre; les autres rectrices intermédiaires beaucoup plus longues que les autres qui sont étagées et toutes terminées de blanchâtre; bec long et noir. Longueur, sept pouces. Les jeunes ont les ailes vertes bordées de gris. De la Guiane.

**COLIBRI BRIN BLEU.** *Trochilus Cyaneus*, Gmel. Parties supérieures vertes; sommet de la tête, poitrine et rectrices intermédiaires bleus; parties inférieures grises. Longueur, huit pouces. Du Mexique. Espèce douteuse.

**COLIBRI BRUN.** *Trochilus fuscus*, Vieill. Parties supérieures brunes avec quelques reflets verts; rémiges d'un bleu sombre; gorge noire entourée d'un trait brun qui part de la mandibule inférieure; devant du cou et poitrine bruns; partie inférieure blanche ainsi que la plupart des rectrices;

bec noir; jambes duveteuses. Longueur, quatre pouces, trois lignes. Du Brésil.

**COLIBRI A CASQUE POURPRÉ.** *Trochilus galeritus*, Lath. Parties supérieures d'un vert doré; tête ornée d'une huppe pourprée à reflets dorés; rémiges et rectrices brunes; parties inférieures d'un rouge doré. Du Chili.

**COLIBRI CENDRÉ.** *Trochilus cinereus*, Lath., Vieill. Oiseaux dorés, pl. 5. Parties supérieures vertes à reflets dorés; une petite tache blanche à l'angle externe de l'œil; rémiges d'un violet noirâtre; rectrices étagées; les intermédiaires vertes, les deux suivantes vertes à la base, ensuite d'un noir bleuâtre, enfin blanches à l'extrémité, les autres noires, frangées de blanc; parties inférieures d'un gris cendré. Longueur, cinq pouces, six lignes.

**COLIBRI DU CHILI.** *V. COLIBRI A CASQUE POURPRÉ.*

**COLIBRI A COLLIER BLEU.** *Trochilus torquatus*, Lath., *Trochilus purpuratus*, Gmel. Parties supérieures vertes avec les ailes et la queue qui est fourchue, d'un pourpre foncé; un demi-collier d'un beau bleu; gorge et poitrine vertes; abdomen cendré.

**COLIBRI A COLLIER ROUGE.** *Trochilus Leucurus*, L., Edw., Gmel., pl. 156, Buff., pl. enl. 600, f. 4. Parties supérieures, gorge, poitrine, petites tectrices alaires d'un vert brunâtre à reflets dorés; rémiges pourprées; les deux rectrices intermédiaires vertes irisées; les autres blanches, nuancées de brun à l'extrémité; un demi-collier rouge; parties inférieures d'un cendré blanchâtre; bec noirâtre; pieds blanchâtres. Longueur, quatre pouces six lignes. De Surinam.

**COLIBRI A COLLIER DE SURINAM.** *V. COLIBRI A COLLIER ROUGE.*

**COLIBRI A CRAVATE NOIRE.** *Trochilus nigricollis*, Vieill. Parties supérieures d'un vert doré; rémiges et rectrices d'un brun violet; gorge, devant du cou et milieu de la poitrine d'un noir velouté; ventre vert. Longueur, quatre pouces. Du Brésil.

**COLIBRI A CRAVATE VERTE.** *Trochilus*

*chilus maculatus*, Gmel., *Trochilus gulæris*, Lath. Jeune Colibri à hausse-col vert qui prend son plumage d'adulte.

**COLIBRI A FACE ORANGÉE**, *Trochilus fulvifrons*, Latham. Parties supérieures noirâtres à reflets bleus; haut de la gorge, bords extérieurs des rémiges, tectrices caudales inférieures et une tache entre le bec et l'œil orangés; rectrices bleues; bec noir à la base, blanc à l'extrémité; pieds noirs. Longueur, trois pouces. Espèce douteuse, Patrie inconnue.

**COLIBRI A FRONT JAUNE**, *Trochilus flavifrons*, Lath. Parties supérieures vertes avec le front jaune; rémiges et rectrices noirâtres, Espèce douteuse.

**COLIBRI A GORGE BLEUE**, Vieill., Oiseaux dorés, pl. 66. Parties supérieures d'un vert doré, noirâtre sur la tête et les côtés du cou; rémiges d'un violet noirâtre; rectrices vertes en dessus, d'un violet bronzé en dessous, avec une tache bleuâtre vers l'extrémité qui est blanche; parties inférieures blanches variées de bleu à la gorge et à la poitrine. Longueur, quatre pouces quatre lignes. Il paraît être une variété d'âge d'une autre espèce, peut-être du Colibri à ventre piqué.

**COLIBRI A GORGE ET CROUPION BLANCS**. *V. SOUÏMANGA JAUNÂTRE*.

**COLIBRI A GORGE CARMIN**, *Trochilus gularis*, Lath. Jeune Colibri Grenat qui prend son plumage d'adulte.

**COLIBRI A GORGE GRENAT**. *V. COLIBRI GRENAT*.

**COLIBRI A GORGE ROUGE**. *V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE RUBIS*.

**COLIBRI A GORGE VERTE DE CAYENNE**. *V. COLIBRI HAUSSE-COL VERT*, jeune âge.

**COLIBRI (GRAND)**. *V. COLIBRI GRENAT*.

**COLIBRI GRENAT**, *Trochilus granatinus*, Lath., *Trochilus auratus*, Gmel., Vieill., Oiseaux dorés, pl. 4, Edw. Clav., pl. 266. Parties supérieures d'un noir bleuâtre; tectrices abaisées et caudales d'un vert doré brillant; rectrices d'un vert noirâtre; gorge et devant du cou pourprés; le

reste des parties inférieures d'un noir bleuâtre; bec et pieds noirs. Longueur, quatre pouces six lignes. La femelle est moins brillante; elle a les parties inférieures et les ailes brunes.

**COLIBRI HAUSSE-COL NOIR**, *Trochilus aurulentus*, Audeb. et Vieill., Oiseaux dorés, pl. 12 et 13. Parties supérieures d'un vert obscur doré; tectrices caudales vertes; rectrices d'un brun verdâtre; les latérales violettes, terminées de bleu; gorge d'un vert doré brillant, entourée d'un reflet bleu; poitrine noire; ventre brunâtre; flancs variés de vert doré et de noirâtre; bec et pieds noirs. Longueur, quatre pouces. La femelle a le sommet de la tête brun, les rectrices latérales d'un brun roussâtre à leur base, ensuite d'un noir violet terminé de blanchâtre, la gorge et la poitrine de couleur grisâtre, plus obscure sur le ventre. De Porto-Ricco.

**COLIBRI HAUSSE-COL A QUEUE FOURCHUE**, *Trochilus elegans*, Aud. et Vieill., Ois. dorés, pl. 14. Plumage vert plus brillant sur la gorge et les côtés du cou; poitrine et partie du ventre noires; rectrices d'un noir violet, les latérales plus longues; bec noir en dessus, jaunâtre en dessous; pieds emplumés blancs. Longueur, quatre pouces quatre lignes. Les jeunes ont la gorge et le cou grisâtres, les rémiges et les rectrices brunes. De Saint-Domingue.

**COLIBRI HAUSSE-COL VERT**, *Trochilus gramineus*, Gmel., *Trochilus pectoralis*, Lath. Parties supérieures d'un vert obscur faiblement doré; rémiges et rectrices d'un noir violet; gorge et côtés du cou d'un vert foncé très-brillant; une plaque d'un noir velouté sur la poitrine; abdomen d'un vert noirâtre et quelquefois blanc; bec très-long, noir ainsi que les pieds. Longueur, quatre pouces six lignes.

**COLIBRI HUPPÉ**, *Trochilus paradiscus*, Lath. La majeure partie du plumage rouge; les ailes blanches; une huppe composée de plumes étroites retombe sur le cou; rectrices intermédiaires beaucoup plus longues que

les autres, Longueur, huit pouces six lignes. Du Mexique. Espèce douteuse.

**COLIBRI A HUPPE DORÉE**, *Trochilus cristellus*, Lath. Plumage vert ; tête garnie d'une huppe verte à reflets dorés très-brillants ; ailes et queue noires. Longueur, deux pouces six lignes. La femelle a les parties supérieures d'un brun verdâtre, les inférieures blanchâtres. Patrie inconnue.

**COLIBRI DES INDÉS**. *V. SOUMANGA* DLET.

**COLIBRI DE LA JAMAÏQUE**, *Trochilus Mango*, L., Buff., pl. enl. 680, f. 5; Vieill., Ois. dorés, pl. 7. Parties supérieures d'un vert doré ; rectrices d'un brun pourpre irisé en violet ; gorge, devant du cou, poitrine d'un bleu velouté, encadré de chaque côté par une bande bleue qui descend du bec. Longueur, quatre pouces. Des Antilles.

**COLIBRI A LONGUE QUEUE**. *V. COLIBRI A BRIN BLANC*.

**COLIBRI A LONGUE QUEUE DU MEXIQUE**. *V. COLIBRI A BRIN BLEU*.

**COLIBRI DU MEXIQUE**, *Trochilus holosericeus*, L., Buff., pl. enl. 680, fig. 1. Parties supérieures et gorge d'un vert doré, irisé ; une bande noire sur la poitrine ; rectrices alaires et caudales bleues ; rectrices noires irisées en violet ; parties inférieures d'un noir bronzé. Longueur, quatre pouces.

**COLIBRI MULTICOLOR**. *V. COLIBRI ALEQUIN*.

**COLIBRI PETIT (OUTERRE)**, *V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE HUPPE*.

**COLIBRI (PETIT) DU BRÉSIL**, *Trochilus Thaumantius*, Lath., Buff., pl. enl. 600, f. 1. Tout le plumage d'un vert doré, à l'exception des ailes qui sont d'un brun violet ; une petite tache blanche à l'abdomen ; rectrices bordées de blanc. Longueur, près de trois pouces. Du Brésil.

**COLIBRI (PETIT) BRUN**, Edwards. *V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE POURPRE*.

**COLIBRI (PETIT) DE LA GUIANE**. *V. PETIT COLIBRI DU BRÉSIL*.

**COLIBRI (PETIT) VIOLET**, Buff. *V. PETIT COLIBRI DU BRÉSIL*.

**COLIBRI PIQUETÉ**. *V. COLIBRI ZIT-ZIT*.

**COLIBRI A PIEDS VÊTUS**, *Trochilus hirsutus*, Gm., Vieill., Ois. dorés, pl. 20. Parties supérieures d'un vert doré ainsi que les deux rectrices intermédiaires ; les trois latérales sont rousses avec une tache noire, terminée de blanc ; parties inférieures et gorge roussâtres. Bec noir avec la mandibule inférieure jaunâtre ; pieds emplumés jaunâtres avec les doigts et les ongles blancs. Longueur, quatre pouces six lignes. Le jeune, figuré pl. 68 des Ois. dorés, a le sommet de la tête, le cou et les tectrices alaires d'un brun bronzé. On observe encore quelques autres variations dans le reste du plumage. De l'Amérique méridionale.

**COLIBRI A PLASTRON BLANC**, *Trochilus margaritaceus*, Lath., Vieill., Ois. dorés, pl. 16. *V. COLIBRI A HAUSSECOL VERT*, jeune âge.

**COLIBRI A PLASTRON NOIR**. *V. COLIBRI DE LA JAMAÏQUE*.

**COLIBRI A PLASTRON VIOLET**, *Trochilus Mango*, Var. Lath., Vieill., Ois. dorés, pl. 7. Ne diffère du Colibri à hausse-col vert, dont Vieillot le croit une variété, que par la teinte violette de ses parties inférieures.

**COLIBRI A POITRINE BLEUE (AZARA)**. *V. COLIBRI QUADRICOLOR*.

**COLIBRI QUADRICOLOR**, *Trochilus quadricolor*, Vieill. Parties supérieures d'un vert doré ; tête noirâtre ; rectrices violettes, terminées de noir ; devant du cou et poitrine d'un bleu foncé, bordés de chaque côté de bleu plus clair ; bec peu courbé. Longueur, quatre pouces cinq lignes. Du Paraguay.

**COLIBRI A QUEUE BLANCHE ET VERTE**, *Trochilus virens*, Ois. dorés, pl. 41. Parties supérieures d'un vert doré ; sommet de la tête d'un brun verdâtre ; un trait blanc au-dessus de l'œil ; rémiges rousses ; gorge et poitrine d'un vert jaunâtre, brillant ; ventre vert doré ; abdomen gris, mélangé de vert ; rectrices arrondies, mélangées de vert et de blanc doré ; bec peu courbé, blanchâtre, noir en dessus et vers l'extrémité ; pieds jau-

nâtres. Longueur, quatre pouces six lignes. De l'île de la Trinité.

**COLIBRI A QUEUE EN CISEAUX.** V.

**COLIBRI ACUTIPENNE.**

**COLIBRI A QUEUE FOURCHUE.** V.

**COLIBRI TOPAZE.**

**COLIBRI A QUEUE SINGULIÈRE, *Trochilus Erricurus*, Vieill., Temm., Ois. color. pl. 66, fig. 3.** Parties supérieures d'un vert doré; rémiges brunes; rectrices singulièrement étagées, les latérales les plus longues; celles qui les suivent plus courtes d'un tiers et toutes entièrement brunes; les intermédiaires très-courtes et bordées de vert; gorge d'un violet clair et pourpré; un demi-collier blanchâtre et jaune, couvrant presque toute la poitrine. Bec peu courbé noir ainsi que les pieds. Longueur, quatre pouces trois lignes. De l'île de la Trinité.

**COLIBRI A QUEUE VIOLETTE, *Trochilus albus*, Gm., *Trochilus nitidus*, Lath., Ois. dorés, pl. 11.** Jeune Colibri à haute-col vert.

**COLIBRI ROUGE HUPPÉ A LONGUE QUEUE DU MEXIQUE.** V. **COLIBRI HUPPÉ.**

**COLIBRI ROUGE A LONGUE QUEUE DE SURINAM.** V. **COLIBRI TOPAZE.**

**COLIBRI DE SAINT-DOMINGUE.** V. **COLIBRI A HAUSSE-COL VERT, jeune âge.**

**COLIBRI DE SURINAM.** V. **COLIBRI A COLLIER ROUGE.**

**COLIBRI TACHETÉ, *Trochilus Naevius*, Dumont.** Parties supérieures d'un vert sombre faiblement doré; rémiges violettes; rectrices égales, les deux intermédiaires vertes, les deux latérales rousses, les autres progressivement partagées de roux et de vert; parties inférieures d'un blanc sale, tachetées longitudinalement de noir; gorge et devant du cou roux; bec d'un blanc jaunâtre, noir en dessus et à l'extrémité; pieds bruns. Longueur, quatre pouces six lignes. Du Brésil.

**COLIBRI A TÊTE BLEUE, *Trochilus porficatus*, L., Edw. Glan. pl. 33; Schaw, Misc. p. 222., Ois. dorés, pl. 60.** Plumage d'un vert doré, à l'ex-

ception de la tête qui est bleue, des rémiges qui sont d'un brun violet, et du ventre qui est blanchâtre; rectrices latérales très-longues, les autres diminuant progressivement jusqu'aux intermédiaires qui sont très-courtes; bec peu arqué noir ainsi que les pieds. Longueur, de sept à huit pouces. De la Jamaïque.

**COLIBRI A TÊTE, DEMI-COLLIER ET QUEUE POURPRÉS.** V. **COLIBRI A COLLIER BLEU.**

**COLIBRI A TÊTE NOIRÂTRE.** V. **COLIBRI A BANDE NOIRE.**

**COLIBRI A TÊTE NOIRE, *Trochilus polytmus*, Lath., Ois. dorés, pl. 67.** Parties supérieures d'un vert doré; rémiges et rectrices d'un brun violet irisé; rectrices latérales très-longues, les autres beaucoup plus courtes et étagées; tête ornée de plumes longues, noires; à reflets bleuâtres; poignet blanc; parties inférieures vertes à reflets bleus; bec jaune; pieds noirs. Longueur, cinq pouces six lignes. La femelle a les parties inférieures, les côtés du cou et les rectrices variés de blanc, le sommet de la tête d'un brun noirâtre. De la Jamaïque.

**COLIBRI A TÊTE NOIRE ET A LONGUE QUEUE.** V. **COLIBRI A TÊTE NOIRE.**

**COLIBRI A TÊTE ORANGÉE, *Trochilus aurantius*, Lath.** Parties supérieures d'un brun foncé; rémiges pourprées; rectrices sautes; tête orangée; gorge et poitrine jaunes; ventre brun. Espèce douteuse.

**COLIBRI TOPAZE, *Trochilus Pella*, L., Edw. Glan. pl. 50; Buff., pl. enl. 559; Schaw, Misc. p. 513; Ois. dorés, pl. 2 et 3.** Parties supérieures d'un marbré pourpré; qui passe au brun orangé vers le croupion; sommet de la tête d'un noir pourpré qui s'étend de chaque côté sur la gorge où il entoure une plaque verte à reflets très-brillants d'un jaune de topaze; rémiges brunes, irisées en violet; les deux rectrices intermédiaires très-longues, d'un noir violet; les autres courtes et rousses; bec noir; pieds blanchâtres. Longueur, sept pouces six lignes. La femelle a le plumage d'un vert cuivreux, les quatre rectri-

es intermédiaires, d'un vert doré; les autres rousses et toutes d'égale longueur, la gorge d'un pourpre à reflets dorés. De la Guiane.

**COLIBRI VERT, *Trochilus exilis*, Lath.** Plumage d'un brun verdâtre à reflets dorés pourprés; sommet de la tête garni d'une huppe verte à sa base, reflets dorés très-brillants vers l'extrémité; rémiges et rectrices noires. Longueur, dix-huit lignes. De la Guiane.

**COLIBRI A VENTRE BLANC, *Trochilus Oiseau-Mouche* JACOBINE.**

**COLIBRI A VENTRE NOIR, *Trochilus atrigaster*, Vieill., Ois. dorés, pl. 15.** Parties supérieures d'un vert doré; rectrices et rémiges d'un violet noirâtre; parties inférieures d'un noir pourpré avec l'abdomen blanc; gorge verte; bec et pieds noirs. Longueur, dix-huit pouces neuf lignes. On la considère comme la femelle du Colibri du Mexique.

**COLIBRI A VENTRE PIQUETÉ, *Trochilus punctatus*, Lath., Vieill., Ois. dorés, pl. 8.** Parties supérieures vertes, faiblement dorées; rémiges noires, irisées en violet; rectrices latérales noires, bordées et terminées de blanc; parties inférieures d'un brun cendré, avec les plumes bordées de brun sur la poitrine et de blanc sur le reste; bec et pieds noirâtres. Longueur, quatre ponce. Ce Colibri pourrait bien être une variété d'âge du sexe du Zit-Zit.

**COLIBRI A VENTRE ROUSSATRE, *Trochilus Brasiliensis*, Lath., Vieill., Ois. dorés, pl. 19.** Parties supérieures d'un vert olive doré; un trait noir au-dessus de l'œil et un autre blanc en dessous; rectrices étagées et pointues, d'un noir violet irisé, terminées de blanc; les deux intermédiaires les plus longues; parties inférieures d'un cendré jaunâtre; bec d'un blanc jaunâtre en dessous; pieds emplumés. Longueur, quatre ponce. Du Brésil et de la Guiane.

**COLIBRI VERT, *Trochilus viridis*, Vieill., Ois. dorés, pl. 15.** Plumage d'un vert foncé, doré; rémiges d'un brun violet; rectrices blanches avec

l'extrémité des latérales frangées de blanc; bec et pieds noirs. Longueur, quatre ponce. Des Antilles.

**COLIBRI VERT ET BLEU d'Edwards, *Trochilus Oiseau-Mouche* AMETHYSTE.**

**COLIBRI VERT A LONGUE QUEUE d'Edwards, *Trochilus Oiseau-Mouche* A TÊTE BLEUE.**

**COLIBRI VERT ET NOIR, *Trochilus* DU MEXIQUE.**

**COLIBRI VERT-PERLE, *Trochilus Dominicus*, Lath. *Trochilus* HAUSSE-COL VERT, jeune âge.**

**COLIBRI VERT A VENTRE NOIR d'Edwards, *Trochilus* DU MEXIQUE.**

**COLIBRI VIOLET, *Trochilus violaceus*, Lath., Buff., pl. enl. 600, f. 2. *Trochilus* GRENAT.**

**COLIBRI VIOLET DE SURINAM, *Trochilus* TOPAZE, femelle.**

**COLIBRI ZIT-ZIT, *Trochilus punctulatus*, Lath.** Plumage d'un vert cuivreux, irisé ou pourpré; rémiges d'un brun violet; rectrices brunes, irisées en vert, terminées de blanc; gorge, devant du cou et tectrices alaires tiquetées de blanc; bec et pieds noirs. Longueur, cinq ponce six lignes. Du Mexique.

†† **Bec droit. — COLIBRI OISEAU-MOUCHE A MOUCHES.**

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE AMETHYSTE, *Trochilus amethystinus*, Lath., Buff., pl. enl. 672, f. 2.** Parties supérieures d'un vert doré; rectrices latérales les plus longues; gorge et devant du cou violets, changeant en pourpre doré; parties inférieures variées de blanchâtre et de brun. Longueur, trois ponce. De la Guiane. On le considère comme une variété d'âge du Colibri Oiseau-Mouche Rubis.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE BANCROST, *Trochilus Bancrosti*, Lath. *Trochilus* GRENAT.**

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A BEC BLANC, *Trochilus albirostris*, Vieill., Ois. dorés, pl. 45.** Parties supérieures d'un brun irisé de pourpre, et d'un vert avec les reflets plus vifs sur la tête; rémiges brunes plus longues que les rec-

trices qui sont roussâtres; cou, gorge et poitrine d'un vert doré avec les plumes frangées de blanc; abdomen brun irisé; tectrices caudales inférieures blanches. Longueur, trois pouces trois lignes. De la Guiane. Présumé une variété de sexe d'une espèce décrite sous un autre nom.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A BEC EN SCIE**, *Trochilus serrirostris*, Vieill. Parties supérieures vertes, dorées; rémiges violettes; gorge d'un bleu violet, doré et irisé de vert; poitrine et ventre d'un brun violet; abdomen blanc; bec noir dentelé sur les bords de la mandibule supérieure. Longueur, trois pouces neuf lignes. Du Brésil.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE BRUN-GRIS**. *V.* **COLIBRI OISEAU-MOUCHE A QUEUE ROUSSE**, femelle.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE DE CAYENNE**. *V.* **COLIBRI OISEAU-MOUCHE TOUT VERT**, jeune âge.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A CALOTTE BRUNE**, *Trochilus hypophæus*, Lath. *V.* **COLIBRI OISEAU-MOUCHE RUBIS-TOFAZE**, jeune âge.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE CENDRÉ**, *Trochilus cinereus*, Vieill. Parties supérieures d'un vert doré; rémiges violettes; rectrices étagées; les intermédiaires vertes, terminées de bleu; les autres bleues avec une tache blanche au bout des latérales; gorge, devant du cou, poitrine et tectrices caudales inférieures d'un gris obscur; ventre vert; bec noir, rougeâtre à sa base. Longueur, trois pouces six lignes. Du Paraguay.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE CHALYBÉE**, *Trochilus Chalibæus*, Vieill., Temm., Ois. color., pl. 66, fig. 2. Parties supérieures d'un vert sombre, plus brillant et doré sur le sommet de la tête et les tectrices alaires; front et joues ornés de plumes longues, étagées; d'un vert doré, terminées par une tache blanche; croupion jaune; rémiges violettes; rectrices couleur de rouille foncée; un large collier blanc varié de brun; poitrine et parties inférieures d'un cendré brun varié de taches transversales

plus foncées; bec et pieds noirs. Taille, trois pouces quatre lignes. Du Brésil.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A COLLIER**, *Trochilus melthiorus*, Lath., Vieill., Ois. dorés, pl. 25. Parties supérieures d'un vert doré avec la tête bleue ainsi que la gorge; rémiges d'un bleu violet; rectrices blanches, terminées de noir; poitrine d'un bleu verdâtre; un demi-collier blanc; ventre de cette dernière couleur; bec et pieds noirs. Longueur, quatre pouces trois lignes.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A COU MOUCHETÉ**, *Trochilus maculatus*, Lath., Vieill., Ois. dorés, pl. 55. Parties supérieures d'un vert brun faiblement doré; une tache rouge de chaque côté de la gorge qui est blanchâtre ainsi que les parties inférieures; rectrices latérales terminées de blanc. Longueur, trois pouces. Des Antilles. C'est le Colibri Oiseau-Mouche mâle, jeune âge.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A CRAVATE DORÉE DE CAYENNE**, *Trochilus laucogaster*, Lath., Buff., pl. enlum. 672, fig. 3. C'est le Rubis-Topaze mâle, jeune âge.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A CROUPION, AILES ET QUEUE POURPRÉS**, *Trochilus obscurus*, Lath. Sommet de la tête d'un vert obscur; cou et partie antérieure du dos d'un bleu foncé; le reste du dos et la queue d'un brun pourpré; tectrices alaires d'un bleu pourpré, ainsi que la poitrine et le ventre; gorge d'un vert brillant. Longueur, quatre pouces.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE DELALANDE**, *Trochilus Delalandi*, Vieill., Temm., pl. color. 18, fig. 1 et 2. Parties supérieures d'un vert doré; sommet de la tête garnie d'une huppe verte, du milieu de laquelle s'élève une longue plume bleue; une tache blanche à l'angle postérieur de l'œil; rémiges d'un brun violet; rectrices de la même couleur, égales, les latérales terminées du blanc; gorge et côtés du cou d'un cendré bleuâtre; poitrine et ventre d'un bleu d'acier brun; abdomen et tectrices caudales

inférieures cendrées; bec et pieds noirs. Taille, trois pouces trois lignes. La femelle n'a point de huppe; elle a les sourcils blancs, les parties inférieures cendrées ainsi que la gorge et la poitrine; le bec jaune à sa base. Du Brésil.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A DOUBLE HUPPE**, *Trochilus bilophus*, Temm., pl. color., 18, fig. 3. Parties supérieures d'un vert doré; sommet de la tête d'un bleu d'azur entouré d'une teinte d'Aigue-Marine; de l'angle postérieur de l'œil s'élève une aigrette composée de plusieurs plumes d'un rouge cuivreux, bordées de jaune et terminées de vert; de longues plumes d'un violet noirâtre couvrent le menton et le haut de la gorge; poitrine et côtés du cou blancs; rémiges d'un iris violet; rectrices latérales graduellement plus courtes, blanches, et intermédiaires très-longues et écartées. Taille, quatre pouces. Du Brésil.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE ÉCAILLÉ**, *Trochilus squamosus*, Temm., pl. color. 213, fig. 1. Parties supérieures d'un vert métallique foncé; gorge et partie du devant du cou noires avec des plumes bordées de blanc; une bande et une tache blanches de chaque côté de la tête près des yeux; partie de la poitrine et abdomen blancs; rémiges et rectrices d'un noir violet irisé; une petite tache blanche en dessous des dix rectrices latérales; rectrices caudales blanches, bordées de cendré; queue assez courte, un peu fourchue; bec noir, long de quatorze lignes. Taille, quatre pouces. Du Brésil. La femelle a les couleurs un peu moins vives.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE ÉCLATANT**, *Trochilus splendidus*, Vieill. Parties supérieures d'un vert doré; rectrices bleues, les latérales plus longues; un point blanc derrière l'œil; gorge et devant du cou d'un vert foncé; ventre blanc; bec rouge et la tête noire. Longueur, trois pouces six lignes. Du Paraguay.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE ÉMERAU-AMÉTHYSTE**, *Trochilus Ourisia*,

Lath., Buff., pl. ent. 27, fig. 3. Parties supérieures d'un bleu améthyste; bas du dos et érection d'un brun irisé et doré; rémiges noirâtres; rectrices noires, les latérales les plus longues; gorge et devant du cou d'un vert doré; poitrine bleuâtre; ventre blanc. Longueur, quatre pouces. De la Guiane.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE ESCARBOUCLE**, *Trochilus Carbunculus*, Lath., Vieill., Ois. dorés, pl. 54. **COLIBRI OISEAU-MOUCHE RUBIS-TOPIAZE**.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A GORGE BLANCHE**, *Trochilus albicollis*, Temm., Ois. color., pl. 203, fig. 2.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A GORGE BLEUE**, *Trochilus caeruleus*, Vieill., Ois. dorés, pl. 40. Parties supérieures d'un vert cuivreux brillant; rémiges d'un noir violet; rectrices bleues, verdâtres; gorge bleue, changeant en brun pourpré; devant du cou, poitrine et ventre verts; bec noir, d'un brun jaunâtre en dessous; pieds noirs. Longueur, trois pouces six lignes. De la Guiane.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A GORGE ET POITRINE VERTES**, *Trochilus maculatus*, Vieill., Ois. dorés, pl. 44. Parties supérieures d'un vert brunâtre, faiblement doré; gorge et poitrine d'un vert doré; un trait anguleux blanc sur toute la longueur du ventre va se réunir aux rectrices caudales inférieures qui sont d'un gris irisé; rectrices latérales bordées de roux; bec jaunâtre à sa base, noir à la pointe. Longueur, trois pouces huit lignes. De la Guiane.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A GORGE DORÉE DU BRÉSIL**. **OISEAU-MOUCHE RUBIS-TOPIAZE**.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A GORGE ROUGE DE LA CAROLINE**. **OISEAU-MOUCHE RUBIS**.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A GORGE ROUGE DE CAYENNE**. **OISEAU-MOUCHE RUBIS**.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A GORGE ROUGE DU BRÉSIL**. **OISEAU-MOUCHE RUBIS-ÉMERAUDE**.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A GORGE ROUSSE.** *Trochilus ruficollis*, Vieill. Parties supérieures d'un vert doré; rectrices d'un fauve jaunâtre, brillant; les deux intermédiaires et les deux latérales les plus courtes; gorge rousse; parties inférieures vertes, dorées, variées de brun; bec rougeâtre; noir à la pointe. Longueur, quatre pouces. On regarde comme variété d'âge ou de sexe, les individus qui ont les rectrices dorées, avec une tache jaune à l'extrémité des trois latérales; la gorge et la poitrine d'un brun de cannelle. Du Paraguay.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A GORGE TACHETÉE.** *Trochilus fimbriatus*, Gmel., Vieill., Ois. dorés, pl. 22. *V. OISEAU-MOUCHE A COLLETS*, jeune âge.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A GORGE TOPAZE, D'AMÉRIQUE, DU BRÉSIL ET DE CAYENNE.** *V. OISEAU-MOUCHE RUBIS-TOPAZE.*

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A GORGE ET VENTRE BLANCS,** Vieill., Ois. dorés, pl. 43. Parties supérieures d'un vert brunâtre doré; rémiges et rectrices latérales d'un vert noirâtre, irisées en violet; gorge, côtés du cou et de la poitrine vert dorés; milieu de la poitrine et ventre blancs; bec noir, blanchâtre en dessous; pieds bruns. Longueur, quatre pouces. De Cayenne. Vieillot soupçonne que c'est une variété d'âge de l'Oiseau-Mouche tout vert.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A GORGE VERTE,** *Trochilus mellisugus*, Lath., Vieill., Ois. dorés, pl. 39. Parties supérieures d'un vert doré; rémiges d'un noir violet; rectrices d'un noir bleuâtre; gorge et côtés du cou d'un vert irisé; poitrine, ventre et flancs d'un vert jaunâtre, doré; abdomen blanc; pieds emplumés, noirs, ainsi que le bec. Taille, trois pouces. La femelle a les couleurs moins vives; les jeunes ont le vert du plumage mélangé de brun, et le ventre brun. Des Antilles.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A GOSIER BLEU.** *V. OISEAU-MOUCHE A GORGE BLEUE.*

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A GOSIER DORÉ,** Vieill., Ois. dorés, pl. 46. *V. OISEAU-MOUCHE RUBIS-TOPAZE*, mâle, jeune âge.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE (GRAND) DE CATRINE.** *V. OISEAU-MOUCHE A GREILLES.*

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE GRAND RUBIS.** *V. OISEAU-MOUCHE A QUÈRE ROUSSE.*

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE (LE PLUS GRAND),** *Trochilus maximus*, Lath. Parties supérieures verdâtres, dorées; sommet de la tête, rémiges et rectrices bleuâtres; gorge blanche; poitrine vertes; abdomen noir; rectrices intermédiaires les plus longues. Longueur, huit pouces.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE DE LA GUIANE.** *V. OISEAU-MOUCHE VERT ET CRAMOISI.*

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE HUPPE-COL,** *Trochilus ornatus*, Lath., Vieill., Ois. dorés, pl. 49 et 50; Ruff., pl. enl., 640, fig. 3. Parties supérieures d'un vert obscur, doré; une huppe rousse sur la tête; un bouquet de plumes étagées rousses, terminées par des reflets très-éclatants; s'élève de chaque côté du cou et se dirige en arrière; croupion et rectrices caudales d'un noir foncé; rémiges d'un brun violet; rectrices brunes bordées de noir; gorge et poitrine d'un vert obscur; reflets très-brillants; abdomen verdâtre; bec noir à sa base, noir à l'extrémité; pieds noirâtres; longueur, deux pouces sept lignes. La femelle n'a ni huppe ni ergots; elle a le croupion d'un doré brillant, toutes les parties inférieures rousses, mélangées de vert; les rectrices rousses à leur base et d'un vert noirâtre à l'extrémité. De la Guiane.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE HUPPE,** *Trochilus cristatus*, L., Vieill., Ois. dorés, pl. 47 et 48. Parties supérieures d'un vert brun doré; tête ornée d'une huppe d'un vert très-brillant; rémiges et rectrices d'un brun irisé en vert et en violet; les deux rectrices intermédiaires d'un vert doré; base du bec enveloppée de plumes vertes; parties inférieures d'un vert jaunâtre,



en doré, avec la gorge cendrée; pieds emplumés bruns. Taille; trois pouces. La femelle est plus petite; elle est privée de huppe; ses couleurs sont en général plus sombres, ses parties inférieures sont cendrées; elle les rectrices latérales terminées de blanc. Des Antilles.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A HUPPE BLEUE**, *Trochilus pileatus*, Lath.; *Trochilus puniceus*, Grmel.; Vieill., Ois. dorés, pl. 63. Plumage entièrement d'un brun plus ou moins foncé sur diverses parties, à l'exception d'une huppe bleue éclatante qui garnit le sommet de la tête. Longueur, six pouces six lignes. Vieillot le considère comme une variété accidentelle du précédent.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE JACOBINE.**

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A COLLIER.**

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE LANGSDORFF**, *Trochilus Langsdorffi*, Vieill., emm., Ois. color., pl. 66, fig. 1. Parties supérieures d'un vert doré brillant; rémiges violettes; rectrices étalées, les latérales les plus longues d'un gris violet, les six intermédiaires progressivement beaucoup plus courtes et d'un bleu brillant; gorge haut de la poitrine d'un vert d'émeraude; un demi-collier d'un pourpre doré sépare la poitrine du ventre qui est d'un noir velouté; abdomen blanc; bec noir; pieds noirâtres; plumes garnies de plumes blanches échelonnées de noir. Taille, quatre pouces neuf lignes. Du Brésil.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A LARDES TUYAUX**, *Trochilus latipennis*, Lath.; *Trochilus campylopterus*, Grmel., Vieill., Ois. dorés, pl. 21; coll., pl. enlum. 672, fig. 2. Parties supérieures vertes, faiblement dorées; quelques-unes des grandes rémiges ont leur tige dilatée, courbée vers milieu, et garnie de barbes courtes et noirâtres; rectrices latérales brunes, terminées de blanc; gorge et parties inférieures cendrées; bec noir. Taille, quatre pouces huit lignes. De Guiane.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A LONGUE**, *Truchilus longirostris*, Vieill.,

Ois. dorés, pl. 69. Parties supérieures d'un vert foncé, doré; sommet de la tête bleu; une bande noire suivie d'une autre blanche s'étend depuis l'angle du bec jusqu'en-dehors de la nuque; extrémité des rectrices latérales blanche; gorge d'un rouge très-vif; poitrine, côtés du cou et flancs verts; le reste des parties inférieures blanchâtre; bec très-long, noirâtre. Taille, quatre pouces trois lignes. De l'île de la Trinité.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A LONGUE QUEUE COULEUR D'ACIER BRUN**, *Trochilus macrourus*, Lath. Parties supérieures vertes, dorées, très-brillantes; tectrices alaires et rémiges d'un brun violet; rectrices d'un bleu d'acier éclatant, les deux latérales les plus longues, les autres diminuant progressivement; sommet de la tête, gorge et cou d'un bleu violet; le reste des parties inférieures vert; bec et pieds noirs. Longueur, six pouces. De la Guiane.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A LONGUE QUEUE NOIRE.** **COLIBRI A TÊTE NOIRE.**

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A LONGUE QUEUE, OR, VERT ET BLEU.** **COLIBRI A TÊTE BLEUE.**

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE MAGNIFIQUE**, *Trochilus magnificus*, Vieill. Parties supérieures d'un vert doré, très-brillant; tête garnie d'une huppe orangée; de longues plumes étagées, blanches, terminées de vert doré, forment de chaque côté du cou un bouquet qui se relève en arrière; rectrices alaires lisérées d'orangé; rémiges d'un noir violet; rectrices inférieures brunâtres, bordées d'orangé; parties inférieures d'un vert doré un peu moins brillant que le manteau; un trait blanc au bas de la gorge; bec brun; pieds noirs. Longueur, deux pouces huit lignes. Du Brésil.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE MARBRÉ**, *Trochilus marmoratus*, Vieill. Parties supérieures vertes avec chaque plume bordée de roussâtre; sommet de la tête blanc, entouré de roux foncé; occiput varié de blanc, de roux et de brun; un peu de blanc à l'angle pos-

térieur de l'œil; une bande blanchâtre longitudinale de chaque côté du corps; parties inférieures variées de bleu noirâtre et de blanc; bec et pieds noirâtres. Longueur, quatre pouces six lignes. Du Paraguay.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE MAURÉ;** *Trochilus Maugeri*, Vieill., Ois. dor., pl. 37 et 38. Parties supérieures d'un vert doré brillant, avec des reflets bleus et violets aux inférieures; rémiges et rectrices d'un noir velouté, irisées en bleu violet; les rectrices latérales les plus longues; abdomen blanc; bec noir, jaunâtre en dessous; pieds noirs. Longueur, trois pouces sept lignes. La femelle est d'un vert moins brillant; elle a les rémiges brunes, les rectrices latérales terminées de bleu; puis de blanc aux plus extérieures; les parties inférieures tachées de blanc avec la gorge de cette couleur. Des Antilles.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A ORBILLES;** *Trochilus auritus*, Vieill., Ois. dor., pl. 25 et 26. Parties supérieures d'un vert doré brillant; un double bandelet vert et violet, d'assez longues plumes, à chaque côté du cou; une bande d'un noir velouté sous l'œil; rémiges noirâtres; les quatre rectrices (intermédiaires) d'un noir noirâtre, les latérales blanches, ainsi que la gorge et toutes les parties inférieures; bec et pieds noirs. Longueur, quatre pouces six lignes. La femelle a les parties inférieures parsemées de quelques taches noirâtres, et également deux rectrices intermédiaires d'un bleu noirâtre. Souvent la bande du dessous de l'œil est plus large et d'un noir varié de bleu pourpre. Des Antilles et de l'Amérique méridionale.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE OR-VERT;** *Trochilus viridissimus*, Lath. V. **COLIBRI OISEAU-MOUCHE TOUT VERT.**

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE PÉTAPORE;** *Trochilus Petasophorus*, P. Linn., Ois. col., pl. 203, f. 3; *Trochilus Janthinotus*, Natter. Parties supérieures d'un vert doré; une large tache de plumes violettes, irisées, formant de chaque côté du cou une

halle-paure; gorge d'un vert velouté, très-brillant, le reste des parties inférieures d'un vert plus sombre; rémiges et rectrices d'un noirâtre bronzé; les trois rectrices latérales finement bordées de blanchâtre, toutes très-larges et disposées de manière à faire paraître la queue un peu fourchue; bec et pieds noirs. Taille, quatre pouces. Du Brésil.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE (PETIT) A QUEUE FOURCHUE DE GUYENNE.** V. **COLIBRI OISEAU-MOUCHE AMÉTISTE.**

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE LE PLUS PETIT;** *Trochilus minimus*, L., Vieill., Ois. dor., pl. 64; Buff., pl. enl. 276, f. 1. Parties supérieures vertes, dorées, les inférieures d'un blanc sale; rémiges d'un brun violet; rectrices intermédiaires d'un noir bleuâtre, les latérales cendrées, terminées de blanc; bec noir; pieds bruns. Longueur, seize lignes. La femelle est un peu plus petite, moins brillante, avec les parties inférieures d'un cendré obscur. De la Guiane et des Antilles.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A QUEUE BLEUE.** V. **COLIBRI OISEAU-MOUCHE ÉMERAUDE-AMÉTISTE.**

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A BLAQUE DORÉE SUR LA GORGE.** V. **COLIBRI OISEAU-MOUCHE RUBIS-TOPAZE**, jeune mâle.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE ROUGE;** *Trochilus ruber*, Lath. Parties supérieures brunes, variées de jaunâtre; rémiges, rectrices latérales d'un violet pourpre; parties inférieures d'une sauve éclatante, variées de rouge et de noir, irisées de pourpre; bec noir, rougeâtre en dessus; pieds noirs. Taille, trois pouces. De l'Amérique méridionale.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A QUEUE AZURÉE;** *Trochilus Cyanurus*, Vieill. Parties supérieures vertes, dorées; front noirâtre, à reflets dorés, très-brillants; une tache noire de chaque côté de la tête; rectrices à barboles épaisses, bleues; les latérales plus longues, les autres progressivement plus courtes; parties inférieures variées de brun et de blanchâtre. Lon-

neur, trois pouces cinq lignes. La femelle a les couleurs moins vives et les tectrices caudales inférieures brunes, variées de blanchâtre. De l'Amérique méridionale.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A QUEUE FOURCHUE DU BRÉSIL**, *Trochilus taucopia*, Lath. Le plumage d'un vert doré brillant; sommet de la tête d'un bleu violet; grandes tectrices alaires d'un noir verdâtre; rémiges d'un brun violet; rectrices d'un brun violet; les antérieures les plus longues; tectrices caudales inférieures blanches. Taille, quatre pouces six lignes.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A QUEUE FOURCHUE DE CAYENNE**, *V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE A LONGUE QUEUE D'ULBUR D'ACIER BRUN*.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A QUEUE FOURCHUE DE LA JAMAÏQUE**, *V. COLIBRI A TÊTE NOIRE*.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A QUEUE OUSSE**, *Trochilus ruficaudatus*, Vieill., Ois. dor. pl. 27 et 28. Parties supérieures d'un gris obscur, presque noir vers le croupion, et très-peu dorées; tectrices alaires d'un brun rouxâtre doré; rémiges brunes et rousses; rectrices rousses, bordées de blanc; bas de la gorge d'un rouge de feu très-brillant; devant du cou et poitrine d'un vert mêlé en bleu sur le reste des parties inférieures; bec et pieds noirs. Taille, quatre pouces trois lignes. La femelle a les parties supérieures brunes et les inférieures roses, les rectrices intermédiaires d'un vert brun, les autres rousses et noires, terminées de blanc. De la Guiane.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A RAQUETTES**, *Trochilus platyrus*, Lath.; *Trochilus longicaudus*, L., Vieill., Ois. dor. pl. 30. Parties supérieures d'un vert doré; rémiges d'un brun violet; rectrices d'un brun verdâtre; les huit intermédiaires pointues, les deux latérales en raquettes, avec les tiges jaunâtres; gorge et poitrine d'un vert émeraude; ventre d'un noir brun; abdomen blanc. Longueur, quatre pouces. De la Guiane.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE RAYÉ**, *V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE A GAZOTTE BRUNE*.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE RUBIS**, *Trochilus Colubris*, L., Vieill., Ois. dor. pl. 31, 32 et 33. Parties supérieures d'un vert doré; rémiges brunes; rectrices noires; les intermédiaires vertes et plus courtes; gorge d'un rouge vif éclatant; parties inférieures cendrées, noirâtres vers l'abdomen; bec brunâtre, plus foncé vers la pointe. La femelle a les couleurs moins vives, la queue non fourchue, les rectrices latérales blanches à l'extrémité, toutes les parties inférieures et la gorge blanchâtres. Le mâle, dans son jeune âge, n'a que de petits points rouges sur la gorge. Taille, trois pouces quatre lignes. Des deux Amériques.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE RUBIS-ÉMERAUDE**, *Trochilus rubineus*, Lath., Buff., pl. enl. 276, fig. 4. Le plumage d'un vert doré brillant, avec les grandes tectrices alaires, les rémiges et les rectrices rousses, bordées de brun violâtre; petites tectrices alaires d'un bronzé cuivreux, ainsi que la gorge qui jette des reflets d'un vif éclat de rubis; bec et pieds noirs. Taille, quatre pouces quatre lignes. De la Guiane.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE RUBIS-TOPAZE**, *Trochilus Mosquitos*, Lath., Buff., pl. enl. 640, fig. 1, et pl. 227, fig. 2; Vieill., Ois. dor. pl. 54, 55 et 56. Parties supérieures d'un vert noirâtre; sommet de la tête d'un rouge pourpré obscur, changeant en belle couleur de rubis; rémiges d'un brun violet; rectrices d'un roux pourpré terminées de noir; gorge et devant du cou d'un vert obscur, changeant en couleur de topaze la plus éclatante; le reste des parties inférieures noir, avec quelques taches blanches et les tectrices caudales inférieures rousses. Taille, trois pouces neuf lignes. La femelle a les parties supérieures et le sommet de la tête d'un vert cuivreux, des reflets dorés sur les tectrices et les rectrices intermédiaires, la gorge comme les parties inférieures cen-

drées. C'est le *Trochilus Pegasus*, Lath. On reconnaît assez facilement les jeunes mâles qui commencent à prendre le plumage de l'adulte: les autres ressemblent aux femelles, mais les parties supérieures sont noirâtres. De l'Amérique méridionale.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE DE SAINT-DOMINGUE.** *V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE RUBIS-TOPAZE*, femelle.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE SAPHIR**, *Trochilus saphirinus*, Lath., Vieill., Ois. dor. pl. 57 et 58. Parties supérieures d'un bronzé brillant; tectrices alaires brunes, dorées; rémiges brunes; rectrices d'un bleu d'acier bruni; sommet de la tête, gorge, devant du cou et poitrine d'un bleu foncé, irisé en violet; le reste des parties inférieures d'un noir verdâtre; bec blanchâtre, avec l'extrémité noire; pieds bruns. Taille, trois pouces six lignes. Les jeunes ont les parties supérieures d'un vert cuivré, les inférieures variées de noir et de gris; et quelquefois de bleu; le haut de la gorge roux; les rectrices brunes, bordées de grisâtre. Lorsqu'ils sont plus avancés en âge, les parties supérieures prennent le vert doré brillant; les rectrices latérales sont d'un noir violet en dessus et rousses en dessous, de même que les tectrices caudales inférieures; parties inférieures vertes; avec la gorge rousse et la poitrine d'un bleu de saphir. De la Guiane.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE SAPHIR-ÉMERAUDE**, *Trochilus bicolor*, Lath., Vieill., Ois. dor. pl. 36. Parties supérieures vertes, dorées; les inférieures un peu moins éclatantes; sommet de la tête et gorge lançant des reflets bleus très-brillants; scapulaires et tectrices d'un bleu violet; rémiges noires; rectrices d'un noir velouté, irisées en bleu violet; les latérales un peu plus longues; bec noir, jaunâtre dans une partie du dessous; pieds noirs. Taille, quatre pouces. Des Antilles.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE SASIN**, *Trochilus rufus*, Gm.; *Trochilus colaris*, Lath., Vieill., Ois. dor. pl. 61 et 62. Parties supérieures d'un brun

tirant sur le fauve; tête d'un vert roussâtre, doré, très-brillant; tectrices alaires vertes, dorées; rémiges d'un brun pourpré; rectrices brunes, larges et pointues; côtés du cou garnis de plumes un peu plus longues; gorge et poitrine supérieure d'un rouge brillant de rubis; bas de la poitrine et ventre blanchâtres, passant au brun vers l'abdomen; bec et pieds noirâtres. Longueur, trois pouces deux lignes. La femelle n'a point de longues plumes au cou; elle a la gorge blanchâtre, tachetée de roux, et les rectrices latérales terminées de blanc. De la baie de Nootka.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE DE SURINAM.** *V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE POURPRÉ.*

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE DE TABAGO**, *Trochilus Tabagensis*, L. *V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE MAUGÉ.*

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE TACHETÉ DE CAYENNE.** *V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE TOUT VERT*, jeune âge.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE AUX TEMPS BLANCHES**, *Trochilus leucotaphus*, Vieill. Parties supérieures vertes, dorées; deux bandes lentes contiguës à l'angle postérieur de l'œil, l'une blanche, l'autre noirâtre; rectrices d'un bleu noir; les latérales terminées de blanc; parties inférieures, gorge et poitrine blanchâtres; bec rougeâtre à la base, noir vers l'extrémité. Taille, trois pouces cinq lignes. Du Paraguay.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE À TÊTE BLEUE**, *Trochilus cyanocephalus*, Lath. Parties supérieures d'un vert doré; tête d'un bleu éclatant; rémiges et rectrices bleues, avec des reflets pourprés; parties inférieures orangées; queue trois fois plus longue que le corps; bec blanchâtre. Du Chili.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE À TÊTE OBSCURE.** *V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE À CROUPION*, AILES ET QUEUE POURPRÉS.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE POURPRÉ.** *V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE RUBIS*, femelle, jeune âge.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE TOUT VERT**, *Trochilus viridanus*, Gmel.,

Lath., Vieill., Ois. dor. pl. 42. Parties supérieures d'un vert doré, brillant; sommet de la tête d'un vert sombre; rémiges d'un violet noirâtre; gorge, poitrine et ventre d'un vert doré; abdomen et tectrices caudales inférieures d'un blanc mêlé de vert; bec brun, jaunâtre en dessous; pieds noirâtres. Taille, quatre pouces. De la Guiane.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A VENTRE BLANC.** V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE A GORGE ET VENTRE BLANCS.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE A VENTRE GRIS DE CAYENNE,** *Trochilus Pegasus*, Lath. V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE RUBIS-TOFAZE, femelle, jeune âge.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE VERT DORÉ.** V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE TOUT VERT, jeune âge.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE VERT ET CARMOISI,** *Trochilus Gulahensis*, Lath. Parties supérieures vertes, dorées; sommet de la tête orné d'une petite huppe rouge; rémiges et tectrices variées de vert, de rouge et de pourpre; poitrine rouge; bec noir, long et grêle. Taille, deux pouces environ. De la Guiane. Espèce douteuse.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE VIEILLOT.** V. COLIBRI OISEAU-MOUCHE GRAND RUBIS.

**COLIBRI OISEAU-MOUCHE VIOLET A QUEUE FOURCHUE,** *Trochilus furcatus*, Gm., Lath., Vieill., Ois. dor. pl. 34. Parties supérieures d'un bleu violet doré, vertes aux ailes et à la queue; sommet de la tête d'un vert brun, irisé en vert doré; tectrices d'un bleu noir; l'extérieure la plus longue; les autres progressivement plus courtes; gorge d'un vert doré, brillant; poitrine et flancs d'un bleu violet doré; le reste des parties inférieures noirâtres; bec et pieds noirâtres. Taille, quatre pouces. De la Guiane. (DR. Z.)

\* **COLIER-FAUX OU MANGOSE.** BOT. FRAN. (Adanson.) Syn. de *Cordia cordifolia*, Cav., au Sénégal. (B.)

\* **COLIMACÉES.** MOLL. Sous ce

nom, Lamarck (Anim. sans vert. T. VI, 2<sup>e</sup> partie, p. 57 et 61) établit une famille dans les Trachélipodes, où il comprend tous les genres de Mollusques qui habitent à la surface de la terre, et qui respirent l'air libre par une ouverture transmettant ce fluide sur le réseau vasculaire qui tapisse la cavité branchiale. La plupart des Animaux de cette famille cherchent les lieux frais et ombragés. Les Colimaçées sont divisés en deux sections: la première renferme tous ceux qui ont quatre tentacules, les deux plus grands étant oculés au sommet, et la seconde ceux qui n'ont que deux tentacules. Les genres de la première section sont: HÉLICE, CAROCCOLLE, ANOSTOME, HÉLICINE, MAILLOT, CLAUSILIE, BULIME, AGATHINE, AMBRETTE; ceux de la seconde sont: AURICULE et CYCLOSTOME (V. ces mots). Presque tous les Mollusques de cette famille sont dépourvus d'opercules; quelques-uns pourtant en portent un sous le pied, mais la plupart d'entr'eux s'enferment pendant la mauvaise saison, au moyen d'une sorte de cloison calcaire qui ferme l'ouverture de la Coquille. (D. II.)

**COLIMAÇON.** MOLL. Quelques auteurs d'histoire naturelle se sont servis de ce mot qui est synonyme d'Hélice, et qui ne s'emploie plus que vulgairement. V. HÉLICE. (D. II.)

\* **COLIMAÇON.** BOT. CRYPT. (*Champignons.*) Paulet appelle ainsi une petite espèce d'Agaric dont le chapeau est contourné sur lui-même en forme d'Hélice. (AD. B.)

\* **COLIMBE OU COLYMBE.** OIS. Syn. francisé du nom générique latin *Colymbus*. V. PLONGEON. (DR. Z.)

**COLIN.** OIS. (Belon.) Quelques espèces de Goélants, *Larus*, L. V. MAUVE. On a aussi appelé COLIN NOIR la Poule d'eau, *Fulica Chloropygus*. V. GALLINULE. (DR. Z.)

\* **COLIN OU MORUE NOIRE.** POISS. Espèce du genre Gadus. V. ce mot. (B.)

**COLINGA.** ois. Pour Cotinga. *V.* ce mot.

**COLINIANE.** BOT. PHAN. Syn. indou de Zérumbeth, espèce du genre *Amome*. *V.* ce mot. (B.)

**COLINIL** ou **KOLINIL.** BOT. PHAN. Espèce indéterminée d'Indigo à la côte de Malabar. (B.)

\* **COLINS.** ois. (Cuvier.) Sous-division du genre *Perdrix*, qui comprend les *Perdrix* et *Cailles* d'Amérique dont le bec est plus court, plus gros et plus bombé que dans les congénères. *V.* *PERDRIX*. (DR..Z.)

**COLIOLE.** BOT. PHAN. *V.* *COLEUS*.

**COLIOU.** *Colius*. ois. (Gmelin.) Genre de l'ordre des Granivores. Caractères : bec gros, court, épais, convexe en dessus, aplati en dessous ; un peu comprimé vers la pointe ; mandibule inférieure recouverte par les bords de la supérieure ; narines petites, placées à la base du bec, en partie recouvertes par les plumes qui l'entourent, et percées dans sa substance cornée, latérales, rondes ; pieds médians ; quatre doigts, trois de vant, réunis jusqu'à la première articulation ; l'externe plus long que le tarse ; le doigt de derrière court et versatile ; angles très-arrqués ; ailes assez courtes ; la première rémige nulle ou presque nulle, la deuxième un peu plus courte que la troisième qui est la plus longue.

Concentrés dans les régions intertropicales de l'Afrique et de l'Asie, les *Colious* ont offert rarement l'occasion d'étudier leurs mœurs et leurs habitudes, qui étaient presque entièrement inconnues avant les intéressans voyages de Lestevant dans la partie la plus sauvage de l'ancien continent. C'est à ce hardi et zélé naturaliste que l'on est redevable d'observations précieuses sur les Oiseaux de ce genre : elles ont depuis été confirmées et enrichies par d'autres voyageurs qui ont visité l'Afrique et la Nouvelle-Hollande. Les *Colious* ont le vol très-court, difficile et pour ainsi dire embarrassé, ce que l'on pourrait attri-

buer à la faiblesse de leurs ailes, si ces Oiseaux montraient plus d'agilité dans le grimper le long des branches à la manière des Pies et des Perroquets, ou dans la marche qu'ils semblent préférer au vol, et qu'ils exécutent presque en rampant. Essentiellement granivores, ils dédaignent les Insectes ; mais ils se jettent avec avidité sur les fruits et les tendres bourgeons dont en un instant ils dépouillent un Arbre ; ils sont à cause de cela un grand fléau dans les cantons cultivés. Ils vivent en société, et ne se séparent jamais, même au temps des amours ; la nidification se fait en commun sur un même buisson qu'ils choisissent bien touffu et garni d'épines, afin de mettre leurs jeunes familles à l'abri des regards et de l'atteinte des Oiseaux de proie contre lesquels ils ne sauraient apporter la moindre défense. On voit quelquefois cinq à six nids et plus, presque contigus ; ils renferment chacun trois à quatre œufs teints de rose ou de brunâtre suivant les espèces. C'est aussi en société qu'ils se livrent au sommeil, et l'on prétend qu'ils dorment suspendus à l'extrémité des branches, la tête en bas, de manière qu'en gardant par le transport du sang vers cette partie, il devient très-aisé, le matin, de les décrocher et de les prendre l'un après l'autre, genre de chasse auquel, dit-on, se livrent les naturels qui trouvent dans ces Oiseaux un excellent gibier.

**COLOU DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.** *Colius Capensis*, L., Buff., pl. enl. 382, fig. 1 ; Vieillot, *Pl. d'Afr.*, pl. 257. Parties supérieures blanchâtres avec la tête ; le cou, les scapulaires et les tectrices alaires cendrés, ainsi que la gorge et le poitrin ; nuque garnie de plumes assez longues, se relevant en huppe ; une tache pourprée sur le croupion ; rectrices intermédiaires noires et les plus longues, les autres grises et diminuant progressivement de longueur jusqu'aux latérales qui n'ont guère plus de dix lignes ; parties inférieures d'un blanc teint de rougeâtre ; bec gris,

noir à l'extrémité; iris brun; pieds rougeâtres. Longueur, dix pouces trois lignes.

**COLIOU A CROUPTON ROUGE**, *Erythropygus*, Vieill.; *Loxia cristata*, Gmel. Parties supérieures blanchâtres; sommet de la tête garni d'une huppe rouge; croupion et poitrine rouges; rectrices cendrées, les intermédiaires les plus longues; parties inférieures blanches; bec noirâtre; pieds rouges. Longueur, neuf à dix pouces. La femelle a la huppe et la poitrine blanchâtres. De la partie orientale de l'Afrique.

**COLIOU A DOS BLANC**, *Colius leucorhous*, Lath., *Colius Erythropus*, Gm. V. **COLIOU DU CAP**, dont il ne diffère qu'en ce qu'il a le dos pourpré et traversé par une bande blanche. Levallant les regarde sous deux comme identiques.

**COLIOU A GORGE NOIRE**, *Colius nigricollis*, Vieill.; Levall., Ois. d'Afr., pl. 269. Parties supérieures brunes, avec les ailes noisâtres; front noir; sommet de la tête orné d'une huppe d'un cendré vineux; cou, poitrine et flancs bruns, rayés transversalement de noir; parties inférieures d'un fauve foncé; bec jaunâtre; pieds rouges. Longueur, quatorze pouces. De la côte d'Angole.

**COLIOU HUPPÉ DU SÉNÉGAL**, *Colius senegalensis*, Lat., Buff., pl. enl. 282, fig. 2; Levall., Ois. d'Afr., pl. 258. Parties supérieures d'un cendré bleuâtre, légèrement irisé en verdâtre; front d'un brun roussâtre; huppe grise bleuâtre; arête des yeux nue et rougeâtre; rectrices longues et d'un gris bleuâtre; gorge d'un blanc roussâtre; poitrine nuancée de bleuâtre et de verdâtre; parties inférieures roses; bec grisâtre, noir à l'extrémité; pieds gris. Taille, douze pouces.

**COLIOU DE L'ÎLE PANAY**, *Colius panayensis*, Lat. Parties supérieures grises, nuancées de lilas qui passe au rougeâtre vers le croupion; huppe d'un cendré vineux; gorge et poitrine blanchâtres, rayées transversalement de brun; parties inférieures roussâtres; rectrices vertes, les intermé-

diaires plus longues; bec noir en dessus, gris en dessous; iris brun; pieds d'un brun roussâtre. Longueur, treize pouces.

**COLIOU DES INDES**, *Colius indicus*, Lath. V. **COLIOU HUPPÉ DU SÉNÉGAL**.

**COLIOU QUIRIWA**, *Colius Quiriwa*, Dum. V. **COLIOU HUPPÉ DU SÉNÉGAL**.

**COLIOU A JOUES ROUGES**, *Colius Erythromelun*, Vieill. Cet Oiseau, dont Vieillot a fait une espèce particulière, paraît être le Coliou huppé du Sénégal avec quelques légères différences dépendantes de l'âge ou du sexe.

**COLIOU RAYÉ**, *Colius striatus*, Gm., Levall., Ois. d'Afr., pl. 256. V. **COLIOU DE L'ÎLE PANAY**.

**COLIOU VERT**, *Colius viridis*, Lath. Plumage d'un vert éclatant, avec les ailes et la queue noirâtres; front et paupières d'un noir vif; rectrices intermédiaires les plus longues; bec et pieds noirâtres. Taille, onze pouces. De la Nouvelle-Hollande. (DR..Z.)

**COLIROJO**. ois. Syn. espagnol du Rossignol de muraille, *Motacilla Phœnicurus*, L. V. **SYLVIE**. (B.)

**COLISAURA**. REPT. SAUR. (Gessner.) Le Lézard vert chez les Grecs modernes. (B.)

\* **COLITE**. *Colites*. MOLL. FOSS. On a quelquefois donné ce nom aux Bélemnites. V. ce mot. (B.)

**COLIUS**. ois. (Linné.) V. **COLIOU**.

**COLIVICOU**. ois. (Salerne.) Syn. vulgaire, aux Antilles, du Tacca, *Cuculus Verula*, Gm. V. **COUA**. (DR..Z.)

**COLJE**. BOT. PHAN. Syn. timorien de *Borassus flabelliformis*. (B.)

\* **COLLA**. BOT. PHAN. Suc résineux employé dans l'Archipel pour coller les bois de marqueterie; il provient des racines du *Carlina acaulis*, disent les uns, et du *Chondrilla juncea*, selon les autres. (B.)

\* **COLLADI**. BOT. PHAN. (Rhéede.) Syn. indou de *Bignonia bigemina*. (B.)

**COLLADOA**. BOT. PHAN. Genre de la famille des Graminées établi par Cavanilles, et adopté par Persoon et

Beauvois. Il n'est pas différent de l'Andropogon. *V.* ce mot. (A. R.)

\* **COLLANO.** POIS. L'*Accipenser Huso* dans quelques parties de l'Allemagne. *V.* ESTURGEON.

\* **COLLARIUM.** BOT. CRYPT. (*Mucedinées*.) Link a créé ce genre dans ses Observations mycologiques (*Beil. Mag.*, 1809, p. 17). Il l'a caractérisé ainsi : filamens rapprochés, cloisonnés, rameux, décumbens ; sporules agglomérées en petits tas épars sur les filamens. Ce genre ne diffère des *Sporotrichum*, avec lesquels Persoon l'a réuni, que par ses sporules agglomérées. Link en a décrit deux espèces, le *Opbarium nigrispermum*, qui vient sur la colle sèche, et le *Collarium fructigenum* qui croît sur les Pommes pourries. Le premier a les filamens jaunâtres et les sporules noires ; le second présente des filamens blancs et des sporules grises. (AD. B.)

\* **COLLARONE.** BOT. CRYPT. (Micheli.) Nom collectif des Agarics munis d'un anneau. (B.)

**COLLARPOE.** BOT. PHAN. Syn. malabara d'*Achyranthes lanata*, L., Ouret d'Adanson. (B.)

**COLLE.** ZOOL. et BOT. Les arts tiennent des Animaux et de la farine des Frumentacées cette préparation fort employée. Celle qui provient de la farine, plus particulièrement appelée Colle, s'aigrit aisément, et c'est alors que s'y développent ces Infusoires dont l'étude occupa tant les naturalistes qui se servirent les premiers du microscope. (B.)

\* La COLLE-FORTE est celle qui provient de la gélatine que l'on a fortement épaissie au feu, puis jetée dans des moules qu'elle se prend en tablettes dont on achève la dessiccation à l'air. Cette substance, transparente, blonde ou brune, se gonfle dans l'eau, se fond au feu, et sert alors, par son extrême adhérence, à réunir fortement toutes surfaces solides quelconques. On mêle aussi sa solution avec les couleurs en détrempe, pour leur donner de la fixité.

La COLLE DE POISSON est la gélatine produite par la membrane interne de la vessie natatoire de plusieurs Poissons, et principalement de l'Esturgeon, *Accipenser Sturio*, L. On lave cette membrane, on la découpe par lanières que l'on roule sur elles-mêmes. On donne au cylindre la forme d'un double crochet que l'on fait sécher fortement pour les livrer au commerce. Cette Colle, la plus solide de toutes, se fond comme la gélatine des autres Animaux ; on la préfère pour les ouvrages de prix, et même on l'emploie aux usages culinaires, parce qu'elle est blanche, inodore, et qu'elle n'offre rien de désagréable au goût. (DR. Z.)

\* **COLLECHAIR.** BOT. PHAN. Même chose que Sarcocolle. *V.* ce mot. (B.)

**COLLECTEURS.** BOT. PHAN. H. Cassini appelle ainsi les poils, papilles ou aspérités qui se trouvent sur les styles des Synanthérées. Comme ils n'existent que dans les fleurs mâles et hermaphrodites, cet auteur pense que leur fonction est de balayer le pollen, lorsque le style traverse le tube des anthères, et, par un mouvement d'irritation communiqué à tous les organes sexuels, de le lancer sur les stigmates. La disposition de ces Collecteurs sur les branches du style des fleurs hermaphrodites a fourni des caractères qui ont semblé excellens à Cassini pour la distinction de ses tribus. Leur nature varie aussi d'une tribu à l'autre : ainsi, dans les Lactucées ils sont piliformes, papilliformes dans les Carduacées, glanduliformes dans les Adénostylées, etc. (G. N.)

\* **COLLECTIONS.** ZOOL. BOT. MIX. Réunion des êtres dont la nature se compose, préparés de manière à se conserver le plus long-temps possible, à présenter les caractères qui les distinguent, et disposés selon une méthode ou un système propre à faciliter leur comparaison et leur étude. Sans le secours des Collections, il est presque impossible de s'occuper fruc-



neusement d'histoire naturelle; mais les Collections sont longues, difficiles, et souvent dispendieuses à former. Il est impossible à un simple particulier d'en réunir qui offrent des richesses égales dans tous les genres. Les gouvernemens seuls y peuvent parvenir, et les Collections que possède la France dans son Muséum d'Histoire naturelle sont les plus belles de l'univers: aussi, c'est de ce foyer de science et de lumières que jaillirent le plus de découvertes utiles, et les grands travaux classiques par lesquels se sont illustrés, en éclairant l'Europe, les habiles professeurs de ce magnifique établissement. Les naturalistes qui, après avoir pris de ces grands maîtres, dans les galeries qu'ils ont si bien exposées, des connaissances générales qu'il est indispensable aujourd'hui de porter à un certain point de profondeur pour réussir dans quelque branche que ce soit de la science, devront, en se consacrant à l'étude particulière qui leur souvrira, former une collection. Le botaniste se composera un Herbar. V. ce mot. Pour conserver les Animaux vertébrés, il faudra des soins plus considérables. V. AXIDERMIE. Au mot ENTOMOLOGIE, nous nous occuperons de l'art de donner la chasse aux Insectes et de les conserver. La plus grande partie des autres Animaux ne peut guère se conserver que dans la liqueur, ou doit être mise en cire. C'est au mot PRÉPARATIONS CONSERVATRICES que seront donnés les moyens de soustraire à la corruption les êtres qu'on voudrait conserver, et l'art de nettoyer les Coquilles.

Les Collections minéralogiques sont faites de toutes qui se conservent le mieux, et l'on peut même les regarder comme indestructibles, tandis que les autres sont sujettes à des dégradations continuelles. (B.)

**COLLEMA. BOT. CRYPT. (Lichens.)** genre, l'un des mieux caractérisés de la famille des Lichens, a été introduit par Hoffmann et adopté par les botanistes. On le distingue à

sa fronde gélatineuse et trépanoïde lorsqu'elle est humide, homogène, devenant sèche et cassante par la dessiccation, de figure très-variable: ses apothécies sont en forme de scutelles sessiles ou quelquefois portées sur un court pédicelle, entourées par un rebord peu saillant, entièrement formées d'une substance semblable à celle de la fronde et ordinairement de même couleur qu'elle.

L'organisation de la fronde des Plantes de ce genre est tout-à-fait différente de celle des autres Lichens; par son aspect extérieur, elle rappelle entièrement les Nostochs, les Tremelles, etc.: l'organisation intérieure confirme cette analogie. Bory de Saint-Vincent, auquel nous devons tant d'observations importantes sur l'organisation des Plantes cryptogames aquatiques, a reconnu dans la fronde des Collema la même organisation que dans certaines Plantes de la famille des Chaodiniées. Quelques espèces de ce genre qui croissent dans l'eau et qui se rapprochent par-là de la nouvelle famille établie par notre savant collaborateur, méritent d'être étudiées de nouveau; cependant la présence de vraies scutelles range nécessairement ce genre parmi les Lichens. C'est ainsi qu'on trouve entre presque toutes les familles naturelles des points de contact et des genres intermédiaires. Acharius a décrit soixante-quatre espèces de Collema, presque toutes propres à l'Europe: il les a distribuées, d'après la forme de la fronde, dans sept sous-genres que nous allons faire connaître.

1. **PLACYNTHIUM.** Fronde en forme de croute adhérente, à contour irrégulier. Le *Collema nigrum* appartient à ce sous-genre, il est assez commun sur les rochers calcaires.

2. **ENCHILTIUM.** Fronde presque orbiculaire, composée de petits lobes plissés et imbriqués, très-enflés par l'humidité. Parmi les espèces de cette section, la plus nombreuse de toutes, nous citerons les suivantes qui sont les plus communes: *Collema*

*crispum*, Ach., *Collema melasoum*, Ach., *Collema fasciculare*, Ach.

5. *SCYTIUM*. Fronde presque foliacée, irrégulière, formée de lobes distincts, nus, dilatés, épais et renflés. Nous citerons comme type de cesous-genre le *Collema palmatum*, Ach.

4. *MALLOTIUM*. Fronde foliacée; lobes arrondis, velus ou hérissés en dessous. Le *Collema saturninum*, l'une des espèces les plus communes de ce genre, appartient presque seul à ce sous-genre. Il croît sur les troncs d'Arbres et sur les pierres.

6. *LATRAGIUM*. Fronde foliacée, à lobes presque membraneux, lâches, nus, d'un vert foncé. Outre plusieurs espèces moins connues, ce sous-genre renferme les *Collema nigrescens* et *Collema fulvum* qui sont fort communs surtout sur les vieux troncs d'Arbre, et particulièrement sur le Peuplier d'Italie.

6. *LEPTOGIUM*. Fronde foliacée composée de lobes membraneux très-minces, arrondis, nus, presque transparents, d'un gris glauque; apothécies légèrement pédicellées. Presque toutes les espèces de ce sous-genre, qui mériterait peut-être d'être séparé des *Collema*, sont exotiques et des pays chauds. Elles croissent sur les Monsses : la seule espèce commune en Europe est le *Collema lacerum* qui est très-abondant parmi les grandes Mousses.

7. *POLYCHIDIUM*. Fronde très-mince, finement découpée, ou formée de filaments cylindriques. Ce sous-genre devra peut-être également être séparé des *Collema* dont il diffère beaucoup par son aspect et par son organisation. Le *Collema muscicola* et le *Collema velutinum* sont les espèces les mieux connues de cette section.

On voit, par cette énumération, combien les formes de ce genre varient, et cependant, à l'exception des deux dernières sections, il est un des plus naturels de la famille des Lichens.

(AN. R.)

**COLLERETTE. BOT. V. COLLERETTE.**

**COLLET. BOT. CRYPT. (Champignons.) V. ANNEAU.**

**COLLET. Collum. BOT.** Les botanistes entendent par ce mot le plan intermédiaire entre la tige et la racine, la ligne de démarcation entre les fibres ascendantes et celles qui commencent à descendre. Ce n'est donc pas d'un organe dont on veut parler lorsqu'on emploie ce mot; c'est au contraire de l'absence des organes dans un point souvent difficile à apercevoir. Grew l'appelait *Coarcture*, Jungius *Limes communis* ou *Fundus Plantæ*, et Lamarck le considérant comme la partie la plus essentielle à l'existence du Végétal, à cause de sa position entre les deux organes les plus importants, c'est-à-dire la tigelle et la radicelle, l'a nommé *Nœud vital*. En ne se servant du mot de Collet que dans son véritable sens, on éviterait beaucoup d'ambiguïtés, et l'on ne désignerait pas sous ce nom tantôt le plateau ou la tige tout entière, réduite à son minimum, de certaines Liliacées, tantôt la partie supérieure de la racine, tantôt enfin l'organe que l'on a nommé Souche ou Caudex. V. ces mots. (G. N.)

**COLLET DENOTRE DAME. BOT. PHAN. Syn. de Piper pedunculé aux Antilles.** (B.)

**COLLETE. Colletes, 129.** Genre de l'ordre des Hyménoptères, section des Porte-Aiguillons, famille des Mellifères, tribu des Andrenées, établi par Latreille (*Gener. Crust. et Ins. T. IV, p. 148*) et dont les caractères sont : languette courte, à trois lobes, évasée à son extrémité, le lobe du milieu plus large, divisé en deux; troisième article des antennes plus long que le second; une cellule radiale et trois cubitales dont la seconde, petite et presque carrée, reçoit la première nervure récurrente; et la troisième, plus grande et resserrée dans sa partie antérieure, reçoit la seconde récurrente, Jurine (Nouv.

déthod. de Classif. des Hyménop., n. 227) range ces Insectes dans la première division de la famille du genre Andrène.

Les Collètes et les Prosopes de Jurine, ou Hylées de Latreille, forment, dans la tribu des Andrenètes, une section particulière et bien distincte tant par la forme de leur languette que par leurs antennes et leur abdomen. Les Collètes diffèrent des Prosopes par le nombre des cellules cubitales, par les antennes, par les mandibules et par leur corps qui est velu; leurs mœurs sont aussi fort différentes. Le mot Collète est tiré du grec et correspond au mot français Colleur.

Réaumur (Mém. pour servir à l'Hist. des Ins. T. IV, p. 132), ayant observé les parties de la bouche d'une espèce de ce genre qu'il range parmi les Abeilles qui font leur nid de membranes soyeuses, nous donne beaucoup de détails sur la manière dont elles se constituent dans des trous de murailles. Ce nid est une espèce de cylindre fait de plusieurs cellules mises bout à bout, de sorte que le fond de la première, et ainsi de suite. Ces cellules ont la forme d'un dé à coudre et n'ont pas plus de deux lignes de diamètre: elles sont composées de plusieurs membranes excessivement fines et appliquées l'une sur l'autre; ces membranes ont l'apparence d'une toile pure et blanche; mais vues au microscope, on n'aperçoit aucune apparence de fibres. Réaumur pense que les Collètes font cette espèce de soie avec une liqueur visqueuse qu'elles rendent par la bouche et qui se solidifie par le contact de l'air. Les cellules ont assez de consistance pour qu'on puisse les toucher sans altérer leur forme. Elles renferment une matière solide, quelquefois un peu détrempée et qui a l'apparence de la Cire; cette matière sert de nourriture à la larve qui est blanche et ressemble à celle de l'Abeille mellifère; cette larve, pour conserver sa coque intacte, a soin de

consommer sa pâtée avec le plus grand soin; elle y pratique au milieu un petit trou qu'elle agrandit journellement, de sorte que les parois de sa cellule sont soutenues par un tuyau de pâtée qui devient de plus en plus mince, mais qui ne manque que quand la larve a tout mangé et qu'elle est prête à se transformer. L'Insecte parfait écôt vers la fin de juillet de l'année suivante.

La principale espèce et celle qui sert de type au genre a reçu le nom de COLLETTE ORINTURÉE, *Coll. succincta*, Latr., *Andrena succincta*, Fabr., la femelle; *Megilla calendarum*, Fabr., le mâle. Latreille en figure une autre espèce, (*Gener. Crust. et Ins.* T. I, tab. 14, fig. 7) sous le nom de *Colletes fodiens*. C'est la *Melitta fodiens* de Kirby et de Panzer. (G.)

COLLÉTIE. *Colletia*. BOT. PHAN. Genre de la famille des Rhamnées et de la Pentandrie Monogynie, L. Ce fut Commerson qui lui donna ce nom en le distinguant bien comme genre particulier, mais sans en publier les caractères. Dausson *Genera Plantarum*, A.-L. Jussieu les traça d'après les manuscrits et les échantillons rapportés du Brésil par Commerson, et du Pérou par J. Jussieu. Ventenat, en donnant la description des Plantes rares du Jardin de Cels, examina ensuite sur le vivant quelques espèces de *Colletia*, ce qui lui fournit le moyen de rectifier le caractère générique, et de l'exposer de la manière suivante: calice urcéolé, quinquéfide, intérieurement velu à sa base ou muni de cinq plis en forme d'écaillés; cinq pétales très-petits, squamiformes, rarement nuls; cinq étamines opposées aux pétales; ovaire trigone, surmonté d'un style et d'un stigmate tronqué, obscurément tridenté. Le fruit est une baie sèche placée sur la base persistante du calice, à trois coques déhiscentes et monospermes. Ainsi défini, le genre *Colletia* diffère de *Rhamnus* par son fruit à trois coques, et du *Ceanothus* avec lequel

il a beaucoup de rapports, par son calice velu intérieurement, par ses fleurs hypétales ou pourvues de petits pétales dans onglets, par son style simple, son stigmate à trois dents peu apparentes, et surtout par son port. Selon Ventenat, quelques espèces de Colléties ne sont apétales que par avortement, comme dans le *Rhamnus alaternus*, L., et les cinq plis squamiformes qui se trouvent à la base du calice, pourraient représenter la corolle.

Les Colléties sont des Arbrisseaux à feuilles et à rameaux opposés. La plupart sont très-épineux et d'un aspect maigre et désagréable. Ils habitent tous l'Amérique méridionale et principalement le Pérou, où l'espèce sur laquelle le genre a été primitivement constituée, fut trouvée par J. Jussieu. Ventenat en a décrit et figuré plusieurs espèces dans l'ouvrage mentionné plus haut. (G.N.)

**COLLETIER.** BOT. PHAN. *V.* COLLETIE.

**COLLETS.** BOT. CRYPT. (*Champignons*.) Nom impropre par lequel Paulet désigne diverses espèces d'Agarics dont le pédicule est entouré d'un collet ou anneau; il appelle :

**COLLETS EN FAMILLE**, certaines espèces d'Agarics croissant en touffe au pied des Arbres.

**COLLETS SOLITAIRES.** Le même auteur nomme ainsi une famille d'Agarics croissant isolément et dont le stipe est cylindrique et garni d'un anneau. *V.* AGARIO. (AD. B.)

**COLLI ET HOLLI-RAY.** BOT. PHAN. Syn. chinois d'*Aletris chinensis*. (B.)

**COLLIBRANCHE.** POIS. Syn. de Sphagèbranche à museau pointu. *V.* SPHAGÈBRANCHE. (B.)

**COLLIER.** OIS. Nom que l'on donne à une bande de couleur tranchante qui ceint une partie du cou chez diverses espèces d'Oiseaux. Cette marque distinctive fournit assez souvent la dénomination spécifique. (DR.Z.)

**COLLIER.** Collare. ROIS. Espèce du genre *Choctodon*. *V.* ce mot.

**COLLIER ARGENTÉ.** INS. Nom vulgaire du *Papilio Euphrasie*, L., qui appartient aujourd'hui au genre *Argyné*. *V.* ce mot. (E.)

**COLLIER.** ROT. *V.* COLLET ET ANNEAU.

**COLLIGUAY.** *Colligaya*. BOT. PHAN. Molina, dans son Histoire Naturelle du Chili, cite sous ce nom un Arbrisseau qui, par ses caractères, tout incomplets qu'ils sont, semble appartenir à la famille des Euphorbiacées, où il prend sa place non loin du *Sapium* et du *Stilligia*. Ses fleurs monoïques offrent un calice quadrifide sans appendices pétaloïdes ou autres. On observe dans les mâles huit étamines; dans les femelles trois styles, une capsule trigone, renfermant trois graines et s'ouvrant avec élasticité. Les feuilles sont opposées, un peu épaissies, denticulées sur leur contour et glabres sur leurs surfaces. Les fleurs mâles sont disposées en chatons axillaires au-dessous desquels naissent les femelles. (A.D.T.)

**COLLINARIA.** BOT. PHAN. (Ehart.) Syn. de *Koeleria*. *V.* ce mot. (B.)

**COLLINE.** GÉOL. *V.* MONTAGNES

\* **COLLINIER.** BOT. CRYPT. (Paulet.) Syn. de l'*Agaricus Collinus* de Scopoli. (AD. B.)

\* **COLLINSIE.** *Collinsia*. BOT. PHAN. Nuttall appelle ainsi (*Genera of north Am. Plants*, T. II, p. 45) un genre nouveau de la famille des Antirrhinées, caractérisé par un calice quinquéfide, une corolle monopétale irrégulière, bilabiale et fermée à son orifice. La lèvre supérieure est bide, l'inférieure a trois lobes dont le moyen est creux, carent et recouvert par les étamines et le style qui sont déclinés. La capsule est globuleuse, ordinairement à une seule loge, qui s'ouvre incomplètement en quatre valves et contient deux ou trois graines ombiliquées. Ce genre, voisin des *Antirrhinum* et des *Gerardia*, se

compose d'une seule espèce, *Collinsia verna*. Elle a été figurée dans le premier volume du Journal de l'Académie des Sciences naturelles de Philadelphie, pl. 9. C'est une Plante annuelle qui croît sur les bords de l'Ohio et dans d'autres parties des États-Unis. Sa tige porte des feuilles entières opposées ou verticillées, et des pédoncules axillaires uniflores, aussi opposés ou verticillés. (A. N.)

**COLLINSONIE.** *Collinsonia*. BOR. PHAN. Dans son *Herbarium Cliffortianum*, p. 14, Linné a dédié ce genre à Collinson, Anglais auquel la botanique doit la propagation de plusieurs espèces américaines, et notamment de celle qui a été le type du genre dont il agit. Il appartient à la Diandrie Monogynie et à la famille des Labiées, où le place près des Sauges et des Monarques, dans la section caractérisée par la présence de deux étamines seulement. Voici ses caractères : calice bilabié, dont le limbe supérieur est tridenté, l'inférieur bifide; corolle irrégulière, ayant un tube beaucoup plus long que le calice; un limbe à cinq lobes inégaux dont les quatre supérieurs ne sont que des dents peu saillantes; l'inférieur est très-long, frangé en un grand nombre de découpures linéaires, inégales et aiguës. Des quatre étamines, trois avortent, et il n'en reste qu'une seule globuleuse à la maturité. Nuttall observe qu'une espèce, le *Collinsonia anisata*, Pursh, a quatre étamines; et qu'une autre possède deux étamines avortées. Il ajoute qu'on a remarqué dans ce genre cette irritabilité des étamines qui les fait rapprocher alternativement du style à l'époque de la fécondation. Les Collinsonies sont des plantes sous-frutescentes, toutes indigènes de l'Amérique du nord. Nuttall en mentionne sept espèces dont six ont été décrites avec soin par Linné, Pursh, Aiton et Walter. Nous ne citons ici que les espèces cultivées dans les jardins d'Europe:

La **COLLINSONIE DU CANADA**, *Collinsonia canadensis*, L.; est une Plante vivace élevée de près d'un mètre; ses feuilles sont aiguës, cordiformes,

sessiles, dentées en scie, glabres et ridées. Elle porte des fleurs d'un jaune pâle et disposées en panicules trichotomes et terminales. Elle habite les forêts de la Virginie et du Canada. On la cultive en pleine terre et elle résiste aux hivers ordinaires, aussi bien à peu près que les Sauges dont la culture est si facile; mais elle demande un terrain plus frais et d'un meilleur fond. Cette Plante contribuerait à l'ornement et à la variété des parterres, si elle fleurissait moins rarement.

La **COLLINSONIE A TIGE RUDE**, *Collinsonia scabruscula*, Ait. H. Kew., a ses feuilles et sa tige couvertes de poils denses et un peu rudes. Elle croît dans la Floride, et on la cultive chez nous dans l'orangerie. (G. N.)

**COLLIROSTRES.** INS. *V. AUCHÉ-NORRHYNQUES.*

**COLLIS.** BOT. PHAN. Syn. chinois de *Dracæna terminalis*, L. *V. DRACONNIER.* (B.)

\* **COLLITORQUIS.** ORS. (Cælius.) Syn. du Torcol, *Yuna Torquilla*, L., appelé *Collitorio* en italien. *V. TORCOL.* (DELL.)

**COLLIURE.** *Colluris*. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, famille des Carabiques, tribu des Cicindelides. Degeer a donné ce nom à un genre qu'il a établi sur un Insecte qui, d'après Latreille, doit appartenir à la tribu des Carabiques et qui lui paraît devoir être réuni aux Agres de Fabricius. Latreille s'en sert pour désigner un genre dont les caractères sont : antennes sensiblement plus grosses vers le bout, avec le troisième article long, très-comprimé et courbé; palpes labiaux plus grands ou aussi grands que les maxillaires extérieurs, avec le dernier article presque en forme de triangle renversé; yeux très-élevés supérieurement, comme pédicelés; point de dent au milieu de l'échancrure du menton; cône labial presque cylindrique, rétréci près de l'extrémité antérieure; pénultième article de tous les tarses, dans les mâles,

prolongé antérieurement et obliquement en manière de lobe ou d'appendice ovale: abdomen allongé presque cylindrique. Les Colliures sont des Insectes propres aux Indes-Orientales, dont on ne connaît encore ni les métamorphoses ni les mœurs: ils se distinguent facilement des autres genres de Cicindelètes par leur forme allongée, par le corselet et par la dilatation des tarses dans les mâles.

Fabricius, qui a substitué à la dénomination primitive de ce genre celle de *Collyris*, en décrit trois espèces. La principale et la plus connue est le COLLIURE LONGICOLLE, *Colliuris longicollis*, Fabr. On a reçu de Java une nouvelle espèce très-voisine de celle-ci et que Latreille nomme COLLIURE DE DIARD, *Colliuris Diardi*, en l'honneur du voyageur qui l'a découverte. (G.)

**COLLOCOCUS.** BOT. PHAN. (Brown.) Deux espèces de *Cordia*. V. SÉBESTIER, et non SESBAN, comme l'indique le Dictionnaire de Dérerville. (B.)

\* **COLLOMIE.** *Collomia*. BOT. PHAN. Genre de la famille des Polémoniacées et de la Pentandrie Monogynie, L., établi par Nuttall (*Genera of north Amer. Plants*) et dont le *Phlox linearis*, Cav. (*Icon.* 6, p. 17, t. 527) est le type. Ses caractères consistent en un calice cyathiforme, large et à cinq dents aiguës; en une corolle infundibuliforme dont le limbe est à cinq lobes ovales, oblongs, courts, et le tube étroit, long et grêle. La capsule offre trois pointes à son sommet. Elle est à trois loges monospermes et s'ouvre en trois valves obcordiformes. Les graines sont oblongues, anguleuses, enveloppées d'une couche de mucilage très-épais.

Ce genre tient le milieu entre les *Phlox* et les *Polemonium*. (A. R.)

\* **COLLORED FALCON.** OIS. (Pennant.) Syn. du Gerfaut, *Falco islandicus*, L. V. FAUCON. (DR..Z.)

\* **COLLO-ROSSO.** OIS. Syn. vulgaire du Millouin, *Anas ferina*, L. V. CANARD. (DR..Z.)

**COLLOTORTO.** OIS. V. COLLYTORQUIS.

**COLLURIE.** OIS. Syn. de Pie-Grièche. V. ce mot. (DR..Z.)

**COLLURIENS.** OIS. Desmarest a formé sous ce nom une division du genre Tangara dont quelques espèces se rapprochent des Pie-Grièches. V. TANGARA. (DR..Z.)

\* **COLLURIO.** OIS. Nom scientifique de l'Ecorcheur. V. PIE-GRIÈCHE. (DR..Z.)

**COLLURIONS.** *Colluriones*. OIS. Nom donné par Vieillot à une famille de l'ordre des Oiseaux sylvains, qui comprend une partie des genres de l'ordre des Insectivores de la méthode de Temminck. V. INSECTIVORES. (DR..Z.)

**COLLYBITE.** OIS. Espèce du genre Sylvie, *Motacilla rufa*, Gmel. V. SYLVIE. (DR..Z.)

**COLLYRION.** OIS. Même chose que Collurie. V. ce mot. (DR..Z.)

\* **COLLYRION.** MIN. Nom sous lequel on connaissait la Terre ou Argile de Samos, dont Théophraste, Pliny et Dioscoride ont parlé; on en distinguait deux variétés sous les noms d'*Aster* et de *Collyrion* proprement dits. L'*Aster* était blanc, granuleux, et avait la densité d'une pierre à arguier; le *Collyrion* était doux au toucher, happait à la langue, était mou et friable, et, d'après Pliny, il paraissait être cendré, tandis que l'*Aster* était blanc. D'après ces caractères et ces propriétés, on est porté à croire que l'*Aster* avait des rapports avec les Argiles Kaolin et Cimolithe, et que le *Collyrion* pouvait en avoir avec l'Argilloplastique. V. ces mots. G.

**COLLYRIS.** INS. V. COLLYRE.

\* **COLLYRITE** ou **KOLLYRIT** MIN. Espèce d'Argile. V. ARGILLE. COLLYRITE. G.

**COLMA.** OIS. Espèce du genre Fourmillier, *Turdus Colma*, Latr. V. FOURMILLIER. (DR..Z.)

\* **COLMELE, COQUEMELE, COUTEMELLE** et **COUANELLE** BOT. CRYPT. Noms vulgaires de l'*Ericus procerus* de De Candolle. G.

\* **COLMENILLAS.** BOT. CRYPT.

Comme qui dirait *petites ruches*. Syn. de Morille en espagnol. (B.)

**COLNUD.** ois. Espèce du genre Coracine, *Corvus nudus*, Gmel., *Gracula festida*, Lath. V. CORACINE. (DR..Z.)

**COLOBACHNE.** BOT. PHAN. Beauvois a établi ce genre dans son Agrostographie pour le *Polypogon vaginatus* qui diffère du genre *Polypogon* par les deux valves de sa lépicène implemment aiguës et non sétifères, par la valve inférieure de sa glume qui est tronquée et trifide à son sommet, et qui porte une arête naissant un peu au-dessous du milieu de sa face externe. (A. R.)

**COLOBE.** *Colobus*. MAM. (Illiger.) V. GUENON.

**COLOBIQUE.** *Colobicus*. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, famille des Clavicornes, tribu des Nitidulaires, établi par Latreille (Consid. génér., p. 177), dont les caractères sont : antennes terminées en massue solide, orbiculaire, de deux articles ; bouche recouverte par un avancement arrondi et en forme de chaperon à l'extrémité antérieure de la tête ; corps ovale et déprimé ; élytres recouvrant entièrement le dessus de l'abdomen.

Ce genre se distingue des Nitidules : des *Peltis*, auxquels il ressemble beaucoup, par ses mandibules, et surtout par l'espèce de chaperon qui recouvre la tête. La seule espèce bien connue est le **COLOBIQUE BORDÉ**, *Colobicus marginatus* de Latreille, qui est figuré dans le *Genera Crust. et Ins.* de Latreille, T. 1, pl. 16, f. 1. On le trouve aux environs de Paris, sous les écorces des Ormes. Rossi l'a décrit sous le nom de *Nitidula hirta* (Faun. trusc. T. 1, p. 59, t. 3, f. 9). Le *ermeste lunulé* de Paykull et de Fabricius pourrait bien appartenir à ce genre. (G.)

**COLOBIUM.** BOT. PHAN. Nom donné primitivement par Roth à un genre de Chicoracées, qu'il a depuis changé pour celui de *Thrinia* adopté aujourd'hui par tous les botanistes. V. THINCE. (G..N.)

\* **COLOBOTHÉE.** *Colobotheca*. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères, fondé par Dejean (Catal. des Coléopt., p. 108) aux dépens des Saperdes de Fabricius. Les caractères de ce nouveau genre sont encore inédits ; il comprend huit espèces originaires du Brésil ou de Cayenne. (AUD.)

\* **COLOBRITGENS.** ois. Syn. vulgaire des Colibris à Surinam. (DR..Z.)

**COLOCASIE.** *Colocasia*. BOT. PHAN. Espèce du genre *Arum*. V. GOUET. (B.)

**COLOCHIERNI.** BOT. PHAN. Syn. de Chardon dans l'île de Crète. (B.)

**COLOCOLLA** ou **COLOCOLO.** MAM. Espèce de Chat du Chili mentionnée par Molina, mais encore imparfaitement connue. (B.)

**COLOCOLO.** ois. Syn. d'une espèce de Cormoran ou de Pélican des Philippines, qui paraît avoir beaucoup de ressemblance avec le grand Cormoran, *Pelecanus Carbo*, L. (DR..Z.)

**COLOCYNTIDA.** BOT. PHAN. Ce nom désigne la Coloquinte dans la Bible, *Colocynthis* des Grecs et des Latins, ou peut-être le *Cucurbita lagenaria*, L. (B.)

**COLOETIA, COLOITIA** ET **COLYTEA.** BOT. PHAN. D'où *Colutea*. Noms du Baguenaudier chez les Grecs. (B.)

**COLOMANDRA.** BOT. V. DOUGLASSIA.

**COLOMBADE.** ois. Syn. provincial de Fauvette. V. ce mot. (DR..Z.)

**COLOMBAR.** ois. Nom donné par Levaillant et Temminck à une division des Pigeons dont Cuvier a fait un sous-genre. V. PIGEON. (DR..Z.)

\* **COLOMBAR-COMMANDEUR.** ois. (Temm.) Syn. du Pigeon vert de l'île Saint-Thomas, *Columba St.-Thomæ*, Lath. V. PIGEON. (DR..Z.)

**COLOMBASSE.** ois. Syn. vulgaire de la Litorne, *Turdus pilaris*, L. V. MERLE. (DR..Z.)

\* **COLOMBATES.** Résultats de la combinaison de l'Acide colombique avec les bases salifiables. (DR..Z.)

\* **COLOMBAUDE.** ois. (Buffon.)  
Syn. présumé de la Sylvie cendrée.  
V. *Sylvia*. (DR..Z.)  
**COLOMBE.** *Columba*. ois. Syn. de  
Pigeon. V. ce mot.

\* **COLOMBE DU GROENLAND.**  
ois. Syn. vulgaire du Guillemot à  
miroir blanc, *Colymbus Grylle*, L.  
V. *GUILLEMOT*. (DR..Z.)

\* **COLOMBE-LARGÜP.** ois.  
(Temm.) Syn. du Pigeon cendré fer-  
ruginéux, *Columba pacifica*, Lath.  
V. *PIGEON*. (DR..Z.)

\* **COLOMBE LUMACHELLE.** ois.  
(Temm.) Syn. du Pigeon aux ailes  
bronzées, *Columba chateoptera*, Lath.  
V. *PIGEON*. (DR..Z.)

**COLOMBEIN.** ois. Syn. vulgaire  
du Tourne-Pierre, *Thinga interpres*,  
L. V. *TOURNE-PIERRE*. (DR..Z.)

**COLOMBELLE.** *Colombella*. MOLL.  
Le genre Colombelle, établi par La-  
marck, le premier de ses Columellai-  
res, aux dépens du genre immense des  
Volutes de Linné, est si naturel que  
tous les conchyliologues, après lui,  
l'ont admis; ou comme genre, ou  
comme sous-genre. Montfort (*Con-  
chyl. Syst.* T. II, p. 591) et Férussac  
(*Hist. des Moll. prod.* p. xxxv) l'ont  
conservé comme genre, et lui ont  
laissé le même nom. Cuvier (*Regn.  
Anim. T. II.* p. 433) en fait un sous-  
genre de Volutes. Quoique ce genre  
n'ait pas été caractérisé plus tôt, cela  
n'empêche pas qu'antérieurement on  
n'ait connu plusieurs Coquilles qui y  
appartiennent; mais répandues soit  
parmi les Buccins, soit parmi des  
Volutes ou d'autres genres, leurs ca-  
ractères génériques avaient échappé;  
il était pourtant facile de les réunir,  
car elles ont toutes un air de famille  
qui les fait distinguer au premier as-  
pect. Caractères: Animal trachelipode,  
dont la tête est munie de deux tenta-  
cules, portant les yeux au-dessous de  
leur partie moyenne; un siphon au-  
dessus de la tête pour la respiration;  
un petit opércule, trop petit pour  
fermer tout-à-fait la coquille, est at-  
taché au pied; coquille ovale, à spire  
courte, à base de l'ouverture plus  
ou moins échancrée et sans canal; des

plis sur la columelle; un renflement  
à la partie interne du bord droit rétré-  
cissant l'ouverture. Comme les es-  
pèces de ce genre sont nombreuses,  
il nous est impossible de les présen-  
ter toutes; nous nous contenterons  
d'en choisir quelques-unes des mieux  
caractérisées.

**COLOMBELLE ÉTOILÉE,** *Colombella  
rustica*. C'est le Siger d'Adanson  
(Sénég. pl. 9, fig. 28) et la *Voluta  
rustica*, L. (p. 3447, n° 36), figu-  
rée dans Martini (*Conchyl.* t. 44,  
f. 470) et dans Knorr (*Verg.* 6, tab.  
18, fig. 4). Elle est assez variable  
dans ses couleurs qui sont plus  
ou moins foncées, lisse, ovale et  
réticulée de rouge brun, à mailles  
plus ou moins grandes sur un fond  
blanc. Elle est ornée de taches blan-  
ches stellées irrégulièrement autour  
de la spire près des suture. On la  
trouve très-communément dans la  
Méditerranée, l'océan Atlantique et  
celui des Antilles. Elle est longue de  
neuf à dix lignes.

**COLOMBELLE RUBANÉE,** *Colombella  
mendicaria*, *Voluta mendicaria*, Lin.  
(p. 3448, n° 38), très-bien figurée  
dans Knorr (*Verg.* 4, tab. 16, fig. 5)  
et dans l'Encycl. (pl. 375, fig. 10, A,  
B). Elle se reconnaît facilement par  
ses bandes alternatives blanches ou  
jaunes et noires, et son dernier tour  
subnoduleux strié à sa base.

**COLOMBELLE TOURTERELLE,** *Col.  
turturina*, Lamk! (*Anim.* sans vert.  
T. VII, p. 296, n° 15); *Encycl.* (pl.  
374, fig. 2, A, B). Celle-ci, outre qu'elle  
n'est guère plus longue que large, est  
très-remarquable par l'épaisseur de sa  
lèvre droite, qui rétrécit singulière-  
ment l'ouverture, laquelle est grima-  
cante et fortement plissée des deux  
côtés. La coquille est blanche, lisse  
supérieurement, striée à sa base et  
ornée de points ou de petites bandes  
irrégulières brunâtres.

**COLOMBELLE COMMUNE,** *Colombel-  
la mercatoria*, Lamk! (*Anim.* sans vert.  
T. VII, p. 294, n° 3), *Voluta merca-  
toria*, L. (p. 3446, n° 35). Le Sta-  
ron d'Adanson (Sénég. pl. 9, fig. 29),  
le Colombelle marchand de Montfort



*Conch. Syst.* T. II, p. 591), figurée dans Martini (*Conch.* 2, t. 44, fig. 52 à 458), et dans l'Encyclopédie pl. 375, fig. 4, A, B). Cette espèce est très-commune, marquée transversalement, dans toute son étendue, de flos assez profonds; elle est ovale, pisse; la lèvre droite est renflée et entée. Pour d'autres espèces, nous envoyons à l'ouvrage de Lamarck Anim. sans vert. T. VII, p. 392).

(D. H.)

\* COLOMBELLIER. MOLL. Animal de la Colombelle. V. ce mot. (B.)

COLOMBETTE. BOT. CRYPT. (*Champignons.*) Nom vulgaire, dans la Manche-Comté et l'Alsace, d'un Agaric très-recherché et très-bon à manger. C'est l'*Agaricus Columbetta* de L. qui regarde l'*Agaricus leucophthalmus* de Bulliard, t. 428, fig. 1, ab. 536, comme une simple variété de cette espèce.

(AD. B.)

COLOMBIE. *Columbia*. BOT. PHAN. Le genre, que l'on rapporte à la famille des Tiliacées et à la Polyandrie monogynie, L., avait d'abord reçu de Cavanilles le nom de *Colona*. Persoon l'a changé en celui de *Columbia*, tout en entrant, dit-il, dans les vues de Cavanilles qui voulait, par la délicatesse d'une belle Plante, exprimer la reconnaissance que doit l'Amérique au célèbre Christophe Colomb, et qui, par son mot de *Colona*, était compris de personne. On lui a donné les caractères suivans : calice à cinq divisions intérieurement colorées et persistantes; corolle composée de cinq pétales, ayant à leur base une petite écaille; étamines nombreuses hypogynes; ovaire tétragone, surmonté d'un style et d'un stigmate; fruit capsulaire à quatre expansions membraneuses en forme d'ailes, et à quatre loges mono ou dispermes. Ce genre, ainsi caractérisé, ne diffère guère du *Grewia* que par les ailes de son fruit. L'espèce encore unique dont il se compose, *Columbia americana*, Pers., *Colona serratifolia*, Cav. Icon. 4; p. 47, t. 370), est un Arbre de six à sept mètres, à rameaux nombreux et duvetés dans leur jeunesse, à

feuilles presque sessiles, très-grandes, rudes en dessous, ovales, lancéolées et dentées en scie. Les fleurs, environnées à leur base d'une espèce d'involute à trois folioles, sont disposées en grappes axillaires. Cet Arbre croît près de Bannos, dans les îles Philippines; Persoon a donc commis un contre-sens dans le nom spécifique qu'il lui a imposé. En conséquence, De Candolle (*Prodr. Syst. Veg.*, t. 1, p. 512) lui a restitué celui de *serratifolia*.

(A. N.)

\* COLOMBI-CAILLE. OIS. Syn. de la Tourterelle hottentote, *Columba hottentota*, Temm., Levaill. (Ois. d'Afrique, pl. 282). V. PIGEON. (N. Z.)

COLOMBI-GALLINES. OIS. Espèce de Pigeon, *Columba carunculata*, qui sert de type à une division de ce genre, indiquée par Levaillant et Temminck, adoptée comme sous-genre par Cuvier, et qui renferme les Pigeons Joura, Nicobar, etc. (N. Z.)

COLOMBINA. OIS. Syn. vulgaire de la Draine, *Turdus viscivorus*, L. V. MERLE. (D. Z.)

\* COLOMBINA. POIS. Nom sicilien d'une espèce de Squalé peu connu, que Schneider a nommé *Squalus Vaccaca*.

(S.)

COLOMBINE. ZOOL. On désigne sous ce nom les excréments des Pigeons et autres Gallinacées, qui sont considérés comme l'engrais le plus chaud et le plus actif.

(D. Z.)

COLOMBINE. BOT. PHAN. Ce nom a été vulgairement appliqué à l'*Aquilegia vulgaris*, à une variété de l'*Anémone orientale* cultivée, et au *Thalictrum aquilegifolium*.

(B.)

COLOMBINS. *Columbini*. OIS. (Vieillot.) Famille de l'ordre des Oiseaux sylvains, qui comprend les genres Treron, Pigeon et Goura, de la méthode de Vieillot.

(D. Z.)

\* COLOMBIQUE. MIN. (Acide.) V. ACIDE.

COLOMBITE. MIN. Nom sous lequel Hattchet désigne un Métal dans lequel il avait cru voir un nouveau Métal qu'il appelait *Colombium*. Wollaston a reconnu que c'était le même

que celui du *Tantalite*. *V.* ce mot et *COLOMBIUM*. (G. DEL.)

**COLOMBIUM.** MIN. Métal d'un gris sombre, assez brillant, dur, susceptible de rayer le verre; fragile, pulvérisable par la trituration; peu fusible, absorbant à une température élevée 0, 04 à 5 d'Oxigène, et se convertissant ainsi en Acide columbique. Il est presque insoluble dans les Acides, etc., etc. Sa découverte, qui date de 1801, fut le résultat de l'analyse d'un Minéral de Massachusetts aux Etats-Unis, faite par le chimiste Hatchet. Ce Métal a depuis fixé l'attention de divers chimistes qui, en confirmant la découverte de Hatchet, ont conservé au nouveau Métal un nom qui vaut bien ceux empruntés aux corps célestes, puisqu'il consacre la mémoire de Christophe Colomb. (DR..Z.)

**COLOMBO.** BOT. PHAN. Pour *Colombo*. *V.* ce mot.

\* **COLOMESTRUM.** BOT. *V.* *CYNOCTONUM*.

\* **COLONNAIRE.** BOT. PHAN. Ce mot, qui désigne un organe en forme de colonne ou de cylindre, s'applique spécialement à l'androphore des Malvacées. Dans celles-ci, une disposition si caractéristique des étamines leur a valu le nom collectif de *Colonnées* (*Columnnate*), donné par Linné, dans ses ordres naturels, aux Plantes de cette famille. *V.* *ANDROPHORE* et *MALVACÉES*. (G..N.)

**COLOMNÉE.** *Columnnea*. BOT. PHAN. Genre de la famille des Gesnériées de Richard et de la Didymie Angiospermie; L., distingué par les caractères suivants: son calice est à cinq divisions profondes et un peu inégales; sa corolle est monopétale, irrégulière et bilabée, ayant son tube bossu sur l'un des côtés de sa base; laèvre supérieure est en voûte à deux ou quatre lobes; dans ce dernier cas l'inférieure est formée d'un seul lobe étroit; dans le premier elle est à trois divisions. Les étamines sont au nombre de quatre et didymes, ayant les anthères rapprochées et comme agglomérées; l'ovaire est

libre et accompagné à sa base par un disque hypogyne latéral et en forme d'écusson; coupé transversalement, il offre une seule loge, aux parois de laquelle sont attachés deux trophospermes d'abord simples; puis bipartis, recouverts d'une multitude d'ovules extrêmement petits; du sommet de l'ovaire naît un long style qui se termine par un stigmaté simple et concave. Le fruit est une capsule à parois un peu charnues, enveloppée dans le calice persistant, à une seule loge contenant un grand nombre de graines attachées à deux trophospermes pariétaux saillans et rapprochés vers le milieu de la loge, de manière à représenter en quelque sorte un fruit biloculaire. Les Colonnées sont des Plantes herbacées, ayant les feuilles opposées, la tige grimpante ou étalée, et les fleurs grandes et généralement solitaires à l'aisselle des feuilles.

On a retiré de ce genre les espèces à corolle régulière pour en former le genre *Cyrilla*; telle est surtout la *Columnnea erecta* de Lamarck, qui est le *Cyrilla putchella* de l'Héritier (*Stirpes*, tab. 71). (A. R.)

\* **COLON.** ZOOL. *V.* *INTESTINS*.

**COLON.** OIS. (Azzara.) Espèce du genre Moucherolle, *Muscicapa Colonus*, Vieill. *V.* *MOUCHEROLLE*. (DR..Z.)

**COLONA.** Et non *Colonie* ou *Colonia*. BOT. PHAN. C'était le nom donné primitivement au genre *Columbia* par Cavanilles. (G..N.)

**COLONIE.** *Colonia*. BOT. PHAN. Du Dictionnaire de Dérerville. *V.* *COLONA* et *COLOMBIE*.

\* **COLONNARIA.** BOT. CRYPT. (*Champignons*.) Genre fondé par Rafinesque, mais qui ne paraît devoir former qu'une section des *Clathrus*. Il en diffère par ses branches charnues qui, au lieu d'être anastomosées comme dans les vrais *Clathrus*, sont simples et réunies au sommet, et portent les séminules sur leur bord. La seule espèce connue est le *Clathrus columnatus*, Bosc. Rafinesque en indique deux autres sous les noms de

*Colonnaria urceolata*, et *truncata*.

(AD. B.)

**COLONNE ARTICULÉE.** MOLL. (KNOTT.) *V. TELEPHITE*.

**COLONNE TORSÉE.** MOLL. C'est le nom qu'on donne vulgairement à une jolie Coquille très-rare, que Bruguière a nommée *Bulime flambé*, *Bulimus Columna*, et que Lamarck a placée parmi les *Lymnées*, mais à tort ; car cette Coquille est terrestre, et doit faire partie du genre *Bulime*. *V. ce mot.* (D. H.)

**COLOOCE.** BOT. PHAN. Marsden désigne sous ce nom une espèce d'Ortie employée à Sumatra pour faire du fil. (B.)

**COLOPHANE.** BOT. PHAN. Suc résineux des *Pinus sylvestris* et *maritima*, L., que l'on dessèche au feu dans des chaudières afin d'en chasser l'humidité et l'huile volatile de Térébenthine. On le coule bouillant dans des baquets où il se prend en masses solides par le refroidissement. La Colophane est brune, transparente, solide, légèrement amère, fusible, inflammable, brûlant en répandant une fumée épaisse et une odeur peu agréable. Elle est employée dans la confection de certains médicaments externes, à la fabrication des vernis communs, etc., etc. On en frotte l'archet des instrumens afin qu'il ne glisse pas sur les cordes, ce qui s'opposerait à leur vibration, conséquemment à la production des sons. *V. ce mot.*

On donne aussi le nom de Colophane à diverses sortes de bois. *V.*

**COLOPHONIA** et **MARIANTA.** (DR. Z.)

**COLOPHERME.** *Colophermum*. BOIS. CRYST. Genre établi par Rafinesque et qui pourrait appartenir également à la famille des Conservées ou à celle des Céramesines ; d'après le peu qu'il en dit. Ses caractères sont : filaments cloisonnés ; gongyles terminaux et solitaires. La seule espèce de ce genre, observée, est la *Colophermum docton*, qui vit dans les mers de Sibirie, et dont les liges nageoires forment des flocons plus ou moins épais. *V. ce mot.* (B.)

**COLOPHON.** OIS. (Lachênaye-Desbois.) Syn. péruvien d'un Oiseau pêcheur que l'on soupçonne être une espèce de Héron. (DR. Z.)

**COLOPHONE.** BOT. PHAN. Même chose que Colophane. *V. ce mot.* (B.)

**\* COLOPHONIA.** BOT. PHAN. Commerson avait nommé ainsi un Arbre résineux, connu à l'Île-de-France sous le nom de *Bois de Colophane*, à feuilles pinnées, à fleurs dont le calice est trifide, la corolle tripétale ; les étamines au nombre de trois, et l'ovaire ayorté. Il est congénère du *Bursera* ; selon Lamarck et Jussieu (*Genera Plantarum*, p. 372). *V. GOMMART.* (G. N.)

**COLOPHONITE.** MIN. On donne ce nom à une variété de Grenat d'un jaune roussâtre, ayant un aspect analogue à celui de la Résine appelée Colophane. On la trouve en Suède, dans l'île de Ceylan et en Toscane. *V. GRENAT RÉSINITE.* (G. DESJ.)

**COLOQUINELLE.** BOT. PHAN. (Duchesne.) Variété de Pépon. *V. ce mot.* (B.)

**COLOQUINTE.** BOT. PHAN. Espèce du genre *Concombre*. *V. ce mot.* (B.)

**COLOS** ou **COLUS.** MAM. (Strabon.) Syn. présumé de Saïga, espèce d'Antilope. *V. ce mot.* (B.)

**COLOSTIS.** BOT. PHAN. Syn. présumé de *Pyrèthre*. *V. ce mot.* (B.)

**COLOSTOS.** BOT. PHAN. Syn. de *Costus*. *V. ce mot.* (B.)

**\* COLOSTRUM.** ZOOL. *V. ALLAITEMENT.*

**COLOUASSE.** OIS. *V. CALOUASSE.*

**\* COLPESCE.** POIS. L'un des noms italiens de l'*Accipenser Huso*. *V. ESTURGEON.* (B.)

**\* COLPODIUM.** (BOT.) PHAN. Trinius, dans son ouvrage intitulé : *Fundamenta Agrostographiæ*, a établi sous ce nom un genre nouveau de la famille des Graminées ; auquel il donne pour caractères : des fleurs disposées en panicule, ayant la lépée à deux valves aiguës, plus courtes que celles de la glume qui sont allongées, résistantes, minces et transparentes à leur sommet où elles sont obtusés et érosés. La cariopse

est allongée et non enveloppée dans les écailles florales.

Ce genre se compose de deux espèces : *Colpodium monandrum*, Trin., qui est originaire de l'Amérique septentrionale, et *Colpodium Steveni* ou *Agrostis versicolor* de Steven. Il se rapproche beaucoup du genre *Agrostis*, et en particulier des espèces qui forment le genre *Vilfa* d'Adanson et de Beauvois. (A. R.)

**COLPOON.** BOT. PHAN. Bergius a donné ce nom à un Arbrisseau du cap de Bonne-Espérance, que Linné a constitué, de son côté, en un genre particulier, nommé *Fusanus*, mais qui, selon son fils, rentre dans le genre *Thecium*. Néanmoins, Rob. Brown en a de nouveau rétabli la distinction. D'ailleurs, l'inspection seule de la Plante suffit pour se convaincre que ce ne peut être un *Thecium*. *V. FUSANTIS.* (G. N.)

\* **COLQUHOUNIE.** *Colquhounia*. BOT. PHAN. Le docteur Wallich, surintendant du magnifique jardin de Calcutta, a publié sous ce nom (*Trans. of Lin. Soc. of Lond.*, vol. 15, p. 608) un beau genre de la famille des Labiées, qui est voisin des genres *Leucas* de Burmanni et *Dracocephalum*, mais qui s'en distingue par plusieurs caractères, et notamment par la forme et la grandeur de ses fruits.

Le *Colquhounia coccinea*, Wall., la seule espèce dont ce genre est composé, est un Arbruste volubile, légèrement tomenteux, portant des feuilles ovales, dentées en scie, un peu rudes, et de grandes fleurs rouges, axillaires, diversement disposées; leur calice est cylindrique, à cinq dents égales, rapprochées après la floraison; la corolle est à deux lèvres; la supérieure concave et bidentée; l'inférieure à trois lobes, celui du milieu plus petit et entier; les quatre étamines didynames sont ascendantes; le style est terminé par un stigmate à deux lobes inégaux; les akènes sont très-grands et ailés; chaque graine contient un embryon dressé

au milieu d'un grand endosperme. Cette belle Plante croît dans les montagnes du Napaul où elle a été découverte par Wallich. (A. R.)

**COLSA.** BOT. PHAN. Pour Colza. *V. CHOU.* (B.)

**COLT.** BOT. PHAN. *V. CALAB.*

\* **COLTOTL.** ois. (Hernandez.)

Espèce du Mexique encore peu connue, et que l'on soupçonne appartenir au genre Gros-Bec. (DE. Z.)

**COLTRAICHE.** ois. Syn. vulgaire en Angleterre du Pingouin macrop-tère, *Alca torda*, L. *V. PINGOUIN.* (DE. Z.)

\* **COLTRICIONE.** BOT. PHAN. (Micheli.) Champignons que le même auteur nomme ailleurs *Polyporus alpinus*, tab. 71, f. 2. (B.)

**COLTSFOOT.** BOT. PHAN. Syn. d'Asaret en Virginie, et de *Tussilago Farfara* en Angleterre. (B.)

**COLUBER.** REPT. OPH. *V. COULEVRE.*

\* **COLUBRA DE MER.** pois. (Delaroché.) C'est-à-dire *Coleura de mer*. Syn. d'*Ophisurus Serpens*, Lac., à Ivica. *V. OPHISURE.* (B.)

**COLUBRI.** ois. (Salerno.) Syn. de Colibri. *V. ce mot.*

**COLUBRIN.** REPT. OPH. Espèce du genre Anguis ou Orvet. *V. ce mot.* (B.)

**COLUBRINA.** BOT. PHAN. Syn. italien de Bistorte. *V. RETORTUE.* Nom espagnol de l'*Ophiorhiza Mangos*; et en vieux français l'*Arun Dracuncul.* (B.)

**COLUBRINE.** *Cotubrina.* pois. Ce genre, qui n'a pas même été mentionné par Cuvier, a été fondé par Lacépède d'après une peinture de la Chine, et pourrait être conséquemment d'une existence douteuse. Son inventeur lui assigne pour caractères: point de dorsale; l'angle étroite et courte; caudale fourchue; tête et corps très-allongés; crâne couvert de plaques comme dans les Serpens. Lacépède n'en cite qu'une espèce, qu'il dit être d'un bleu argenté sans aucune tache. (B.)

\* **COLUBRINE.** BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires de la Bryone. (B.)

**COLUBRINE. MIN. V. SERPENTINE.**

\* **COLUBRINS. *Colubriai.* REPT.** M. Opper désigne sous ce nom son petit ordre des Ophiidiens qui ont pour caractères leur queue arrondie, us mince que le corps; point de crochets à venir, mais des plaques caudales, le plus souvent doubles.

(B.)

**COLUDDLYS. BOT. PHAN.** Synonyme de Poulia, espèce du genre lenthe. V. ce mot.

(B.)

\* **COLUM. BOT. PHAN.** Salisbury a écrit ce mot en remplacement de plantain, ou de la partie du périsperme qui donne attache aux graines.

(G.N.)

**COLUMBA. OIS. V. PERON.**

**COLUMBA. BOT. PHAN.** L'un des noms anciens du Grémil.

(B.)

\* **COLUMBAIRE. *Columbaria.* OT. PHAN.** Espèce du genre Scabieuse. Nous avons remarqué qu'en Espagne on la Scabieuse colombeira est communément des Méridiens la recherchaient.

(B.)

\* **COLUMBARIS. BOT. PHAN.** L'un des anciens noms de la Verveine. V. ce mot.

(B.)

**COLUMBASSE. OIS. V. COLOMBASSE.**

**COLUMBEE. *Columbes.* BOT. PHAN.** Dans les Transactions de la Société Linnéenne, n. 8, Salisbury a ainsi nommé un genre identique avec le *Dombeya* de Lamarck ou *Araucaria* de Jussieu. V. ce dernier mot. D'ailleurs, le nom de *Columbea* ne saurait être admis à cause de sa consonnance avec le *Columbia* de Persoon. (G.N.)

**COLUMELLELLER. MOLL.** Pour Colomellier. V. ce mot.

**COLUMBIA. OIS.** Espèce du genre Corbeau; *Corvus Columbina*, Wils. De l'Amérique septentrionale. V. CORBEAU.

(DR.Z.)

**COLUMBE. BOT. PHAN.** Pour Colombie. V. ce mot.

\* **COLUMBIN. BOT. PHAN.** Espèce du genre Géranier; *Geranium columbinum*, L., commun dans toute la France.

**COLUMBITE ET COLUMBIUM.**

**MIN.** Pour Colombite et Columbium. V. COLUMBIUM et TANTALE.

**CUMBO. BOT. PHAN.** Vers l'année 1697, François Rédi a, le premier, fait connaître les propriétés médicales d'une racine apportée de l'Inde et surtout de *Cumbo*, ville de Ceylan. Quoique la Plante qui la produit ne fût pas originaire de cette île, on lui avait donné le nom du pays où elle était cultivée en quantité. Long-temps après, les médecins anglais, et surtout le docteur Percival, constatèrent par plusieurs expériences son efficacité comme tonique et surtout comme médicament propre à arrêter les diarrhées et les vomissements opiniâtres. Ils ne manquèrent pas d'exagérer les vertus, ce qui explique la célébrité dont elle a joui il y a cinquante ans, et l'oubli dans lequel on la laisse aujourd'hui. Mais, quelle que soit l'opinion qu'on se forme sur ses propriétés, on ne peut lui refuser une action bien prononcée, surtout en partant de la composition chimique donnée par Planche. Elle renferme environ un tiers d'amidon, une substance azotée, une matière jaune et amère, et des traces d'huile, de sel, etc. Si on la fait bouillir, l'amidon se dissout en même temps que la substance amère, et l'action du médicament est d'une toute autre nature que si on en prépare une infusion qui contient seulement la matière amère. Cette racine se vend dans le commerce sous la forme de rondelles jaunâtres ou d'un brun verdâtre, marquées de zones concentriques; elle a une saveur amère et une odeur désagréable. La Plante d'où on la tire est le *Cocculus palmarum*, D. C., Arbruste grimpant qui croît naturellement sur la côte de Mozambique; à Madagascar et dans le continent de l'Inde.

(G.N.)

**CUMELLELLAIRES. MOLL.** Famille établie par Lamarck (Anim. sans vert. T. VI, 2<sup>e</sup> part., p. 59; T. VII, p. 591), et qui renferme tous les genres présentant les caractères suivants: point de canal à la base de l'ouverture, mais une échancrure subdorsale plus ou

moins distincte, et des plis sur la columelle. Cette famille a été faite parmi les Trachélipodes (V. ce mot) et aux dépens du genre *Voluta* de Linné, et quoiqu'on ait ôté de ce genre immense toutes les Coquilles qui ont des plis à la columelle, mais dont l'ouverture est entière ou terminée par un canal plus ou moins long, cela n'empêche pas qu'elle ne reste formée de cinq genres qui tous sont généralement remarquables par le brillant des couleurs dont ils sont ornés. Cette famille nous semble fort naturelle; elle se compose des genres COLOMBELLE, MITRE, VOLUTE, MARGINELLE et VOLVAIRE. V. ces mots.

(D.H.)

COLUMELLE. *Columella*. MOLL.

Partie d'une Coquille spirivalve sur laquelle viennent s'enrouler tous les tours; c'est l'axe sur lequel ces tours s'appuient. V. COQUILLE. (D.H.)

COLUMELLE. *Columella*. BOT.

PHAN. Ce mot a été employé par divers auteurs pour désigner des genres de Plantes très-différens. Ainsi Loureiro a donné ce nom à un Arbrisseau grimpant qui diffère, dit-il, du genre *Cissus* par sa baie biloculaire, ses pétales agus, et surtout par l'insertion de ses étamines sur le bord du calice et non sur le nectaire. Ses autres caractères sont : calice monophylle, tronqué et persistant; corolle de quatre pétales, un peu recourbée en dedans; nectaire ou disque marqué de quatre sillons; quatre étamines à filets subulés plus petits que la corolle; baie arrondie renfermant deux graines rondes d'un côté et anguleuses de l'autre. Malgré la comparaison que Loureiro a faite de ce genre avec le *Cissus*, Roemer et Schultes ont indiqué sa place dans la famille des Rhannées, rapprochement que justifierait l'insertion des étamines, si, dans la recherche des affinités, on devait se contenter d'un seul caractère. Loureiro n'en a décrit qu'une espèce sous le nom de *Colum. pedata*, que les Cochinchinois appellent *Caynat lang*. L'impropriété du mot générique imposé par Loureiro

pouvant par la suite devenir une raison suffisante pour proposer son changement, j'aurais pensé qu'il serait convenable de latiniser le nom de pays, et d'en former le mot *Cayratia*.

Dans la Flore du Pérou et du Chili, Ruiz et Pavon ont donné le nom de *Columella* à un genre que Vahl a changé en celui de *Columellia* à cause de l'existence antérieure du *Columella* de Loureiro. Les botanistes ont, en général, adopté ce changement, et on doit y applaudir encore pour un autre motif; c'est que le mot *Columella*, étant employé pour désigner un organe des Végétaux, ne peut pas servir comme expression générique. V. COLUMELLIE. (G.N.)

COLUMELLE. *Columella*. BOT.

On appelle ainsi l'axe central qui existe dans l'intérieur de certains fruits secs, comme, par exemple, dans les Euphorbiacées, les Umbellifères. V. FRUIT, PÉRICARPE et AXE. (A.B.)

COLUMELLE. *Columella*. BOT.

CRYPT. (Mousses.) On donne ce nom à l'axe central qui traverse la capsule des Mousses. Cet axe dont la longueur varie beaucoup, tantôt s'élève à peine au-dessus du fond de la capsule, et tantôt dépasse son orifice et s'applique contre l'opercule, comme on l'observe dans les *Splachnum*, dans le *Tayloria* et dans le *Syatidium*, si bien décrit par Hornschuch. Elle offre même cette singularité, d'adhérer complètement à l'opercule qui est persistant: Palisot de Beauvois, dans son système sur le mode de reproduction des Mousses, regardait la Columelle comme l'organe femelle, et la perispière qui l'entoure comme le pollen; mais il est bien prouvé que la Columelle n'est formée que d'une substance spongieuse et charnue qui ne se sépare jamais sous forme de semencules, tandis que les grains pulvérulents qui l'entourent doivent être regardés comme de nouvelles Plantes; et sont, par conséquent, de véritables semences. V. MOUSSE. (A.B.)

COLUMELLE. *Columella*. BOT. PHAN. Jacquin; dans la description des Plantes rares du jardin de Sienne.

ordonné, a dédié ce genre à la mémoire du poète-agriculteur Columelle, et lui donne pour caractères : capitule ramifié, dont le disque contient des fleurons nombreux, réguliers et hermaphrodites; fleurs de la circonférence en languettes et semelles; involucre cylindrique composé d'écaillés imbriquées, lancéolées et aiguës, les extérieures dressées, les intérieures étalées et scarieuses sur leurs bords; réceptacle sans paillettes; ovaire grêle surmonté d'une aigrette en forme de couronne et irrégulièrement dentée. Ce genre de la Syngénésie superflue de Linnaeus, de la famille des Synanthérées, et placé par Cassini dans sa tribu des Inulées, est voisin de l'Amelus. La connotation de son nom avec *Columellia* de Vahl a déterminé Sprengel à le remplacer par celui de *Vestleria*.

La seule espèce connue, *Columellia biennis*, Jacquin, *Nastlera biennis*, Sprengel, croît au cap de Bonne-Espérance. C'est une Plante dont la tige branchue et cylindrique, haute de quatre à six décimètres, est garnie de feuilles linéaires obtuses, très-entières et cotonneuses. Ses fleurs sont jaunes et disposées au sommet des rameaux. (G.N.)

\* COLUMELLI. POLYF. Des Turbidolies, des Caryophyllites simples et cylindriques, ainsi que des débris de tiges de Crinoïdes ou d'Entomites, ont été nommés *Columelli* par Luid, Plait, Wolfart et d'autres naturalistes anciens. (LAM..X.)

COLUMELLIE. *Columellia*. BOT. PHAN. Sous le nom de *Columella*, Ruiz et Pavon ont décrit dans la Flore du Pérou un nouveau genre appartenant à la Dismérie Monogynie, L. Cette dénomination a été modifiée par Vahl en celle de *Columellia* qui a paru plus convenable. Elle a été adoptée, en effet, par la plupart des auteurs, et en particulier par Kunth qui a exprimé de la manière suivante ses caractères génériques : calice persistant dont le limbe est libre et à cinq divisions profondes et égales; corolle à tube étalé court, à limbe

quinquéparti presque égal et étalé; deux étamines insérées à la base du tube de la corolle; les loges des anthères présentant des plis ondulés; style court surmonté d'un stigmate capité et déprimé; capsule recouverte par le calice, biloculaire et à deux valves bifides à leur sommet; placental adnés aux cloisons et portant des semences nombreuses. Aux deux espèces publiées et figurées par Ruiz et Pavon, sous les noms de *C. oblonga* et *C. obovata*, Kunth en a ajouté une troisième voisine de cette dernière; et qu'il nomme *C. vertica*. Elle habite, ainsi que les précédentes, le royaume de Quito au Pérou. Ce sont des Arbres ou Arbustes à branches et à feuilles opposées; celles-ci sont simples et entières. Les pédoncules supportent deux ou plusieurs fleurs jaunes munies de bractées.

Ce genre, pour lequel A.-L. Jussieu avait proposé le nom d'*Uluxia*, dérivé de celui qu'une des espèces porte dans sa patrie, et dont il avait indiqué les affinités avec le genre *Calceolaria*; a été en effet placé par Kunth à la suite de celui-ci dans la famille des Scrophularinées. (G.N.)

\* COLUMEN. BOT. PHAN. (Tournefort.) F. AXE.

COLUMESTRUM. BOT. PHAN. Syn. d'Aconit chez les Romains. (S.)

COLUMNÆA. BOT. PHAN. F. COLUMNÉE.

CO-LUO-MEO. BOT. PHAN. Syn. cochinchinois du *Scabiosa cochinchinensis* de Loureiro. (S.)

COLUPPA. BOT. PHAN. Nom de pays de l'*Illecebrum sessile* à la côte de Malabar. (B.)

\* COLURELLE. *Colurella*. INF. Genre de la seconde sous-famille des Brachionides, et qui a pour caractères : l'absence de tout organe biliaire; un test bivalve; antérieurement tronqué; deux tentacules et une queue terminale profondément bidentée et articulée. Une seule espèce; que nous avons retrouvée dans l'eau des marais; y est jusqu'ici renfermée; c'est le *Brachionus uncinatus* de Müller

(Inf., p. 350, tab. 50, f. 6-11; Encyc. Vers., pl. 28, f. 10-12). Sa forme, vue par le dos, est amygdaloïde, un peu atténuée postérieurement, et carrément tronquée en avant. Une ligne suturale, qui règne longitudinalement, indique l'union des deux valves. Le corps, qui semble composé de trois parties ovoïdes que séparent deux étranglemens, se contracte ou s'allonge dans la transparence du test; lorsque celle qu'on peut considérer comme la tête, atteint, par son allongement au bord antérieur, on la voit distinctement armée de deux tentacules uncinés, parfaitement muques, nus, fort courts et non contractiles. En profil, le dos est bombé, et la partie inférieure aplatie comme le plastron d'une Tortue. Cette espèce, que nous nommerons *CODURELLE UNCINÉE*, n'est pas rare parmi les Conferves et les Lenticules. (B.)

**COLURNA.** BOT. PHAN. Espèce du genre Noisetier.

**COLUS.** MAM. *V.* COLOS.

**COLUTEA.** BOT. PHAN. *V.* BAGUENAUDIER.

**COLUTIA.** BOT. PHAN. Moench a proposé ce nom générique pour distinguer le *Colutea frutescens*, L., espèce de Baguenaudier. *V.* ce mot. (G..N.)

**COLUVRINE DE VIRGINIE.** BOT. PHAN. Syn. d'Aristolochie serpentinaire. (B.)

**COLVERT.** OIS. Syn. piémontais du Souchet, *Anas Clypeata*, L. *V.* CANARD. (DR..Z.)

**COLYDIE.** *Colydium.* INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères, ainsi nommé par Herbst, établi par Fabricius aux dépens du genre *Ips* d'Olivier, et rangé par Latreille (Règn. Anim de Cuvier) dans la famille des Xylophages. Ses caractères sont : antennes guère plus longues que la tête, de onze articles distincts, dont les trois derniers forment une massue brusque et perfoliée; palpes très-courts, terminés

par un article plus gros et tronqué; corps ayant une forme presque linéaire ou cylindrique. Les Colydies diffèrent des Lyctes et des Ditomes par les articles composant le massif des antennes, au nombre de trois; ils partagent ce caractère avec les Troglodytes proprement dits; mais ils en diffèrent cependant par une longueur moindre des antennes.

Ces Insectes, auxquels Fabricius (Actes de la Soc. d'Hist. Nat. de Paris, p. 31) avait appliqué le nom de *Cylo-nium*, ont un corps allongé très-étroit; une tête obtuse en avant et comme tronquée, portant les antennes sur ses rebords latéraux; un labre fort petit, apparent, linéaire et transversal; des mandibules bifides à leur sommet; des mâchoires bilobées avec la division intérieure petite et demi-forme; des palpes terminés en massue; une languette coriace, en carré transversal et entier; un menton à peu près semblable; un prothorax long et étroit, et des tarses à articles simples. On trouve ces Insectes sous les écorces des Arbres.

Le *COLYDIE ALLONGÉ*, *Col. elongatum*, Fabr., ou l'*Ips linéaire* d'Olivier (Coléopt. T. II, n° 18, pl. 5, pl. 2, fig. 17, A, B), peut être considéré comme le type du genre. Il est rare aux environs de Paris. *V.*, pour les autres espèces, Fabricius (*loc. cit.*) et Dejean (Catal. des Coléoptères, p. 103), qui en mentionnent trois espèces, dont deux parisiennes et l'autre de Dalmatie. (AUD.)

\***COLYEUZ.** OIS. (Albert le Grand.) Syn. de Hulotte, *Strix Aluco*. *V.* CHOUETTE. (B.)

\***COLYMADE.** BOT. PHAN. (Dioscoride.) Espèce ou plutôt variété d'Olive, aujourd'hui indéterminée. (B.)

**COLYMBE.** OIS. *V.* COLIMBE.

**COLYMBÈTE.** *Colymbetes.* INS. (Clairville.) *V.* DYTIQUE.

\* **COLYMBIDA.** OIS. (Athénée.) Nom sous lequel sont désignés dans plusieurs auteurs anciens quelques espèces du genre Grèbe. (DR..Z.)



**COLYMBO CRISTATO.** ois. Syn. italien du Grèbe huppé, *Podiceps cristatus*, Gmel. *V.* GRÈBE. (DR., Z.)

**COLYMBUS.** ois. *V.* PLONGEON.

**COLYTEA.** BOT. PHAN. Pour Colutea. *V.* BAGUENAUTIER.

**COLZA.** BOT. PHAN. Espèce du genre Chou. *V.* ce mot. (B.)

**COM.** BOT. (Gaimard.) Syn. timorien d'Épine. (B.)

**COMA ET COME.** BOT. PHAN. (Dioscoride.) Syn. de Salsifis. (B.)

**COMA AUREA.** BOT. PHAN. *V.* CHRYSOCOME.

**\* COMACAI.** BOT. PHAN. (La Condamine.) Espèce de Figuier que Jusieu présume être le *Ficus citrifolia*. (B.)

**COMACON.** BOT. PHAN. Pour Comakon. *V.* ce mot.

**\* COMAGÈNE.** BOT. PHAN. (Pline.) Plante de Syrie, sur laquelle l'antiquité ne nous a laissé aucune indication, sinon qu'elle entraît dans un emplâtre fait avec de la graisse et du *cinnaomum*. (B.)

**\* COMAKA.** BOT. PHAN. (Nicolson.) Syn. caraïbe de *Bombax Ceiba*. *V.* ROMAGER. (B.)

**COMAKON.** BOT. PHAN. (Théophraste.) Syn. de Muscadier. (B.)

**COMALTECATL.** ois. (Hernandez.) Syn. mexicain de l'Échasse, *haradrius himantopus*, Gmel. *V.* CHASSE. (DR., Z.)

**COMAN.** BOT. PHAN. *V.* COMON.

**COMANDA GUIRA.** BOT. PHAN. (arcgraff.) Syn. de Cajan. *V.* ce mot. (B.)

**\* COMANDRA.** BOT. PHAN. Le *Thesium umbellatum* de Linné a servi de type à ce genre proposé par Nutt. dans son *Genera* de l'Amérique du Nord. La description que cet habile botaniste en donne, offre en effet des caractères fort différents de ceux du *Thesium*; mais ayant analysé avec soin ces deux genres, nous n'avons pu saisir leur distinction. En

effet, ce que Nuttall décrit comme une corolle formée de cinq pétales dans son genre *Comandra*, n'est rien autre chose que le limbe du calice qui est à cinq divisions profondes. L'ovaire, contenant trois ovules pendans, est un caractère que présente également le genre *Thesium*, d'après l'observation d'Auguste St.-Hilaire, consignée dans le quatrième volume des Mémoires du Muséum. Nous pensons donc que le genre *Comandra* doit être réuni au *Thesium*. *V.* ce mot.

(A. R.)

**COMARET.** *Comarum.* BOT. PHAN. C'est dans la section des Fragariacées, de la famille des Rosacées, que vient se placer ce genre de Plantes composé d'une seule espèce qui a le port et les caractères des Potentilles; aussi quelques auteurs, à l'exemple de Scopoli et du professeur Nestler de Strasbourg (*Monog. Potentill.*), ont-ils fait du genre Comaret une espèce de Potentille. En effet, le seul caractère que l'on donne pour distinguer ce genre des véritables Potentilles, c'est qu'après la fécondation, son réceptacle se gonfle un peu et devient spongieux; mais cette différence mérite-t-elle que d'après elle seulement on établisse un genre distinct? Nous ne le pensons pas, et nous nous rangeons de l'avis des auteurs cités précédemment, qui ont réuni aux Potentilles le *Comarum palustre*, L., sous le nom de *Potentilla Comarum*. Cette Plante est vivace et se plaît dans les marécages inondés. Elle porte des feuilles quelquefois pinnées et quelquefois digitées, et des fleurs d'un pourpre noirâtre. *V.* POTENTILLE. (A. R.)

**COMAROIDES.** BOT. PHAN. Nom générique donné par Pontédéra aux Potentilles à feuilles ternées et à réceptacle des fruits non charnu, ayant pour type le *Fragaria sterilis*, L. Séguier le donne comme spécifique au *Potentilla nitida*. *V.* POTENTILLE. (B.)

**COMARON.** BOT. PHAN. Ce nom, qui désignait la Fraise, avait, par l'a-

nalogie du fruit, été étendu à l'Arbousier, *Arbutus Unedo*. Les botanistes modernes en ont fait la base du mot *Comarum* qui, comme on vient de le voir, désigne une Plante que ses rapports naturels et systématiques rapprochent du Fraisier. (B.)

\* **COMAROPSIDE.** *Comaropsis*. BOT. PHAN. Le professeur Nestler, ayant fait précéder sa Monographie des Potentilles par la revue des genres qui composent avec elles la tribu des Fragariacées, a établi, sous le nom de *Comaropsis*, un nouveau genre qu'il a ainsi caractérisé : calice sans bractées, dont le tube est turbiné et couronné par un appendice crénelé en forme d'anneau, et placé en dessous des étamines; pétales non ongiculés; étamines indéfinies; deux à quatre ovaires supportés au fond du calice par de petites gynophores; et terminés par des styles allongés; akènes non rétrécis à la base.

Ces caractères rapprochent singulièrement ce genre des *Waldsteinia*, et pour s'en convaincre, il suffit de jeter les yeux sur les figures comparatives faites par le professeur Richard père, et gravées en tête de l'ouvrage de Nestler. L'unique espèce dont il se compose avait été d'abord placée dans le genre *Dalibarda* (Rich., in Michx. Fl. boreali-Amer., 1, pag. 300, t. 28). C'est une petite Plante à souche rampante, à feuilles ternées, à pédoncules multiflores, et qui a le port de nos Fraisiers: aussi lui avait-on donné le nom spécifique de *fragarioides*. Elle croît dans l'Amérique du nord, et peut-être en Sibérie, si le synonyme de *Dryas triplicata*, Pallas, que lui donne Steudel, est bien exact. (G.N.)

\* **COMASINE.** *Comasinus*. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères, établi par Megerle aux dépens du genre Charanson, et adopté par Dejean (Catal. des Coléopt., p. 85) qui en mentionne trois espèces originaires d'Autriche. Nous ne pouvons prononcer sur la valeur de ce petit genre dont

nous ne connaissons pas les caractères. (AUD.)

\* **COMATI.** BOT. PHAN. Syn. malabare de *Caturus spiciflorus*. (B.)

\* **COMATEA ARDEA.** OIS. Syn. du Crabier jeune, *Ardea rulloides*, *Ardea Erythropus*, Gmel. V. HÉRON. (DR.Z.)

**COMATULE.** *Comatula*. ÉCHIN. Genre établi par Lamarck aux dépens des Astéries de Linné, et placé par lui dans la première section de ses Radiaires échinodermes. Ce genre a été nommé Alecto par Nodder et Leach, et Antedon par Fréminville. Lamarck donne aux Comatules le caractère générique suivant : corps orbiculaire, déprimé, rayonné, à rayons de deux sortes, dorsaux et marginaux, tous munis d'articulations calcaires; rayons dorsaux très-simples, filiformes, cirrux, petits, rangés en couronne sur le dos du disque; rayons marginaux toujours pinnés, beaucoup plus grands que les rayons simples; leurs pinnales inférieures allongées, abaissées en dessous, entourant le disque ventral; bouche inférieure, centrale, isolée, membraneuse; tubuleuse, saillante.

Les Comatules sont éminemment distinguées de toutes les autres Stellérides, non-seulement parce qu'elles ont deux sortes de rayons disposés comme sur deux rangs, mais en outre parce que leur bouche est saillante, membraneuse, et offre un tube en forme de sac ou de bourse, au centre du disque inférieur. Ces Stellérides ont d'ailleurs des habitudes qui leur sont particulières; ce que nous a appris Péron, et ce que confirme l'ongle crochu et solide qui termine leurs rayons dorsaux. Elles doivent donc former un genre séparé des Euryales et des Ophiures, genre que nous enonçons dans nos leçons sous la dénomination de Comatule. Effectivement, les Comatules constituent parmi les Stellérides un genre non-seulement très-distinct, mais même singulier par ses caractères. Le corps de ces Radiai-

res est petit, orbiculaire, déprimé en dessus et en dessous, véritablement discoïde, éminemment rayonné, et en outre ayant des cirres ou des rayons simples, les uns sur le dos du disque, les autres abaissés sous le ventre, entourant la bouche et à quelque distance d'elle. Ces derniers ne sont que des pinnules inférieures des grands rayons, qui sont allongées et abaissées en dessous. Les rayons latéraux ou grands rayons sont constamment pinnés, et ont des articulations calcaires, recouvertes dans le vivant par une peau mince, transparente, qui disparaît dans les individus desséchés. Chaque articulation de ces rayons est épaisse d'un côté et mince de l'autre. Par la disposition de ces articulations entre elles, les côtés épais alternent avec les côtés minces, en sorte que les sutures des articulations sont obliques et en zig-zag. Chaque articulation soutient une seule pinnule qui s'insère sur son côté épais, et il en résulte que les pinnules sont alternes. Ces pinnules sont calcaires, subulées, articulées comme les rayons et moins calcaires. On voit ici le contraire de ce qui a lieu dans les Ophiures; car le disque dorsal des Comatules est beaucoup plus étroit que le disque ventral. Il soutient une rangée de rayons simples, cirreux, terminés chacun par un ongle ou un ergot crochu. Le disque inférieur ou ventral offre un plateau orbiculaire, plus large que le dorsal, entouré de rayons simples, cirreux. À la circonférence de ce plateau, on aperçoit un sillon irrégulièrement orbiculaire, qui s'ouvre sur la base des rayons pinnés, et se propage le long de leur face inférieure, ainsi que de celle des pinnules. Ce sillon, néanmoins, ne s'approche point de la bouche et ne vient point s'y réunir, comme cela a lieu pour la gouttière des rayons dans les Astéries. Au centre du disque inférieur ou ventral des comatules, la bouche membraneuse, bulbueuse ou en forme de sac, fait une saillie plus ou moins considérable suivant les espèces. Ce caractère

singulier, qu'on ne rencontre jamais dans les Euryales ni dans les Ophiures, semble rapprocher les Comatules de certains Médusaires. Quant aux habitudes particulières des Comatules, elles consistent en ce que ces Stellérides se servent de leurs rayons simples, dorsaux, pour s'accrocher et se suspendre soit aux Fucus, soit aux Polypiers rameux. Là, fixées, elles attendent leur proie, l'arrêtent avec leurs grands rayons pinnés, et l'amènent à la bouche avec leurs rayons simples inférieurs.

Les Ophiures et les Euryales, n'ayant point de rayons dorsaux, ne peuvent se suspendre comme les Comatules, mais seulement se traîner sur le sable ou sur les rochers, ou s'accrocher aux Plantes marines avec leurs rayons.

Le nombre naturel des grands rayons ou rayons pinnés des Comatules est de cinq; mais dans certaines espèces, ces rayons divisés, presque jusqu'à leur base, en deux, trois, quatre et quelquefois cinq branches soutenues sur un pédicule très-court, paraissent bien plus nombreux. Néanmoins les divisions de ces rayons ne forment point de dichotomie semblable à celle des Euryales. Les Comatules se rapprochent tellement des Encrinites que l'on pourrait presque regarder ces derniers Animaux comme des Comatules pédicellées. Il est difficile de ne pas les réunir dans la même classe, malgré le grand caractère que présente la faculté locomotrice qui manque aux Encrinites. Ce rapprochement a déjà été fait par Miller et d'autres naturalistes. Les espèces de Comatules répandues dans les différentes mers du monde paraissent assez nombreuses; il en existe plusieurs d'inédites dans les collections, et beaucoup doivent avoir échappé aux recherches des naturalistes. Ces Echinodermes se plaisent dans les zones chaudes; elles sont rares dans les tempérées, et n'ont pas encore été trouvées au-delà du quarante-cinquième degré de latitude.

**COMATULE MULTIRAYONNÉE**, *Comatula multiradiata*, Lamk. T. II, p. 535, n. 2; Encycl. Méth. pl. 125, fig. 3. C'est de toutes les Comatules connues celle qui possède le plus de rayons pinnés; d'abord au nombre de cinq, ils se divisent ensuite en douze branches pinnées et même davantage. Les pinnules sont un peu déprimées, avec des rayons dorsaux assez grands et crochus à la pointe. Elle habite l'océan Indien.

**COMATULE FRANGÉE**, *Comatula fimbriata*, Lamk. T. II, p. 534, n. 4; Miller, Hist. Nat. Crinoïd. (frontisp.) Dans cette espèce confondue avec beaucoup d'autres sous le nom d'*Asterias pectinata*, les rayons pinnés, au nombre de douze à trente, sont grêles, à peine longs de trois pouces, et divisés jusqu'à la base en deux à cinq branches; articulations à bords ciliés. Habite les mers de l'Inde.

**COMATULE DE LA MÉDITERRANÉE**, *Comatula mediterranea*, Lamk. T. II, p. 535, n. 6; Encycl. Méth. pl. 124, fig. 6. Comatule à dix rayons pinnés avec des pinnules longues, subulées, et trente cirres dorsaux ou griffes. Cette espèce assez commune dans les mers d'Europe, principalement dans la Méditerranée, a été confondue par Gmelin avec la Comatule frangée.

Lamarck cite encore dans son ouvrage la Comatule solaire, originaire des mers Australes. — La Comat. rotatoire. De la Nouvelle-Hollande. — La Comat. carinée. De l'Île-de-France. — La Comat. de l'Adéone. Des mers de l'Australasie. — Enfin la Comat. branchiolée, Lamk, *Asterias tenella*, Gmel. De l'océan Atlantique. (LAM..X.)

**CO-MAY**. BOT. PHAN. Nom cochinchinois d'une Graminée qui croît sur les routes, dont la graine s'accroche aux habits, et que Loureiro regarde comme le *Cussu-Cussu* de Rumph. V. ce mot. (B.)

\* **COMBA**. BOT. PHAN. (Proyart.) Syn. de *Solanum Melongena*, L., sur les côtes d'Afrique au nord du Zaïre,

où les naturels se nourrissent des fruits de cette Plante. (B.)

**COMBA-SOU**. OIS. Syn. de *Fringilla nitens*, L., Buff., pl. enl., 291, au Sénégal. V. GROS-BEC. (DR.Z.)

**COMBATTANT**. OIS. Une espèce du genre *Turnix*, *Hemipodius Pugnax*, Temm., et un autre Oiseau qui sert de type au sous-genre des Combattans parmi les Bécasseaux, portent ce nom. V. BÉCASSEAU et TURNIX.

**COMBÈBE**. BOT. PHAN. Pour Combébe. V. ce mot et POIVRE.

\* **COMBER**. POIS. V. COMBRE.

**COMBILI**. *Combilium*. BOT. PHAN. (Rumph, Amb. 9; t. 146.) Syn. de *Dioscorea aculeata*, L. V. DIOSCORTEZ. (B.)

**COM-BIRD**, **COMMBIRD** ou PEIGNÉ. OIS. Labat désigne sous ce nom un gros Oiseau du Sénégal qui ne peut être que l'Oiseau Royal ou la Grue de Numidie, et non l'Ouarde. (B.)

\* **COMBOU-NAGOU**. REPT. OFN. Nom malabare d'une variété du *Coluber Naja*. (B.)

\* **COMBRE**. *Comber*. POIS. Espèce du genre Labre. V. ce mot. (B.)

**COMBRET**. *Combretum*. BOT. PHAN. Vulgairement *Chigomier*. Ce genre, placé autrefois parmi les Onagracées, est devenu le type d'une famille nouvelle à laquelle il a donné son nom. Il a pour caractères : un calice adhérent à l'ovaire articulé avec lui, et au-dessus de cette articulation évasé en un entonnoir caduc, campaniforme, que terminent quatre ou cinq lobes égaux et dressés. Dans leurs intervalles s'insèrent autant de pétales égaux entre eux, ordinairement assez petits; huit ou dix étamines s'insèrent également au calice; la moitié d'entre elles, presque à la même hauteur que les pétales auxquels elles sont opposées, l'autre moitié sur une ligne circulaire inférieure; celles-ci alternent avec les premières. Les anthères à deux loges qui s'ouvrent longi-

ladinement, sont fixés par leur dos au filet sensiblement aminci à son extrémité, et vacillantes. Le style saillant se termine par un stigmatéogone. L'ovaire uniloculaire renferme de deux à cinq ovules, suspendus au sommet de la loge. Le périsperme se réfléchit en dehors, de manière à former quatre ou cinq ailes; il renferme une graine unique dans une loge indéhiscente. Cette graine, qui se moule plus ou moins sur la loge, est composée d'un légerement mince et membraneux, et d'un embryon à radicule supérieure, à cotylédons foliacés, qui tantôt s'enveloppent l'un l'autre en se contournant, tantôt, au contraire, se plient chacun en deux moitiés réfléchies extérieurement et divariquées. On doit remarquer que la première de ces deux dispositions s'observe dans les espèces à dix étamines, la seconde dans les espèces octandres.

Ce genre comprend des Arbres ou des Arbrisseaux à feuilles opposées, très-rarement ternées ou alternes, simples, très-entières, dépourvues de stipules. Les fleurs sont accompagnées de bractées, et disposées en épis terminaux ou axillaires, quelquefois paniculés. On en compte près de quinze espèces, toutes exotiques. L'une d'elles, le *C. coccineum*, est connue vulgairement sous le nom d'Aigrette de Madagascar; Commerson, dans ses manuscrits, l'appelle *Pevraea*, et Sonnerat *Cristaria*, dans son Voyage où il l'a figurée (T. II, tab. 140). Une autre, le *C. frangulaefolium*, l'a été récemment dans les *Nova Genera* de Smith (T. VI, 108, t. 558) qui, en faisant connaître plusieurs autres espèces nouvelles, a développé et fixé les caractères génériques tels que nous les avons exposés ici. V. aussi Lamarck (Illustr. tab. 282), Roxburg *Pl. Corom.* t. 59), Jacq. (*Ambr.* tab. 76 et 260), Venten. (Choix de Pl. 88).

(A. D. J.)

**COMBRÉFACÉES.** *Combretaceae.*  
NOT. PHAN. Le célèbre auteur du *Genera Plantarum*, Jussieu, avait réuni dans sa famille des Elagnées des

genres dont la structure offre des différences extrêmement tranchées. C'est ainsi, par exemple, que les genres *Hippophae* et *Elaeagnus* ont l'ovaire libre; uniloculaire et contenant un seul ovule ascendant; que les genres *Thesium*, *Fusanus*, etc., ont l'ovaire infère à une seule loge contenant plusieurs ovules (2 ou 3) attachés à la partie supérieure d'un trophosperme ou placenta central; enfin dans les genres *Bacida*, *Terminalia*, *Chunchoa*, etc., l'ovaire est infère, et les ovules sont pendans au sommet de la loge, sans placenta central. Dans ces derniers genres; il n'y a pas d'endosperme; tandis que cet organe existe dans ceux que nous avons précédemment mentionnés. Plus tard, Jussieu sépara des Elagnées les genres *Terminalia*, *Bacida*, *Chunchoa*, etc., et en fit une famille nouvelle qu'il nomma Myrobalanées; enfin Robert Brown (*Prod. Fl. Nov. Holl.*, et *General Remarks*), reprenant les travaux de Jussieu, a formé trois familles des genres autrefois réunis sous le nom d'Elagnées, savoir: 1° les Elagnées qui se composent seulement des genres *Hippophae* et *Elaeagnus*; 2° les Santalacées qui comprennent les genres *Santalum*, *Quinchamalium*, *Thesium*, *Leptomeria*, *Fusanus*, etc.; 3° enfin les Combretacées, où il réunit les genres *Bacida*, *Terminalia*, *Chunchoa*, d'abord placés dans les Elagnées, et les genres *Combretum*, *Caconcia*, etc., qui faisaient partie des Onagracées.

Exposons maintenant les caractères distinctifs de cette famille, que nous soumettrons ensuite à un examen plus détaillé.

Les Combretacées sont des Arbres, des Arbrisseaux ou même des Arbustes portant des feuilles opposées, alternes, éparses, entières et sans stipules; des fleurs hermaphrodites ou polygames diversement disposées en épis axillaires ou terminaux; leur calice est adhérent par sa base avec l'ovaire qui est infère. Son limbe est allongé ou campaniforme, à quatre ou à cinq lobes; il est articulé avec

la partie supérieure de l'ovaire, et s'en détache circulairement après la fécondation. La corolle manque dans plusieurs genres. Lorsqu'elle existe, elle se compose de quatre à cinq pétales insérés à la base et entre les lobes du calice. Le nombre des étamines est, en général, double de celui des pétales ou des divisions du calice dans les genres où la corolle manque; cependant ce nombre n'est pas rigoureusement limité, et dans certaines espèces, on en trouve quatre, cinq, douze, quatorze et même quinze. Elles sont toujours insérées à la base du limbe calicinal; leurs anthères sont à deux loges s'ouvrant longitudinalement. L'ovaire, avons-nous dit, est constamment infère, à une seule loge, contenant de deux à quatre ovules pendans, et attachés au sommet de la cavité par un petit prolongement filiforme plus ou moins allongé, sans aucune trace de trophosperme central. Du sommet de l'ovaire on voit s'élever un style long et grêle que termine un stigmate simple. Le fruit offre dans sa forme et sa consistance des différences assez tranchées; il est toujours uniloculaire, monosperme par avortement, et reste constamment clos. Tantôt il est sec, et présente deux, trois ou cinq angles saillans, membraneux et en forme d'ailes; tantôt il est ovoïde ou globuleux et charnu. La graine qu'il contient est suspendue au sommet de la loge, et offre à peu près la même forme que le péricarpe, c'est-à-dire qu'elle est anguleuse dans le premier cas et ovoïde allongée dans le second; son épisperme ou tégument propre est simple et membraneux, et recouvre immédiatement l'embryon. Celui-ci a la même direction que la graine, c'est-à-dire que sa radicule correspond exactement à son point d'attache. Les cotylédons sont foliacés; rarement ils sont planes, et plus souvent ils sont roulés sur eux-mêmes.

Cette famille ne paraît pas au premier abord réunir des genres ayant entre eux une très-grande affinité. En effet les uns sont pourvus de pé-

tales, et les autres en manquent; ceux-ci ont les cotylédons planes, et ceux-là les ont contournés et roulés sur eux-mêmes; mais ces différences, ainsi que celles qui proviennent de la forme et de la consistance du péricarpe, ne sont pas d'une assez haute importance pour nécessiter leur désunion. Le caractère vraiment distinctif de cette famille consiste dans son ovaire uniloculaire contenant un ou plusieurs ovules attachés au sommet de la loge et pendans. Par ses genres apétales elle tient aux Santalacées qui s'en distinguent par la présence d'un endosperme et par leur placenta central. Par ses genres pétales elle se rapproche beaucoup des Onagracées et des Myrtacées entre lesquelles elle vient se placer.

Les genres qui composent cette famille sont peu nombreux, et peuvent être partagés en deux sections; dans la première on placera ceux qui sont dépourvus de corolle, tels que *Bucida*, L., *Terminalia*, L., auquel il faut réunir le *Tanibouca* et le *Pamea* d'Aublet; *Chunchoa*, Pavon, *Conocarpus*, L., *Quisqualis*, L., à moins que l'on ne considère les cinq écailles qui garnissent l'intérieur de son calice comme une corolle polypétale, et dans ce cas il serait partie de la seconde section. La seconde comprendra les genres qui ont une corolle polypétale régulière: tels sont *Laguncularia*, Gaertn. fils, *Combretum*, Læfl., *Cacucia*, Aubl., et *Cestonia*, Roxburgh. (A. B.)

\* COMBURENS (CORPS). On a qualifié ainsi les corps qui, dans la combustion, s'unissaient à d'autres corps dont ils changeaient ou modifiaient les propriétés. Long-temps on a cru que l'Oxigène était l'unique Comburent, que seul aussi il jouissait de la propriété de produire les Acides; mais des travaux récents ont prouvé que plusieurs autres corps, placés même parmi les combustibles, étaient susceptibles de favoriser la combustion et de donner naissance à des Acides. En outre, on a découvert que l'Oxigène, en se combinant avec les

combustibles, communiquait aux uns l'acidité, aux autres l'alcalinité, et souvent aussi formait des produits absolument neutres. Dès-lors, il a été difficile d'attacher un véritable sens au mot Comburent, et de désigner clairement les corps qui jouissent exclusivement de cette propriété.

(DR..Z.)

\* **COMBUSTIBLES** (CORPS). Qualification attachée aux corps qui jouissent de la propriété de dégager du feu, de la lumière, ou de la chaleur; de se combiner avec l'Oxigène, le Chlore, l'Iode et le Phlore; d'être transformés en Acides par la combustion, etc. Cette qualification est devenue assez inexacte depuis que l'on a vu des Combustibles remplir dans certaines circonstances le rôle de comburens.

(DR..Z.)

\* **COMBUSTION**. Phénomène que l'état actuel des connaissances ne permet pas de bien définir. Quand l'on admettait l'Oxigène comme seul comburent, on pouvait dire qu'il y avait Combustion lorsqu'il y avait fixation d'Oxigène dans un combustible quelconque, soit que le phénomène fût accompagné d'un dégagement apparent de feu, soit que ce dégagement ne fût point sensible à nos organes. Mais l'Oxigène n'est plus le seul comburent, et d'autres corps jouissent de cette propriété, peuvent, dans certains cas, se combiner avec des combustibles, sans qu'il y ait Combustion, et, de plus, devenir combustibles eux-mêmes. En attendant que les idées soient mieux fixées sur la Combustion, on pourrait se contenter d'appliquer ce nom au dégagement du feu produit par un échange de principes entre deux ou plusieurs corps, et donnant lieu à des combinaisons nouvelles dont la capacité à maintenir la matière du feu serait moindre que celle des composans.

(DR..Z.)

\* **COME.** ROIS. Syn. japonais de *COMME*, espèce du genre *Pleuronectes*. *V.* mot.

\* **COME.** ROIS. *PHAN.* *V.* *COMMA* et *KOME*.

\* **COME-GOMMI ET MANTÉES.** ROIS. *PHAN.* Syn. japonais de *Sérissa*. Thunberg l'écrit *Komo-Gommi*. (B.)

\* **COMEPHORE.** ROIS. Sous-genre de *Callionyme*. *V.* ce mot.

\* **COMESPERME.** *Comesperma*. ROIS. *PHAN.* Plusieurs. Végétaux herbacés ou frutescents, tous originaires des côtes de la Nouvelle-Hollande, composent ce genre établi par Labillardière. (*Specim. Nov.-Holl.*), et qui vient se ranger dans la nouvelle famille des Polygalées et dans la Diadelphie Octandrie, L. Ses caractères consistent dans un calice à cinq divisions ordinairement inégales, deux étant presque toujours plus grandes que les trois autres. La corolle est formée de cinq pétales irréguliers, inégaux, soudés ensemble par le moyen des filets staminaux, de manière à représenter une corolle monopétale irrégulière, à deux lèvres, l'une supérieure bifide, l'autre inférieure concave et à trois lobes. Les stamens sont au nombre de huit et, diadelphes, comme dans le *Polygala*. Le stigmate est bifide. Le fruit est une capsule comprimée, en forme de spatule, à deux loges contenant chacune une graine couverte de poils renversés. Ces caractères, ainsi qu'il est facile de le voir, rapprochant singulièrement ce genre du *Polygala*, dont il diffère seulement par son calice caduc, sa capsule en forme de spatule, ses graines recouvertes de poils, et la caroncule linéaire qui règne sur l'un de ses côtés.

Dans son *Specimen flora Nov.-Hollandiae*, Labillardière décrit et figure cinq espèces de ce genre, savoir : *Comesperma virgata*, tab. 159; *Comesperma retusa*, tab. 160; *Comesperma conferta*, t. 161; *Comesperma calymega*, t. 162; et *Comesperma valubilis*, t. 163. Ces cinq Plantes sont de petits Arbustes ou des Herbes vivaces, ayant des feuilles alternes, ordinairement étalées, et des fleurs assez

petites qui forment un épi au sommet de la tige. (A. R.)

\* COMÈTE. *INF.* Espèce du genre *Trichode* et du genre *Cercaire*. *V.* ces mots. (B.)

COMÉTÈS. *BOT. PHAN.* Une Plante de Surate, aux Indes-Orientales, avait reçu ce nom générique de Burmann (*Flora Indica*, p. 39) ; elle le devait à l'aspect de ses enveloppes florales hérissées de poils dont les faisceaux divergens simulaient la queue des comètes. Linné accueillit ce genre, et tous les auteurs d'ouvrages généraux l'ont ensuite adopté en copiant les caractères inexacts donnés par Burmann. Il n'est donc pas étonnant qu'on l'ait méconnu, et que Jussieu lui-même l'ait confiné parmi les *Genera incerta sedis*. Lorsque M. Benjamin Delessert eut fait l'acquisition de l'herbier de Burmann, on s'est empressé de venir vérifier la Plante que celui-ci a décrite et figurée (*loc. cit.*, t. 15). Jussieu vit de suite que cette Plante était une Amaranthacée, et non pas une Euphorbiacée, comme avait semblé l'indiquer le faux caractère de capsule à trois coques donné par Burmann. De Candolle reconnut en elle le nouveau genre qu'il avait proposé sous le nom de *Desmochata*, et dont il avait décrit six espèces dans le Catalogue du jardin de Montpellier, p. 101. Dans le second volume des *Annales du Muséum*, p. 132, Jussieu avait antérieurement fondé ce genre sur l'*Achyranthes lappacea*, L., Plante vivante au Jardin de Paris. Il lui avait imposé le nom de *Pupalia*, dérivé de *Pupal-valli*, donné par Rhéede (*Hort. Malab.*, v. 7, t. 44) à une Plante de l'Inde que Jussieu croyait identique avec l'*Achyranthes lappacea*, mais qui, selon De Candolle, ne lui est pas même congénère. Loureiro paraît aussi avoir eu en vue le genre dont nous traitons, en décrivant le *Cyathula* qui, selon Jussieu, se rapporte à l'*Achyranthes prostrata*, L. Les caractères tracés par Jussieu sont très-exacts ; De Candolle les a déve-

loppés, et nous avons pu, de notre côté, en faire une description complète sur le vivant. Nous lui restituons le nom de Comètes, parce qu'il est le plus ancien, et qu'on serait indécis pour l'adoption de l'une des deux dénominations proposées par les botanistes modernes. C'est aussi l'avis de R. Brown dans une note manuscrite sur l'échantillon de Burmann. Voici ses caractères : fleurs ramassées en faisceaux, disposées le long d'un axe commun ; chaque faisceau a deux bractées triflores ; les deux fleurs latérales ont un calice à cinq sépales munis de deux bractées disposées à angles droits par rapport aux bractées de l'involucre ; dans l'aisselle de chacune de ces bractées se trouve une masse de poils longs, roides et crochus comme des hampeçons ; la fleur du milieu n'a point d'appendices bractéiformes ; elle est plus grande, à cinq sépales lancéolés, aigus, connivens, membraneux sur leurs bords, et très-laineux extérieurement ; chaque fleur renferme cinq étamines dont les filets sont réunis à la base en un urcéole appliqué contre l'ovaire ; les anthères sont globuleuses ; l'ovaire est sphérique, visible transversalement en deux parties, surmonté par un style de la longueur des étamines et par un stigmate glanduleux capité ; toute sa cavité est remplie par un seul ovule scissiforme ou, si l'on veut, globuleux, avec un appendice latéral très-grand, et tellement proéminent, qu'il lui donne la forme d'une cornue de chimiste.

Ce genre est bien suffisamment distinct de l'*Achyranthes* dont les fleurs sont séparées et accompagnées chacune de trois bractées, et les filets d'étamines réunis en un tube garni d'appendices intermédiaires. La pièce qu'il occupait dans le système sexuel ne lui convenait pas, car, au lieu d'appartenir à la Tétrandrie, il suit de la description précédente qu'on doit le placer dans la Pentandrie Monogynie.

Les Comètes sont des Plantes herbacées originaires des Indes-Orientales.



les ou de l'Afrique et de l'Arabie. Elles se cultivent assez facilement ; mais leurs fleurs, sans éclat, ne peuvent intéresser que les botanistes. Parmi les six espèces décrites par De Candolle, trois avaient reçu de Linné le nom d'*Achyranthes* ; ce sont ses *Achyr. lappacea*, *Ach. prostrata*, L., et *Ach. alternifolia*, L. Lamarck en avait nommé une autre *Achyr. styracifolia*. Le *Cometes alterniflora*, L., ou *Cometes suratensis*, Burm., paraît être la même espèce que le *Desmodium alternifolia* de De Candolle. Le nom de Comètes désignait un Euphorbe dans Dioscoride. (G.N.)

**COMETITE.** *Cometites*. POLYP. Ce nom a été donné à des Polypiers fossiles du genre Astrée par plusieurs oryctographes. (LAM.X.)

**\*COMINHAM.** BOT. PHAN. *V. COMINIAN.*

**COMINIA.** BOT. PHAN. Ce nom désigne l'Olive dans Pline. Brown l'avait appliqué à un genre qui se trouve avoir été réuni au Sumac. *V. ce mot.* (B.)

**\*COMINIAN ET COMINHAM.** BOT. PHAN. (Rumph.) Nom du Benjoin à Sumatra. (B.)

**COMMA.** (Dapper.) Oiseau que l'on dit habiter la Nigritie, et que l'auteur de la Description de l'Afrique désigne seulement par ses couleurs. Il a le cou vert, les ailes rouges et la queue noire. (DR.Z.)

**\*COMMADU.** BOT. PHAN. (Rhéde.) Syn. indou de *Menyanthes indica*. *V. MÉNYANTHE.* (B.)

**COMMANDEUR.** OIS. Espèce du genre Troupiale, *Icterus phaniceus*, L., Buff., pl. enl. 402. *V. TROUPIALE.* Espèce du genre Traquet, *Ananthe nigra*, Levaill., Ois. d'Afrique, pl. 189, *V. TRAQUET*, et espèce de Bruant, *Emberiza gubernatrix*, Temmink, pl. col. 63 et 64. *V. BRUANT.* (DR.Z.)

**\*COMMBIRD.** OIS. *V. COM-BIRD.*

**COMMÉLINE.** *Commelina*. BOT. PHAN. De jolies Plantes herbacées, annuelles ou vivaces, croissant dans

les contrées chaudes de l'ancien et du nouveau continent, et même à la Nouvelle-Hollande et dans les archipels de l'océan Pacifique, composent ce genre de Plantes monocotylédones, d'abord placé par Jussieu dans sa famille des Junces, mais qui aujourd'hui appartient à un ordre naturel distinct qui en a emprunté son nom. Les Commélines se reconnaissent à leur calice à six divisions profondes et inégales ; trois extérieures persistantes, vertes et caliciformes ; trois intérieures, pétaloïdes onguiculées et caduques. Les étamines sont au nombre de six, dont quelques-unes sont rudimentaires et privées d'anthères. Les fleurs sont généralement bleues ou roses, réunies plusieurs ensemble dans un involucre monophylle, persistant, replié ou roulé en cornet. Les feuilles sont alternes, terminées à leur partie inférieure par une gaine entière.

Plusieurs espèces, d'abord placées dans ce genre, en ont été retirées pour former des genres distincts. Ainsi le professeur Richard a fait de *Commelina Zanonia* de Linné le genre *Campelia*. *V. ce mot.* R. Brown, dans son Prodrome de la Nouvelle-Hollande, propose comme genre différent les espèces de Commélines qui sont dépourvues d'involucre. Il les nomme *Ancilema*. *V. ce mot.* Quoi qu'il en soit, le nombre des espèces qui restent parmi les Commélines est encore assez considérable et peut être évalué à une soixantaine environ.

Les espèces de ce genre méritent peu d'intérêt. Deux seulement sont quelquefois cultivées dans les jardins d'agrément, ce sont :

La COMMÉLINE VULGAIRE, *Commelina communis*, L., Lamk., Ill. t. 85, f. 1. Elle croît naturellement en Amérique et peut-être même en Asie, puisque Thunberg et Kœmpfer l'ont trouvée au Japon. Cependant il serait très-possible que la Plante mentionnée par ces auteurs fût spécifiquement différente de celle d'Amérique. Quoi qu'il en soit, la Comméline commune offre une tige cylindrique,

rameuse, un peu étalée, noueuse, portant des feuilles alternes, ovales, lancofolées, aiguës, entières, glabres, terminées à leur base par une gaine entière un peu ciliée sur ses bords. Les fleurs sont d'un bleu tendre, réunies plusieurs ensemble dans une spathe formée par la feuille la plus supérieure de la tige.

La **COMMÉLINE TUBÉREUSE**, *Commelina tuberosa*, L., qui est originaire du Mexique, se cultive assez souvent dans nos serres tempérées. Elle est vivace. Sa racine est formée d'un ou de plusieurs tubercules charnus, d'où naissent plusieurs tiges articulées, cylindriques et grêles. Les feuilles sont cordiformes, allongées, sessiles, engainantes, velues, quelquefois rougeâtres dans leur partie inférieure. Les fleurs sont d'un beau bleu, portées sur des pédoncules pourprés, et d'abord renfermées dans une spathe foliacée. On la multiplie de graines ou en séparant ses racines. (A. R.)

**COMMÉLINÉES. Commelinaceae.**  
BOT. PHAN. R. Brown a formé cette petite famille de Plantes monocotylédones avec quelques genres de la famille des Juncées de Jussieu, et dont le *Commelina*, décrit précédemment, doit être considéré comme le type. Voici les caractères par lesquels se distingue cette nouvelle famille : les fleurs ont un calice ou périanthe simple, à six divisions profondes disposées sur deux rangées ; les trois extérieures, en général plus petites, sont vertes et calicinales, tandis que les trois intérieures sont minces, colorées et pétaloïdes. Tantôt elles sont bromées d'un onglet, tantôt elles en sont dépourvues ; dans la première cas, elles sont quelquefois réunies entre elles par la base de leurs onglets. Les étamines sont généralement au nombre de six ; cependant quelques-unes avortent parfois ou sont stériles et difformes par suite de l'imperfection de leurs anthères. Ces étamines sont toujours attachées sous l'ovaire ; elles ont des anthères à deux loges souvent écartées l'une de l'autre par le moyen

d'un connectif placé entre elles. L'ovaire, entièrement libre, offre trois loges contenant chacune un petit nombre d'ovules fixés à l'axe interne. Il est surmonté par un style et un stigmate simple, et se change en une capsule globuleuse, trigone ou comprimée, à deux ou à trois loges, et s'ouvrant en autant de valves qui portent les cloisons sur le milieu de leur face interne. Les graines sont rarement au-delà de deux dans chaque loge. Outre leur tégument propre, elles se composent d'un endosperme dur et charnu, contenant un embryon en forme de poulie, placé dans une cavité opposée au point d'attache de la graine.

Toutes les Plantes qui composent la famille des Commelinées sont herbacées, tantôt annuelles, tantôt vivaces. Leur racine est fibreuse ou formée de tubercules charnus ; leurs feuilles sont alternes, simples et engainantes à leur base. Leurs fleurs sont nues ou enveloppées dans une spathe foliacée.

Cette famille est fort différente des Juncées par son port, la structure de ses fleurs, sa capsule et ses graines. Elle se rapproche des Restiacées par ses feuilles engainantes et la position de son embryon, dont la radicule est opposée au hile, mais s'en distingue par son périanthe et son embryon placé en dehors de l'endosperme.

Les genres qui entrent dans cette famille sont les suivans : *Commelina*, L., *Campelia*, Rich., *Antilema*, R. Br., *Cartonema*, R. Br., *Tradescantia*, L., *Callisia* et probablement le *Majaca* d'Aublet. (A. R.)

\* **COMMENDADOZA.** OIS. Syn. espagnol du Commandeur, *Icterus phæniceus*, L. V. TROUPIALE (DR. J.)

\* **COMMERSIS.** BOT. PHAN. Nom donné par Du Petit-Thouars à une Plante de la famille des Orchidées (Hist. des Orchidées des îles australes d'Afrique), et qui constitue elle seule la section nommée *Commersorchis*. V. ce mot. (G. S.)

**COMMERSONIE.** *Commersonia*

**BOT. PHAN.** Deux genres de Plantes ont successivement porté ce nom qui rappelle celui d'un des naturalistes français auxquels la botanique doit le plus grand nombre de découvertes, de Commerson qui accompagna Bougainville dans son voyage autour du monde. Forster, le premier, lui consacra une Plante observée par lui dans l'archipel des Amis, d'abord placée parmi les Tiliacées, puis enfin faisant partie de la nouvelle famille des Buttnériacées de Brown. Sonnerat fit également un genre *Commersonia* de la Plante désignée par Rumph sous le nom de *Butonica* et qui appartient à la famille des Myrtacées. Ce dernier genre doit être rejeté, et le *Commersonia* de Forster doit seul conserver ce nom. Ce genre offre pour caractères : des fleurs hermaphrodites dont le calice étalé et en forme d'étoile présente cinq divisions très-profondes, lancéolées et aiguës ; sa corolle se compose de cinq pétales dressés, plus courts que le calice, concaves à leur partie inférieure, qui est beaucoup plus large et offre deux lobes arrondis terminés en pointe à leur sommet ; étamines monadelphes par leur base seulement, au nombre de dix, dont cinq sont stériles et difformes par suite de l'avortement des anthères. Les filaments sont courts et les anthères sont à deux lobes et presque didymes dans les étamines fertiles qui sont placées au face des pétales. La plupart des auteurs ne donnent à ce genre que cinq étamines, considérant les cinq qui sont stériles comme un nectaire à cinq lobes velus. L'ovaire est libre, globuleux, à cinq côtes et à cinq loges, contenant chacune plusieurs ovules ; cinq styles grêles naissent du sommet de cet ovaire et se terminent par autant de petits stigmates simples. Le fruit est une capsule globuleuse, hérissée de pointes roides et plumbeuses, cinq loges contenant chacune deux graines.

Une seule espèce compose jusqu'à présent ce genre encore assez mal connu dans ses caractères ; c'est le *Commersonia echinata*, Forst., Gen.

p. 44, t. 22. Cet Arbre, qui ne s'élève qu'à une hauteur médiocre, est le *Restiaria alba* de Rumph (Amb. 3, t. 119). Il porte des feuilles alternes pétiolées, cordiformes, glabres, à l'aisselle desquelles existent des fleurs petites, portées sur des pédoncules grêles et rameux. Cet Arbre croît à Otaïti et dans les Moluques. Nous en possédons un échantillon recueilli à l'île de Java. (A. R.)

\* **COMMERSONIEN.** POIS. Nom spécifique imposé à des Poissons de divers genres, tels qu'une Lophie, un Able, un Exocet, un Bogue, un Labre, etc., etc., en mémoire de Commerson, investigateur infatigable qui a laissé de précieux manuscrits où ces espèces ont été retrouvées. (B.)

\* **COMMERSOPHYLLIS.** BOT. PHAN. Nom d'une Orchidée proposé par Du Petit-Thouars (Hist. des Orchidées des îles australes d'Afrique). C'est la quatrième espèce de la section des Phyllorchis. V. ce mot. Elle correspond au *Hulbophyllum Commersonii* des auteurs, et elle est figurée (*loc. cit.*, t. 96). (A. N.)

\* **COMMERSORCHIS.** BOT. PHAN. Dans l'ouvrage de Du Petit-Thouars sur les Orchidées des îles australes d'Afrique, on trouve ainsi désignée une section de cette famille sur laquelle on n'a que peu de renseignements : aussi est-elle placée à la fin du tableau, avec cette petite note, que la fleur seule est connue. (G. N.)

**COMMIA.** BOT. PHAN. Genre de la famille des Euphorbiacées établi par Loureiro. Les fleurs sont dioïques ; les mâles disposées en chatons courts et axillaires, dans lesquels les écailles imbriquées portent chacune un filet surmonté d'une anthère multiloculaire, ou plutôt de plusieurs anthères biloculaires accolées. Les femelles, disposées en grappes nombreuses, petites, presque terminales, présentent un calice tripartit, court, persistant ; trois styles courts et réfléchis ; des stigmates légèrement épaissis ; une capsule trilobée, à trois lo-

gas monospermes, percées d'une ouverture de leur côté interne. On en cite une seule espèce; c'est un Arbrusta de la Cochinchine, plein d'un suc résineux qui jouit de propriétés émétiques et purgatives. Ses feuilles sont alternes, très-entières et glabres.

(A. D. J.)

**COMMIER.** BOT. PHAN. Pour Comia et Gommier. V. ces mots. (B.)

**COMMIPHORE.** *Commiphora*. BOT. PHAN. Sous le nom de *Commiphora madagascariensis*, Jacquin (*Hort. Schoenbrunn.* 2, p. 66, t. 49) a décrit et figuré un Arbrisseau de Madagascar appartenant à la Dicoécie Octandrie, L.; mais dont les caractères incomplets ne permettent pas de déterminer la place dans les familles naturelles. Sa tige, droite et ramoureuse, s'élève à la hauteur d'un mètre et plus. Les branches, d'un brun cendré, sont très-étalées, garnies de feuilles alternes, pétiolées, glabres, oblongues, aiguës et dentées en scie; à la base de chaque feuille se trouvent deux folioles opposées et arrondies; fleurs dioïques; les mâles sont petites, jaunâtres, naissant avant les feuilles, agrégées et presque sessiles sur les ramifications; leur calice est campanulé, à quatre dents aiguës et étroites; la corolle à quatre pétales concaves, aiguës et un peu réfléchis; huit étamines insérées sur le réceptacle, incluses et alternes avec les pétales, à filets subulés et à anthères oblongues et dressées. Les fleurs femelles sont inconnues. (O. N.)

**COMOCLADIE.** *Comocladia*. BOT. PHAN. Les manuscrits de Plumier avaient fait connaître un genre de Plantes, appelé *Pseudo-Brasilium*, composé de deux espèces; l'une glabre, l'autre hérissée de poils, toutes les deux à feuilles pinnées, à fleurs en panicules, ayant un fruit drupacé à un seul noyau, et plein d'un suc qui mûrit à l'air, etc. Ces caractères s'accordent parfaitement avec ceux donnés par Bory de Saint-Vincent et Jac-

quin, pour le genre *Comocladia*. Il y a donc identité entre celui-ci et le *Pseudo-Brasilium* de Plumier, qu'il ne faut pas confondre avec un autre genre cultivé sous ce dernier nom dans le Jardin de Paris à l'époque de la publication du *Genera Plant.* de Jussieu. D'après Lamarck, on doit aussi rapporter ici le *Tariri*, Arbrisseau tinctorial figuré par Aublet (*Plantes de la Guiane*, tab. 390).

Le *Comocladia* est du petit nombre des genres de Dicotylédones qui se placent dans la Triandrie Monogynie. Jussieu l'a rangé dans la seconde section des *Terbinthacées* près des genres *Cneorum*, *Rampis* et *Canarium*. Ses caractères, d'après Jacquin, sont : calice très-petit, à trois divisions très-profondes; corolle formée de trois pétales plus grands que le calice, étalés, ovales et aigus; trois étamines à filets très-courts et à anthères didymes; un stigmate obtus et sessile sur l'ovaire. Le fruit est une drupe oblongue, arquée et succulente, marquée de trois points au sommet et contenant un noyau de même forme uniloculaire et monosperme.

Les espèces de ce genre sont encore en petit nombre, mais leur connaissance offre assez d'intérêt en raison des usages variés auxquels on les emploie, ou des dangereuses propriétés qu'on leur attribue. Ce sont des Arbres de moyenne grandeur, indigènes de l'Amérique méridionale et des Antilles. Nous citerons comme les plus remarquables : *Comocladia* *indica* (L.) et *Comocladia* *indica* (L.)

Le *COMOCLADIE* (A. FLORE) est une Plante, *Comocladia indica* (L.), figurée dans *Storne* (*Jamaica* t. 2, fig. 6). Arbre de six à huit mètres de hauteur, à branches et à portant des feuilles pinnées avec impaire, à folioles pétiolées, opposées, ovales, lancéolées, aiguës et très-entières; les fleurs forment de grandes grappes axillaires et sont de couleur pourpre foncée. Il a deux points noirs le long des ramifications des Antilles. On lui donne à Saint-Domingue le nom impropre de *Brésillet*, parce qu'il fournit une

ouleur analogue à celle du bois de résil, *Cesalpinia echinata*, mais un rouge terne plus foncé. Il sert faire quelques ouvrages de tour et de menuiserie, quoiqu'on lui ait connu l'inconvénient de se tordre. Les jeunes créoles de la Jamaïque mangent son fruit lorsqu'il est mûr; sasseur est alors acidule, et il a une couleur pourpre foncée qui le fait distinguer de celui qui n'est pas mûr et dont la couleur est d'un rouge clair. Dans le dernier état, participant aux propriétés générales des autres parties de l'arbre, il ne serait pas sans danger. Elles-ci sont pleines d'un suc tellement caustique qu'il désorganise entièrement les tissus cutanés, ce qu'il a fait employer par des colons inhumains pour imprimer leur nom sur de malheureux nègres, comme nous l'avons vu avec le feu, en Europe, sur les bêtes de somme, et sur les chevaux des régimens.

La *COMOCLADIA DENTÉE* (*Comocladia dentata*, Willd.), est un autre arbre de Saint-Domingue, que les habitants de la partie espagnole de cette île nomment *Cusso*. Il ne diffère du précédent que par ses feuilles bordées de dents épineuses, et parce que ses fruits ne sont pas comestibles. L'odeur infecte d'Hydrogène sulfuré que dégagent ses feuilles lorsqu'on les froisse, indique des qualités assez actives; on va même jusqu'à dire que les émanations sont si dangereuses que des personnes endormies sous son ombrage y ont péri. L'expérience que Jacquelin a voulu jusqu'à un certain point vérifier, mais qui heureusement ne lui a pas réussi. Au reste, les propriétés délétères que partagent les *Comocladia* quelques espèces de *Rhus* où elles sont même beaucoup plus exaltées, confirment les corrélatives indiquées par Jussieu et DeCandolle entre la nature et les formes extérieures des Plantes de même famille.

Les autres espèces sont d'une stature moins élevée que les précédentes, et sont bien moins intéressantes à connaître.

**COMODI ou COMODY.** BOT. PHAN. Syn. indou de *Justicia repens*. (B.)

**COMOLANGA.** BOT. PHAN. *V. CAMALANGA.*

**\* COMON.** BOT. PHAN. (Aphlet.) Espèce de Palmier de la Guiane, appelé aussi Coman, et qui paraît appartenir au genre *Bactris*. (B.)

**\* COMORICHA.** BOT. PHAN. (Dalechamp.) Syn. ityrien du *Phyllirea* à feuilles étroites. (B.)

**\* COMOS ANDALOS.** Selon Pausanias, c'était le nom grec d'une fleur dont les habitans d'une ville du Péloponèse faisaient des couronnes dans leurs fêtes religieuses. Cette fleur était une Jacinthe suivant quelques botanistes; d'après l'Écluse, ce devait être la Tulipe rouge; enfin C. Bauhin l'a rapportée au Lis rouge ou *Lilium bulbiferum*. (B.)

**COMOSPERME.** BOT. PHAN. Pour *Comesperme*. *V.* ce mot. (A. R.)

**COMPAGNON.** MAM. L'un des noms vulgaires du *Mus socialis* de Pallas, qui est un Campagnol. *V.* ce mot. (B.)

**COMPAGNON BLANC.** BOT. PHAN. Nom vulgaire de la variété de la *Lychtide* dioïque dont les fleurs sont blanches. (B.)

**COMPAS-SCALLOP.** MOLL. L'un des noms marchands du *Pecten plourenostes*. *V.* *PRIGNE*. (B.)

**COMPÈDES.** OIS. Nom sous lequel divers auteurs distinguent les Oiseaux à pieds palmés, qui ont la majeure partie de la jambe engagée dans l'abdomen. (DE-Z.)

**COMPOSÉE.** (FLEUR.) BOT. PHAN. Dans le Chardon, l'Artichaut, le Sureau, la Chicorée, etc., les fleurs sont fort petites, rapprochées les unes contre les autres sur un réceptacle commun, et environnées de bractées disposées symétriquement. C'est un petit assemblage de fleurs que les anciens botanistes donnaient le nom de fleur composée. Mais cette expression im-

propre n'est plus employée aujourd'hui, et l'inflorescence des Plantes réunies dans la Syngénésie de Linné, est aujourd'hui considérée, et avec raison, comme un simple capitule. *V.* ce mot. Quelques auteurs lui ont donné le nom de Calathide. *V.* CALATHIDE. (A. R.)

Pendant fort long-temps, on a également nommé COMPOSÉES la famille naturelle de Plantes formée par la Syngénésie de Linné. Mais ce nom rappelant celui de fleur composée, dont il vient d'être question et dont on avait reconnu l'impropriété, le professeur Richard lui a substitué celui de Synanthérées, généralement adopté par les botanistes modernes. *V.* SYNANTHÉRÉES. (A. R.)

\* COMPOSÉS (CORPS). Résultats de la combinaison naturelle ou artificielle de plusieurs corps simples. Ils sont binaires, ternaires, quaternaires, etc., suivant le nombre des principes qu'ils admettent dans leur composition. (DR..Z.)

\* COMPOSITÉES. *Compositi.* BOT. CRYPT. (*Lycoperdaceés.*) Nom donné par Link à une section de ses *Gastromyci*. *V.* LYCOPERDACEÉS. (AD. B.)

\* COMPOSITIFLORES. BOT. PHAN. (Gaertner.) Syn. de Synanthérées. *V.* ce mot. (B.)

COMPTONIE. *Comptonia.* BOT. PHAN. On appelle ainsi un genre de Plantes formé par Gaertner avec le *Liquidambar asplenifolia*, et qui vient se ranger dans la nouvelle famille des Myricées de Richard. Il se reconnaît aux caractères suivans : fleurs monoïques, disposées en chatons. Les chatons mâles plus nombreux sont placés à la partie supérieure des jeunes rameaux, naissant immédiatement au-dessus de la cicatrice des feuilles de l'année précédente, et sont alternes comme elles. Ils sont cylindriques et allongés. Les chatons femelles, au nombre de deux, plus souvent même solitaires, sont beaucoup plus courts que les chatons mâles, au-dessous desquels ils sont immédiatement

placés. Dans les chatons mâles, les écailles sont imbriquées, très-serrées les unes contre les autres. A leur base interne, on trouve quatre ou cinq étamines dont les filets sont fort courts et les anthères didymes. On trouve quelquefois des chatons dont toutes les fleurs sont à quatre étamines, et d'autres qui en présentent constamment cinq. Les chatons femelles sont beaucoup plus courts que les mâles ; ils sont ovoïdes, allongés, formés d'écailles également imbriquées. A la base interne de chaque écaille se trouve une fleur femelle. Celle-ci se compose d'un calice formé de trois folioles lancéolées et inégales, les deux latérales étant un peu plus longues. Chacune d'elles est accompagnée à sa base interne d'un petit corps charnu et comme glanduleux. Ces folioles s'accroissent sensiblement après la fécondation, et accompagnent le fruit. L'ovaire est sessile un peu comprimé à une seule loge, renfermant un seul ovule dressé. Le style est extrêmement court et à peine distinct du sommet de l'ovaire. Il se termine par deux stigmates subulés, glanduleux, beaucoup plus longs que les écailles du chaton. Le chaton fructifère est globuleux, bariolé d'écailles linéaires et ciliées sur leurs bords. Les fruits sont ovoïdes, allongés, un peu comprimés. Leur péricarpe est légèrement charnu et dehors, dur et crustacé en dedans ; il renferme une seule graine dressée. Ayant comparé avec la plus scrupuleuse attention, les caractères du genre *Comptonia*, que nous avons traités avec quelque étendue, avec ceux du genre *Myrica*, nous n'avons trouvé aucune différence sensible entre ces deux genres, et nous pensons qu'ils doivent être réunis.

Une seule espèce forme le genre *Comptonia*. Elle est originaire de l'Amérique septentrionale et porte le nom de *Comptonia asplenifolia*, Michx. C'est un Arbrisseau-rameux que l'on cultive quelquefois dans les jardins. Ses feuilles sont alternes et ont quelque ressemblance avec celles du *Ce-*

érach, c'est-à-dire qu'elles sont allongées, profondément crénelées et un peu velues en dessous. (A. R.)

COMSAREN. BOT. PHAN. Syn. norvégien de *Prunella vulgaris*, L. V. RUNELLA. (B.)

CO-MUC. BOT. PHAN. Nom cochinois d'une Plante qui sert à teindre les cheveux, et qu'on croit être l'*Eclipta erecta*, L. (B.)

CONABIBY. ois. (Sonnini.) Syn. vulgaire à la Guiane de l'Autour de Cayenne, *Falco cayennensis*, L. V. L'AUCON, division des Autours. (DR..Z.)

\* CONAMBAI-MIRI. BOT. PHAN. (Moane.) Même chose qu'Avenka. V. mot. (B.)

\* CONAMBAYA. BOT. CRYPT. (Pison.) Ptéride bipinnée qu'il est difficile de déterminer exactement. (B.)

CONAMI. BOT. PHAN. Aublet, sous ce nom, a désigné un genre qui n'est autre chose qu'une espèce de *Phyllanthus*. Cette Plante paraît douée de propriétés narcotiques, et, mêlée à l'eau, jette les Poissons dans un état de stupeur. Aublet apprend que ce nom de *Conami* est appliqué dans la Guiane aux divers Végétaux qui ont le même effet, et, par suite, les mêmes usages. (A. D. J.)

CONANA. BOT. PHAN. Nom de plusieurs, à la Guiane, paraît être le même de ceux qui désignent le Corosol. V. ce mot. (B.)

CONANAM. BOT. PHAN. Aublet. Préfontaine mentionnent sous ce nom un Palmier de la Guiane, qui paraît être l'*Elais guianensis*. (B.)

CONANI. BOT. PHAN. Pour Conani. V. ce mot. (B.)

CONANTHÈRE. *Conanthera*. BOT. PHAN. Genre établi par Ruiz Pavon dans la Flore du Pérou, placé dans l'Hexandrie Monogynie, et auquel ils ont donné les caractères suivans : périanthe supère, six divisions réfléchies; anthères unies en forme de cône; capsule longue, trilobulaire et trivalve; se-

mences peu nombreuses et presque rondes. Une seule espèce constituait primitivement ce genre; c'était le *Conanthera bifolia*, Fl. Peruv., figurée par Trew, T. III, sous le nom de *Bermudiana pulposa*. Cette Plante est indigène du Chili; ses fleurs sont d'un bleu violet, panachées à la base des pétales. On mange dans le pays ses bulbes, soit crus, soit cuits.

A cette espèce, Persoon a réuni une Plante qui, s'il est vrai qu'elle se rapporte bien au genre *Conanthera*, doit faire modifier ses caractères. C'est l'*Echeandia terniflora* d'Ortega, dont la hampe est simple, les feuilles linéaires; les fleurs jaunes et les filets des étamines garnis de points glanduleux. On ignore sa patrie; mais elle est cultivée au Jardin des Plantes de Paris où nous l'avons souvent remarquée, surtout à cause de la soudure de ses anthères, cas très-rare chez les Monocotylédones. Dans cette espèce, le périanthe n'est point supère; on voit, au contraire, un ovaire libre, sous lequel sont insérées les étamines; ce n'est donc pas parmi les Narcissées qu'on doit placer cette Plante, ainsi qu'on l'a imprimé quelque part, mais bien plutôt près des Asphodélées, dont son organisation et son port indiquent l'affinité. Cavanilles avait également senti ces rapports, en la réunissant aux *Anthericum*. Nous pourrions ajouter qu'elle ressemble beaucoup par son *faciès* à certains *Sisyrinchium*; mais le nombre et l'insertion des étamines sont trop différens pour qu'on veuille les rapprocher. (G. N.)

\* CONASSI. BOT. PHAN. V. CODAGAPALA.

\* CONASTELLO ET CONASTRELLO. BOT. PHAN. Syn. de Troëne dans quelques cantons de la Lombardie. (B.)

CONCA DE MORU. ois. Syn. sarde de l'Hirondelle de fenêtre, *Hirundo urbica*, L. V. HIRONDELLE. (DR..Z.)

CONCANAUTHLI. ois. (Hernandez.) Nom mexicain d'un Canard;

dont la description spécifique ne nous est parvenue. (DR..Z.)

**CONCEPTACLE.** *Conceptaculum*. BOT. Sous le nom de *Conceptaculum seminum*, Jüngius et Medikus ont désigné le péricarpe des fruits, quelle que fût sa forme ou sa nature, réservant le mot *Pericarpium* pour les péricarpes secs. On l'a aussi appliqué spécialement au réceptacle des organes reproducteurs des Végétaux cryptogames, tels que les Champignons, les Lichens, les Hypoxylées et les Algues; mais cet organe a reçu des noms qui non-seulement diffèrent d'une famille à l'autre, mais qui sont encore très-multipliés dans la même famille. Ainsi le Conceptacle des Champignons est appelé Pédion, celui des Hypoxylées Sphérule, Lirvelle; dans les Lichens, il est assez communément désigné sous le nom d'*Apothecium* ou *Apothecia*, quoiqu'on l'ait aussi nommé Scutelle, Orbille, Patellule, Gyrome, Globule, Cistule, Céphalode, etc. V. tous ces mots. (G..N.)

**CONCEVEIBA.** BOT. FRAN. Aublet (Plantes de la Guiane, pag. 353) nomme ainsi un Arbre dont on ne connaît jusqu'ici que les fleurs femelles. Elles sont portées sur des pedoncles épaissis et articulés, disposés sur un axe commun. Le calice est composé de cinq ou six divisions aiguës et roides, au-dessous desquelles sont extérieurement des glandes souvent bilobées. Le style est court, triparti; les trois stigmates se partagent à leur extrémité; l'ovaire est trigone, parsemé d'une poussière qu'on reconnaît, à l'aide de la loupe, être formée par des petits poils étoilés; il présente trois loges, dont chacune, un peu velue à sa base, contient un ovule unique, surmonté d'un appendice plus ou moins long. Le fruit se sépare en trois portions, dont chacune se subdivise en deux valves, et les graines sont revêtues d'une coiffe charnue, bonne à manger. Les feuilles sont alternes, portées sur un long pétiole accompagné de stipules, lé-

gèrement dentées, glabres sur leur surface supérieure, et marquées sur l'inférieure d'un réseau de vaisseaux assez saillans. Le Concreta paraît appartenir aux Euphorbiées. (A. B. I.)

\***CONCHA TRILOBA.** CRUST. AN. sous lequel on a désigné anciennement les queues des Trilobites qu'on croyait être des Coquilles. V. TRILOBITE. (ATT.)

**CONCHELA.** BOT. FRAN. C'est-à-dire *Petite Conque*. Syn. portugais de *Cotyledon Umbilicus-Veneris*. (A.)

**CONCHIFÈRE.** *Conchifera*. ZOOI. Classe établie par Lamarck (Animaux sans vert. T. v, p. 411) pour les Mollusques acéphales de Cuvier. Une bouche au-dessus de laquelle se trouve un ganglion nerveux, que l'on regarde comme le cerveau, peut-être considérée comme une tête. Nous ne le croyons pas; car, pour tous les êtres organisés vivans, la tête est cette partie qui rassemble, outre un centre commun de rapport des sensations ou des irritations, quelques sens extérieurs, comme ceux de la vision, de l'ouïe, etc. Ce n'existant pas dans les Conchifères on peut donc aussi, avec Cuvier, leur donner le nom d'Acéphales; mais il est difficile de croire avec lui que le mot de tête ne signifie pas, avec d'autres caractères organiques bien tranchés pour faire des Animaux dont il s'agit une classe particulière, et de regarder ces caractères comme d'une valeur seulement égale à ceux qu'on tire du mode de marcher, lesquels ne sont que de simples modifications dans les organes respiratoires des Animaux mollusques proprement dits. Nous serons donc obligés de convenir que ces caractères ont trop d'importance pour pouvoir se comparer, et nous admettons avec le célèbre auteur de l'Histoire Naturelle des Animaux sans vertèbres la classe des Conchifères. Cette classe est si naturelle qu'Aristote l'avait désignée sous le nom de *Coques*, dans lesquelles il faisait entrer



comme genre les Huîtres qui comprennent, par une acception étendue, toutes les Coquilles fixées sur les rochers ou au fond de la mer, ainsi que les Galades, les Cames, les Solens & quelques autres genres qu'il avait distingués. Ceci nous semble suffisant pour faire voir que, depuis Aristote, on reconnaissait parmi les Coquilles un genre ou plutôt une classe particulière pour les Bivalves. Comme cette partie s'est perfectionnée avec le reste de la science, et que son histoire y est liée intimement, ce sera à l'article CONCHYLIOLOGIE que nous la traiterons avec détail. Nous nous contenterons ici d'en établir les caractères et d'en exposer les divisions. Lamarck les a distingués par les caractères suivans : Animaux mollasses, inarticulés, toujours fixés dans une coquille bivalve; sans tête et sans yeux; ayant la bouche nue, cachée, dépourvue de parties dures, et un manteau ample, enveloppant tout le corps, formant deux lobes lamelliformes, à lames souvent libres, quelquefois réunies par-dessus; génération ovo-vivipare; point d'accouplement; branchies externes, situées de chaque côté entre le corps et le manteau; circulation simple; le cœur à un seul ventricule; quelques ganglions rares; des nerfs divers, mais point de cordon médullaire ganglionné; coquille toujours bivalve, enveloppant entièrement ou en partie l'Animal, tantôt libre, tantôt fixée; valves le plus souvent réunies d'une seule pièce par une charnière ou un ligament; quelquefois des pièces testacées accessoires et étrangères aux valves augmentent la coquille.

Les Conchifères, n'ayant point de tentacules, sont conséquemment dépourvus de tentacules; leur bouche, cachée entre les lobes du manteau, n'est mue que d'appendices labiaux; elle est toujours dépourvue de parties dures, parce qu'elle n'est destinée qu'à recevoir des alimens qui n'ont pas besoin d'être broyés; c'est, à bien dire, l'entrée de l'œsophage qui lui-même est dur, large, et aboutit directement

à l'estomac qui n'en est qu'un renflement. Le système de circulation et de respiration se compose de branchies en nombre pair et variables, externes, grandes quelquefois autant que le manteau, formées de plusieurs filets résultant d'une multitude de petits vaisseaux parallèles, artériels, qui vont se rendre dans un tronc commun, lequel aboutit lui-même au cœur situé vers le dos. Quant au système nerveux, il est moins avancé dans sa composition; un ganglion se remarque au-dessus de la bouche, et ce ganglion a été considéré comme le cerveau; un autre plus éloigné est lié au premier par deux filets nerveux et par d'autres branches qui en partent; il donne la sensibilité à presque toutes les parties. La manière dont les Conchifères se meuvent est bien différente de celle qu'emploient les Mollusques proprement dits; ils n'ont point sous le corps un disque pour ramper, mais quelques-uns ont un corps charnu, musculueux, qui leur sert à s'avancer en s'enfonçant dans le sable, et même à exécuter des sauts; et ce corps, devenant même tendineux, se divise en une multitude de filamens plus ou moins fins, sert à fixer l'Animal, et se nomme alors *Byssus*. Tous les Conchifères sont revêtus d'une coquille formée de deux pièces uniques ou principales, le plus souvent semblables, dures, testacées, réunies à leur base par un ligament élastique, ligament qui, par sa structure, agit toujours de la même manière, soit qu'il existe intérieurement, soit qu'il se montre à l'extérieur; les valves sont encore retenues dans leur position par des dents cardinales plus ou moins nombreuses, disposées comme des engrenages dont les parties saillantes sont reçues dans des enfoncemens et réciproquement. Lamarck est le premier qui se soit servi du nombre des muscles pour diviser les Conchifères en deux ordres; cette méthode a été adoptée en 1810 par Ocken, et depuis par presque tous les conchyliologues. Il a employé aussi des caractères

tières secondaires non moins faciles à saisir : ces caractères consistent dans l'égalité ou la non égalité des valves, dans le bâillement plus ou moins considérable de ces valves, etc., caractères que nous ferons connaître en particulier, en parlant de chaque famille et de chaque genre. Les muscles des Conchifères laissent sur les coquilles des impressions plus ou moins profondes qu'il est toujours très-facile de reconnaître. Ces impressions sont sub-centrales dans les Monomyaires (Conchifères à un seul muscle); alors le muscle traverse le corps de l'Animal dans son milieu; dans les Conchifères dimyaires (à deux muscles), au contraire, ils sont placés aux extrémités de la coquille, et semblent traverser ces mêmes extrémités; ces muscles sont fermes, durs, surtout vers les points d'attache.

Tous les Animaux de cette classe ne peuvent respirer que dans l'eau; ils vivent donc sans exception au milieu de cet élément. Le plus grand nombre habite les eaux de la mer; ceux qui se trouvent dans les eaux douces sont moins nombreux, quoiquela quantité s'en augmente à mesure que les recherches et les observations se multiplient.

Plusieurs classes d'Animaux qui rentrent dans les Mollusques et parmi les Annelides de Cuvier, étant susceptibles de se couvrir d'un corps protecteur que l'on est convenu de nommer Coquille, c'est à cet article que nous renvoyons pour tous les détails de formation et de structure.

Nous allons réunir dans un seul et même tableau les divisions principales admises parmi les êtres qui composent cette classe. V. le tableau ci-joint.

(D..H.)

\* CONCHIKAS. BOT. PHAN. Syn. de *Cercis Siliquastrum* chez les Grecs modernes. (B.)

\* CONCHILLE. BOT. PHAN. (Olivier de Serres.) Vieux nom du *Quercus coccifera*. V. CHÊNE. (B.)

\* CONCHOCARPE. *Conchocarpus*. BOT. PHAN. Genre de Plantes proposé par Mikan (*Delect. Flor. et Faun.*

*bras*. 1, p. 2) et adopté par Nées d'Esenbeck et Martius dans le Travail qu'ils viennent de publier récemment sur le groupe des *Rutaceæ*, qu'ils nomment *Fraxinellæ*. Voici les caractères que ces derniers lui assignent dans l'ouvrage que nous venons de citer : le calice est court, cylindrique et à cinq dents; la corolle se compose de cinq pétales soudés intimement de manière à représenter une corolle monopétale, tubuleuse, hypocratériforme, dont le limbe est à cinq divisions inégales. Des sept étamines, deux seulement sont fertiles et anthérifères; elles sont insérées vers la base du tube; leurs anthères sont allongées à deux loges, sans appendices à leur base; les cinq étamines stériles sont sous la forme de filamens subulés plus longs et glanduleux; l'ovaire est à cinq côtes et cinq loges, porté sur un disque hypogyne qui les recouvre dans leur partie inférieure; le style se termine par un stigmate cylindrique; le fruit se compose de cinq coques monospermes, coriaces, s'ouvrant intérieurement par une suture longitudinale.

Ce genre se compose de deux espèces qui croissent dans les forêts du Brésil. Ce sont deux Arbrisseaux à feuilles simples ou ternées, glabres, ponctuées, alternes, sans stipules, portant des fleurs d'un rose pâle, munies de bractées et disposées en grappes allongées. L'une, *Conchocarpus macrophyllus*, Mikan (*loc. cit.* t. 2), a été trouvée dans la province des Mines au Brésil; elle porte des feuilles très-grandes, simples, pétiolées, elliptiques, allongées, arrondies à leur base. La seconde a été décrite et figurée par Nées d'Esenbeck et Martius (*Fraxinellæ*, p. 16, t. 2) sous le nom de *Conchocarpus cuneifolius*. Elle se distingue de la précédente par ses feuilles également pétiolées, mais rétrécies à leur base cunéiformes. Elle croît au Brésil.

(A..B.)

\* CONCHODERME. *Conchoderma*. MOLL. Olfers a donné le premier

NOMS

DES FAMILLES.

|             |                                        |                  |                                                                  |
|-------------|----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| CONCHIFÈRES | ORDRE I<br>CONCHIFÈRES<br>BIVYAIRES    | .....            | { TUBICOLÈRES.<br>PHOLADAIRES.<br>SOLÉNACÉES.<br>MYTAINES.       |
|             |                                        | ent intérieur. . | { MACRACÉES.<br>CORBULÉES.                                       |
|             |                                        | ent uniquement   | { LITHOPHAGES.<br>NTMYPHACÉES.                                   |
|             |                                        | .....            | { CONQUES.<br>CARDIACÉES.<br>ARCACÉES.<br>TRIGONÉES.<br>NATADES. |
|             |                                        | .....            | { CAMACÉES.                                                      |
|             |                                        | .....            | { TRIDAGNÉES.                                                    |
|             |                                        | .....            | { MYTILACÉES.<br>MALLÉACÉES.                                     |
|             |                                        | .....            | { PECTINIDES.                                                    |
|             |                                        | .....            | { OSTRACÉES.                                                     |
|             |                                        | .....            | { RUDISTES.                                                      |
| CONCHIFÈRES | ORDRE II<br>CONCHIFÈRES<br>MONOMYAIRES | .....            | { BRACHYPODES.                                                   |

ger les organes de la respiration ; c'est sur ces organes qu'elle vient pour ainsi dire se mouler ; les modifications de la coquille seront donc des traces certaines de celles des organes de l'Animal qui l'habite. Cette proposition nous semble tellement rentrer dans l'ordre naturel, que nous ne chercherons pas à insister longtemps sur ce point ; et nous dirons seulement que les poumons des Vertébrés qui respirent l'air, que les branchies qui sont les poumons modifiés pour respirer l'eau dans les Poissons, se trouvant parfaitement en rapport avec les enveloppes extérieures qui les protègent et en facilitent les fonctions, de même, dans les Invertébrés où la respiration n'est guère moins importante, et surtout dans les Mollusques dont l'organisation est la plus avancée, les parties protectrices de la fonction ont dû être modifiées, et on doit voir sur elles comme dans tous les êtres les traces plus ou moins sensibles de cette modification.

Nous ne chercherons pas ici à prouver l'utilité de l'étude des Mollusques ; quand même leur connaissance ne fournirait aucune application utile à nos besoins et à nos arts, elle n'en serait pas moins nécessaire à l'histoire de l'ensemble des êtres. Mais en la présentant sous un autre point de vue, nous voulons parler de son application à la géologie, elle prend alors un intérêt que les anciens conchyliologues ne lui connaissent pas. En effet, que sont les Coquilles ; et en général les restes fossiles des autres Animaux, sinon d'antiques médailles qui sont la preuve la plus évidente des changemens qu'a éprouvés la surface de la terre ? Et en nous servant de justes comparaisons, ces débris nous mettent à portée d'apprécier jusqu'à un certain point les changemens qui se font d'une manière peu sensible sous nos yeux. Un autre fait où nous conduit cette application est celui relatif aux analogues : pour arriver à ce résultat, il a fallu étudier avec soin toutes les espèces en particulier, les

comparer ensuite avec les Coquilles fossiles des différentes régions, et constater l'analogie, non pas par une ressemblance même frappante, mais par une ressemblance exacte dans les plus petits détails. Quel a dû être l'étonnement du naturaliste, après une suite nombreuse de pareilles comparaisons, lorsqu'il a retrouvé au milieu des terres, dans d'autres climats, à des températures actuellement différentes, les Coquilles les plus parfaitement analogues ? Quelles conclusions a-t-il dû tirer d'un tel fait, que l'on peut regarder comme général ? Deux idées se présentent en se rattachant à deux systèmes ; le premier, le plus ancien, qui admet des bouleversemens, des cataclysmes, d'énormes transports de terrains ; et qui nous offre plus de sectateurs aujourd'hui parmi les géologues. On supposerait alors que les Coquilles ainsi que les conchies, ou elles se trouvent, auraient été déposées loin de l'endroit de leur première formation, et que des restes d'Animaux qui ne vivent plus que dans la zone torride, se seraient trouvés rejetés à plusieurs milliers de lieues dans les pays tempérés, et même septentrionaux, par un de ces bouleversemens que l'on a longtemps supposés pour se rendre compte des faits. Mais comment se ferait-il que des Coquilles, quelquefois très-minces et très-déliées dans leur structure, se soient trouvées transportées à des distances énormes, comme par enchantement, sans éprouver de fracture, sans même que de légères aspérités aient été usées, quand nous voyons sur nos côtes, et même dans nos rivières, les Coquilles s'usur et devenir méconnaissables en fort peu de temps, lorsqu'elles sont soumises au balottement des flots.

L'autre hypothèse qui acquiert chaque jour quelque nouveau degré de probabilité, est celle qui suppose un changement de température dans les lieux où les Animaux, dont nous trouvons les têtes fossiles, ont vécu et ont été enfouis. Que le changement de température ait eu lieu par refroidissement

de la terre, comme quelques-uns le pensent d'après Buffon, ou par toute autre cause que nous ne pouvons apprécier, le fait n'en est pas moins constant, et l'observation journalière faite sur les Fossiles, non-seulement des environs de Paris, mais encore des autres pays, nous apprend qu'ils ont autrefois vécu dans le lieu de l'enfouissement ou à très-peu de distance, puisque nous les retrouvons d'une conservation parfaite dans les parties les plus délicates et les plus fragiles.

Aristote a le premier consigné dans ses écrits quelques notions sur les Coquilles. Il les a distinguées, l'après leur habitation, en terrestres et en marines; il divise ensuite ces dernières en univalves et en bivalves. Il fait une section dans laquelle il place les Turbinées qu'il ne distingue que par le volume, la prééminence de la spire, la mollesse plus ou moins grande de l'Animal. Nous ferons observer ici que le nom de Mollusques a été appliqué par lui à des Animaux nous ou qui ont un os à l'intérieur, comme les Sèches, les Calmars, etc.; ceux-ci font aujourd'hui la troisième division des Céphalopodes de Lamarck. Les écrits du philosophe grec sont d'ailleurs remplis d'une foule d'observations très-justes; ne pouvant les consigner ici, nous renverrons le lecteur à son Histoire des Animaux (liv. 4, pag. 189, parag. 4, traduction française de Camus, 1783). Nous ne cherchons qu'à établir ce fait, que c'est à Aristote qu'on doit la division des Coquilles d'après leur habitation, division qui a été long-temps admise par beaucoup d'auteurs après lui. Linné et quelques naturalistes qui le suivirent, en ne faisant que répéter ce qu'avait écrit Aristote, n'ajoutèrent rien à l'histoire naturelle des Animaux que la postérité doit à ce grand homme. On peut même dire que depuis Aristote jusqu'à Daniel Major, en 1675, rien n'a été fait dans le véritable intérêt de la science; en effet, est-ce en réunissant des collections pour le vain plaisir de récréer les yeux, sans y

mettre d'autre soin que de les embellir par des objets d'un grand prix, riches en couleur, et souvent même dénaturés par le poli artificiel qu'on leur donne, que l'on peut faire marcher une science? Pendant long-temps il en a été ainsi de la Conchyliologie, et, comme la plupart des autres parties d'histoire naturelle, elle a suivi à peu près les phases et les progrès de la philosophie moderne; présentant néanmoins, sous quelques rapports, un moindre intérêt aux zoologistes par le peu d'utilité dont ils la jugeaient et par le peu de connaissance qu'ils en avaient, ils l'abandonnèrent pour ainsi dire, et si quelques hommes supérieurs n'avaient tenté de la mettre au rang des autres parties de la science, et n'avaient jeté de temps à autre quelque lumière sur elle, Linné l'eût encore trouvée dans l'enfance.

Pour faire convenablement l'histoire de la Conchyliologie, il faut la diviser en deux grandes époques: 1° considérer ce qu'elle était avant Linné, établir par conséquent ses progrès et ses changemens avant l'apparition de ce génie réformateur; 2° la reprendre depuis Linné pour en suivre les modifications et l'avancement jusqu'à notre époque. Nous allons passer rapidement en revue, et par ordre chronologique, les principaux travaux qui, depuis Daniel Major, ont précédé ceux du célèbre professeur d'Upsal. En 1675, ce Daniel Major donna, à la fin du Traité de la Pourpre de Fabius Columna, dix tables synoptiques dans lesquelles il chercha à saisir quelques caractères généraux et spéciaux qui l'amènèrent à des coupes plus ou moins heureuses, et dont quelques-unes furent même long-temps admises. Comme il se borna, dans ce travail qu'il aurait pu rendre plus complet, à se servir des notes qu'il avait données dans l'ouvrage de Columna, il a dû nécessairement résulter de l'insuffisance des matériaux, une imperfection dépendant seulement du petit nombre d'objets observés. Nous devons néan-

moins lui savoir d'autant plus de gré des efforts qu'il a faits, qu'il n'avait guère de modèles à suivre et aucun antécédent; tout son travail est le fruit de son propre génie. En 1679, Harder donna, dans une petite brochure in-12, quelques détails sur l'anatomie de l'Animal des Hélices, mais ce travail est incomplet, et se ressent beaucoup du temps où il a été composé; il ne présente d'ailleurs qu'un fait isolé. En 1681, Grew, secrétaire de la Société royale de Londres, déjà connu par de belles découvertes en physiologie végétale, donna, dans le *Museum regalis Societatis*, des tables systématiques des genres de Coquilles; ses principales coupes qui sont encore admises aujourd'hui, sont tirées du nombre des pièces: les Coquilles simples (nos Univalves), les Coquilles bivalves, et les multivalves. Il donne en outre beaucoup d'excellentes indications qui peuvent conduire à des genres établis sur de bons caractères. Heyde, en 1684, publia, sous le titre d'*Anatomie Mytili belgicæ Massel*, etc., un petit volume in-12 avec des figures fort médiocres. L'Animal qu'il décrit appartient, d'après ce que nous pouvons en juger, au genre Modiole de Lamarck, et peut-être à l'espèce connue sous le nom de *Modiola Tudipa*.

En 1684, Sibbald, dans la *Scotica illustrata*, divisa les Coquilles d'après Aristote, c'est-à-dire suivant leur habitation; ainsi il les rangea en deux ordres, les terrestres et les aquatiques, et ces dernières en fluviatiles et en marines. Du reste, rien qui puisse intéresser la science ne se trouve dans cet ouvrage. Tels étaient, en 1685, les antécédents de Lister. Placé dans des circonstances plus favorables, ce médecin de la reine Anne sut en profiter. Le commerce étendu de l'Angleterre, et ses nombreuses relations, le mirent en état d'embrasser l'universalité de ce qui était connu en Conchyliologie, et de donner un plus vaste champ à ses observations; cependant il s'attacha encore aux grandes divisions d'Aristote, et son système ne différa de celui du philosophe grec que par

quelques détails dont nous allons donner un aperçu.

Lister renferme toutes les Coquilles dans quatre livres. Le premier comprend les Coquilles terrestres qu'il partage en deux parties: l'une traite de *Buccinis et Turbinibus terrestribus*; l'autre est intitulée: *Cochleæ nudaæ terrestres, Limacæ quibusdam dictæ*. Dans le second livre, il s'occupe des Coquilles d'eau douce qu'il divise également en deux parties; la première est consacrée aux Coquilles univalves, et la suivante aux bivalves. Le livre troisième traite des Coquilles bivalves marines, dans lesquelles l'auteur fait entrer les multivalves. La première partie de ce livre a pour titre: *Testaceis bivalvibus imparibus testis*; la seconde: *Testaceis bivalvibus paribus testis*, et la troisième: *Testaceis multivalvibus*. Il faut faire d'autant plus attention à cette distinction des Coquilles équivalves ou inéquivalves, qu'elle se trouve justifiée par la solidité des caractères, et que Lister est le premier qui s'en soit servi. Le quatrième livre renferme toutes les univalves marines divisées en seize sections, conduisant quelquefois à des familles assez naturelles ou à de bons genres, tels que les Patelles perforées au sommet (les Fissurelles); celles qui ont une lame intérieure courbée (les Calyptrées), etc.; etc. L'ouvrage que nous venons d'analyser, est d'ailleurs précieux par le grand nombre de bonnes figures qu'il renferme. Après Lister, en 1705, Rumph publia en hollandais un ouvrage où il rassembla tout ce que les Coquilles d'Amboine offraient de curieux; mais comme il n'ajouta rien à la science, nous nous hâtons d'arriver enfin à notre célèbre Tournesort qui, après avoir soumis les Végétaux à une savante classification, essaya aussi d'en appliquer une aux Coquilles; mais Tournesort mourut en 1708 et ne la publia pas, lui-même; son manuscrit fut communiqué à Gualtieri qui en fit l'application dans son ouvrage. Voici sur quoi cette méthode est basée: Toutes les Coquilles, dit-il, peu-

rent être séparées en trois classes ; les *Monotoma*, les *Ditoma*, et les *Polytoma*. Les Monotomes sont divisés, d'après la forme générale, en univalves, c'est-à-dire les Patelles, en Coquilles spirales et en Coquilles fistuleuses ; les Ditomes sont considérés d'après un caractère auquel on n'avait fait jusqu'alors aucune attention, et dont on est entièrement redevable à notre grand naturaliste. Il comprit dans une première famille tous les Ditomes parfaitement clos, et dans une seconde tous ceux qui sont ouverts ; mais, par une erreur palpable, il rangea les Pholades dans la première famille. Enfin, dans les Polytomes, où il plaça les Oursins, il établit encore deux familles : la première renferme les Oursins regardés comme des Coquilles articulées, et la seconde contient les Balanes dont les pièces sont réunies par un cartilage. — En 1711, Rumph, dans son *Thesaurus imaginum Piscium, Testaceorum, Cochlearum*, etc., sans établir des divisions méthodiques, sentit pourtant les rapports de certains genres, les moins difficiles à saisir il est vrai ; ainsi il circonscrivit assez bien le genre Cône, celui des Porcelaines, celui des Pterocères, et dirigea ensuite son attention sur les Coquilles operculées ; il les distingua en Coquilles dont l'opercule est rond comme celui des Turbots, et en Coquilles dont l'opercule est semi-lunaire comme celui des Scutelles.

Langius, en 1722, se servit de plusieurs divisions établies avant lui, et se contenta de les modifier ; c'est ainsi qu'il réunit dans une même coupe les Balanes, les Lépas et les Vermisseaux de Tournefort, auxquels il ajouta, dans des sections séparées, les Coquilles enroulées sur elles-mêmes, celles que les Nautilites, les Porcelaines et les Cornes d'Ammon ; dans une seconde partie, il rangea toutes les Coquilles dont la spire est saillante, et dans les sous-divisions il sut se servir de la forme de l'ouverture, ce qu'on n'avait pas fait jusqu'alors. Les Coquilles bivalves sont comprises

dans une dernière grande division, et Langius se sert, pour les distinguer, des caractères tirés par Lister de l'égalité ou de l'inégalité des valves ; mais comme les Coquilles inéquivalves sont en très-petit nombre, il les regarde comme des anomalies et les rejette dans une dernière section. Il ne fait pas mention des Multivalves.

Dans une dissertation publiée à Dantzick par Breyné, en 1752, celui-ci propose une nouvelle division qui est encore en usage aujourd'hui, parce qu'elle est juste dans l'application qu'il en fit ; mais, si l'on excepte cette idée saillante, tout le système est défectueux. L'auteur y sépare en deux sortes toutes les Coquilles, celles qui ont la forme d'un tube, et celles qui ont la forme d'un vase plus ou moins évasé. Il divise ensuite, 1<sup>o</sup> les Coquilles tubuleuses en Monothalamies ou formées d'une seule cavité, et en Polythalamies ou séparées en plusieurs cavités par des cloisons ; 2<sup>o</sup> les Coquilles en forme de vase sont divisées à leur tour en deux parties, les simples et les composées. Les Coquilles simples, sous le nom de Lépas, comprennent toutes les Univalves dont l'embouchure est large comme les Patelles, et les Coquilles composées renferment indistinctement les Bivalves, les Multivalves, les Balanes séparées des Anatifères, et les Oursins. Après Breyné, nous citerons dans l'ordre chronologique l'ouvrage de Plancus en 1739, qui le premier donna de l'intérêt aux Coquilles microscopiques. Il fit figurer avec soin celles que l'on trouve dans les sables de Rimini ; c'est ce travail qui a donné par la suite à Soldani l'idée d'en essayer un plus parfait. Gualtiéri, qui fit en 1742 l'application du système de Tournefort, publia un gros volume in-folio qui n'a pas même le mérite des bonnes figures ; il n'en a d'autre que d'en avoir rassemblé un assez grand nombre. La même année, D'Argenville, qui jouit long-temps d'une grande réputation, publia un ouvrage ayant pour titre : *L'Histoire Naturelle éclaircie* dans deux de ses

parties, la Lithologie et la Conchyliologie; mais, au lieu d'avancer cette science comme le titre semble l'annoncer, D'Argenville ne profita nullement de ce qui avait été fait avant lui, et se servit encore de l'habitation des Coquilles, comme Aristote l'avait fait le premier, pour établir de grandes divisions entre elles. Aussi, dans cet ouvrage, une première partie est destinée aux Coquilles marines, et une seconde aux Coquilles terrestres et fluviatiles; les subdivisions sont les mêmes que celles qu'avaient établies les auteurs précédents; seulement il rendit la méthode encore plus mauvaise, en plaçant dans les Multivalves les Oursins, les Tuyaux marins, les Glands de mer, les Pousse-Pieds, les Conques anatifères et les Pholades. On peut dire pourtant que, si l'ouvrage de D'Argenville est médiocre pour la distribution, il est un des premiers qui ait fixé l'attention sur les Animaux des Coquilles dont il fit figurer quelques espèces dans sa Zoomorphose; ce travail est, néanmoins, trop incomplet pour servir de base à un système. — Entre D'Argenville et Linné nous avons encore à citer, en 1750, Spengler qui, le premier, proposa le genre Gastrochène admis depuis, mais avec d'autres caractères; il le fit figurer avec son tube dans les *Nova Acta Danica*, chose à laquelle on ne fit pas attention en l'établissant de nouveau sans cette partie essentielle et caractéristique. Une suite d'observations qui nous sont propres, et que nous rapporterons avec détail à l'article Fistulane, prouvera que tous les Gastrochènes devront passer dans ce dernier genre. — En 1753, Klein proposa une nouvelle méthode pour classer les Coquilles; mais cette méthode ne présente pas des coupes assez naturelles, pour être admise; elle fut bientôt oubliée, quoiqu'elle eût le mérite d'avoir dirigé l'observation vers la forme de la bouche des Univalves; la division principale est prise comme dans la plupart des systèmes antérieurs du nombre des parties. Au lieu des *Monotoma*, *Ditoma*, *Polytoma*

de Tournefort, ce sont des *Monconcha*, *Diconcha*, *Polyconcha*, ce qui revient absolument au même, et ce qui ramène à la division de Lister, et aux Univalves, Bivalves et Multivalves de Linné. — Enfin si nous ajoutons l'ouvrage de Valentyn, en 1754, qui n'est autre chose qu'un supplément à celui de Rumph, et qui est exécuté dans le même plan, nous aurons à peu près le tableau des auteurs de l'époque qui précéda Linné, quand ce législateur publia la sixième édition du *Systema Naturæ*. Ainsi, avant Linné, personne n'avait cherché à appliquer la zoologie aux Animaux testacés, et conséquemment on n'avait pas tenté de faire accorder la connaissance de l'habitant avec les caractères extérieurs de sa demeure. Il trouva néanmoins quelques idées justes solidement établies par ses prédécesseurs. En effet, Grew avait proposé la division en Univalves, Bivalves, Multivalves; Lister avait fait voir que l'on pourrait tirer de bons caractères de l'égalité ou de l'inégalité des valves; Tournefort y ajouta celui du bâillement ou du non bâillement des valves; Breyne proposa les Monothalamés et les Polythalamés. Cependant une chose essentielle manquait à la partie des sciences qu'il fallait restaurer; c'était les connaissances zoologiques. Aussi, dans les premières éditions de Linné, on s'aperçut facilement, quoique son système valût mieux que les précédents, qu'il manquait de fondemens solides.

C'est à l'époque où les six premières éditions du *Systema* se succédaient avec rapidité, que parut l'ouvrage si important d'Adanson, qui dut avoir sur la manière de voir de Linné une très-grande influence par le point de vue tout à la fois nouveau et juste dont notre savant compatriote considéra l'étude de la Conchyliologie; et l'on vit aux éditions suivantes de son grand ouvrage combien Linné avait profité de celui du voyageur français. Comme nous ne voulons rendre compte de la méthode de Linné que lorsqu'elle eut atteint son dernier de-



ré de perfection, c'est-à-dire d'après les éditions qui suivirent la publication de l'ouvrage d'Adanson, nous exposons auparavant le résultat des observations de celui-ci. Adanson admet sous d'autres noms les trois divisions principales : les Limaçons sont ses univalves, les Conques ses Bivalves, les Conques multivalves ses Multivalves. Il divise les Limaçons en ceux qui sont sans opercules ou univalves proprement dits, et en ceux qui sont operculés. Les Limaçons proprement dits sont partagés en cinq familles : 1° ceux qui n'ont ni yeux ni cornes ; 2° ceux qui ont deux cornes, et les yeux placés à la base de la partie interne ; 3° ceux qui ont quatre cornes, les extérieures portant les yeux à leur sommet ; 4° ceux qui ont deux cornes, les yeux à la base, du côté externe ou par derrière ; 5° enfin ceux qui ont deux cornes, les yeux vers le milieu, sur le côté externe. Les Limaçons operculés sont divisés en trois familles : 1° ceux qui ont deux cornes avec un renflement, et qui portent les yeux au-dessus de la base, au côté externe ; 2° ceux qui ont deux cornes sans renflement, les yeux à la base, au côté externe ; 3° ceux qui ont quatre cornes, dont les extérieures portent les yeux au sommet. Telles sont les divisions principales établies entre les Univalves ou Limaçons. Cette distribution où l'on n'a tenu compte que d'un caractère physique, fondé sur les tentacules et les cornes qu'ils portent, a cet inconvénient grave qu'elle met en contact des espèces fort différencées, tels, par exemple, que le Limaçon terrestre (*Helix*) et l'Heliothide; tels encore que le Lépas Patelle, l'Yvet qui est une espèce de Volute, et la Vis, etc. — Les Conques ou Bivalves sont distribuées en trois familles d'après la forme du manteau : 1° les Conques qui ont les lobes du manteau séparés dans tout leur contour ; 2° les Conques dont les deux lobes du manteau forment des ouvertures sans aucun intervalle ; 3° les Conques dont les deux lobes du manteau forment trois ouvertures

dont deux prennent la figure d'un triangle assez long. Par ces caractères, le genre *Helix* lui seul est bien caractérisé ; quant aux autres, et surtout celui du Jambonneau, ils ressemblent des Coquillages bien différencés. On y voit des Modioles, des Moules, des Pignes, des Avicules, et même une Cardite. De ses Conques multivalves il a judicieusement écarté tout ce que différencés auteurs y avaient pour ainsi dire jeté au hasard, afin de n'y conserver que les *Pholades* et les *Tarrets*.

Linné, auquel toutes les parties d'histoire naturelle sont redevables d'une sorte de régénération, qui porta sur chacune d'elles cet esprit investigateur et d'observation qui a été le cachet de ses nombreux écrits, n'a pu perfectionner, autant qu'il l'aurait voulu, la classification des Coquilles. Comme nous l'avons déjà fait observer, les connaissances zoologiques n'étaient point assez exactes, ni assez multipliées de son temps pour établir un système invariable ; cependant ce grand homme en sentit l'importance, et ouvrit la marche à cet égard, en faisant entrer pour quelque chose la forme de l'Animal dans la composition du genre. En vain l'on pourra objecter que la plupart de ses applications comparatives des Animaux mollusques étaient fausses, il ne reste pas moins à Linné le mérite d'avoir fait le premier cette application ; faisant abstraction de l'importance de cette idée, et considérant ensuite son système comme simplement basé sur les caractères des Coquilles, il l'emporterait encore de beaucoup sur tous ceux qu'on avait établis avant lui. On pourra se convaincre de cette vérité par l'exposé rapide que nous allons en faire. Linné admet les trois coupes principales établies avant lui : les Multivalves, les Bivalves et les Univalves. Les Multivalves comprennent trois genres : *Chiton*, *Lepas* et *Pholas*. Les Bivalves sont divisées, comme il suit, en quatorze genres : 1. *Mya* ; 2. *Solen* ; 3. *Tellina* ; 4. *Cardium* ; 5. *Macra* ; 6. *Donax* ; 7. *Venus* ; 8. *Spondylus* ; 9.

*Chama*; 10. *Arca*; 11. *Ostrea*; 12. *Anomia*; 13. *Mytilus*; 14. *Pinna*. Toutes les Univalves, dont les Serpules, les Dentales et le Taret ne furent pas séparés, sont renfermées dans dix-neuf genres : 1. *Argonauta*; 2. *Nautilus*; 3. *Conus*; 4. *Cypræa*; 5. *Bulla*; 6. *Voluta*; 7. *Buccinum*; 8. *Strombus*; 9. *Murex*; 10. *Trochus*; 11. *Turbo*; 12. *Helix*; 13. *Nerita*; 14. *Haliotis*; 15. *Patella*; 16. *Dentalium*; 17. *Sabellia*; 18. *Teredo*; 19. *Serpula*. La plupart de ces genres sont bien circonscrits; cependant, à mesure que la science, appuyée d'une saine observation, a marché vers son but, on a trouvé des caractères échappés à Linné, assez solides pour démémbrer ses genres en plusieurs autres. Le système qui vient de nous occuper présente, on ne peut en disconvenir, plusieurs défauts; mais il a l'avantage sur tous les autres, d'avoir indiqué des rapports de relation d'un genre à son voisin; d'avoir, dans les Bivalves, considéré la forme de la charnière comme un caractère essentiel pour la circonscription du genre; et, dans les Univalves, la forme de la bouche; il a rendu plus facile par-là, ainsi que par ses phrases caractéristiques, la détermination exacte de l'espèce. Son auteur a senti, mieux que personne avant lui, la valeur de mots techniques qu'il n'a jamais employés que pour signaler des différences réelles. On peut dire qu'il a mis les naturalistes sur le vrai chemin nécessaire pour atteindre la perfection que l'on peut désirer à la science des Coquilles. Malheureusement il n'est qu'un petit nombre de naturalistes qui aient senti l'importance des préceptes qu'il a donnés, et nous voyons des auteurs systématiques tomber dans les errements des premiers conchyliologues; mais, comme les ouvrages de la seconde époque se multiplient beaucoup, qu'un certain nombre ont suivi strictement la méthode de Linné, que d'autres se sont contentés de publier sans méthode des recueils plus ou moins complets de figures, que d'au-

très ont encore admis d'anciens systèmes, et que d'autres enfin ont cherché à la modifier, en la rendant plus parfaite, nous citerons de préférence les ouvrages de Geoffroy, de Müller, de Bruguière, de Draparnaud, de Poli, de Daubebard de Férussac, de Cuvier, de Lamarck, comme étant du nombre de ceux qui ont fait faire les plus grands pas à la science, et qui l'ont enfin placée à la hauteur des autres parties de l'histoire naturelle. Comme nous nous proposons, à l'article MOLLUSQUE, de donner un précis historique des travaux qui concernent les connaissances anatomiques de ces Animaux, nous y renvoyons. Après Adanson et Linné, nous aurons à citer, en 1758, l'ouvrage de Séba, qui, quoique mal fait sous le rapport des descriptions, a le mérite, ainsi que ceux de Regenfusen de la même année et de Knorr en 1764, d'augmenter de beaucoup, par de bonnes figures, le nombre des espèces connues. En 1767, Geoffroy, médecin - régent de la Faculté de Paris, après avoir publié les Insectes des environs de la capitale qu'il habitait, donna aussi un traité sommaire des Coquilles, tant fluviatiles que terrestres, qui s'y trouvent. Ce petit ouvrage, dans lequel on s'est servi des Animaux pour établir des genres, est réellement précieux pour la quantité de bonnes observations que l'on y rencontre; il divise les Coquilles terrestres et fluviatiles en univalves et en bivalves. Les univalves renferment cinq genres : 1° le Limas, *Cochlea*; 2° le Buccin, *Buccinum*; 3° le Planorbe, *Planorbis*; 4° la Nerite, *Nerita*; 5° l'Ancyle, *Ancylus*. Les bivalves sont divisées en deux genres : 1° la Came, *Chama*; 2° la Moule, *Mytilus*. Tous ces genres sont établis avec netteté sur les caractères tirés des Animaux et des Coquilles.

Après Geoffroy, en 1769, commença à paraître le grand recueil de figures publié par Martini. Ce recueil, le plus complet que nous ayons encore, est remarquable par le grand nombre de figures qu'il con-

tient, par leur belle coloration et leur exactitude. Quant au système adopté pour la classification, il est calqué sur celui de Linné. Cet ouvrage fut commencé par Martini qui en donna lui-même les trois premiers volumes; les huit autres sont de Chemnitz et de Schröter.

Nous citerons, sans nous y arrêter, les ouvrages de Dacosta, en 1770; six numéros d'une Conchyliologie de Schröter, de la même année; une Classification systématique des Coquilles terrestres, de Muxray, 1774; publiée dans les *Amanuenses*, Acad. T. VIII; l'Histoire naturelle des Coquilles terrestres, 1772, de Schirach. Nous nous bâteons d'arriver aux ouvrages de Müller, qui ont commencé à paraître dès 1775. Mais des deux ouvrages de cet auteur, le dernier est bien préférable; c'est de celui-là seul qu'il sera question: de même que Linné, l'auteur y admet les trois grandes coupes ou familles d'Univalves, de Bivalves et de Multivalves. Les changemens qu'il a fait subir à la méthode de Linné sont sensibles, surtout dans les Univalves qu'il partage en trois sections: 1° *Testacea univalvia, testâ perversâ*, qui renferme les genres *Echinus*, *Spatangus*, *Dentalium*; 2° *Testacea univalvia, testâ patulâ*. Nous y trouvons onze genres, ce sont: *Anera*, *Argonauta*, *Bulla*, *Buccinum*, *Corithium*, *Verrugo*, *Turbo*, *Helix*, *Planorbis*, *Ancylus*, *Patella*, *Heliotis*; 3° la troisième section des *Testacea univalvia, testâ operculatâ*, ne contenant que les cinq genres *Trilobium*, *Trochus*, *Nerita*, *Falvata* et *Serpula*. Parmi les Bivalves dont les genres sont presque les mêmes que ceux de Linné, nous remarquons qu'il a judicieusement séparé des *Anomia* de ce dernier le genre des *Terebratulæ*. On voit par ce léger aperçu de l'ouvrage de Müller que, s'étant servi, comme Adanson, de la forme, des tentacules et de la position des yeux, il est tombé comme lui dans quelques rapprochemens évidemment faux, comme de la *Bulla* à l'*Argonauta*, comme de la *Serpula* à la *Nerita*, et de quelques autres; mais, en général,

les genres, pris séparément, sont bien circonscrits; ils ressemblent d'ailleurs pour la plupart à ceux de Linné; ou en sont déjà des démembremens. Schröter, qui fit tant de travaux pour la Conchyliologie, qui l'enrichit d'espèces nouvelles en général médiocrement figurées, publia, en 1774, le premier numéro de son Journal de Minéralogie et de Conchyliologie. On connaissait déjà ce savant par quelques ouvrages dont un a déjà été cité, et il acquit ensuite une réputation méritée, non seulement par des Mémoires publiés dans divers journaux, par son Introduction à la Conchyliologie de Linné, mais encore par son Histoire des Coquilles aquatiques, spécialement de celles qui vivent dans les eaux de la Thuringe. Il est fâcheux que les figures dont son ouvrage est accompagné soient médiocres.

En 1776, Dacosta donna son ouvrage en français des *Éléments de Conchyliologie*; mais le système de cet auteur diffère trop peu de celui de Linné pour que nous devions nous y arrêter. Il publia aussi, en 1778, une Conchyliologie britannique assez complète. — Soldani, si célèbre par ses nombreuses recherches sur les Coquilles microscopiques, avait été devancé par Plancus. Quoiqu'il eût surpassé de beaucoup son prédécesseur, il ne put jouir pendant sa vie d'une réputation acquise par tant d'années de travaux et de recherches. Son ouvrage ne se vendit pas, et il en éprouva tant de chagrin, qu'après avoir mis en vente la dernière partie dont il ne sortit qu'un seul exemplaire de chez le libraire, il se décida à la détruire. Le feu consuma toute cette partie, et laissa incomplet le reste de l'ouvrage. Ce fait a été recueilli sur les lieux par Mémard de la Groye qui nous l'a raconté plusieurs fois. Quoiqu'il en soit, ce qui nous reste de la *Testaceographia ac Zoophytographia parva et macroscopica*, 1789, suffit pour illustrer à jamais son auteur. Cet ouvrage dont nous ne chercherons pas à faire l'analyse, a besoin d'être vu et con-

sulté saurient pour qu'on puisse l'apprécier ce qu'il vaut.

Quoique le système de Linné ait prévalu chez presque tous les conchyliologues, nous voyons néanmoins Favanne, en 1780, se servir encore de la méthode de D'Argenville, de laquelle, en donnant pour ainsi dire une nouvelle édition, il se contente d'augmenter d'un nombre assez considérable les bonnes figures. Dans la même année parut l'ouvrage de Born, que nous ne considérons, comme le précédent, que par les estampes. Il est intitulé : *Testacea Musæi Cæsaris Vindobonensis*. — Martyn, en 1784, publia un *Traité de Conchyliologie universelle* qui est accompagné de bonnes planches et d'espèces en général peu connues. Chemnitz, à peu près dans le même temps, donna, dans un volume in-4° avec des figures, des observations sur une famille de Coquilles multivalves, les Oscabrions, qu'il regarde comme des Animaux articulés. Enfin, en 1792, parut la première partie du premier volume de l'Encyclopédie fait par Bruguière, qui ramèna la Conchyliologie à ce qu'elle devait être, et la remplaça avec succès dans le chemin où Linné l'avait mise, et d'où elle avait dévié. Bruguière rendit à la Conchyliologie l'importance qu'elle n'eût jamais dû perdre en France où fut son berceau; il en sut habilement rassembler les matériaux épars dans les ouvrages de ses prédécesseurs; se servant du système de Linné comme d'une base solide, il le modifia en y faisant entrer, pour servir à ses divisions, des caractères déjà aperçus, mais qu'on avait trop souvent méconnus. C'est ainsi qu'il se servit, comme Linné, de l'ancienne division en Multivalves, Bivalves et Univalves. L'importance des travaux de l'illustre Bruguière est telle, qu'on trouvera soigneusement rapportés à chacun des genres de Coquilles traités dans ce Dictionnaire, les modifications et les changemens qu'il fit subir à la science.

C'est à l'époque où florissait Bru-

guière que commença à paraître l'important ouvrage de Poli, si utile aux conchyliologues par les belles anatomies de Mollusques que l'on y trouve. Que de regrets nous devons éprouver qu'un si habile observateur ne nous ait donné que la partie des Multivalves et des Bivalves ! Ses ouvrages sont des dépôts où l'on viendra long-temps puiser les observations les plus précieuses pour classer convenablement cette partie des Invertébrés. — L'ouvrage d'Olivier, publié la même année, est bien inférieur au précédent; il présente pourtant d'utiles détails sur le même sujet, et il donne une liste assez complète de ce qui se trouve dans les eaux du golfe Adriatique. Nous reprocherons néanmoins à l'auteur de n'avoir dédié, sous le nom de *Lamarckia*, au célèbre auteur de la Flore Française et de tant d'autres grands ouvrages, qu'un chétif genre de production marine, formé de l'*Alcyonium cydonium*, *Bursa*, et d'Eponges. V. SPONGODIUM.

Lamarck, qui avait marqué son époque dans la botanique par des ouvrages qui auraient seuls suffi pour constituer une brillante réputation, devenu, au Muséum d'Histoire Naturelle, professeur de zoologie pour les Animaux sans vertèbres, soumit cette nombreuse partie des êtres vivans à cet esprit de philosophie analytique qui caractérise tout ce qui sort de sa plume sévère. Il embrassa d'un coup-d'œil rapide tous les Invertébrés; et chacune des parties de la science qui renferme ceux-ci, a subi entre ses mains des modifications et des changemens qui dévoilent avec quelle justesse et quelle sagacité l'illustre professeur a saisi les lois générales par lesquelles la nature se régit, et paraît avoir conçu le vaste ensemble des êtres organisés vivans. On peut déjà se faire une idée des premiers travaux de l'auteur dans l'ouvrage qui a pour titre *Système des Animaux sans vertèbres*, publié en 1801. Les observations zoologiques y sont déjà assez nombreuses pour établir un système basé sur elles;

ient, par leur belle coloration et leur vacuité. Quant au système adopté pour la classification, il est calqué sur celui de Linné. Cet ouvrage fut commencé par Martini qui en donna lui-même les trois premiers volumes; les huit autres sont de Chemnitz et de Schröter.

Nous citerons, sans nous y arrêter, ces ouvrages de Dacosta, en 1770; six numéros d'une Conchyliologie de Schröter, de la même année; une Classification systématique des Coquilles terrestres, de Murray, 1771, publiée dans les *Amanitates Acad.* T. VIII; Histoire naturelle des Coquilles terrestres, 1772, de Schirach. Nous nous bornerons d'arriver aux ouvrages de Müller, qui ont commencé à paraître dès 1775. Mais des deux ouvrages de cet auteur, le dernier est bien préférable; c'est de celui-là seul qu'il sera question: de même que Linné, l'auteur admet les trois grandes coupes ou familles d'Univalves, de Bivalves et de Multivalves. Les changemens qu'il a fait subir à la méthode de Linné sont sensibles, surtout dans les Univalves qu'il partage en trois sections: 1° *Testacea univalvia, testâ perviâ*, qui renferme les genres *Echinus*, *Spatangus*, *Dentalium*; 2° *Testacea univalvia, testâ patulâ*. Nous y trouvons onze genres, à savoir: *Achar*, *Argonauta*, *Bulla*, *Buccinum*, *Corithium*, *Verigo*, *Turbo*, *Helix*, *Planorbis*, *Ancylus*, *Patella*, *Malionis*; 3° la troisième section des *Testacea univalvia, testâ perculatâ*, ne contient que les cinq genres *Trifonium*, *Trochus*, *Nerita*, *Calvata* et *Serpula*. Parmi les Bivalves dont les genres sont presque les mêmes que ceux de Linné, nous remarquons qu'il a judicieusement séparé les *Anomia* de ce dernier leger des *Cerebratales*. On voit par ce léger aperçu de l'ouvrage de Müller que, étant servi, comme Adanson, de la forme des testicules et de la position des yeux, il est tombé comme lui dans quelques rapprochemens évidemment faux, comme de la *Bulla* à la *Argonauta*, comme de la *Serpula* à la *Nerita*, et de quelques autres; mais, en général,

les genres, pris séparément, sont bien circonscrits; ils ressemblent d'ailleurs pour la plupart à ceux de Linné, ou en sont déjà des démembremens. Schröter, qui fit tant de travaux pour la Conchyliologie, qui l'enrichit d'espèces nouvelles en général, médiocrement figurées, publia, en 1774, le premier numéro de son Journal de Minéralogie et de Conchyliologie. On connaissait déjà ce savant par quelques ouvrages dont un a déjà été cité, et il acquit ensuite une réputation méritée, non-seulement par des Mémoires publiés dans divers journaux, par son Introduction à la Conchyliologie de Linné, mais encore par son Histoire des Coquilles fluviatiles, spécialement de celles qui vivent dans les eaux de la Thuringe. Il est fâcheux que les figures dont cet ouvrage est accompagné soient médiocres.

En 1776, Dacosta donna en anglais et en français des *Elémens de Conchyliologie*; mais le système de cet auteur diffère trop peu de celui de Linné pour que nous devions nous y arrêter. Il publia aussi, en 1778, une Conchyliologie britannique assez complète. — Soldani, si célèbre par ses nombreuses recherches sur les Coquilles microscopiques, avait été devancé par Plancus. Quoiqu'il eût surpassé de beaucoup son prédécesseur; il ne put jouir pendant sa vie d'une réputation acquise par tant d'années de travaux et de recherches. Son ouvrage ne se vendit pas, et il se déprouva tant de chagrin, qu'après avoir mis en vente la dernière partie dont il ne sortit qu'un seul exemplaire de chez le libraire, il se décida à la détruire. Le feu consuma toute cette partie, et laissa incomplet le reste de l'ouvrage. Ce fait a été recueilli sur les lieux par Ménard de la Greye qui nous l'a raconté plusieurs fois. Quoiqu'il en soit, ce qui nous reste de la *Testacea graphia ac Zoophytographia perita et microscopica*, 1789, suffit pour illustrer à jamais son auteur. Cet ouvrage dont nous ne chercherons pas à faire l'analyse, a besoin d'être vu et con-

En 1811, Megerle a donné, dans le Magasin de Berlin, un nouveau système de Conchyliologie dont la partie qui traite des Bivalves seulement a paru.

Lamarck, en 1812, dans une petite brochure intitulée *Extrait du Cours*, etc., fait pressentir les changemens qu'il se propose de faire subir à sa première méthode, changemens qu'il commença à établir en 1815, et qu'il termina, en 1822. Cet ouvrage, l'un des plus importans qui aient été publiés sur les Animaux sans vertèbres, présente pour les Mollusques une division basée à la fois sur les caractères pris dans les Animaux, ce qui sert à former les principales coupes, et sur ceux tirés de la coquille, qui servent presque toujours seuls à former les genres. Le tableau que nous en donnons servira plus à l'intelligence du système, que ce que nous pourrions en dire. Nous renvoyons également au tableau des Conchifères, que nous avons présenté à ce mot. Il est inutile de dire que cette méthode, quelque bonne qu'elle soit, a pourtant des défauts : le plus grave, à notre avis, est d'avoir trop donné d'importance aux caractères tirés des Coquilles : mais aussi on peut dire que ces moyens présentent de très-grands avantages pour grouper par familles ou par genres, et mettre tout en rapport de formes.

Cuvier, en 1817, considérant les Mollusques plutôt d'après les rapports de structure interne que d'après tout autre, donna aux caractères tirés des différences organiques une bien plus grande importance que ne l'avait fait Lamarck lui-même, ce qui le ramena aussi à diminuer le nombre des genres, mais à admettre dans ceux-ci, avec la désignation de sous-genres, un certain nombre de coupes secondaires dans lesquelles rentrent presque tous les genres que Lamarck avait proposés dans la première édition de son Système.

Un auteur ingénieux dans ses systèmes, qui a jeté sur l'anatomie comparée de grandes lumières, aussi habile professeur que savant naturaliste,

Blainville, dès 1814, posa à son tour les fondemens d'une nouvelle classification des êtres vivans, à laquelle il donna quelques développemens, en 1816, dans le *Journal de physique* etc. (octobre). Voici, pour la partie des Mollusques, ce qu'il a proposé. Il divise les Mollusques ou Malacozoaires en deux classes, en Céphalophores et en Acéphalophores (Mollusques céphalés et acéphalés, Cuv.). Les Céphalophores se distinguent en espèces qui ont les organes de la respiration et la coquille symétriques, et en espèces qui ne sont pas symétriques. Les premières ou les symétriques sont distinguées : 1° en Cryptodibranches, 2° Pterodibranches, 3° Polybranches, 4° Cyclobranches, 5° Inférobanches, 6° Nucléobanches, 7° Cervicobanches. Les non symétriques sont distinguées : 1° en Chismobranches, 2° Pulmobranches, 3° Syphonobranches, 4° Monopleurobranches. La seconde classe ou les Acéphalophores est divisée en trois ordres : 1° les Palliobranches, 2° les Lamellibranches, 3° les Hétérobanches, divisés eux-mêmes en fixés ou Ascidines simples et agrégés, et en libres ou Biphores simples et agrégés aussi. On voit par cet exposé que c'est sur la disposition des organes de la respiration que sont fondées les coupes principales. Pour juger de la solidité de ces coupes, il sera nécessaire d'en voir l'application détaillée que Blainville ne tardera pas sans doute à publier. On voit aussi que, d'après l'opinion de Desmarest, de Cuvier, etc., et contre celle de Lamarck, il admet les Tuniciers parmi les Mollusques, ce que Férussac a également fait depuis. La nouveauté de noms inusités et la plupart un peu longs, adoptés par le savant Blainville, sera le principal obstacle que pourra rencontrer l'adoption de son système, car telle est l'influence d'une nomenclature où l'harmonie n'est pas trop sacrifiée à l'exactitude, que celle de Linné fut l'un des principaux élémens du succès de ses immortels travaux.

Notre collaborateur Férussac, du-

# E

## GENRES.

Bélemnite, Hippurite, Ammonite, Argonautes.

Cymbulie, Limacine.

Tritonies, Téthys, Scyllée, Tergipe.

lide.

Aplysie, Dolabelle, Notarches,

ts, Clausilies, Agathines.

be, Lymnée, Physa, Auricul  
a, Pyramidelle.

onchylie, Nérites.

ae, Ovule, Tarière, Volute  
s, Rochers, Strombes.

## LES MOLLUSQUES.

ons, Crépidules.

nule, Septaire, Carinaire, Ca-

Placune, Spondyle, Maricau,

au, Arche.

s, Mule, Cardites, Crassa-

onacis, Cyclades, Corbeilles,  
s, Lucine, Venus, Corbule,

, Byssomie, Hyatelle, Solen,  
Fistulaie.

, Polyclinum.

le, Orbicule.

# D'APRÈS LA MÉTHODE DE M. LAMARCK.

|                                                                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| .....                                                                                                       | Les HYALIN.                            |
| Intérieures au-dessus du manteau ; sur le dos ; point de cavité branchiale. ....                            | Les TERTIOSER.                         |
| Intérieures sur le rebord du manteau ; séries de corps ou d'un seul côté ; point de cavité branchiale. .... | { Les PHYLLIDIER.<br>Les SEMI-PHYLLID. |
| .....                                                                                                       | Les CALYPTACH.                         |
| .....                                                                                                       | Les BULLARIA.                          |
| .....                                                                                                       | Les LAMPYRIN.                          |
| .....                                                                                                       | Les LERACHIN.                          |
| .....                                                                                                       | Les COLIDACH.                          |
| .....                                                                                                       | Les LUTIDACH.                          |
| .....                                                                                                       | Les MÉLANTER.                          |
| .....                                                                                                       | Les PÉLIDACH.                          |
| .....                                                                                                       | Les NÉRIDACH.                          |
| .....                                                                                                       | Les JANTIER.                           |
| .....                                                                                                       | Les MAGOSTER.                          |
| .....                                                                                                       | Les PÉLIDACH.                          |
| .....                                                                                                       | Les SCALANT.                           |
| .....                                                                                                       | Les TERNACH.                           |
| .....                                                                                                       | Les CARALIN.                           |
| .....                                                                                                       | Les AILIN.                             |
| .....                                                                                                       | Les PÉLIDACH.                          |
| .....                                                                                                       | Les COLIDACH.                          |
| .....                                                                                                       | Les ESTOILIN.                          |
| .....                                                                                                       | Les ONTOCH.                            |
| .....                                                                                                       | Les LUTONIN.                           |
| .....                                                                                                       | Les CALYPTACH.                         |
| .....                                                                                                       | Les SPÉLIDACH.                         |
| .....                                                                                                       | Les RADIDACH.                          |
| .....                                                                                                       | Les NAUTILACH.                         |
| .....                                                                                                       | Les ANMONIN.                           |
| .....                                                                                                       | Les ARGONACH.                          |
| .....                                                                                                       | Les SICHIN.                            |
| .....                                                                                                       | Les CARINACH.                          |



uel il ne nous est pas permis de faire, ans un ouvrage où il travaille, un loge mérite cependant par d'utiles ravaux, vient d'ajouter aux ouvrages i-dessus mentionnés une magnifique histoire des Coquilles terrestres et fluviales. Cet important Recueil, publié par livraisons, fut commencé en 1819, et se continue avec éclat. La beauté des planches, qui l'emporte sur tout ce que l'on a fait jusqu'ici, correspond à la perfection du texte. Sowerby publie également en Angleterre des figures de Coquilles fossiles, qui méritent l'estime dont elles jouissent parmi les savans. (B. H.)

**CONCHYLITOPOLITHES.** On donne ce nom aux empreintes de Coquilles fossiles dont le moule a disparu. (B.)

\* **CONCHYTES.** MOLL. FOSS. Nom générique appliqué autrefois aux Patelles et aux Conchifères fossiles. (B. H.)

**CONCILIUM.** BOT. PHAN. (Pline). Syn. probable de Jasione. V. ce mot. (B.)

\* **CONCIRRUS.** POIS. Syn. de Cirrhitte tachetée. V. CIRRHITE. (B.)

**CONCOMBRE.** BOT. *Cucumis*. PHAN. L'un des genres les plus intéressans et les plus considérables de la famille des Cucurbitacées. Il se compose d'un grand nombre d'espèces annuelles, toutes exotiques et dont plusieurs sont cultivées dans nos jardins potagers, et nous offrent des fruits aussi salutaires que délicieux. Ses caractères consistent en : un calice adhérent par sa base avec l'ovaire infère, à cinq divisions recourbées; une corolle monopétale régulière, campanulée et à cinq lobes, intimement soudés et confondue par sa base avec le calice. Dans les fleurs mâles, on trouve cinq étamines réunies en trois faisceaux, savoir : deux faisceaux ou filets soudés, portant chacun deux antépères linéaires et recourbés trois fois sur elles-mêmes, et un faisceau formé d'une seule étamine. Au centre des fleurs mâles, on voit un tubercule charnu, trilobé, recouvert par les étamines. Dans les

fleurs femelles, le style est court et surmonté par trois gros stigmates, ordinairement bilobés. Le fruit est une pépoude de forme et de consistance variées; elle est ordinairement relevée de côtes plus ou moins nombreuses, tantôt entièrement charnue, tantôt plus ou moins dure et coriace à l'extérieur : tels sont les caractères du genre Concombre. Il se rapproche beaucoup du genre Courge, *Cucurbita*, dont il ne diffère guère que par sa corolle campanulée, qui est étalée et comme rosacée dans ce dernier genre.

On compte un grand nombre d'espèces de Concombres; mais nous n'entrerons dans quelques détails que pour les trois qui offrent le plus d'intérêt, savoir : le Concombre ordinaire, la Coloquinte et le Melon. Nous nous contenterons d'indiquer quelques autres espèces.

**Le CONCOMBRE CULTIVÉ, *Cucumis sativus*, L.** Cette espèce s'étale sur la terre. Sa tige est fort longue, rameuse, cylindrique, très-rude au toucher, ainsi que ses feuilles qui sont pétiolées, échancrées en cœur à leur base, découpées en cinq lobes aigus et inégaux. De l'aisselle des feuilles naissent de longues vrilles simples, tordues en spirale. Les fleurs sont monoïques; les mâles, plus nombreuses que les femelles, ont le calice campanulé, velu, à cinq divisions linéaires et réfléchies; la corolle campanulée, à cinq lobes acuminés à leur sommet. Dans les fleurs femelles, l'ovaire est très-allongé, hérissé de piquans très-rudes. La corolle offre la même forme. Les fruits sont allongés, obtus à leurs deux extrémités, ayant leur surface lisse ou hérissée, tantôt blanche, tantôt verte, tantôt jaune, suivant les variétés. Le Concombre est originaire d'Orient. Ses fruits forment un aliment assez agréable. Ils sont peu nourrissans, fort aqueux, et d'un goût peu prononcé; mais dans l'été, on les voit assez fréquemment paraître sur la table des riches de Paris, tandis que les pauvres du midi de l'Espagne s'en nourrissent ha-

bituellement. Ordinairement on les fait cuire et on les assaisonne de différentes manières. Quelquefois on les mange crus, après les avoir coupés par tranches minces que l'on arrose avec du vinaigre. Cette Plante présente plusieurs variétés qui tiennent à leur forme, à leur grosseur et à leur couleur : tels sont le *Concombre blanc*, dont la peau est blanchâtre et lisse, et que l'on estime beaucoup à Paris; le *jaune* qui a la peau d'un jaune plus ou moins intense; le *vert petit* connu surtout sous le nom de *Cornichons*, et dont on confit les fruits au vinaigre; le *Concombre de Russie* qui est fort petit, presque rond, et dont les fruits sont groupés par bouquets; c'est la variété la plus hâtive.

La culture du Concombre diffère peu de celle du Melon que nous exposerons tout à l'heure avec plus de détails. Les graines doivent être semées au commencement de mars sur des couches à Melon; on repique les jeunes pieds en avril sur des couches sourdes, ou bien on les met en pleine terre, au commencement de mai, dans des trous que l'on a eu soin de remplir de bon terreau. Les graines de Concombre peuvent se conserver pendant huit à dix ans sans se détériorer.

Le **MELON**, *Cucumis Melo*, L. Originaire des contrées les plus chaudes de l'Asie, le Melon est cultivé en Europe depuis un temps immémorial. Il se distingue du Concombre par ses feuilles plus grandes, à lobes arrondis et moins profonds, et par ses fruits plus gros, globuleux ou ovoïdes, ayant la chair rougeâtre, fondante, sucrée et d'un goût agréable. Les Melons sont fort recherchés en été et sont l'ornement des repas les plus somptueux. Aussi leur culture est-elle fort étendue et pratiquée avec un soin particulier. Le nombre des variétés qu'elle a produites est extrêmement considérable. On peut les rapporter à trois races principales qui ont pour types : le Melon Maraîcher ou galeux, le Cantaloup et le Melon de Malte. Les variétés du *Melon Maraîcher* sont faciles à reconnaître à leur

surface qui est grisâtre, crevassée et rugueuse. Elles manquent en général de côtes et sont peu estimées. On distingue surtout parmi elles : le *Sacris de Tours*, dont la chair est rouge, ferme et très-sucrée; le *Melon de Honsleur* qui est allongé, d'une grosseur très-considérable, très-fondant et d'un bon goût.

Les *Melons Cantaloups* sont au contraire les plus estimés et les plus délicats. On les reconnaît à leurs côtes très-saillantes, séparées par des sillons profonds, à leur surface qui est verte, jaune ou quelquefois d'un brun plus ou moins intense, et très-irrégulière. Leur chair est fort épaisse; mais il n'y a guère que leur moitié interne qui soit tendre et bonne à manger. On distingue parmi les meilleures variétés : le petit et le grand Prescott, la Boule de Siam, le Fin hâtif, etc.

Les *Melons de Malte*, qui forment la troisième race, se distinguent par leur peau fine, peu épaisse et lisse. Leur chair est blanche ou rouge, suivant les variétés qui sont peu nombreuses.

Dans certaines provinces du midi et même du centre de la France, les Melons n'exigent pas beaucoup de soins de la part du cultivateur. On les sème en plein champ, après avoir bien préparé et surtout bien fumé la place qu'ils doivent occuper; et ils se mûrissent leurs fruits; mais à Paris, la culture des Melons, et surtout celle des bonnes espèces, telles que les Cantaloups, est fort dispendieuse. Nous allons la faire connaître en peu de mots. Lorsque l'on veut avoir des Melons de primeur, il faut semer les graines à la fin de janvier ou au commencement de février, sous châssis ou dans des baches convenablement chaudes. Pour cela, on creuse des pots d'environ quatre poises d'ouverture, remplis de terreau bien consommé et dans lesquels on plante une ou quelquefois deux graines. Quand les graines sont levées, on les accoutume graduellement au jour et à la température extérieure, on calcule

gèrement les châssis dans les beaux jours, et surtout ceux où le soleil nit. Il est inutile de prévenir que, quand le froid est trop vif et surtout pendant la nuit, les paillassons, qui couvrent les châssis, ne doivent pas tre enlevés. A l'époque où la jeune plante a déjà poussé deux feuilles, sans compter les deux cotylédons ou feuilles séminales, on pince le bourgeon terminal, opération qui favorise le développement des bourgeons latéraux, sur lesquels les fleurs se développent principalement. C'est alors le temps de mettre en place les jeunes plants. A cet effet, on prépare une couche inclinée vers le midi, pleine de terreau, mélangée d'environ un dixième de terre franche, et recouverte de châssis; on place les jeunes plants sans les démotter, de manière à laisser entre eux un espace convenable, pour que leurs ramifications puissent se développer facilement. Tant que le froid ne permet pas de les exposer à l'air, on les recouvre des châssis que l'on ouvre plus fréquemment, à mesure que le temps devient plus doux et les jeunes plants plus vigoureux. Enfin, on les découvre entièrement, lorsque l'on n'a plus à redouter les gelées. On a soin d'arroser convenablement jusqu'à la parfaite maturité des fruits, et de rancher les branches gourmandes ou les fleurs mâles surabondantes qui fatiguent inutilement le sujet. Lorsque les fruits approchent de leur maturité, on les soulève, on les place sur une tuile ou sur un morceau de planche. Ce procédé a l'avantage de permettre la libre circulation de l'air tout autour du fruit, et de faciliter sa maturation.

Lorsque l'on veut manger les Melons six semaines ou deux mois plus tard, on s'évite beaucoup de soins et de dépenses. On sème en avril sous châssis ou simplement sur couche bien préparée, et l'on recouvre d'une cloche chaque place où l'on a semé une graine. On recouvre les cloches de paille ou de paillassons pendant les nuits froides. On donne fréquem-

ment de l'air; et enfin on enlève les cloches quand la chaleur permet d'exposer les jeunes Plantes à l'air libre. Ce procédé, beaucoup moins dispendieux, donne des fruits incomparablement plus savoureux.

La **COLOQUINTE**, *Cucumis Colocynthis*, L., vulgairement Concombre amer. L'Asie septentrionale est la patrie de cette Plante. On la trouve également dans les îles de l'Archipel. Elle est annuelle, et présente une tige herbacée, couchée à terre ou s'élevant sur les corps voisins, au moyen des vrilles nombreuses qui naissent sur les côtes de ses feuilles; cette tige est charnue, cassante, cylindrique, et porte des feuilles alternes, subréni-formes, aiguës, pubescentes, à cinq lobes dentés et aigus. Aux fleurs femelles succèdent des fruits globuleux, jaunes, de la grosseur d'une Orange, glabres et recouverts d'une écorce dure, coriace, assez mince, renfermant une pulpe blanche et spongieuse, dans laquelle on trouve des graines nombreuses, ovales, comprimées et blanches. Cette pulpe et ces graines sont d'une amertume excessive. On en fait usage comme d'un médicament violemment purgatif. La Coloquinte du commerce est le fruit dépouillé de son enveloppe crustacée. Elle est en masses blanches et spongieuses, désignées sous le nom vulgaire de **POMMES DE COLOQUINTE**. Son excessive amertume provient de la résine qu'elle contient. C'est un drastique très-violent et que l'on ne doit administrer qu'avec de grandes précautions, et à fort petites doses, dans les hydropisies passives, la manie, l'apoplexie séreuse, etc. On donne six à douze grains de Coloquinte que l'on peut au plus porter jusqu'à vingt et vingt-quatre. (A. R.)

Les jardiniers nomment vulgairement :

**CONCOMBRE DE CARÈME**, une variété de Courge.

**CONCOMBRE D'HIVER** ou de **MALTE**, des variétés de Giraumont.

**CONCOMBRE AUX ANES**, le *Momordica Elaterium*.

• On appelle à Cayenne **CONCOMBRE SAUVAGE**, le *Melothria pendula*. (B.)

\* **CONCOMBRES DE MER**. ÉCHIN. Plusieurs *Holothuries* et quelques autres *Echinodermes* de forme allongée sont ainsi nommés par les marins et les pêcheurs de nos côtes. (LAM..X.)

**CONCOMBRES PÉTRIFIÉS**. ÉCHIN. FOSS. Des pointés d'Oursins et des Alcyons fossiles ont été nommés ainsi par les anciens naturalistes. (LAM..X.)

\* **CONCORDITA**. POIS. Syn. sarde de *Mugil Cephalus*. V. MUGE. (B.)

**CONCRÉTIONS**. MIN. ZOOL. BOT. Toute substance solide, irrégulière, formée, dans des milieux moins denses, de particules qui se sont agglomérées plus ou moins lentement, a reçu le nom de Concrétion. On en rencontre dans les trois règnes; mais l'acception de ce mot n'est pas toujours la même. En minéralogie, par exemple, tantôt on nomme Concrétion une substance pierreuse et saline dont la structure en couches parallèles s'emboîtant les unes dans les autres, indique une formation lente et successive; ce n'est qu'un état différent du même corps. Ce cas est très-fréquent dans la nature: les Stalactites, les Stalagmites, l'Albâtre sont des Concrétions de Carbonate ou de Sulfate calcaires; toutes les variétés de Minéraux, dits concrétionnés, se rangent aussi sous cette même manière de voir. V., quant à leur histoire particulière, chacune des espèces auxquelles elles appartiennent. Les minéralogistes entendent encore par Concrétions les nodules ou parties grossièrement arrondies que l'on rencontre dans l'intérieur de certaines roches ou des terrains calcaires, schisteux et argileux. Leur consistance est toujours plus grande que celle de ces terrains; leur composition souvent dissimilable, et les formes bizarres qu'elles affectent quelquefois, les ont fait distinguer par des noms tirés des objets avec lesquels on a voulu leur trouver de la ressemblance. Ainsi plusieurs de ces Concrétions

ont été nommées Priapolithes, Ostéocolle, Tête-de-Chat, etc. V. ces mots.

Les Animaux, de leur côté, n'offrent malheureusement que trop d'exemples de Concrétions. Comme ce sont des corps entièrement inorganiques et inertes; loin d'être essentiels à la vie, leur présence est presque toujours funeste; elle indique d'ailleurs une précession de phénomènes morbides qui ont plus ou moins lésés les organes. Tels sont les calculs biliaires, arthritiques, etc. Cette classe de Concrétions est très-nombreuse; non-seulement les calculs diffèrent entre eux par l'organe où ils sont logés, mais encore leur nature varie singulièrement dans le même organe: ainsi les calculs vésicaux, pour nous borner à un seul exemple, sont très-diversifiés, chimiquement parlant, quoiqu'ils se présentent tous sous forme concrétionnée. Les viscères de certains Animaux contiennent quelquefois des Concrétions auxquelles on attribuait jadis de merveilleuses propriétés, et que l'on nommait Bézards. On a aussi appliqué la dénomination d'Egagropiles à celles dont la formation était due à des substances ingérées parmi les aliments des Animaux, et qui constituaient de véritables masses agglomérées. V. les mots CALCUL, BÉZARD et EGAGROPILE.

Dans le règne végétal, les Concrétions sont plus rares; cela tient probablement à la simplicité et à l'uniformité de leurs sucs alimentaires. Cependant on en a observé de bien singulières et dont il est difficile de concevoir la formation. Telles sont, par exemple, les Concrétions sucrées du Bambou et d'autres Graminées. Dans la charpente toute calcaire de quelques Plantes aquatiques, comme celle de certains Chars qui, selon Théodore de Saussure, contiennent 74 pour 100 de Carbonate de Chaux, ne pouvons-nous pas aussi voir une sorte de Concrétion? Ce sont en effet, de même que les calculs animaux, des corps produits par des dépôts successifs de molécules inorganiques et

qui tendent à la désorganisation complète de l'individu. (G.N.)

CONDAGA. MOLL. Syn. malais de *Pyraomoneta*, vulgairement Cauris, (B.)

CONDALIE. *Condalia*. BOT. PHAN. L'absence des pétales et l'unité de style ont été les motifs qui ont engagé Lavanilles à établir ce genre rapporté aux Jujubiers par Ortéga, quoique eux-ci aient tous des pétales et un double style. Si l'on conserve ce genre, il doit être placé parmi les Rhamnées et dans la Pentandrie Monogynie, L.; ses fleurs sont néanmoins assez souvent tétrandres, mais ses affinités avec les *Rhamnus* empêchent de les éloigner, quel que soit le système adopté. Il se compose d'une seule espèce, *Condalia microphylla*, (Cav. con. T. VI, p. 46, t. 526) ou *Ziniphus cyrtoides*, Ortéga. C'est un Arbuste pousseux, indigène du Chili.

Ruiz et Pavon ont aussi établi un genre sous le même nom, mais qui est tout différent, avec le *Coccytysika*. V. ce mot. (G.N.)

\* CONDANAROUSE. REPT. OPH. (Daudin.) Syn. indien de *Cotuberlicatus*, L., espèce du genre Couleuvre. V. ce mot. (B.)

\* CONDANG. BOT. PHAN. (Rumph.) Syn. malais de *Ficus bengalensis* que Bourcerois rapporte à tort à son *Ficus articulata*. V. FIGIER. (B.)

\* CONDANG-WARU. BOT. PHAN. (Murmah.) Syn. javanais d'*Hibiscus ticeus*. V. RHAMNÉE. (B.)

CONDEA. BOT. PHAN. (Adanson.) Syn. de *Sarcocolla americana*, Poir. SARIETTE. (B.)

\* CONDENSATION. CHIM. MIN. Nom donné au rapprochement des molécules des corps, qui s'opère presque toujours, au moyen d'une sous-action, du calorique. (DA.Z.)

\* CONDER. BOT. PHAN. (Avicenne.) Syn. arabe d'*Encens*. V. ce mot.

\* CONDI, CONDISI ET CONDILUM. BOT. PHAN. (Daléchamp.) Syn. arabe de *Gypsophila Struthium*. V. GYPSOPHILÉ. (B.)

CONDIO. MAM. Syn. finlandais d'Ours brun. (A.D.NB.)

\* CONDI-PALI. BOT. PHAN. Une Clématite indéterminée de la côte de Coromandel. (B.)

CONDISI ET CONDISIUM. BOT. PHAN. V. CONDI.

\* CONDOMA. MAM. Espèce du genre Antilope. V. ce mot. (B.)

\* CONDONDOUG. BOT. PHAN. Que Rumph nomme *Condonum*. Syn. malais de *Spondias amara*, L. V. SPONDIAS. (B.)

CONDOR. OIS. Espèce du genre Catharte. V. ce mot. (B.)

CONDORI ou CONDOUMANI. BOT. PHAN. V. ADENANTHERA.

CONDOUS. MAM. Même chose que Condoma. V. ce mot. (B.)

\* CONDRACHANTE. INTEST. V. CHONDRACHANTE.

CONDRILLE. *Chondrilla*. BOT. PHAN. V. CHONDRILLE.

\* CONDRIS ou CHONDRIS. BOT. PHAN. (Pline.) Syn. présumé de *Mayrubium Pseudo-Dictamnus*. (B.)

\* CONDRODITE ou CHONDRODITE. MIN. Brucite des Américains. Nom donné par Berzélius à une substance minérale qui ne s'est encore présentée que sous la forme de grains brunâtres, à texture lamelleuse, disséminés dans une gangue calcaire. Ce savant la regarde, d'après l'analyse qu'il en a faite, comme un Silicate de Magnésie, pénétré d'Oxide de Fer. Haüy lui assigne pour forme primitive un prisme rectangulaire, dont la base est oblique, et repose sur une arête horizontale, en faisant avec le plan adjacent un angle de 112 d. 12'. Sa pesanteur spécifique est de 3,2. Elle a un degré de dureté suffisante pour rayer le verre. Elle est infusible sur le charbon; l'action de la chaleur lui fait perdre seulement sa couleur et la rend opaque. Elle fond avec le Borax en un verre transparent et légèrement coloré. Ce Minéral a été d'abord découvert à New-Jersey, aux Etats-

Unis, dans la Calcaire lamellaire qui renferme le Graphite; il y est disséminé en petites masses arrondies et jaunâtres, que les minéralogistes du pays prirent pour une variété de Titan silicéo-calcaire. La même substance a été retrouvée depuis en Finlande, dans la gangue de la Pargasite, et à Åker en Sudermanie, dans un Calcaire laminaire. Berzelius reconnut bientôt qu'elle devait former une espèce nouvelle, à laquelle il donna le nom de Condrodite. La chimie et la cristallographie concoururent ensuite à prouver l'identité du Minéral de Finlande avec celui des Etats-Unis. (G. DEL.)

\* CONDUCTEUR DU REQUIN ET CONDUCTEUR DE L'EGLEFIN. POIS. Noms vulgaires d'espèces de Gade et de Centronote. *V.* ces mots. (B.)

\* CONDUM-NAGOU. REPT. OPH. (Russel.) Probablement la même chose que Comban-Nagou. *V.* ce mot. (B.)

CONDUR. OIS. Même chose que Condor. *V.* ce mot.

CONDURDUM. BOT. PHAN. (Pline.) Plante qu'il est impossible de reconnaître sur ce que les anciens rapportent de ses propriétés antiscrophuleuses, et où cependant quelques-uns ont vu le *Valeriana rubra*, L. (B.)

\* CONDURI. BOT. PHAN. Qu'il ne faut pas confondre avec Condori (*Adenantha*.) Graine rouge marquée de noir que Linscot dit servir de monnaie à la Chine, et qui paraît être l'*Abrus precatorius*, L. (B.)

\* CONDYLE. ZOOL. *V.* SQUELETTE et Os.

\* CONDYLOCARPE. *Condyllocarpus*. BOT. PHAN. Dans le huitième volume des Mémoires du Muséum (p. 119, t. 2), le professeur Desfontaines a décrit et figuré un nouveau genre de la famille des Apocynées, extrêmement rapproché du genre *Echites* dont il diffère seulement par son fruit. Le CONDYLOCARPE DE LA

Guiane, *Condyllocarpus guianensis*, Desf. (loc. cit.) est un Arbrisseau dont la tige est ligneuse; les rameaux flexibles, noueux à la naissance des feuilles, très-légèrement striés et tuberculeux. Ses feuilles sont ternées, elliptiques, lancéolées, entières, lisses et persistantes, portées sur des pétioles grêles, longs de quatre à cinq lignes. On ne connaît point encore ses fleurs. Le fruit se compose de deux follicules dont un avorte quelquefois; ils sont formés chacun de trois ou quatre lobes oblongs, aplatis, un peu épais, articulés les uns à la suite des autres, rétrécis au point de jonction, longs d'un pouce ou plus, sur quatre à cinq lignes de largeur. Ils restent indéchirés et se séparent les uns des autres à l'époque de leur maturité; chacun d'eux renferme une seule graine; allongée et sans aigrette.

Cet Arbrisseau a été découvert par Martin à la Guiane française. Nous en possédons un échantillon recueilli au Brésil par le baron de Langsdorff. (A. R.)

\* CONDYLOPES. ZOOL. Nom formé de deux mots grecs qui signifient *nœud* et *pied*, et sous lequel Latreille (Mém. du Mus. d'Hist. Nat. T. VIII, p. 169) propose de désigner les Animaux articulés, à pieds articulés, ou les Insectes de Linné qui comprennent trois classes, les Crustacés, les Arachnides et les Insectes. *V.* ARTICULÉS. (AUD.)

CONDYLIRE. MAM. Genre de Carnassiers insectivores, caractérisé par six incisives en haut, dont les deux intermédiaires sont très-larges, garnissent tout le bord de la mâchoire et sont creusées en cuiller, à tranchant un peu oblique; les deux incisives latérales, longues et coniques, ressemblent à des canines; quatre incisives en bas, aplaties, inclinées en avant et en forme de cuiller; trois fausses molaires coniques en haut, suivies de quatre vraies molaires formées chacune de deux replis d'émail dessinant deux tubercules aigus sur

e côté interne, et au contraire sur le côté externe, il y a un talon étroit à la base interne de ces quatre dents qui vont en augmentant de volume jusqu'à la troisième, la quatrième et dernière, étant moindre que celle qui précède. Il y a en bas cinq fausses molaires à plusieurs lobes, dont la première, qui est de beaucoup plus grande, a trois lobes, ainsi que la seconde où la lobe postérieur est le plus apparent; la troisième a quatre lobes, la quatrième est presque semblable à la troisième, et la cinquième ne diffère de la quatrième que par sa largeur qui égale presque celle de la dernière vraie molaire; enfin les trois vraies molaires inférieures résultent aussi de deux replis d'émail dont les côtés se dessinent à l'opposite de ceux d'en haut. Il n'y a pas d'oreille extérieure; les yeux sont très-petits; les pieds de devant courts et arges ont cinq doigts avec de forts ongles propres à fouir; les pieds de derrière très-grêles ont aussi cinq doigts. Ce genre paraît propre à l'Amérique septentrionale.

**CONDYLURE A MUSEAU ÉTOILÉ**, *Condylura cristata*, Buff., Supplément. T. VI, fig. 37. Reconnaissable au premier coup-d'œil par les nombreuses nodosités de la queue et le disque rayonné qui termine son museau. Ce long museau est supporté par un axe osseux, analogue à l'os du boutoir des Cochons. Ses narines s'ouvrent au centre du disque dont les bords sont découpés en languettes cartilagineuses de couleur rose, mobiles et à surfaces granuleuses au nombre de vingt. Les deux anguettes d'en haut et les quatre d'en bas, qui sont en dessus ou le plus près de la ligne médiane, sont un peu plus saillantes que les autres. Les pattes représentent de petites mains larges, nues, écailleuses, à tranchant inférieur bien moins marqué que dans la Taupe. Les ongles sont bien moins forts qu'à la Taupe, mais plus longs. Les pieds de derrière, au contraire de ce qui existe dans la Taupe, la Chrysochloire, les Scalopes, sont plus grands

d'un tiers que ceux de devant; les doigts en sont divisés profondément. Toutes les phalanges sont libres, tandis qu'aux pieds de devant une phalange correspond à la phalange métacarpienne. Le bord interne du pied est garni d'une large écaille membraneuse, mince. La queue est remarquable par des replis transverses correspondant à chaque vertèbre, mais dont les intervalles ne sont pas renflés en nodosités, comme le représente la figure de Buffon. Les intervalles de ces replis abondent naissance à des poils plus rares et plus longs que ceux du reste du corps. Le pelage est un peu moins fin que celui de la Taupe, mais de la même couleur. Les nodosités ne proéminent pas de côté, mais se dirigent toutes parallèlement en avant. On voit plutôt la place des yeux indiquée par les poils du sourcil que par les yeux eux-mêmes. Le tranchant extérieur de la main est bordé d'une rangée de poils roides. D'ailleurs cet Animal n'a pas la physiologie lourde de la Taupe; c'est plutôt la figure d'un Rat. Sa queue est le tiers ou la moitié de la longueur du corps qui a quatre pouces. Il n'est pas probable que le Condylure étoilé se serve de son museau pour fouir. Ses taupinières sont peu nombreuses et assez petites. Ses habitudes sont inconnues.

**CONDYLURE A LONGUE QUEUE**, *Condylura longicaudata*, Erxleben, Encycl. pl. 28; f. 5; Boddaert, *Elench. Animal*, Sp. 2. Pas de cornes nasales; queue aussi longue que la moitié du corps; mains antérieures larges et conformées comme celles de la Taupe d'Europe; pieds de derrière écailleux et parsemés de poils rares et courts; les doigts en sont longs et grêles.

C'est le *Long-Tailed* mâle de Pennant, *Syn. Quadrop.* n° 244, tab. 18, f. 2. On ignore ses habitudes; il habite aussi l'Amérique septentrionale (A. V. SS.)

**GENE. Cont.** *arct.* Genre fort

nombreux en espèces, la plupart très-belles, et fondé sur des caractères si naturels, qu'il a été distingué par presque tous les premiers conchyliologues. Rumph les groupa assez bien d'après leur forme, en laissant parmi elles quelques Volutes. Bonanni (*Recreat.*, etc.) les nomma Cylindres, et les sépara des autres Coquilles. D'Argenville, dans sa Conchyliologie, adopta le nom de Bonanni et en fit une famille. Linné, enfin, établit le genre Cône sur des caractères saillans, qui ne permirent plus aucun mélange; et depuis, tous les conchyliologues l'ont admis en entier, excepté Montfort (*Conchyl. Syst.* T. I, p. 591 et suiv.) qui le démembra inutilement et sur des caractères de nulle valeur; c'est ainsi qu'il proposa les genres Cylindre, Rouleau, Hermès, Rhombe et Cône, distinctions futiles, plus nuisibles à la science qu'elles ne lui sont utiles. Bruguière, dans le Dictionnaire Encyclopédique, en décervit avec soin un très-grand nombre d'espèces, cent quarante-six, qu'il vit dans la belle collection de Hwass, mais ces descriptions sans les figures auraient été pour la plupart inutiles, si Lamarck n'avait eu soin de faire représenter toutes ces espèces dans l'Encyclopédie, d'après les types qui avaient servi aux descriptions de Bruguière; et d'y ajouter (*Anim. sans vert.* T. VII, p. 442) l'indication de la synonymie de ce genre. Nous devons aussi à Lamarck d'avoir augmenté le nombre des espèces jusqu'à cent quatre-vingt-une; ce qui est d'autant plus remarquable que le nombre des espèces fossiles est fort limité.

Les caractères de ce genre sont faciles à saisir; Lamarck (*Anim. sans vert.* T. VII, p. 440) les a exprimés ainsi: coquille turbinée ou en cône renversé, roulée sur elle-même; ouverture longitudinale, étroite, non dentée, versante à sa base. On peut y ajouter ce qu'Adanson nous a appris de l'Animal: tête cylindrique, surmontée de deux tentacules courts, près du sommet; le man-

teau est petit et sort par l'émission de la coquille sous forme d'un siphon placé au-dessus du cou de l'Animal; pied petit, elliptique, portant à son extrémité postérieure un très-petit opercule que l'on peut dire rudimentaire.

Les Cônes se rencontrent ordinairement sur les fonds de sable, à une profondeur de dix ou douze brasses; dans les mers des pays chauds où ils sont plus abondans que partout ailleurs. Pour obtenir leur coquille en bon état, il faut tâcher de les avoir pendant la vie de l'Animal; ils sont alors revêtus à l'extérieur de cette croûte nommée *Drap de mer*, qui, étant enlevée, laisse voir au-dessous les couleurs vives et brillantes qui caractérisent ce beau genre. Lamarck, pour faciliter la distinction des espèces, les a séparées en deux coupes: 1<sup>o</sup> les Cônes dont la spire est couronnée de tubercules plus ou moins saillans; 2<sup>o</sup> ceux qui ont la spire non couronnée. Dans l'une et l'autre de ces sections, nous citerons quelques espèces des plus remarquables, et nous y ajouterons les espèces fossiles qui présentent quelque intérêt.

† Coquilles dont la spire est couronnée.

**CÔNE DAMIER**, *Conus marmoreus*. Sur un fond d'un beau noir, il présente des taches blanches bien distinctes et triangulaires. C'est le *Conus marmoreus* de Linné (p. 3574, n. 1); le *Rhombus cylindro-pyramidalis* de Lister (*Synopsis*, t. 787, fig. 39); le *Cylindrus indicus* de Bonanni (*Recreat.*, p. 128, fig. 123). D'Argenville l'a nommé le vrai Tigre (pl. 15, fig. 0); il est bien figuré par Martini (*Conchyl.* 2, t. 62, fig. 685) et dans l'Encyclopédie (pl. 317, fig. 5), où sont figurées plusieurs variétés (pl. 527, fig. 10, 6 et 8), excepté la variété 3 qui l'est dans Chemnitz (*Conchyl.* 10, tab. 138, fig. 1979). Ce Cône vient des mers d'Asie.

**CÔNE CÉDONELLI**, *Conus Cedoanelli*. Celui-ci, l'un des plus beaux et des plus recherchés du genre, présente



un grand nombre de variétés; celui qui sert de type à l'espèce est le *Codonulli Amiralis* de Linné. Il offre, sur le milieu du dernier tour, deux fascies transverses et composées de taches irrégulières, blanches, circonscrites de brun; de plus, outre les lignes ponctuées que toutes les variétés présentent, on remarque quatre cordonnets perlés, dont un au-dessus des fascies et trois au-dessous. Cette Coquille est figurée dans la Conchyliologie de D'Argenville (Append. pl. 1, fig. 5), dans Favanne pl. 16, fig. D, 5, D, 8) et dans l'Encyclopédie (pl. 316, fig. 1). Les variétés, au nombre de huit, sont nommées par Bruguière dans l'Encyclopédie et par Lamarck (Hist. des Anim. sans vert. T. VII, pl. 447, n. 11): 1° *Codonulli Mappa* (Encycl. pl. 316, fig. 7); 2° *Codonulli Curassaviensis* (ibid. fig. 4); 3° *Codonulli Trinitarius* (ibid. fig. 2); 4° *Codonulli Martinicanus* (ibid. fig. 3); 5° *Codonulli Dominicanus* (ibid. fig. 8); 6° *Codonulli Surinamensis* (ibid. fig. 9); 7° *Codonulli Granadensis* (ibid. fig. 5); 8° *Codonulli Caracanus* (ibid. fig. 6). V. planches de ce Dictionnaire. Les mers de l'Amérique méridionale et les Antilles produisent cette Coquille précieuse.

**CÔNE PIGRE DE MOUCHE**, *Conus venatus*. Celui-ci, sur un fond blanc, présente une multitude de points blancs ou rougeâtres parsemés irrégulièrement sur toute la surface. C'est encore un *Rhombus cylindro-pyramidalis* de Lister (Synops. t. 761, fig. 10). Rumph l'a nommé *Voluta venata minor* (Thes. t. 35, fig. a, A), et Linné *Conus Stercus Muscarum*. Il se confond avec des espèces voisines, car il ne le distingue que comme variété ordinairement couronnée. Ce Cône est bien figuré dans Favanne (Conchyl. p. 495, pl. 15, f. 2) et dans l'Encyclopédie (pl. 320, fig. 6). Il présente deux variétés, d'après Bruguière et Lamarck, la première prise dans des individus plus petits, qui offrent à leur surface des points plus petits et plus rapprochés. Nous croyons, d'après ce que nous avons observé, que cette

variété n'appartient qu'à l'âge des individus. La seconde variété est toute granuleuse; elle a une forme différente et pourrait bien être une espèce distincte. Toutes deux sont figurées dans l'Encyclopédie (pl. 320, fig. 3 et 4) parmi les Cônes couronnés.

**CÔNE CROISÉ**, *Conus decussatus*, N., espèce fossile que nous avons découverte aux environs de Paris dans les recherches que nous avons faites à Valmondois. Ce Cône, long d'un pouce neuf lignes, outre qu'il présente une spire bien élargée et élégamment couronnée, ce qu'il n'était pas encore remarqué parmi les espèces des environs de Paris, offre surtout dans les jeunes individus toute sa surface chargée de stries transverses, élevées, qui sont croisées par d'autres descendant perpendiculairement et par deux de chaque tubercule.

†† Coquilles dont la spire n'est pas couronnée.

**CÔNE TIGRE**, *Conus millepunctatus*. Ce Cône est pour ainsi dire le géant du genre. Sa Coquille épaisse et pesante présente, sur un fond blanc, un grand nombre de points disposés par lignes parallèles. Ces points varient, quant à la forme, à l'étendue, au nombre et à la couleur, ce qui a fait établir plusieurs variétés. Il est à noter que dans cette espèce les taches qui sont sur la spire sont plus grandes que les autres. La spire est elle-même assez aplatie, obtuse, et tous ses tours sont légèrement canaliculés. Parmi les variétés, l'une a les taches brunes, semilunaires; une autre sur un fond rougeâtre a des taches serrées, quadrangulaires, et des rangées de points interposées; une quatrième enfin a des taches fauves et ovales. Toutes ces variétés sont figurées dans l'Encyclopédie (pl. 323, fig. 5, 3, 2, et pl. 324, fig. 3, 4). Les marchands nomment cette Coquille le Tigre ou le Cornet Millepoints. Il se trouve dans l'océan des Grandes-Indes.

**CÔNE AMIRAL**, *Conus Amiralis*. Le Cône Amiral est encore une de ces

Coquilles, qu'à ses belles couleurs et ses variétés font rechercher avec empressement par les amateurs de conchyliologie. Cette espèce en effet rivalise pour la rareté et la beauté avec le Cône Cédonulli. Linné l'a nommée *Conus Amiralis* (p. 3378, n. 10); mais Rumph (Thes. t. 34, fig. 6) lui avait donné le nom d'*Architalassus primus*. Tous les auteurs, depuis Linné, lui ont conservé le nom d'Amiral, et l'on a désigné les variétés d'après le nombre des bandes; c'est ce que firent Born (*Ind. Mus. Cassar.*, p. 154 et 145, Tab. Min., fig. 6), Favanne (*Conchyl.* T. II, p. 370, pl. 17, fig. 1, 1), Bruguière (*Encycl.*, p. 658, n. 57, pl. 358, fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), et Lamarck (*Anim. sans vert.* T. VII, p. 473, n. 69). Ce Cône, sur un fond jaune fauve, est parsemé de taches triangulaires blanc de lait; ces taches sont plus ou moins grandes; en général, elles le sont plus dans les variétés qui viennent des mers du Sud; le fond est interrompu par un plus ou moins grand nombre de bandes finement réticulées et d'un jaune citron peu foncé. Quelques variétés sont chargées de granulations comme chagrinées, ce qui les rend plus remarquables. On trouve cette belle Coquille dans les mers du Sud et celles des Grandes-Indes.

**CÔNE STRIÉ**, *Conus striatus*, Lamk. (*Anim. sans vert.* T. VII, pag. 506; n. 142), *Conus striatus*, Lin. (p. 5393, n. 58), Brug. (*Encycl.*, n. 120, pl. 343, fig. 1, 3 et 4), *Voluta tigrina*, Rumph (*Thes.*, tab. 31, fig. F), le Mela, Adanson (p. 90, pl. 6, fig. 2), l'Ecorché, D'Argenville (*Conchyl.*, 2<sup>e</sup> édit., p. 242, pl. 15, fig. O), et Favanne (*Conchyl.*, pl. 19, fig. N). Cette belle Coquille, qui n'est pas rare, est finement striée en travers sur toute sa surface; elle est blanche rosée avec des taches irrégulières brunes ou fauves plus ou moins grandes. Elle présente quelques variétés qui dépendent de l'étendue des taches et de leurs couleurs.

Parmi les espèces fossiles que nous rapportons à cette section, nous cite-

rons de préférence le Cône perdu, *Conus deparditus*, parce qu'il nous offre l'analogie remarquable du Cône treillissé qui vit dans l'océan Pacifique. Ce Cône se trouve très-communément à Grignon, et il varie beaucoup. Sa spire, peu élevée ordinairement et pointue, s'aplatit presque tout-à-fait dans quelques individus en passant par des transitions insensibles; les stries qui sont à la base de la coquille, assez prononcées vers le bas, diminuent à mesure qu'elles gagnent les parties supérieures, et disparaissent tout-à-fait; quelquefois se montrent saillantes sur toute la surface, et ce sont ces individus qui ressemblent le plus au Cône treillissé. C'est donc à tort que Bruguière, qui le premier en a fait connaître l'analogie, a donné le nom de Perdu à cette espèce, puisque effectivement elle est une de celles qui présentent une analogie. (D. H.)

**CONE**. *Conus*. BOT. PHAN. Dans les Pins, les Cèdres, les Sapins, etc., les fleurs femelles sont placées à l'aiselle d'échailles persistantes, ordinairement disposées en forme conique. C'est à cette espèce d'inflorescence que Lion a donné le nom de *Cône* ou de *Strobile*; de-là le nom de *Conifères*, donné aux Végétaux qui offrent ce mode particulier d'inflorescence. Cette disposition des fleurs n'est pas un caractère uniquement réservé aux Conifères proprement dites, c'est-à-dire à cette famille intéressante de Végétaux dont les Pins, les Sapins, les Cèdres et les Mélèzes sont les modèles. On l'observe aussi dans quelques autres Arbres appartenant à d'autres familles, et en particulier dans l'Aune et le Bouleau dont le fruit est un véritable Cône. Il y a plus; quelques Arbres appartenant à la famille des Conifères, par l'ensemble de tous leurs autres caractères, n'offrent pas ce mode d'inflorescences tels sont par exemple l'If, le Genévrier, le Ginkgo et plusieurs autres. F. CONIFÈRES. (A. R.)

**CONE-D'OR** ou **CONE DORE**.

**BOT. CRYPT.** Ce nom, emprunté de l'ournefort, a été donné par Paulet à divers Champignons qu'il regarde comme des variétés d'une même espèce, en y ajoutant des épithètes non moins impropres. (A.D.B.)

**CONAJITOS.** BOT. PHAN. De *Conajito* (Lapin). Comme qui dirait *Petits Lapins*. Syn. espagnol d'*Antirrhinum hirsutum*, L. (B.)

**CONEMON ou CONOMON.** BOT. PHAN. Nom de pays du Concombre du Japon. *V.* CONCOMBRE. (B.)

**CONEPÂTE et CONOPALT.** MAM. (Buffon et Hernandez.) Selon Cuvier, ce sont deux variétés de la Mouffette Lorille, dont l'une a six raies blanches sur le dos et l'autre deux. *V.* MOUFFETTE. (A.D.NS.)

\* **CONESSI.** BOT. PHAN. Pour Connessi. *V.* ce mot et CODAGAPALA. (B.)

**CONFANON.** BOT. PHAN. (Dochoens.) Vieux nom du Coquelicot. *V.* PAVOT. (B.)

**CONFERVE.** *Conserva.* BOT. CRYPT. (*Conservées.*) Pline le premier mentionna, sous le nom de *Conserva*, une Plante aquatique, plus voisine, dit-il, de l'Eponge d'eau douce que de la Mousse et de l'Herbe, qui était creuse et qui croissait le plus souvent dans les fleuves des Alpes. Cette Plante passait pour souveraine dans les fractures, et l'on s'en servait afin de hâter la cicatrisation des blessures faites, non-seulement aux Animaux, mais encore aux Arbres. C'est de cette propriété qu'était venu le nom de la Conserve, qui signifiait souder et consolider. Les anciens botanistes, Lobel entre autres, ayant rapporté ce nom employé par le naturaliste romain, à l'une des Plantes aquatiques, qui Dillen le conserva depuis, la désignation de Conserve s'étendit bientôt à toutes les Algues aquatiques et filamenteuses, auxquelles Linné l'a laissé. Ce nouveau Plin imposa à son genre Conserve les caractères suivans : fibres simples, uniformes, capillaires, filamenteuses,

continues et articulées. Ces caractères étaient bien vagues, et Gmelin ne les rendit pas plus précis en les reformant de la manière suivante : fibres simples ou rameuses, renfermant des gemmes globuleuses. Dillen avait, dans son Histoire des Mousses, apporté quelque attention sur les Conerves dont il fit connaître et figurer plusieurs espèces d'eau douce ou marines. Cependant Linné, qui se servit si utilement du beau travail de ce grand botaniste, ne mentionna pas tout ce que celui-ci avait décrit. On ne trouve guère dans son *Species* que vingt — une espèces de Conerves portées à cinquante-neuf par le compilateur Gmelin. Poussés par un goût naturel vers l'étude des productions aquatiques, nous fixâmes de bonne heure notre attention sur un genre linnéen où, dès le premier coup d'œil, nous avions aperçu qu'il y avait des découvertes à faire, et nous ne tardâmes pas à voir combien les botanistes connaissaient mal des êtres chez lesquels nous trouvions de grands sujets de méditation. Dès l'an V de la république, et bien jeune encore, nous présentâmes à la Société naissante d'Histoire Naturelle de Bordeaux, un travail assez étendu, où, doublant le nombre des espèces d'eau douce, nous indiquâmes la nécessité de distribuer ces espèces dans plusieurs genres. Nous eûmes dès-lors l'opinion que plusieurs des êtres qu'on rangeait parmi les Conerves, pouvaient ne pas être des Plantes, mais nous n'affirmâmes point que toutes fussent des Animaux, ainsi que le fit bientôt Girard — Chantrains dont nous sommes loin d'adopter les idées. Notre travail confié à Belin de Baln, de qui nous suivions alors les leçons de grec, et auquel une intime amitié nous liait, fut si horriblement maltraité à l'impression, durant un voyage que nous avions entrepris, le microscope à la main, sur les rives de l'Océan, que nous ne voulûmes point permettre à notre retour qu'il fût livré au public. Quelques exemplaires cependant s'en répandirent ; et ce n'est pas sans surprise, que

nous avons vu, jusqu'en Allemagne, publier plus d'une partie de ce travail sans la moindre indication de la source où l'on avait puisé. Quoi qu'il en soit, nous avions à cette époque inspiré du goût pour l'étude des Conserve, à notre savant ami Draparnaud de Montpellier, et nous préparions avec lui l'histoire générale des Conserve, quand une mort prématurée enleva ce naturaliste à la science. Les circonstances nous ayant arrachés à une étude dont nous nous promettons d'intéressants résultats, cette étude ne tarda pas néanmoins à obtenir une certaine vogue. Roth, professeur allemand, rappela l'attention des botanistes sur les Conserve. Le premier volume de ses *Calceola botanica*, qui parut à la fin du siècle dernier, augmenta le nombre des espèces, en établissant à leurs dépens le genre *Ceramium*. Dans le second fascicule du même ouvrage imprimé en 1800, on trouve quelques additions, et la création du genre *Hydrodictyon* que nous avons indiqué, cinq ans auparavant, sous le nom de *Réticulina*. Enfin, le même savant a publié en 1806 un troisième fascicule. En y reprenant l'histoire des Conserve dans le plus grand détail, il rétablit le genre *Batrachosperma*, que nous avons formé de l'un, et ne créant que de simples divisions parmi le reste des Conserve, il en décrit cent ou cent cinquante espèces, tant d'eau douce que marines. Cependant Vaucher, naturaliste genevois, observateur exact et rempli de sagacité, avait, en 1805, publié un essai sur les Conserve d'eau douce, ouvrage précieux rempli d'observations bienfaites, où nous avons retrouvé avec une sorte d'orgueil plusieurs des découvertes que nous avions faites cinq ou six ans auparavant. Ce traité doit être considéré comme le meilleur ouvrage qui existe encore aujourd'hui sur cette matière. Vaucher y établit six genres parmi ce qu'il nomme Conserve, savoir : 1° *Ectospermum*, que nous considérons comme appartenant à la famille des Rhapha-

cées; 2° *Conjugata*, dont nous avons formé une sous-famille d'Arthrodiées; 3° *Polysperma*, coupe vicieuse où l'auteur avait confondu, sous des caractères faux, des espèces qui n'appartiennent pas même à des familles semblables; 4° *Hydrodictyon*, que l'on doit s'empresse d'adopter; 5° *Batrachosperma*, dont il a été question dans le second volume de cet ouvrage; 6° *Proflig*, groupe parfaitement naturel, dont le nom ne pouvant être adopté, parce qu'il pêche contre les règles de nomenclature établies, ne peut être mieux remplacé que par celui du savant qui découvrit le mode étrange de reproduction des espèces qui le composent. Deux genres de Vaucher, les *Hydrodictyes* et les *Prolifères*, sont seuls des Conserve dans le sens rigoureux du mot. De Candolle, dans sa Flore Française, s'occupant non-seulement des Conserve d'eau douce, mais encore des espèces marines, a considérablement amendé le travail de son compatriote; mais dans le vaste plan qu'il avait conçu ce savant, obligé de passer légèrement sur des classes où le secours du microscope était nécessaire, De Candolle n'a pu laisser aux Conserve un travail qui pût suffire à leur étude. Changeant les caractères et jusqu'aux noms de genres établis par ses prédécesseurs, rejetant dans les *Ceramies* des uns des Conserve des autres, et dans les Conserve de ceux-ci des *Ceramies* de ceux-là, il décrit beaucoup de nouvelles espèces reportées dans les genres *Diatome*, *Chytrinsie*, *Conserve*, *Batrachosperme*, *Hydrodictye* et *Vauchérie*. Les *Diatomes* de De Candolle sont pour nous des *Arthrodiées* de la sous-famille des *Frugillaires*; ses *Chytrinsies*, genre des plus incohérents, se répartissent dans nos *Vauchéries*, dans nos *Léonies*, dans les *Ceramies*, les *Cadmus*, les *Salmacides*, les *Zygnaides*, les *Arthrodiées*, etc. Ses *Batrachospermes* sont les nôtres, confondus avec les *Draparnaudiées* et *Thorées*; son *Hy-*

odyctie est celui de tous les auteurs; Vauchéries, qui sont les Ectocermes de Vaucher, ont mal à propos reçu un nouveau nom, quand celui qui avait établi l'inventeur était si plus significatifs et devait être conservé. Agardh, professeur à Lund Suède, qui s'est beaucoup occupé d'hydrophytologie, et Lynghye, suédois, qui a publié récemment un fort bon ouvrage sur la Cryptogamie aquatique, ont aussi établi de nouvelles coupes parmi les Conserve, changé plus ou moins la nomenclature. Leurs divisions sont excellentes, mais plus d'un rapporte en fait la Flore suédoise donne de bonnes figures d'espèces peu ou point connues. Dillwin, botaniste anglais, s'est aussi beaucoup occupé des Conserve, entre lesquelles il n'a point admis de genres nouveaux, et qui lui ont fourni le sujet d'un ouvrage de luxe, dont les figures sont réputées magnifiques, encore qu'elles ne nous paraissent pas dignes de leur célébrité. Ces figures ont reproduites en partie dans l'ouvrage de Sowerby.

Bonnemaison de Quimper vient de publier récemment, dans le Journal de Blainville, un Mémoire tendu sur ce qu'il nomme les Hypophytes localées, et dans lequel cet aimable naturaliste a traité de tout ce que la mer lui présente de filamenteux et d'articulé. Il y établit, sous des noms nouveaux, soit sous des noms adoptés, d'après des caractères établis ailleurs ou réformés par lui, vingt-sept genres qui doivent être répartis dans les familles que nous avons reconnues exister dans ce que l'on avait si long-temps confondu sous la désignation impropre et commune de Conserve. Nous ne citerons pas ici le travail de Girod-Chanans, qui n'a établi aucun ordre parmi les Conserve, qui n'a rien déterminé positivement, et qui, au lieu de caractériser des espèces, est borné à soumettre à ses lecteurs des conjectures et des hypothèses accompagnées de figures médiocres. C'est lui surtout qui s'est établi

le défenseur de l'idée que les Conserve étaient des Polymiers. Avancer un tel fait d'une manière absolue ne pouvait être qu'une erreur. Dans l'union d'être incohérens, que l'on avait confondus sous le nom de Conserve, il se trouvait effectivement quelques espèces qui s'alliaient au règne animal; mais le plus grand nombre était des Plantes; ainsi la question de l'animalité des Conserve était oiseuse dans toute l'acception du terme. Ce point ayant été éclairci au mot ARTHRODIE, nous n'y reviendrons pas. Il suffit ici d'apprendre à nos lecteurs que, dans le genre *Conserva* de Dillen, de Linné et des auteurs qui ont suivi les traces de ces législateurs, nous avons trouvé les matériaux de familles dont une, celle des Arthrodies, établit le passage des Plantes à l'animalité; la seconde, celle des Chaodinees, semble être le point de départ de l'organisation végétale, très-développée dans les deux dernières qui sont les Cérames et les Conservees. Ces mots.

Le genre Conserve, qui sert de type à cette dernière famille et dont il sera ici spécialement question, a pour caractères : des filamens cylindriques renfermant une matière colorante qui paraît contenue dans un tube interne, tube qui n'atteint pas toujours au tube externe, et qu'interceptent des articulations paraissant formées par sections transverses à l'aide de valvules, ou indiquées par l'espace transparent qui sépare le tube interne rempli de matière colorante. Les Conserve ont leurs filamens simples, très-flexibles, généralement verts; elles adhèrent un peu moins au papier que la plupart des Chaodinees et des Cérames, se trouvent dans les eaux douces aussi bien que dans la mer, sont fort nombreuses et nous paraissent du nombre des Plantes aquatiques les plus répandues dans nos ruisseaux et dans nos étangs. Elles méritent que nous leur réservions avec Lynghye, qui nous paraît avoir bien connu ce genre (encore qu'il ait confondu avec lui deux autres genres qui sont cependant fort distincts), le nom de *Conserva*.

sous lequel on confondit si long-temps tant d'espèces disparates. Le genre *Conserva* se divisa en trois sous-genres qui, lorsqu'on eut acquis sur l'hydrophytologie des connaissances plus approfondies, pourrout être totalement séparés.

† **CONFERVES PROPREMENT DITES**, où l'articulation évidemment formée au moyen de valvules fort distinctes, et qui se détachent en un trait vis et comme une section sur la transparence du tube, contient une matière colorante disposée en fascie transverse et généralement plus étroite dans le sens de la longueur de l'article. Les *Conserva compacta*, *zonata*, *fugacissima*, *disiliens*, viennent se ranger dans ce sous-genre qui pourrait bien rentrer un jour parmi nos *Zoocarpées*, dont elles'ont parfaitement l'aspect avant l'époque où ces dernières préparent intérieurement et émettent leurs gemmes vivantes. Telle est notre conception que, frappés d'une ressemblance de laquelle on ne nous eût même pas reproché de nous être autorisés, nous n'avons pas osé nous permettre un rapprochement que l'avenir eût pu désavouer. Il est bon d'observer que dans les figures données par Lyngbye du *Conserva fugacissima*, tab. 46, il n'y a que 1, 2 et 10, qui conviennent à cette espèce.

†† **CHANTRANSIES**, où l'articulation est absolument conformée comme dans les *Conferves* proprement dites; la matière colorante s'y agglomère en taches fort différentes des fascies, plus ou moins approchant de la forme carrée, et s'allongeant dans le sens de la longueur de l'article. Les espèces de ce sous-genre deviennent surtout percussives en se desséchant, et leurs articles paraissent alors alternativement ovoïdes et comprimés en fil, ce qui leur donne plus communément qu'aux autres *Conferves* une figure qu'on ne peut guère comparer qu'à celle que présentent dans les boutiques de charcutiers des séries de saucisses ou de boudins. Le *Conserva Enicetorum*, s'il n'est un *Le-*  
*da*, les *Conserva alpina*, *quadran-*

*gula*, *capillaris* et *fascicola*, sont les espèces les plus communes de ce sous-genre; la dernière abonde sur les *Fucus* qu'elle recouvre d'un duvet brunâtre; l'avant-dernière se rencontre dans nos eaux douces où on la confond souvent avec le *Rivularia* qui nous paraît appartenir à nos *Zoocarpées*, ou peut-être à nos *Vau-chéries*, mais qui serait en litige entre les *Conferves* et les *Chantransies*, si elle devait demeurer dans le genre qui nous occupe.

††† **LAMOUROUXELLES**, où l'article n'est indiqué par aucune valvule ou par aucun trait vis remarquable sur le tube extérieur, mais où la matière colorante affecte dans l'intérieur la forme d'une série de carrés. Les *Conserva flacca*, *implexa*, *tortuosa* et *linum*, donnent d'excellens exemples de ce sous-genre où se range la *Conserva antennina* que nous découvrîmes à l'île de Mascareigne, et que depuis nous avons retrouvé sur nos côtes, tandis que notre savant ami Léon Dufour le rencontrait dans le port de Barcelone. (B.)

\* **CONFERVÉES. NOT. CRYPT.** Famille que nous proposons d'établir parmi les Algues aquatiques de Linné aux dépens du genre *Conserva* de ce grand naturaliste. Ses caractères généraux sont : filaments tubuleux, cylindriques, vitrés, simples ou rameux, articulés au moyen de valvules qu'on distingue dans leur transparence, chez lesquels une matière intérieure colorante indique, quand les valvules ne sont pas perceptibles, des articulations dans un tube intérieur qui, pour n'être pas toujours facilement visible, n'en est pas moins existant. La fructification, quand elle est manifeste, paraît consister dans des gemmes intérieures que ne revêt aucune enveloppe. Les *Confervées* ont le plus grand rapport avec les *Ceramiales* qui en diffèrent par leur fructification externe, présentant déjà une organisation capsulaire bien distincte; elles ressemblent beaucoup aussi aux *Chaetodées*, mais n'en ont pas la même

ent; les Arthrodiées de la sous-famille des Zoocarpées, ne seraient pas des Confervées si leurs propagules étaient pas de véritables Animaux. Ils ont quelques points d'affinité avec les Ulvacées, par les espèces d'Ulves tubuleuses et la couleur généralement verte; mais le tissu des filaments des unes et les expansions des autres les éloignent. Quant aux Ectopermes (F. ce mot) de Vaucher, dont les tubes ne sont jamais articulés, et dont la fructification extérieure mérite plus grande attention, ils nous paraissent former un genre parfaitement circonscrit qui doit rentrer dans la famille des Characées. Cette affinité pour avoir échappé à tout monde, ne sera pas moins démontrée par la suite.

Les Confervées habitent les eaux, douces, soit salées, quelquefois sur la surface des bois pourris et des murs humides; nous en avons rencontré que dans les infusions. La sécheresse les fait mourir et disparaître à leur retour, et après qu'elles ont été séchées, elles ne reprennent plus, comme la plupart des Céramiaires, d'Ulves et des Chaodimées, l'apparence de la vie. Le genre Bryopsis, rapporté dans le second volume de notre Dictionnaire à la famille des Ulvacées, nous paraît, depuis que nous l'avons mieux examiné, devoir se placer dans la famille dont il est l'essence; sa fructification est absolument inconnue, mais la matière colorante n'y est pas continue, et les séparations qu'on y aperçoit indiquent nécessairement un système d'articulation intérieure incompatible avec l'idée qu'on doit se faire des Ulvacées dont les Bryopsides d'ailleurs n'ont pas le genre. Nous répartirons les Confervées dans les genres suivans :

† A filamens cylindriques généralement rameux (voisins des Céramiaires).

I. *Scytonema*, *Scytonema*, Agardh. Filamens coriaces, cylindriques, marqués d'anneaux moniliformes intérieurement; sans que les ar-

ticles soient tranchés sur le tube extérieur.

II. *Sphacellaria*, *Sphacellaria*, Lyngb. Filamens cylindriques, articulés par sections transversales; chaque article marqué par une bande transversale de matière colorante; fructification aux extrémités des rameaux légèrement renflés en masses.

III. *Lyngbyella*, *Lyngbyella*, N. Diffère du genre précédent en ce que les fascies de la matière colorante sont longitudinales dans les articles.

IV. *Pilayella*, *Pilayella*, N. Filamens articulés par sections transversales fort visibles, dépourvus de toute macule de matière colorante; fructification formée par des globules qui se développent à la suite les unes des autres vers l'extrémité des rameaux.

†† Filamens généralement rameux où chaque article est renflé (voisins des Ulvacées).

V. *Lomentaria*, *Lomentaria*, Lyngb.; *Ulva articulata* des auteurs.

††† Filamens généralement simples (voisins des Arthrodiées).

VI. *Percursaria*, *Percursaria*, N. Un filament interne fort sensible parcourant d'une extrémité à l'autre le filament externe à travers les articles bien distincts qui s'y voient.

VII. *Monillina*, *Monillina*, N. Gemmes sphériques ou ovoïdes, solitaires dans chaque article bien indiqué par des valvules transverses.

VIII. *Gaittonella*, *Gaittonella*, N. Gemmes intérieures sphériques, transversalement coupées dans leur diamètre, de manière à présenter l'idée de petites boîtes à savonnette.

IX. *Vaucheria*, *Vaucheria*, N.; *Prolifera*, Vaucher. Filamens bien articulés par sections transverses dont quelques-unes se renflent à l'époque de la reproduction et deviennent de grosses gemmes globuleuses. L'*Oscillatoria muralis* des auteurs est évidemment une Vauchérie.

+++ Douteuses (voisines des Ectospermes, et conséquemment des Characées).

X. PUSILLINE, *Pusillina*, N. Nous renverrons à l'article de ce genre obscur qui renferme les Conierves d'infusion, pour de plus amples détails.

On verra, quand l'ordre alphabétique nous aura donné les moyens d'exposer l'histoire particulière de chacun des genres qui viennent d'être indiqués, que plusieurs Végétaux aquatiques, regardés comme des Conierves, cessent d'en faire partie pour passer dans d'autres familles : tels sont particulièrement les *Conserva glomerata*, *fracta*, *cristallina* et *rupes-tris*, qui deviendront certainement des Cérames quand leur fructification sera connue. (B.)

CONFITERO. BOT. PHAN. C'est-à-dire *Confiturier*. Nom espagnol d'une variété de Pépon dont on fait diverses confitures, conserves, etc. (B.)

\* CONFUSI, SINI ET COBUS. BOT. PHAN. Syn. japonais de *Magnolia glauca*. (B.)

CONGA. BOT. PHAN. Qu'il ne faut pas confondre avec *Conghas*. Nom indien, que feu Richard croyait convenir au *Bombax Gossypium*, L. F. FROMAGER. (B.)

\* CONGE. BOT. PHAN. (Poiret.) Nom chinois d'une variété de Thé à feuilles étroites. (B.)

\* CONGÉLATION. Passage d'un liquide à l'état solide, occasionné par un abaissement de température. (DR. Z.)

CONGÉLATIONS PIERREUSES. On donne ce nom très-impropre à des dépôts calcaires, cristallins ou gypseux, qui se forment sur les parois des grottes, et qu'il est plus convenable de nommer Stalagmites. V. ce mot. (LUG.)

\* CONGHAS. BOT. PHAN. Nom qu'on donne à Ceylan au *Schleichera de Willdenow*, dont Jussieu a fait son *Melicocca trijuga*. (B.)

\* CONGI. BOT. PHAN. Arbruste de

la côte de Coromandel dont on n'a pas vu la fleur, et qu'on croit être un Sébastier ou un Ehretia. (B.)

\* CONGO - MAHOE. BOT. PHAN. Nom que les Nègres donnent à l'*Hibiscus clypeatus* de la Jamaïque, où ils croient que cette Plante a été apportée du Congo. (B.)

\* CONGONA ET CONGONITA. BOT. PHAN. Nom de pays du *Peperomia inæqualifolia* de Ruiz et Pavon. V. PEPEROMIA. (B.)

\* CONGONO. BOT. PHAN. (Aublet.) Syn. de *Piper trifolium* à Cayenne. (B.)

\* CONGOXA. BOT. PHAN. Syn. portugais de *Vinca major*. V. PERVENCHE. (B.)

CONGRE. ROIS. Espèce du genre Murène, qui est le type d'un sous-genre auquel cette espèce a donné son nom. V. MURÈNE. (B.)

\* CONGRE SERPET. ROIS. (Larocche.) Syn. de *Murena mystax* en Catalogne. V. MURÈNE. (B.)

CONGYLES. BOT. PHAN. (Columelle.) La Rave. (B.)

CONHAMETRA. BOT. PHAN. L'un des noms portugais de Mauve, d'où *Conhametra brava*, syn. de *Malva alcea*. (B.)

CONIA. BOT. CRYPT. Ventenat. avait proposé de donner ce nom aux *Byssus pulvérulens* de Linné, qui forment actuellement le genre *Lepra* ou *Lepraria*. V. LEPRARIA. (AD. B.)

\* CONIANGTIUM. BOT. CRYPT. (Lichens.) Ce genre, fondé par Fries dans les Actes de l'Académie de Stockholm (1821, p. 330), présente beaucoup d'analogie avec le genre *Conioluma* de Floerke; sa fronde est crustacée, très-mince, adhérente; les apothécies sont sessiles, arrondies ou elliptiques, sans bord distinct; leur surface est formée par une membrane solide, rude, qui ne se détruit jamais, et qui recouvre des sporules pulvérulentes colorées très-abondantes.

Fries cite comme type de ce genre, sous le nom de *Coniangtium vulgare*,



le *Spiloma paradoxum*, Ach., Lichen., dont le *Lecidea dryina* n'est suivant lui qu'un état imparfait. Cette espèce est commune sur les écorces des Chênes, des Sapins, des Bouleaux, etc. (AD. B.)

**CONIANTHOS.** BOT. CRYPT. (*Hépatiques*.) Palisot de Beauvois désignait sous ce nom un genre séparé des *Jungermannes* de Linné, et qui correspondait exactement aux *Jungermannia* de Micheli. Il était caractérisé par ses semences (fleurs mâles d'Hedwig) rassemblées en boules nues au sommet des rameaux ou des feuilles. V. *JUNGERMANNIA*. (AD. B.)

\***CONICHYDONTES.** POIS. ROSS. Syn. de *Glossopètres*. V. ce mot. Gesner appelait généralement *Conic-Térites*, les dents de Poissons fossiles. (B.)

**CONIDIS.** BOT. PHAN. Le *Plantago Pryllium* en Sicile. (B.)

\***CONIE.** *Conia*. MOLL. Ce genre, proposé par Leach et adopté généralement, a été fait pour le *Lepas porosa* de Linné, et une nouvelle espèce encore peu connue. Ses caractères sont : test divisé en quatre parties bien distinctes; opercule formé de deux parties seulement.

La *CONIE POREUSE*, *Conia porosa*, est rare; elle vient des mers de l'Inde; récente, elle est verte à l'extérieur, noire en dessus et blanche en dessous. Il est étonnant que Bruguière ainsi que Lamarck n'aient point fait mention de cette espèce de *Lepas* de Linné, et se soient abstenus de la placer, l'un dans ses *Balanites*, le second dans ses *Balanes*. (D..H.)

**CONIE,** BOT. CRYPT. V. *CONIA*.

**CONIELLE.** BOT. PHAN. La *Conyse squameuse* en Italie. (B.)

**CONIER,** MOLL. L'Animal des Cônes. V. ce mot. (B.)

**CONIFÈRES.** *Conifereae*. BOT. PHAN. Groupe de Végétaux placé par Jussieu dans sa classe des *Diclines*, mais qui doit être rangé parmi les familles *Triclylédones* apétales super-

ovariées. Ainsi que l'indique son nom, cette famille réunit une foule d'Arbres intéressans dont le fruit est un cône, c'est-à-dire un assemblage d'écaillés imbriquées, et dont l'ensemble approche plus ou moins de la forme conique. Cependant plusieurs genres, appartenant évidemment à la famille des *Conifères* par l'ensemble de tous leurs autres caractères, n'offrent point un cône pour fruit; tels sont *Pin*, le *Genévrier*, le *Genko*, etc. Nous ferons connaître ces particularités en traçant avec détails les caractères généraux que présente la famille des *Conifères*.

Les *Conifères* s'éloignent de toutes les autres familles de Plantes phanérogames par plusieurs caractères de la plus haute importance; aussi décrirons-nous leur structure avec quelques détails. Dans tous les genres de cette famille, les fleurs sont constamment unisexuées, ordinairement monoïques, plus rarement portées sur deux individus distincts. Les fleurs mâles se composent essentiellement d'une seule étamine, en sorte que l'on doit compter autant de fleurs qu'il existe d'étamines. Tantôt ces étamines ou fleurs mâles sont isolées les unes des autres et entièrement nues, c'est-à-dire sans aucune écaille; tantôt elles sont réunies et diversement groupées, soit à l'aisselle, soit à la face inférieure d'écaillés dont l'ensemble constitue généralement une sorte de cône. Dans ce dernier cas, ces étamines s'entregreffent souvent entre elles par le moyen de leurs fillets, et sont monadelphes. Les anthères sont membraneuses, à une ou à deux loges généralement écartées l'une de l'autre, et s'ouvrant soit par une fente longitudinale, soit par un trou qui se pratique à leur partie supérieure. La disposition générale des fleurs mâles, c'est-à-dire leur mode d'inflorescence, offre aussi beaucoup de variations dans les différens genres; ainsi elles forment quelquefois des épis plus ou moins longs, dépourvus d'écaillés (*Podocarpus*, *Phyllocladus*, *Salsburia*, etc.). D'autres fois elles sont placées

à la face inférieure ou à l'aisselle d'écaillés minces qui forment des cônes, des épis simples ou rameux. L'inflorescence des fleurs femelles n'est pas moins variable. Ainsi elles sont solitaires et axillaires dans le *Podocarpus*, le *Taxus*; solitaires et terminales dans le *Dacrydium*; réunies au nombre de trois à cinq au milieu d'un involucre formé d'écaillés dans le *Genévrier*, l'*Ephedra*, le *Callitris*; enfin placées à l'aisselle d'écaillés disposées en cônes dans une foule d'autres genres, tels que les Pins, les Sapins, les Cèdres, etc. Chacune des fleurs considérée en particulier offre une organisation qui a une analogie extrêmement frappante dans les différents genres; un calice monosépale, quelquefois renflé à sa partie inférieure, quelquefois très-comprimé, et formant latéralement une expansion membraneuse plus ou moins étendue, enveloppe un pistil libre ou semi-adhérent. Le calice se prolonge supérieurement en un tube plus ou moins étroit, dont le bord, quelquefois évasé, est entier ou bifide, et assez souvent épaissi par une substance glanduleuse. Il est extrêmement difficile de distinguer avec précision la véritable structure du pistil renfermé dans l'intérieur de ce calice. Il paraît être à une seule loge, et contenir un seul ovule. Le style et le stigmate sont simples et fort peu distincts des autres parties du pistil. La position des fleurs femelles n'est pas la même dans tous les genres; en effet, elles sont dressées dans un certain nombre, tandis qu'elles sont renversées dans d'autres; ainsi elles sont dressées dans les genres *Taxus*, *Phyllocladus*, *Salisburia*, *Ephedra*, *Juniperus*, *Thuya*, *Callitris*, *Cupressus*, *Taxodium*; elles sont au contraire renversées dans les genres *Podocarpus*, *Pinus*, *Abies*, *Cedrus*, *Larix*, *Agathis*, *Araucaria*.

Le fruit offre dans son aspect et sa consistance des différences fort notables. En parlant de l'inflorescence, nous avons déjà fait remarquer que les fleurs femelles étaient parfois solitaires, parfois réunies, et diversement grou-

pées. Ce caractère entraîne une différence très-marquée dans le fruit considéré d'une manière générale. Nous trouverons dans la famille des Conifères des fruits simples, c'est-à-dire provenant d'une seule fleur: tels sont ceux du *Taxus*, du *Podocarpus*; et des fruits agrégés ou composés, c'est-à-dire résultant d'un nombre plus ou moins considérable de fleurs: tels sont les fruits du Sapin, du *Genévrier*, du Cèdre, etc. Dans tous ces fruits le calice est persistant, et prend un accroissement plus ou moins considérable; ainsi, dans les genres qui ont les fleurs renversées, le calice se dilate sur ses parties latérales, et donne naissance à des expansions membraneuses en forme d'ailes. (P. Sapin, Cèdre, *Agathis*, etc.); d'autres fois ce calice s'épaissit, devient plus ou moins charnu, et forme autour du véritable fruit une sorte de péricarpe accessoire (*Taxus*, *Dacrydium*, *Podocarpus*, *Ginkgo*, etc.).

Dans les genres dont les fleurs femelles sont munies d'écaillés, celles-ci persistent constamment. Elles prennent dans le fruit un accroissement très-considérable. Dans le *Genévrier*, ces écaillés, d'abord distinctes quand on les examine dans la fleur, finissent par se souder entre elles, s'épaissir, devenir charnues, recouvrir les véritables fruits, et leur former un péricarpe accessoire. Ainsi la partie charnue dans le *Genévrier* n'est pas du tout la même que celle de l'If. Dans le premier de ces genres elle est formée par les écaillés de l'involucre, tandis que c'est le calice qui la constitue dans le second cas.

Examinons maintenant la structure du fruit proprement dit, et dépouillé du calice qui l'enveloppe constamment. Remarquons d'abord que, dans certains genres et en particulier dans ceux qui ont les fleurs renversées, le calice est intimement soudé avec la paroi externe du péricarpe dans les trois quarts ou moins de son étendue, en sorte qu'ils ne peuvent être isolés l'un de l'autre. Quoiqu'il en soit, le péricarpe est toujours

sez mince, crustacé ou simplement membraneux, toujours indéhiscant, une seule loge qui renferme une seule graine. Le tégument propre de la graine est peu distinct de la paroi interne du péricarpe, avec laquelle il contracte une adhérence plus ou moins intime. L'intérieur de la graine est rempli par un endosperme charnu contenant un embryon axillaire plus ou moins cylindrique, et dont la structure s'éloigne beaucoup de celle des autres Plantes phanérogames. Il est constamment renversé, c'est-à-dire que sa radicle est opposée au point d'attache de la graine. Cette extrémité radiculaire de l'embryon n'est pas libre, ainsi qu'on l'observe pour tous les autres Végétaux; elle est intimement soudée et confondue avec l'endosperme dont on ne peut le séparer sans déchirement. C'est cette considération qui avait engagé le professeur Richard à former avec les Conifères et des Cycadées, dans lesquelles cette particularité s'observe également, une classe à part dans le règne végétal sous le nom de *Synanthizés*, c'est-à-dire Végétaux dont la radicle est soudée.

Le corps ou extrémité cotylédonaire de l'embryon n'est pas moins remarquable. Quelquefois il n'offre que deux cotylédons, mais dans un grand nombre d'espèces on trouve de trois à douze cotylédons. Quelques auteurs, pour ramener cette anomalie à la loi générale de l'embryon dicotylédon, ont dit que, dans les Conifères, il n'existait réellement que deux cotylédons, mais que souvent ces deux corps étaient divisés plus ou moins profondément en un certain nombre de segments. Cette assertion n'est pas confirmée par l'observation; en effet, dans le Pin-Pignon, par exemple, dont l'embryon offre de dix à douze cotylédons, chacune des incisions qui les séparent à la même profondeur, et, par conséquent, chacun d'eux doit être considéré comme distinct.

Les genres qui composent la famille des Conifères ne sont pas très-nombreux; et leurs caractères dis-

tinctifs sont quelquefois fondés sur des différences assez difficiles à apprécier, tant est grande l'analogie qui existe entre eux. Cependant ces genres peuvent être facilement divisés en trois ordres distincts dont nous allons exposer brièvement les caractères, et indiquer les genres qui entrent dans chacun d'eux.

### I<sup>er</sup> ORDRE. — TAXINÉES.

Ce premier ordre renferme les genres ayant les fleurs femelles distinctes les unes des autres, attachées à l'aisselle d'une écaille, ou au fond d'une sorte de cupule. Les fruits sont simples; les genres qui entrent dans cet ordre sont les suivants :

*Podocarpus*, Labillard.; Rich., Conif., t. 1, 29, f. 1; *Daorydium*, Rich., Conif., t. 2, f. 5; *Taxus*, L.; Rich., Conif., t. 2, f. 1, 2; *Satimburia*, Rich., Conif., t. 3, f. 1, t. 3 bis; *Phyllocladus*, Rich., Conif., t. 3, f. 2; *Ephedra*, L.; Rich., Conif., t. 4, t. 29, f. 2.

### II<sup>e</sup> ORDRE. — CUPRESSINÉES.

Dans cet ordre les fleurs femelles sont dressées, réunies plusieurs ensemble à l'aisselle d'écailles peu nombreuses qui forment un fruit plus ou moins arrondi, quelquefois charnu. On compte dans cet ordre les genres : *Juniperus*, L.; Rich., Conif., t. 6 et 7; *Thuya*, L.; Rich., Conif., t. 8, fig. 2; *Callitris*, Desfont.; Rich., Conif., t. 8, f. 1; *Cupressus*, L.; Rich., Conif., t. 9; *Taxodium*, Rich., Conif., t. 10.

### III<sup>e</sup> ORDRE. — ABÉTINÉES.

Cet ordre renferme les véritables Conifères, c'est-à-dire les genres qui ont pour fruit un cône formé d'écailles imbriquées, à l'aisselle de chacune desquelles on trouve deux fleurs femelles renversées. Voici les genres qui le composent :

*Pinus*, L.; Rich., Conif., t. 11 et 12; *Larix*, Rich., Conif., t. 13; *Cedrus*, Rich., Conif., t. 14 et t. 17, f. 1; *Abies*, Rich., Conif., t. 14, f. 2-3, t. 15, t. 16, t. 17, f. 2; *Cunninghamia*, Rich., Conif., t. 18, f. 3;

*Agathis*, Rich., Conif., t. 19; *Araucaria*, Juss., Rich., Conif., t. 20 et 21.

La famille des Conifères n'est pas moins intéressante par ses usages dans l'économie domestique, les arts et la thérapeutique, que par les particularités de son organisation. La tige des Pins et des Sapins, qui souvent s'élève à une hauteur de quatre-vingt-dix à cent pieds, est employée avec avantage, comme bois de mâture, dans les constructions navales, et quoique le grain de ce bois soit un peu lâche, cependant on en fait un usage très-fréquent dans les ouvrages de menuiserie et de charpente. Les Conifères sont également fort remarquables par la grande quantité de substances balsamiques et résineuses qu'elles produisent. La plupart des Térébenthines, des Résines, des Baumes sont fournis par des Arbres appartenant à cette famille. V., pour de plus longs détails, chacun des genres qui composent cette famille. (A. R.)

\* CONIFEL. MAM. Nom du Lapin chez les anciens Celtes, et d'où seraient venus *Cuniculus* des Latins, *Conejo* des Espagnols, *Conoglio* des Italiens, etc. (B.)

CONILA. BOT. PHAN. On attribue cet ancien nom à l'Origan. (B.)

\* CONILÈRE. *Conilera*. CRUST. Genre de l'ordre des Isopodes, établi par Leach, et ayant, suivant lui (Dict. des Sc. nat. T. XII, p. 248), pour caractères : deuxième, troisième et quatrième paires d'ongles très-courbes; les autres peu arqués; les huit dernières pates de derrière épineuses, au moins à l'extrémité de leur article; tête non saillante en avant; yeux granulés, petits, écartés, nullement proéminens; antennes supérieures, dont les premier et deuxième articles sont presque cylindriques; côtés des articles de l'abdomen presque droits, involutes. Les Conilères, que Leach range dans la quatrième race de la famille des Cy-

mothoades, avoisinent singulièrement les genres Rocinèles et Asga, et peuvent être réunies aux Cymothoës de Fabricius. Leach ne cite qu'une espèce, le CONILÈRE de MONTAGU, *Col. Montagui*. Son corps est fusse, non ponctué; le dernier article de l'abdomen est plus long que large; les côtés sont arqués vers leur milieu; l'extrémité est arrondie. Montagu n'a pu se procurer qu'un seul individu mâle; il a été trouvé à Salcombe, sur la côte sud-ouest de l'Angleterre. On voit que tout concourt, dans cette circonstance, à jeter du doute sur l'établissement de ce nouveau genre. (A. R.)

\* CONILITE. *Conilites*. MOLL. FOSS. Sous ce nom générique, Lamarck (Anim. sans vert. T. VII, p. 598) a séparé des Bélemnites et des Hippurites, des Coquilles multiloculaires pétrifiées, qui paraissent se distinguer parfaitement de ces deux genres. Il paraîtrait que les Coquilles qui doivent y rentrer sont rares, ou sont restées confondues avec les genres voisins. Aussi Lamarck n'a proposé ce genre que pour signaler ces corps et en donner un bon exemple. Voici les caractères par lesquels il les sépare : coquille conique, droite, légèrement inclinée, ayant un fourreau mince, distinct du noyau qu'il contient; noyau subséparable, multiloculaire, cloisonné transversalement. Ce qui distingue principalement ce genre, c'est le peu d'épaisseur du fourreau; il sépare effectivement ce genre des Bélemnites qui sont toujours très-épais, et qui ne revêtent un cône cloisonné que par une faible portion de leur étendue. Une seule espèce a été signalée : c'est la CONILITE PYRAMIDALE, *Conilites pyramidata*, qui a été trouvée pétrifiée aux Vaches-Noires sur les côtes de Bretagne par Lucas. Nous ne connaissons pas cette Coquille longue de deux pouces, et qui est à l'état pyriteux comme presque toutes celles que l'on trouve dans cette localité. (D. R.)

**CONIOCARPUS** ET **CONIOCARON**. BOT. CRYPT. (*Lichens*.) De molle n'a établi dans la Flore Française un nouveau genre sous ce nom, correspond à celui qu'Acharius a nommé *Spiloma* dans sa Lichénographie universelle. Quoique cet ouvrage soit postérieur, sa nomenclature étant généralement adoptée, nous le suivrons. *V. SPILOMA*.

De Candolle n'a décrit que trois espèces de ce genre; la première, *coniocarpon cinnabarinum*, se rapporte au *Spiloma tumidulum*, var. *rubrum* d'Acharius, qui appartient au genre *Coniolum* de Floerke; la seconde, *Coniocarpon olivaceum*, est *Spiloma olivaceum*, Ach.; la troisième, *Coniocarpon nigrum*, est le *Spiloma melaleucum*, Ach. (AD. B.)

\* **CONIOLOMA**. BOT. CRYPT. (*Lichens*.) Floerke a séparé sous ce nom un genre qui comprend quelques espèces de *Spiloma* d'Acharius; il est ainsi caractérisé : fronde crustacée, adhérente; apothécies oblongues, régulières, déprimées, ensuite convexes, bordées; disque à surface inégale, portant de petites vésicules; bord divergent ou floconneux, semblable à la croûte. Les espèces qui appartiennent à ce genre sont : 1. *Coniolum coccineum*, Floerke, *Spiloma tumidulum*, var. *B. rubrum*, Ach. — 2. *Spiloma vitiligo*, Ach. — 3. *Spiloma ratatum*, Engl. Bot. 2028. — 4. *Spiloma tuberculatum*, Engl. Bot. 2556. Toutes ces espèces croissent sur les troncs des Arbres.

Le *Coniocarpon cinnabarinum* de Candolle paraît appartenir à la dernière espèce de ce genre. (AD. B.)

\* **CONIOMYCES**. *Contomyces*; *Coniomyces*. BOT. CRYPT. (*Uredinées*.) Les réunis sous ce nom un grand nombre de petits Champignons caractérisés par l'absence de périidium, membrane séminifère et de filaments réguliers; ils sont formés soit uniquement de petites capsules réunies en groupes sous l'épiderme des plantes comme dans les Uredos, Puccinies, etc., soit d'une base charnue ou

filamenteuse, sur laquelle ces capsules sont éparses. Pour nous conformer à la nomenclature adoptée dans la plupart des familles naturelles, nous avons proposé de nommer ce groupe **URÉDINÉES**, le genre *Uredo* pouvant en être regardé comme le type. *V. ce mot*. (AD. B.)

**CONION**. BOT. PHAN. (*Dioscoride*.) Ce nom paraît bien certainement convenir au *Conium maculatum* de Linné. *V. CIGUE*. (B.)

**CONIOPHORE**, *Coniophora*. BOT. CRYPT. (*Champignons*.) Ce genre fondé par De Candolle (Flor. Franç. T. VI, p. 34) est voisin des *Thélephores* dont il diffère par ses sporules réunies en amas nombreux et pulvérulents, qui forment des zones concentriques sur la surface fructifère. Ces Champignons sont membraneux et charnus; ils adhèrent par toute leur surface stérile aux corps sur lesquels ils croissent.

De Candolle n'en a décrit qu'une espèce, le *Coniophore membraneux*, *Coniophora membranacea*, figuré par Sowerby sous le nom d'*Auricularia pulverulenta*, Sow., *Fung.* t. 214. Il croît sur les poutres dans les serres chaudes. Sa surface adhérente est noirâtre, l'autre est rousse. Persoon, dans sa *Mycologia europæa*, y a ajouté trois autres espèces sous les noms de *Coniophora fastida* (*Thelephora fastida*, Ehrenb.); *Coniophora cuticularis*, Pers.; *Coniophora cerebella* (*Thelephora cerebella*, Pers., *Synops.* p. 580.) Il pense que les *Thelephora olivacea*, *marginata*, *puteana* et *lactea*, doivent peut-être se rapporter à ce genre. *V. THÉLÉPHORE*. (AD. B.)

\* **CONIOPHORUS**. BOT. CRYPT. (*Mucédinées*.) Palisot de Beauvois donnait ce nom à un genre séparé du *Dematium* de Persoon, et qui faisait partie du genre *Byssus* de Linné. Il y rapportait le *Dematium Petrarum*, Pers. (*Byssus aureus*, L.), et quelques autres espèces inédites. *V. DEMATIUM*. (AD. B.)

\* **CONIPHYLIS**. BOT. PHAN. Nom

proposé par Du Petit-Thouars (Hist. des Orchidées des îles australes d'Afrique) pour le *Bulbophyllum conicum*, et qui appartient à la section des *Phyllorchis*. V. ce mot. Cette Plante est figurée (*loc cit.*, t. 99).

(G. N.)

**CONIROSTRES.** ois. Qualification donnée par quelques ornithologistes à une famille d'Oiseaux dont le bec offre l'aspect d'un cône. (DR..Z.)

**CONISE.** BOT. PHAN. V. CONYSE.

\***CONISPORÉES.** BOT. CRYPT. (*Urédiées.*) Section des *Hyphomycètes* de Link, qui ne renferme que le seul genre *Conisporium*. V. ce mot.

(AD. B.)

\* **CONISPORIUM.** BOT. CRYPT. (*Urédiées.*) Ce genre voisin des *Stilbospora* a été établi par Link (*Berl. Mag.* 1809, p. 8). Il est ainsi caractérisé : capsules (sporidies) oblongues, non cloisonnées, couvertes extérieurement d'une poussière fine, grumeleuse. Link pense que cette poussière est formée par les sporules. La seule espèce connue de ce genre, le *Conisporium olivaceum*, n'a encore été trouvée qu'en Portugal sur les Pins maritimes. Il y forme des groupes arrondis et irréguliers, verdâtres, d'une demi-ligne environ, composés de capsules agglomérées. Ce genre ne diffère des *Stilbospora* que par la poussière qui recouvre ses capsules. (AD. B.)

**CONITE.** MIN. Nom donné par Schumacher, d'après Retzius, à un Minéral d'un blanc grisâtre qui se trouve en morceaux roulés, plus ou moins gros. Il a une cassure compacte, un peu écaillée, quelquefois conchoïde. Sa dureté est assez considérable pour faire feu sous le choc du briquet, mais point assez pour résister à l'acier qui raye facilement cette pierre. Elle fait effervescence avec l'Acide nitrique. Elle vient d'Islande. On avait regardé ce Minéral comme un mélange naturel de Chaux carbonatée et de Silice, et on l'avait rapporté à la substance pierreuse décrite par Saussure sous le nom de Si-

licicalce. On a aussi rapporté au Conite différentes variétés de Chaux carbonatées, et un calcaire dur, presque translucide, sur les bords, qui se trouve aux environs de Messner, et dans lequel Stromeyer a reconnu de la Silice. On a encore donné le nom de Conite apallique au *Schafstein* ou *Tafelgath*. (O.)

**CONIUM.** BOT. PHAN. Syn. de Conium. V. CIGUE.

**CONIVALVE.** BOT. Dans les Leçons d'anatomie comparée de Cuvier, on trouve sous ce nom un groupe de genres que Lamarck a placés dans ses *Calyptraciens* avec quelques autres. Ces genres sont : *Fissurella*, *Patella*, *Crépidule*, *Calyptrée*. On les voit ainsi que *CALYPTRACIEN*. (O. B.)

\***CONJUGÉES.** ZOOL. BOT. Troisième tribu de nos *Arthrodiées*. V. ce mot.

(O. B.)

**CONJUGUÉE.** *Conjugata* BOT. BOT? (*Arthrodiées.*) Genre formé par Vaucher, adopté par De Candolle, sous le nom de *Conserva*, devenu type de l'une des tribus de nos *Arthrodiées*. V. ce mot. (B.)

**CONJUGULA.** BOT. PHAN. (Pline.) Syn. de Myrte. (B.)

**CONNA.** REPT. BATR. Syn. finlandais de Crapaud. V. ce mot. (B.)

**CONNA.** BOT. PHAN. Syn. malabare de Casse des boutiques, *Cassia fistula*, L. (B.)

\***CONNACONATI.** BOT. PHAN. (Sauriau.) Syn. caraïbe de *Phyllanthus Niruri*, L. V. *CONNARACÉES*. (B.)

\* **CONNARACÉES.** *Connaraceae.* BOT. PHAN. Famille nouvelle proposée par R. Brown (*Botany of Congo*, p. 12) pour trois genres placés auparavant dans les *Térébinthacées* de Jussieu. Dans ces genres qui sont les *Connarus*, L., *Cnestis*, Juss., et *Aloupa*, Aubl., l'insertion, quoique ambiguë, est néanmoins plutôt hypogyne que pérygyne; mais ce qui les caractérise plus particulièrement, c'est la pos-

on de deux ovules collatéraux à la base de chacun des pailles; et la situation de la radicule de l'embryon à la partie supérieure ou à l'extrémité opposée de la graine. Les Connaracées se lient aux Légumineuses par le genre *Connarus* qui se distingue de celles-ci seulement par la situation des parties de l'embryon, relativement à l'ombilic de la graine. D'un autre côté, l'affinité du genre *Cnestis* avec l'*Averrhoa*, et de celui-ci avec l'*Oxalis*, établit un passage entre la nouvelle famille et celle des Oxalidées. (G.N.)

**CONNARE.** *Connarus.* BOT. PHAN. Le genre fondé par Linné, placé par Jussieu dans la famille des Térébinthacées, est devenu le type d'une nouvelle famille à laquelle R. Brown a donné le nom de **CONNARACÉES.** *V.* Le mot. Il appartient à la Monadelphie Décandrie, L., et ses caractères sont : calice à cinq divisions profondes; corolle à cinq pétales plus longs que le calice; dix étamines dont les filets sont soudés par la base; cinq l'étreinte aux alternes, de la moitié plus courts; un seul ovaire supportant un seul style et un seul stigmate. Le fruit est une capsule légumineiforme, un peu resserrée vers son milieu, à deux valves et monosperme, que Gaertner a figurée (*de Fruct.* t. 46) sous le nom d'*Omphalobium*. La graine présente à sa base une arille très-remarquable, et n'a point d'albumen.

Les Connares sont des Arbres ou Arbrisseaux, au nombre de sept ou huit espèces, indigènes de l'Afrique méridionale et des Indes-Orientales. Leurs feuilles sont composées, le plus souvent ternées ou imparipennées, ovales ou pointues, et marquées à la base inférieure de veines saillantes. Ils ont des fleurs nombreuses, petites et disposées ordinairement en panicules. Lamarck (*Dict. encycl.*) a joint aux *Connarus* le *Rhus zeylanicus* *risolatus*, figuré dans Burmann *Zeylon.* t. 89), et lui a donné le nom de *Connarus pentagynus*, rapprochement douteux selon Jussieu, à moins qu'on ne considère le fruit des Connares comme le seul survivant de cinq

carpelles dont l'ovaire est originellement composé. Une autre espèce de ce genre décrite par Lamarck (*loc. cit.*) est le *Connarus africanus* ou l'*Omphalobium indicum* de Gaertner. Jussieu observe que la graine de cette Plante germe dans la capsule, et que sa radicule se répand latéralement comme un appendice cirrhiforme; mais cette prétendue radicule ne paraît être que l'arille remarquable dont nous avons fait mention dans le caractère générique. Les autres espèces sont peu connues, et ne nous semblent rien offrir qui puisse piquer la curiosité. Thunberg (*Ramer Aethiopia, fuit die Botanik.* 1, t. 1) a réuni à ce genre, sous le nom de *Connarus decumbens*, l'*Hermannia triphylla* de Linné; mais le port de cette Plante, très-différent de celui des autres *Connarus*, indique que ce n'est pas encore là sa véritable place. (G.N.)

**CONNAROS ET CONNARUS.** BOT. PHAN. (L'Ecluse.) Syn. présumé de Paliure ou de *Rhamnus spina Christi.* (H.)

**CONNAUBARIL.** BOT. PHAN. Syn. de Brunsfelde à la Guadeloupe. (H.)

**CONNECTIF.** *Connectivum.* BOT. PHAN. Les deux loges qui forment l'anthère dans le plus grand nombre des Plantes phanérogames peuvent être réunies l'une à l'autre de trois manières principales : 1<sup>re</sup> tantôt elles sont accolées par leur côté interne et soudées sans le secours d'aucun autre corps intermédiaire; 2<sup>o</sup> tantôt la partie supérieure du filet est placée entre elles et leur sert de moyen d'union; 3<sup>o</sup> quelquefois enfin elles sont soudées par l'intermédiaire d'un corps particulier, tout-à-fait distinct du filet, et qu'on nomme *Connectif*. Le Connectif est donc un corps très-variable dans sa forme, distinct du filet staminal, et servant à unir les deux loges de l'anthère, qu'il écarte plus ou moins l'une de l'autre. L'Éphémère de Virginie et surtout les diverses espèces du genre Sauge en offrent des exemples extrêmement marqués. Dans toutes les Sauges, le Connectif est sous la forme

d'un filot plus ou moins recourbé et allongé, placé transversalement sur le sommet du filament comme les deux branches d'un T, et portant les deux loges de l'anthere à chacune de ses extrémités. Quelquefois l'une des deux loges avorte, comme par exemple dans la Sauge des prés. *V. ETAMINE*. (A.R.)

**CONCOMBRE**. BOT. PHAN. Selon Comptey, c'est le nom d'une espèce de Concombre (*Cucumis Cononou*, *Cononou*) dans lequel on introduit de la lie de pierre qui par la fermentation produit un mets agréable aux Japonais. (B.)

**CONNIKONNI**. BOT. PHAN. Syn. *malabar d'Abrus*. (B.)

**CONNIL** ou **CONNIN**. MAM. Vieux noms du Lapin. (B.)

**CONNILUS**. OIS. (Schwenckfeld.) Syn. de l'Engoulevent, *Caprimulgus europæus*, L. *V. ENGQUEVENT*. (DR.Z.)

**CONNINA**. BOT. PHAN. (Cesalpin.) Syn. de *Chenopodium Vulvaria*. (B.)

**CONNORO**. OIS. Syn. d'Ara rouge, *Psittacus Macao*, L. *V. PERROQUET*. (DR.Z.)

**CONOBÉE**, *Conopea*. BOT. PHAN. Néel (Plantes de la Guiane, p. 640 et t. 158) a décrit et figuré sous ce nom un genre que Jussieu (*Genera Plantarum*) a placé à la suite des Lysimachiées ou Primulacées, et qui appartient à la Didymie Angiosperme. L. Voici les caractères que son auteur lui a assignés : calice tubuleux, à cinq dents, muni à sa base de deux petites bractées; corolle tubuleuse, divisée en deux lèvres, la supérieure relevée et échancrée, l'inférieure à trois lobes inégaux; quatre étamines didynames, à anthères sagittées; un style et un stigmate bilobé. Le fruit est une capsule pisiforme, entourée par le calice, uniloculaire, marquée de quatre sillons qui se divisent en quatre valves, polysperme. C'est à tort qu'Aublet lui donne un placenta central et s'élevant du fond de la capsule. Auguste Saint-Hilaire, dans son intéressant Mémoire

sur les Plantes à placenta central, a fait voir que la capsule du *Conopea* est réellement à deux loges séparées par une cloison dont le milieu porte dans chaque loge un placenta axilaire. Ce caractère est décisif et fait placer le *Conopea* parmi les Scrophularinées de Brown, auquel confirmant d'ailleurs ses étamines didynames, sa corolle irrégulière, le mode de déhiscence de sa capsule et le ressemblance de son port avec le *Toxaria*, quoique, d'un autre côté, il ait aussi des rapports de physionomie avec l'*Anagallis*. La forme de l'embryon, observée par A. Saint-Hilaire, est aussi celle des Scrophularinées; car il est droit, à radicule tournée vers l'ombilic, occupant l'axe d'un péricarpe charnu. L'espèce décrite par Aublet (*Conopea repens*) est une petite Plante herbacée, à tige perfoliée et traçante, à feuilles opposées et réniformes, à fleurs solitaires au sommet d'un long pédoncule axillaire. Elle croît à Cayenne le long des ruisseaux. Sprengel en a décrit deux nouvelles espèces sous les noms de *C. verticillaris* et *C. viscosa*. (G.N.)

**CONOCARPE**, *Conocarpus*. BOT. PHAN. Genre de la famille des Combrétacées de Robert Brown et de la Pentandrie Monogynie, que l'on reconnaît facilement à ses fleurs très-serrées les unes contre les autres, et formant des capitules globuleux ou ovoïdes. Chaque fleur est accompagnée d'une écaille persistante, et offre un calice adhérent avec l'ovaire infère, ayant son limbe oblique, ronflé, caduc, à cinq divisions régulières. Il n'existe pas de corolle. Les étamines, dont le nombre varie de cinq à dix, sont saillantes au-dessus du calice, à la face interne duquel elles sont insérées. Leurs anthères sont confondues à deux loges, s'ouvrant par un sillon longitudinal. L'ovaire est infère ainsi que nous l'avons dit; il est comprimé, à une seule loge, du sommet de laquelle pendent deux ovules attachés à deux pedospermes filiformes. Le style se termine par un petit stigmate simple; le fruit est aggré et présente



apparence d'un petit cône, c'est-à-dire qu'il se compose d'écaillés imbriquées, à l'aisselle desquelles sont de véritables aîcles imbriquées, renversées, convexes extérieurement, concaves du côté interne. Ils sont monopermes et restent indéhiscens. La rainure qu'ils renferment est oblongue, terminée en pointe à sa partie supérieure. Son tégument propre est mince et membraneux. L'embryon en sort immédiatement recouvert; ses deux cotylédons sont foliacés et roulés sur eux-mêmes longitudinalement.

Ce genre ne se compose que de deux espèces qui sont de grands Arbustes croissant sur les plages maritimes de l'Amérique et de l'Afrique. Leurs feuilles sont alternes, assez épaisses, coriaces, entières, dépourvues de stipules. Leurs fleurs, qui sont fort petites et hermaphrodites, forment des capitules plus ou moins nombreux. La première de ces espèces est le CONOCARPE DRESSÉ, *Conocarpus recta*, L., Jacq., *Am.* t. 52, f. 1. Kunth, auquel nous avons emprunté les caractères de ce genre, réunit à cette espèce, comme de simples variétés, le *Conocarpus procumbens*, Jacq., et *Conocarpus acutifolius*, Willd. in *Ram.* et *Schult. Syst.* Cette espèce croît sur les bords de la mer, dans presque tout le continent américain, et les Antilles. C'est un Arbre de trente à quarante pieds d'élévation, ou simplement un Arbruste étalé, suivant les localités dans lesquelles il se trouve. Ses jeunes rameaux sont anguleux, munés de feuilles alternes, obovées, allongées, tantôt aiguës, tantôt obtuses et simplement acuminées, entières, glabres et un peu coriaces. Leur pétiole, qui est très-court, est glanduleux latéralement. Les fleurs sont petites, formant des capitules ombreux, disposés en une sorte de panicule.

La seconde espèce est nouvelle; nous lui donnons le nom de CONOCARPE A GROS RAUBES, *Conocarpus macrocarpa*. Elle diffère de la précédente par ses feuilles plus grandes, les épines, légèrement glauques, et

par ses cônes deux fois plus gros. Elle croît sur les rivages sablonneux de l'Afrique.

Quant au *Conocarpus racemosa*, L., il forme le genre *Sphaenocarpus* de Richard, ou *Laguncularia* de Gaertner fils. V. SPHÉNOCARPE. (A. R.)

CONOCARPODENDRON. BOT. PHAN. Sous ce nom, Boerhaave (*Index Plantarum Horti Lugduno-Batavi*), a désigné un groupe de Protéacées que R. Brown a nommé LEUCADENDRON. V. ce mot. (B.)

\* CONOCEPHALUM. BOT. CRYPT. (Hépatiques.) Nom donné par Hill à un genre qu'on a appelé *Anthocodium*. V. ce mot et MARCHANTIA. (AD. B.)

CONOCHIA OU CONOCHIE. BOT. CRYPT. (*Champignons*.) Nom vulgaire en Italie de l'*Agaricus procerus*, Pers. Espèce très-bonne à manger et d'un goût très-délicat. (AD. B.)

\* CONOCRAMBE. BOT. PHAN. CYNOCRAMBE.

CONOHRIA ET CONONOU. BOT. PHAN. V. CONORI.

CONOMON. BOT. PHAN. V. CONOMON.

CONOOR. ois. Pour Condor. V. ce mot. (DR..Z.)

CONOPHORE. *Conophorus*. INS. (Meigen.) V. PLOAS.

CONOPHOROS. BOT. PHAN. (Pétiiver.) Syn. de *Protea rosacea*, L. (B.)

CONOPLÉE. *Conoplea*. BOT. CRYPT. (*Urédinées*.) Ce genre, créé par Persoon, a été bien décrit par Link (*Hertl. Mag.* 1815, p. 32) qui lui a réuni le genre *Exosporium* qu'il en avait d'abord séparé. Les Conoplées sont formées par un tubercule globuleux ou déprimé, solide et recouvert de sporidies ou capsules allongées, souvent cloisonnées : on connaît sept à huit espèces de ce genre. Elles croissent sur les feuilles ou les rameaux des Plantes mortes; leur couleur est

brune ou noire; elles diffèrent par la forme de leurs capsules et par celle de la base ou du tubercule sur lequel ces capsules sont portées. (AD. B.)

**CONOPOPHAGE.** ois. Genre établi par Vieillot, et dans lequel il place deux espèces du genre Fourmilier: *Turdus auritus*, L., et *Pipria navia*, L. V. FOURMILIER. (DR., Z.)

**CONOPS.** *Conops.* ins. Genre de l'ordre des Diptères, famille des Athéricères, tribu première des Conopsaires de Latreille (Règne Animal de Cuvier), établi par Linné, et ayant pour caractères : antennes beaucoup plus longues que la tête, droites, en massue ou presque en massue, de trois articles; le second fort long, cylindrique; le dernier court, conique, terminé par une petite pointe; trompe coude à sa base, de trois articles, avancée, renfermant deux soies qui forment le suçoir; soie inférieure beaucoup plus longue que la supérieure; point de palpes ni de petits yeux lisses. Les *Conops* sont remarquables par une tête grosse, plus large que le thorax, présentant à sa partie inférieure un sillon pour recevoir la trompe; celle-ci, coude seulement à sa base, se porte ensuite en avant et ne change plus de direction. Le thorax est court et cubique; il supporte des ailes étroites, écartées, atteignant l'extrémité de l'abdomen et des balanciers allongés; les pattes sont minces et longues, munies de tarses à deux pelotes au bout et à crochets; l'abdomen est comme pétiolé; son extrémité libre se termine par une sorte de renflement ou de massue. Ces Insectes diffèrent des *Myopes* et des *Bocantes* par la direction de leur trompe; ils ressemblent, sous ce rapport, aux *Zodions* et aux *Stomoxes*; mais ils s'éloignent principalement de ces deux genres par le seul caractère tiré de la longueur des antennes. Les *Conops*, auxquels Latreille (*loc. cit.*) associe le genre *Toxophore* de Meigen, ont été confondus avec les *Asiles* et avec les *Myopes* par Geoffroy; on les trouve assez sou-

vent sur les fleurs dont ils sucent le suc miellé; il paraît que les femelles déposent leurs œufs dans les larves des Bourdons ou dans le corps de ces Insectes à l'état parfait. On peut considérer, comme type du genre, le *CONOPS A PIEDS FAIBLES*, *Conops rufipes* de Fabricius. On le rencontre vers le milieu de l'été sur les fleurs des prairies. Latreille dit avoir observé plusieurs fois cet Insecte parfait sortir de l'abdomen des Bourdons. Lachat et moi avons présenté à la Société Philomatique, le 22 août 1818, un travail assez détaillé sur une larve apode que nous trouvâmes au mois de juillet dans le corps d'un Bourdon des pierres (*Bombus lapidarius* de Fabricius), et que nous supposâmes appartenir au *Conops* à pieds faibles. Cette larve blanchâtre (Mém. de la Soc. d'Hist. Natur. T. 1, page 580, pl. 39), très-molle et sans pieds, était située entre les ovaires, au-dessus de l'estomac, entre celui-ci et l'œsophage, et sous le vaisseau dorsal d'un Bourdon dépourvu de graisse; elle avait onze anneaux, un long cou, une bouche, deux lèvres, deux crochets et des mamelons dépendans de la peau; le reste de son corps était renflé, un peu sillonné, en dessus et en dessous, par une série longitudinale de points groupés ordinairement trois par trois sur les côtés de chaque anneau, qui lui-même paraissait légèrement étranglé. L'extrémité, opposée à la bouche correspondante au rectum du Bourdon, avait un anus fendu verticalement, et deux plaques latérales plus élevées, voisines l'une de l'autre, et très-curieuses par leur organisation et leur importance. Nous avons décrit avec assez de soin les différentes parties de cette larve singulière que Bosc paraît avoir aussi étudiée, mais qu'il a confondue avec un Ver intestinal. On remarque d'abord deux membranes qui recouvrent tout le corps, l'une extérieure et l'autre interne; elles forment les deux mamelons saillans au-dessus de la bouche, parallèles entre eux et à la longueur du corps. Les organes de la di-

gestion consistent en une bouche au-  
 rie de deux crochets ; les premiers sont  
 latéraux , d'un brun jaunâtre , com-  
 primés , plus larges à leur partie pos-  
 térieure qu'en avant , où ils sont ter-  
 minés par une pointe doucement in-  
 fléchie en dehors , arrivant petit à petit de-  
 puis une brusque échancrure du bord  
 extérieur. L'extrémité postérieure est  
 étroitement unie aux tégumens et au  
 tube digestif. Non loin de cette base  
 ils ont entre eux une sorte de pivot  
 très-grêle , transversal , concave en  
 avant , dur et corné comme eux , qui  
 les tient éloignés , et devient le cen-  
 tre de leurs mouvemens , dont les uns  
 ont lieu de haut en bas et les autres  
 latéralement ; ceux-ci , plus étendus ,  
 ne permettent cependant point aux  
 bouts des crochets de se mettre en  
 contact dans leur plus grand rappro-  
 chement. Les lèvres , placées hori-  
 zontalement entre les crochets et  
 moins avancées qu'eux , sont molles  
 à leur base , et bordées d'une ligne  
 qui paraît être cornée ; la supérieure  
 est arrondie , et l'inférieure , moins  
 large , est un triangle inéquilatéral.  
 Pendant l'action des crochets , elles  
 s'éloignent ou se rapprochent , et  
 jouent lentement de bas en haut et de  
 haut en bas. L'œsophage naît à leur  
 base , il est assez étendu et d'une  
 égale largeur dans toute sa longueur ;  
 l'estomac est très-spacieux ; il est  
 muni de deux vaisseaux opposés qui  
 se divisent presque aussitôt en deux  
 branches , lesquelles sont remplies  
 de grains miliaires jaunâtres , d'une  
 finesse extrême. Les deux troncs de  
 ces vaisseaux marquent le terme de  
 l'estomac et l'origine du colon. En  
 examinant un autre appareil situé  
 sous le précédent , on est embarrassé  
 pour en déterminer exactement la  
 naissance. Il mesure la moitié anté-  
 rieure de l'œsophage , se dilate et se  
 divise en deux branches plus gros-  
 ses , moins transparentes que leurs  
 troncs , et qui s'engagent entre l'esto-  
 mac et les vaisseaux aveugles. Au so-  
 leil , dans l'eau et au foyer d'une  
 lampe , elles paraissent garnies au  
 dedans de plaques hexagonales , pres-

que continues entre elles , oblique-  
 ment alignées cinq par cinq , blan-  
 châtres sur leur bord , diaphanes au  
 centre. Elles ressemblent beaucoup  
 aux plaques que Linnæus a légère-  
 ment exprimées sur les vaisseaux  
 soyeux de la Chenille , auxquels nous  
 les comparerons directement.

On voit à la partie postérieure et  
 supérieure du corps de la larve deux  
 éminences en forme de reins , dont le  
 côté interne est concave , le gros bout  
 en bas , la face postérieure d'un mar-  
 ron clair , bordée d'une teinte noire  
 très-légère , avec un point rond ,  
 blanc , transparent , central et un peu  
 en dedans. Ces éminences sont par-  
 semées d'un grand nombre de points  
 de même couleur , disposés irréguliè-  
 rement deux par deux , trois par trois ,  
 quatre par quatre , rapprochés ou  
 confondus par leurs côtés voisins.  
 Chacune d'eux est composée d'autres  
 points infiniment plus petits , saillans ,  
 dont la plupart sont circulairement  
 arrangés dans leur étroite enceinte.  
 Ils brillent comme des pierreries  
 agréables. Les trachées respirant l'air  
 par ces petits points , sont doubles et  
 sur les côtés du corps où elles s'étend-  
 dent comme deux Arbres taillés en  
 quenouille , dont les racines seraient  
 fixées à ces éminences , et le som-  
 met se terminerait vers la bouche ,  
 dont les rameaux iraient se diviser  
 sur l'enveloppe générale extérieure ,  
 et qui , par d'innombrables ramifica-  
 tions , la plupart à peine perceptibles  
 à la loupe , rampaient sur tous les  
 tissus et baignaient tous les organes.  
 En rassemblant tous ces faits , on  
 trouve que la larve dont il est ques-  
 tion , est composée d'une double en-  
 veloppe , d'un double organe pour la  
 respiration , d'une sorte de tissu gras-  
 seux abondant , d'une bouche où  
 sont deux crochets très-mobiles et  
 deux lèvres , d'un anus situé au  
 bout d'un canal intestinal très-  
 étendu. On voit enfin qu'elle a un  
 canal analogue aux vaisseaux soyeux  
 des Chenilles.

Il existe quelques autres espèces de  
 Conops : la plus grande a été nommée

**Conops** à grosse tête, *C. macrocephala*, L. Elle ressemble beaucoup à une Guêpe. (AUD.)

**CONOPSAIRE.** *Conopsaria*. INS. Famille de l'ordre des Diptères, établie originairement par Latreille (*Génér. Crust. et Ins.* T. IV, p. 355), et convertie depuis (Règn. Anim. de Cuv.) en une section de la famille des Athéricères. V. ce mot. (AUD.)

**CONORI.** *Conoria* ou *Conhoria*. BOT. PHAN. Genre de la famille des Violariées, établi par Aublet, mais dont les auteurs modernes, en particulier Kunth, ont singulièrement modifié les caractères, puisque ce dernier y réunit les genres *Passura*, *Riana*, *Rinoria* et *Piparea* d'Aublet, *Alsodeia* de Du Petit-Thouars et *Ceranthera* de Beauvois. Voici comment on peut caractériser ce genre : son calice est persistant, à cinq divisions profondes et égales : sa corolle est régulière, formée de cinq pétales hypogynes, ainsi que les cinq étamines qui alternent avec eux. Leurs filets sont courts, libres ou réunis en toute sorte d'uréthre. Les anthères sont à deux lobes et surmontées d'un appendice membraneux. Il n'existe point de disque ni d'appendice en forme de corne, caractère qui paraît tenir à la régularité de la corolle. L'ovaire est sessile et comme triangulaire, surmonté d'un style simple. Le fruit est une capsule coriace à parois épaissies, à une seule loge, s'ouvrant en trois valves qui portent les graines sur le milieu de leur face interne. L'embryon, qui a ses cotylédons planes et sa radicule tournée vers le hile, est renfermé dans l'intérieur d'un épisperme charnu.

Le genre *Conoria* forme avec le *Sauvagesia* une petite section distincte dans la famille des Violariées. La régularité de la corolle est en effet un caractère remarquable dans une famille où tous les autres genres ont leurs fleurs plus ou moins irrégulières. C'est à ce groupe que Rob. Brown avait donné le nom d'ALSODINÉES,

et l'on pourrait l'appeler SAUVAGÉSISÉS, si, comme le veut Kunth et comme l'observation semble le confirmer, le genre *Alsodeia* de Du Petit-Thouars doit rentrer dans le genre *Conoria*.

Aublet (*Guian.* 1, p. 259, t. 95) décrit et figure une seule espèce de *Conoria*, qu'il nomme *Con. flavescens*. Il n'a vu et décrit cette plante qu'en fleurs. Mais son *Passura guianensis*, t. 380, n'est rien autre chose que le *Conoria flavescens* en fruits, ainsi que le professeur Richard s'en est assuré en les recueillant sur un même individu.

Les espèces de ce genre sont nombreuses. Elles se composent des espèces précédemment rapportées aux genres *Riana*, *Rinoria*, *Piparea*, *Alsodeia* et *Ceranthera*, et en outre d'une belle espèce très-voisine du *C. flavescens* d'Aublet, que Kunth décrit et figure (*in Humboldt Nov. Gen.* 3, p. 387, t. 91) sous le nom de *Conoria ulmifolia*. Les autres *Conoris* sont des Arbres ou des Arbrisseaux. Leurs feuilles alternes ou plus rarement opposées, entières ou plus ou moins dentées, munies de stipules. Leurs fleurs sont axillaires et terminales, disposées en grappes ou en panicles. (A. E.)

**\*CONORO-ANTEGRI.** BOT. PHAN. Nom de pays du *Norantea* d'Aublet. V. ce mot. Il ne faut pas le confondre avec *Conori*. (A.)

**CONOSPERME.** *Conosperma*. BOT. PHAN. Smith a institué ce genre dans le quatrième volume des Transactions de la Société Linnéenne de Londres, p. 213, et l'a placé parmi les Protéacées. Gaertner fils (*Cerapl.* 3, p. 198, t. 215) et R. Brown (*Treat. Linn.*, x, p. 153) l'ont adopté, en confirmant le rapprochement que Smith en avait fait, nonobstant l'opinion de Jussieu et de Ventenat qui l'avaient placé dans les Thymélées. La famille des Protéacées faisant le sujet du Mémoire de R. Brown cité plus haut, ce savant a dû, mieux que tout autre botaniste, connaître l'organi-

sation du genre *Conospermum*, d'autant plus qu'il en a publié plusieurs espèces nouvelles. Ce sera donc à lui que nous emprunterons la description de ses caractères : calice ou périgone tubuleux irrégulier, stamini-fère ; la division supérieure concave ; trois anthères incluses, les deux latérales de la moitié plus petites que la supérieure qui est bilobée ; ces anthères sont d'abord réunies et constituent une loge par la connexion des lobes voisins ; stigmate libre. Le fruit est une sorte de noix obconique, et surmontée d'une aigrette. Indépendamment de ces caractères, le *Conospermum* a un embryon droit, un style terminal, et l'estivation de son calice est valvaire, ce qui le fait placer très-convenablement dans les Protéacées, rapprochement fortifié par ses affinités avec le *Simsia*, genre de cette dernière famille.

Tous les *Conospermes* ont pour patrie la Nouvelle-Hollande. Ce sont des Arbrisseaux dont le port est celui des Protées, à feuilles éparses très-entières, à épis axillaires ou terminaux, quelquefois en corymbes. Les fleurs sont solitaires et sessiles au sommet des pédicelles, blanches ou bleuâtres, et munies d'une bractée persistante. Smith en a figuré une jolie espèce sous le nom de *Conospermum longifolium* (*Exot. Bot.* t. 82). Elle est cultivée dans les jardins.

Les espèces décrites par R. Brown sont au nombre de neuf, distribuées en trois tribus. Il les a recueillies près du port Jackson, et dans la terre de Leuwin. (G.N.)

\***CONOSTEGIA.** BOT. PHAN. Genre de la famille des Mélastomacées, séparé du genre *Melastoma* par David Don (*Mem. Soc. Werner. Edinb.*, IV, vol. II, p. 316) qui lui a donné les caractères suivans : calice à limbe indivis, conique, et formant une coiffe qui se sépare horizontalement du tube pendant l'estivation ; cinq à six pétales ; anthères munies de deux oreillettes à la base ; baie capsulaire à huit loges. La forme particulière du

calice distingue suffisamment ce genre de ses voisins. Il est composé d'Arbres ou d'Arbrisseaux indigènes de l'Amérique équinoxiale et des îles de la Société. Son auteur y rapporte les : *Melastoma glabra*, Forst. ; *M. procera*, Swartz et Bonpl. ; *M. maniana*, Sw. ; *M. superba*, Bonpl. inéd. ; *M. extinctoria*, Bonpl. ; *M. Xalapensis*, Bonpl. ; *M. calyptrata*, Lamk. ; enfin, les *M. cucullata* et *holosericea*, Pavon, Mss. (G.N.)

**CONOSTOME.** *Conostomum*, BOT. CRYPT. (*Mousses*.) Ce genre, établi par Swartz (*Journ. Bot. de Schrader*, vol. I, p. 24), est l'un des plus distincts de la famille des Mousses ; ses caractères le rapprochent des *Weissia*, son port a beaucoup d'analogie avec celui des *Barbhamia* parmi lesquelles même Bridel a placé le *Conostomum australe* de Swartz ; il est ainsi caractérisé : capsule terminale ; péristome simple à seize dents également espacées, réunies au sommet en coiffe fendue latéralement. On ne connaît que deux espèces de ce genre : l'une, le *Conostomum boreale*, habite les montagnes des pays voisins du pôle arctique, tels que la Suède, l'Écosse, le Kamtschatka, ou les hautes Alpes de la Suisse au-dessus de douze cents toises ; l'autre, le *Conostomum australe*, est propre aux régions voisines du pôle austral. Elle n'a été trouvée qu'après du détroit de Magellan par Commerson, et à la Terre-des-États par Menzies.

La première espèce a tout-à-fait l'aspect du *Barbhamia fontana*, mais elle est beaucoup moins grande. C'est une des Mousses les plus rares d'Europe. (AD. B.)

**CONOSTYLE.** *Conostylis*, BOT. PHAN. Genre de l'Hexandrie Monogynie, L., fondé par R. Brown, (*Prodrom. Flor. Novae-Holland.* p. 300) pour plusieurs Plantes de la Nouvelle-Hollande, qu'il place dans sa nouvelle famille des *Hamodora*, cées. Il l'a ainsi caractérisé : périanthe supérieur, persistant, coloré, campanulé, à six divisions profondes, et

gulières, couvertes de poils laineux et filueux; six étamines à anthères dressées; quatre à trois loges poly-spermes; surmonté d'un style conique dilaté et creux, et d'un court stigmate. La capsule déhiscence par son sommet, où l'on voit les débris du style divisé en trois, renferme un placenta central triquètre, auquel sont attachées des semences nombreuses. Ce genre est extrêmement voisin de l'*Antigonanthos* de Labillardière, dont il ne se distingue que par une légère différence dans la forme et la nature du périanthe, ainsi que par la persistance du style. R. Brown le fait différer encore du *Lanaria* d'Aiton, ou *Argolista* de Jussieu, par la structure de l'ovaire et du fruit. Ainsi que l'*Antigonanthos*, il s'éloigne des autres genres de la famille par le nombre indéfini de ses graines; mais ce caractère n'est pas d'une telle valeur, qu'on doive pour cela les en distraire.

Les quatre espèces décrites par Brown et qu'il a nommées *Conostylis obtusata*, *C. serrulata*, *C. setigera* et *C. breviscapa*, habitent la côte méridionale de la Nouvelle-Hollande.

Pursh (*Flor. Amer. septentr.* 1, p. 214, t. 6) a rapporté à ce genre une belle espèce de la Nouvelle-Jersey et de la Caroline, qu'il avait d'abord nommée *Argolasia aurea*. La figure qu'il en donne n'étant malheureusement pas accompagnée de détails, on est obligé de s'en rapporter à la description dans laquelle l'ovaire est donné comme supérieur. Ce caractère seulement devrait suffire pour admettre la distinction d'avec le *Conostylis*. Nuttall observe judicieusement que le *Conostylis americana* de Pursh n'est probablement pas congénère des espèces de la Nouvelle-Hollande. Peut-être devra-t-on rétablir en sa faveur le nom de *Lophiola aurea*, proposé dans le *Botanical Magazine*. (G..N.)

\***CONOTROCHITES.** MOLL. FOSS. C'est le nom sous lequel les anciens désignaient les espèces fossiles du genre *Volute*; mais il est à remarquer que ce genre renfermait les Co-

nes dans la plupart des auteurs qui ont précédé Linné, et il ne serait pas étonnant que ce soit plutôt aux Éolies qu'à nos véritables *Volutes* qu'en ait appliqué ce nom. (G..N.)

**CONOTZQUI.** OIS. F. CENOTZQUI.

\* **CONOVALVE.** *Conovalvus.* MOLL. (Du Dictionnaire de Levaillant.) Pour *Conovule*. F. ce mot. (N..H.)

**CONOVULE.** *Conovula.* MOLL. Ce genre fait partie des *Auricules*. F. ce mot. (D..H.)

**CONQUATOTOTL.** OIS. (Saba.) F. CAQUANTOTOTL. (D..Z.)

**CONQUE.** MOLL. Nom anciennement employé par Aristote pour désigner en général toutes les Coquilles bivalves, et adopté par Languis, dans sa Méthode, pour exprimer les mêmes objets; mais depuis il a été appliqué particulièrement à des Coquilles de différents genres, et il est devenu familier aux marchands qui, sous cette dénomination, ont l'habitude de désigner des Coquilles qui, pour la plupart, n'ont aucune ressemblance entre elles. C'est principalement parmi les Conchifères que l'on trouve cette application vulgaire, et surtout dans le genre *Vénus* de Linné. C'est ainsi qu'on nomme *Conque* de *Vénus* maléficiée la *Venus verrucosa*, L.; *Conque* de *Vénus* orientale, la *Venus dysera*; *Conque* de *Vénus* épineuse, la *Venus Dione*. On donna également le nom de *Conques* à des Coquilles du genre *Cardium*; le *Cardium pectinatum*, L., reçut celui de *Conque* de *Vénus* sans pointes; le *Cardium Isocardia*, celui de *Conque* taillée, et le *Cardium costatum*, celui de *Conque* exotique. L'*Hippopus maculatus*, Lamk., fut nommé *Conque* onglée, et on alla même jusqu'à appliquer le mot *Conque* à des Coquilles univalves, le *Murex Tritonis*, L., et la *Purpura persica*, Lamk. Le premier nommé *Conque* de Triton, et le second *Conque* persique, en sont des exemples. Les anciens conchyliologues donnaient le nom de *Conque* de *Vénus* à toutes les Coquilles du genre

recelaine, et Rumph. l'appliqua aux Trigonies fossiles. La Conque naïfère n'est autre chose que l'Anatifa. Ce mot ainsi qu'ANATIF. Il est nécessaire ausside connaître les mots CYTHÈRE, VÉNUS, ORCELAINÉ, BUCARDE, etc. (D. H.)

**CONQUES-OREILLES.** BOT. EGYPT. Paulet a donné ce nom barbare à un groupe de Champignons formé d'espèces incohérentes et qui ressemble des Auriculaires, des Tremelles, des Collèmes et des Pezizes. Ces mots. (AD. B.)

**CONSANA.** BOT. PHAN. (Adanson.) Syn. de *Subularia aquatica*. (B.)

**CONSEILLER.** OIS. Syn. vulgaire du Rouge-Gorge, *Motacilla rubecula*, L. P. BEC-FIN. (DR. Z.)

**CONSILIGO.** BOT. PHAN. (Plin.) Syn. d'*Helleborus viridis*, ou du *fœdus*, selon les uns, et d'*Adonis vernalis*, selon les autres. (B.)

\***CONSIRE.** BOT. PHAN. (Olivier de Serre.) Vieux nom de la Consoude. Ce mot. (B.)

**CONSOLIDA.** BOT. PHAN. D'où Consoude, Consire, Consoli, etc. Noms qui désignent la Consoude, tant des anciens, que les uns ont cru être une Bugle, d'autres une Jauphinelle, des Solidages, des Épernières, etc. (B.)

**CONSOUDE.** *Symphytum.* BOT. PHAN. Famille des Borraginées, Pentandrie Monogynie, L. Ce genre, établi par Tournefort, adopté par Linnaeus, Jussieu, Lamarck et Gaertner, est ainsi caractérisé : calice à cinq divisions profondes ; corolle campanulée, tubuleuse, dont le limbe renfermé à sa base est à cinq lobes courts, droits et presque fermés ; entrée du tube munie d'écaillés oblongues, acuminées et rapprochées en cône ; stigmate simple. Les fleurs des Consoudes sont terminales et axillaires, disposées en panicules corymbiformes ; leurs feuilles caulinaires sont décourbées, hérissées de poils roides et pais, comme dans la plupart des

Borraginées ; certaines espèces ont leurs feuilles florales geminées.

Le nombre des Plantes de ce genre n'est pas fort considérable ; il ne s'élève qu'à sept ou huit, mais leur disposition à varier a pu le faire augmenter inutilement. On cultive seulement dans les jardins de botanique les Consoudes de l'Orient et de la Russie, telles que le *Symphytum orientale*, L., et le *Symphytum tauricum*, Willd. Leurs fleurs, d'un aspect agréable, diversement colorées de bleu et de rouge, de violet et de blanc, ont encore l'avantage de durer pendant une bonne partie de l'été.

Des deux espèces qui croissent naturellement en France nous ne parlerons que de la plus vulgaire, à laquelle son emploi thérapeutique a procuré une petite célébrité.

La **CONSOUDE OFFICINALE**, *Symphytum officinale*, L., est une Plante herbacée dont la tige, haute de cinq à six décimètres, est très-branchue, velue et succulente ; elle porte des feuilles ovales, lancéolées, rudes au toucher, et des fleurs pédonculées au sommet de la tige, disposées sur une sorte de panicule dont le haut est courbé en crosse avant le développement. La couleur des fleurs varie du rouge purpurin au blanc sale. Elle se trouve dans toute l'Europe, sur les bords des fossés et dans les lieux aquatiques. Sa racine fusiforme, charnue et noirâtre extérieurement, dont l'astringence est tempérée par le mucilage abondant qu'elle renferme, convient dans la diarrhée, l'hémoptysie, la leucorrhée, etc. Les pharmaciens en préparent un sirop, forme sous laquelle cette racine est le plus ordinairement administrée.

Le vulgaire donne aussi le nom de Consoude à des Plantes toutes différentes de celle-ci ; ainsi il nomme PETITES CONSOUDS plusieurs espèces de Bugles, CONSOUDS ROYALE, le Pied-d'Alouette des jardins, *Delphinium Ajacis*, L., etc. (G. N.)

\* **CONSTRICTEUR.** *Constrictor.* REPT. OPH. Espèce du genre Boa dont

**Oppel.** a étendu le nom à une famille d'Ophidiens qui contient les genres *Bee* et *Eriz*. (N.)

\* **CONSUL.** MAM. (Salt.) L'un des noms abissins du Renard. (B.)

\* **CONSUL.** OIS. Syn. présumé du *Poël blanc*, *Procellaria nisea*, Gmel. V. **PÉTRIL**. (B.N.)

**CONSYRE.** BOT. PHAN. Même chose que Consire. V. ce mot.

\* **CONTACTRANI.** BOT. PHAN. (Presfontaine.) Arbre indéterminé de la Guiane, dont on dit le bois fort dur. (B.)

\* **CONTA-FASONA.** OIS. Syn. américain d'un Bec-Fin qui paraît avoir quelque rapport avec le Troglodyte. (B.N.)

**CONTARENA.** BOT. PHAN. (Adanson.) Syn. de *Corymbium*. V. ce mot. (B.)

**CONTARÉNIE.** *Contarenia*. BOT. PHAN. Une Plante du Brésil que l'on ne saurait positivement rapporter à sa famille naturelle, vu le défaut de renseignements sur la structure de son fruit, a été décrite sous ce nom par Vandelli. Elle a un calice tubulé à deux divisions; une corolle monopétale divisée supérieurement en trois lobes; quatre étamines courtes; un style grêle persistant et une capsule à deux loges remplies de graines. Les fleurs sont petites et disposées en épis colorés, et les feuilles marquées de trois nervures. D'après ces caractères incomplets, on peut tout au plus assigner à ce genre une place près des Acanthacées ou des Scrophularinées. (B.N.)

\* **CONTIA.** BOT. PHAN. (Pline.) Une variété d'Olive. (B.)

\* **CONTILUS.** OIS. Gesner cite ce nom comme pouvant convenir aux Caillies ou aux Becs-Fins. (B.)

**GONTOUR.** OIS. Syn. de Condor, *Fukur Gryphus*, L. V. **CATHARTES**. (B.N.)

**CONTRA.** OIS. Espèce du genre Étourneau, *Sturnus bengalensis*, Briss. V. **ÉTOURNEAU**. (B.N.)

**CONTRA.** BOT. PHAN. Espèce éminemment vénéreuse du genre Armoise. (B.)

\* **CONTRA-CAPETAN.** BOT. PHAN. On donne ce nom, à Carthagène en Amérique, à l'*Aristolochia angustida*, Jacq., qui a, dit-on, la propriété d'être le poison le plus mortel pour les Serpens. (B.)

\* **CONTRA-COULEVRA.** BOT. PHAN. Sur les rives de l'Orénoque qui avoisinent la Guiane et le Brésil, non loin de San-Thomas de l'Angostura et de San-Carlos del Rio Negro, Humboldt et Bonpland ont trouvé une Plante qui exhale une odeur nauséuse, dont les habitants vantent la décoction de la racine contre la morsure des Serpens, et qu'ils nomment pour cette raison *Contra-Coulevra*. Les feuilles sont aussi employées comme antidiarrhéique. Cette Plante est l'*Agipbila salutaris*, Kunth, de la famille des Verbenacées. V. **EMPHILE**. (B.N.)

\* **CONTRACTILITÉ.** ZOOL. Irritabilité de Glisson et de Haller; *Contractilité animale et organique sensible* de Bichat; *Myotilité* de Chaussier, etc. Propriété qu'ont les muscles de se raccourcir avec effort, quand un corps étranger les touche, ou que la volonté le leur commande par l'intermédiaire des nerfs.

La *Contractilité* ou *irritabilité musculaire*, ressort général des mouvemens du corps, doit être étudiée dans ses phénomènes, dans ses conditions, dans ses causes. L'état du muscle contracté; la forme que prennent ses fibres quand il se contracte; la coopération du fluide sanguin dans la contraction; le rôle surtout que joue le nerf dans ce phénomène, sont autant de questions qui, comme chacun sait, ont successivement occupé presque tout ce qu'il y a eu d'habiles physiologistes depuis Haller. Nous renvoyons au mot **IRRITABILITÉ** le développement de ces questions importantes. (FL.S.)

**CONTRA-MAESTRE.** OIS. (Azara) Nom donné à une petite famille



**Oiseau de Paraguay**, qui appartient au genre *Sylvie*. (DR..Z.)

**CONTRAYERVA**. BOT. PHAN. *V. PANENEPILLI*. — Espèces des genres *orstenia* et *Milleria*. — Syn. d'*Arislochia triloba*. — Ce mot signifie à peu près contre-poison, antidote. Il a été écrit quelquefois *Contrayerba*, d'après la prononciation espagnole. (B.)

**CONTREFAISANT**. OIS. Syn. vulgaire de la Fauvette des Roseaux, *totacilla Hippolais*, L. *V. SYLVIE*. (DR..Z.)

**CONTREMAITRE**. OIS. Traduction du Contra-Maître. *V. ce mot*. (DR..Z.)

**CONTRE-UNIQUE**. MOLL. On a généralement donné ce nom à toutes les Coquilles dont la spire, au lieu de tourner à droite, tourne à gauche, et s'applique plus particulièrement à celles dans lesquelles cette disposition n'est qu'accidentelle, et conséquemment où on a la même Coquille à droite et à gauche. (D..H.)

**CONTRIOUX**. OIS. Syn. vulgaire du Cujelier ou Alouette Lulu, *Alauda arborea*, L. *V. ALOUETTE*. (DR..Z.)

\* **CONTSJOR** ou **TSJONKOR**. BOT. PHAN. Syn. malais de *Kämpferia talanga*. (B.)

\* **CONTURNIX**. BOT. PHAN. (Cœl-alpin) Syn. de Plantain. *V. ce mot*. (B.)

**CONULE**. *Conulus*. ÉCHIN. Nom donné par Klein à un genre d'Oursins dans son ouvrage sur les Echinodermes; il n'a pas été adopté. Lamarck a réuni au genre *Galerite*. *V. ce mot*. (LAM..X.)

\* **CONULE**. BOT. CRYPT. (Bridel.) Syn. de *Conostomie*. *V. ce mot*. (B.)

**CONUS**. MOLL. *V. CÔNE*.

**CONVALLAIRE**. *Convallaria*. BOT. PHAN. Dans ce genre, qui fait partie de la famille des Asparaginées et de l'Hexandrie Monogynie, Linné et plusieurs ont réuni les genres *Polygonatum*, *Lilium Convallium* et *Smilax* de Tournefort. Mais les auteurs modernes, et particulièrement Moench

et Desfontaines, ont de nouveau divisé le genre *Convallaria*. Ainsi ils nomment *Polygonatum* les espèces dont le calice est allongé et plus ou moins cylindrique, comme par exemple les *Convallaria Polygonatum*, *Conv. multiflora*, etc. Desfontaines appelle *Smilacina*, Moench et Roth *Maianthemum*, les espèces dont le calice est plane, rotacé, à quatre lobes et à quatre étamines; telles sont les *Convallaria bifolia*, *trifolia*, *racemosa*, *stellata*, etc. Enfin le genre *Convallaria*, proprement dit ne renferme que les espèces dont le calice est en forme de aloche ou de grelot. Le *Convallaria maialis* est le type de ce genre qui correspond au *Lilium Convallium* de Tournefort. *V. MAIANTHEMUM*, *POLYGONATUM*, *SMILACINA*.

Le genre *Convallaria*, que l'on appelle vulgairement en français *Muguet*, offre les caractères suivans: son calice est campanulé ou en forme de grelot, à six divisions égales et peu profondes; ses étamines sont incluses et au nombre de six; leurs anthères sont cordiformes lancéolées; leur ovaire est libre, à trois loges contenant chacune trois ou quatre ovules attachés à l'angle interne; le style est épais, triangulaire, terminé par un stigmate à trois angles. Le fruit est une baie globuleuse, ordinairement à trois loges monospermes par suite de l'avortement d'un grand nombre des ovules.

Ce genre ne se compose guère que d'une seule espèce qui croît en Europe: c'est le **MUGUET DE MAI**, *Convallaria maialis*, qui au printemps embaume les bois de son odeur suave, et les pare de sa fleur d'un blanc d'ivoire. Sa racine, qui est vivace, pousse une tige haute de six à huit pouces, grêle, nue, embrassée à sa base par trois ou quatre feuilles radicales, dressées, elliptiques, lancéolées, aiguës, très-entières, d'un vert clair, et glabres. Ses fleurs sont quelquefois lavées de rouge, pédicellées et renversées, et forment un épi unilatéral et recourbé. Cette plante est extrêmement commune dans nos

bois. On la cherche pour en faire des bouquets. On la cultive souvent en bordures dans les jardins.

Le *Convallaria japonica*, que l'on avait placé dans ce genre, forme le genre *Fluggea* du professeur Richard.

*V. FLUGGEA.*

(A. R.)

\***CONVALLARINE.** *Convallarina*. INF. Genre microscopique dont nous proposerons l'établissement dans notre famille des Vorticellaires, et qui aura pour caractères: un corps sphérique, ovoïde dans l'état de contraction, devenant plus ou moins campanulé par le développement qui peut lui donner l'Animal; muni d'un pédoncule plus ou moins contractile, l'orifice est dépourvu de tout organe ciliaire, ou du moins on n'a pu encore les y découvrir. C'est par l'absence de tout organe ciliaire que les Convallarines diffèrent surtout des Vorticelles proprement dites, et par leur isolement sur chaque pédoncule qu'on les distingue des Dendrelles. Les Convallarines habitent les eaux sans exception, soit douces, soit marines, soit pures, soit putrides. On peut les distinguer en deux sections.

† A pédicule non contortile en tire-bouchon.

Cette division contient des espèces dont le pédoncule n'est guère plus long que le corps. Les *Vorticella putrina* et *inclians* de Müller en donnent une idée. Ce savant a mentionné et figuré sous le nom de *Vorticella inclians*, var.  $\beta$  (Inf., pl. 45, f. 7) encore une espèce de ce genre que nous nommerons *Convallarina biloba*. Il a confondu avec elle des synonymes qui n'y peuvent absolument convenir, puisqu'ils font mention de cils, tandis que Müller convient lui-même qu'il n'en a jamais pu découvrir sur sa Vorticelle.

†† A pédicule contortile en tire-bouchon.

Peu de Microscopiques, si ce ne sont les Vorticelles et les Dendrelles, présentent un spectacle plus divertissant que celui dont les Convallarines de cette section amusent l'observa-

teur. Il faut voir ces petits Animaux s'allonger, et revenant brièvement sur eux-mêmes par le raccourcissement du filament par lequel ils se fixent, donner l'idée de la pierre qui, lancée par une fronde, serait aussitôt rappelée au point de départ par une force secrète. Les *Vorticella globularis*, *nutans*, *Convallaria* et autres espèces de Müller, composent la section des Convallarines contortiles. Entre les plus remarquables nous citerons notre *Convallarina viridis* (*V. Planch.* de ce Dict., Psysichodiées), *Vorticella fusciculata*, Müll. Cette jolie petite créature qui forme par la réunion de milliers d'individus de petites taches d'un vert brillant sur les Conserves et sur le test des Coquilles des marais, présente, dans son développement, la figure d'une fleur de Liseron ou d'une petite Cloche qui s'étend en tous sens. Sa couleur est des plus brillantes. On la peut communément observer, dans les environs de Paris, au printemps et en automne.

(A.)

CONVERS. FOIS. L'un des noms vulgaires de l'Alose jeune. *V. CLUXE.*

(B.)

**CONVOLVULACÉES.** *Convolvulaceæ.* BOT. PHAN. Le genre Liseron (*Convolvulus*) a donné son nom scientifique à cette famille dont il est le genre principal. Les Convolvulacées font partie des familles de Plantes dicotylédones, monopétales, hypocorollées, c'est-à-dire ayant la corolle attachée sous l'ovaire. Voici les caractères généraux qui distinguent les genres de cette famille: ce sont des Plantes herbacées ou frutescentes, souvent volubiles, c'est-à-dire dont la tige s'enroule autour des corps environnans, quelquefois lactescentes; leurs feuilles sont alternes, dépourvues de stipules, simples, lobées ou profondément pinnatifides. Les fleurs sont quelquefois très-grandes, diversement groupées, tantôt axillaires, tantôt terminales. Leur calice est monopétale, persistant, à cinq divisions plus ou moins profondes. La corolle est monopétale,

ulière, caduque, à cinq lobes  
aux, qui sont ordinairement plus  
moins rabattus. Les cinq étamines  
sont attachées à la partie inférieure  
de la corolle ou vers la base des  
sésions. Leurs filets sont distincts ;  
les anthères à deux loges. L'ovaire  
simple et libre, à deux ou quatre  
loges, contenant un très-petit nom-  
bre d'ovules. Un disque glanduleux  
environne l'ovaire à sa base ; dans la  
plupart, ce disque hypogyne manque  
et est remplacé par cinq appendices  
cylindriques recouvrant l'ovaire et naissant  
de la partie inférieure de la corolle.

Dans un certain nombre de genres, on  
trouve qu'un style surmonté d'un,  
deux ou de trois stigmates ; dans  
quelques autres on observe deux styles  
distincts. Le fruit est toujours une cap-  
sule qui présente d'une à quatre loges,  
contenant ordinairement une ou deux  
saines attachées à la base des cloi-  
sons. En général cette capsule s'ouvre  
à deux ou en quatre valves, dont les  
bords sont appliqués sur les cloisons  
et restent en place ; quelquefois cette  
capsule s'ouvre par une scissure trans-  
versale, ou enfin reste close. Les  
saines sont en général dures et  
comme osseuses, à surface chagrinée  
ou hérissée de poils ; elles renferment  
un embryon roulé sur lui-même et  
dont les deux cotylédons qui sont  
grasses, sont repliés plusieurs fois sur  
eux-mêmes. Cet embryon est placé  
au centre d'un endosperme peu épais,  
ou et comme mucilagineux.

Le genre *Cuscuta*, qui fait évidem-  
ment partie de cette famille, s'en  
loigne par quelques particularités  
dans la structure de son embryon ;  
celui-ci est cylindrique, roulé en hé-  
lice et parfaitement indivis à ses deux  
extrémités. Au lieu de dire, comme  
ont les auteurs, qu'il est dépourvu  
de cotylédons, n'est-il pas plus ration-  
nel de penser que ses deux cotylédons  
sont soudés, ainsi qu'on l'observe  
régulièrement dans plusieurs autres  
embryons, tels que celui du Marron-  
nier d'Inde, du Châtaignier, etc. ?

L'un des caractères les plus tran-  
chés de la famille des Convolvulacées

consiste dans sa capsule dont les su-  
tures correspondent aux cloisons, et  
dans leur embryon roulé sur lui-mê-  
me au centre d'un endosperme mu-  
cilagineux. Ce dernier caractère a mê-  
me paru assez important à R. Brown  
pour séparer des Convolvulacées les  
genres *Hydrolea*, *Nama*, *Sagonea* et  
*Diapensia*, qui ne le présentent point,  
et pour en former un ordre distinct  
qu'il nomme Hydrolées. Les Convol-  
vulacées ont plusieurs points de res-  
semblance avec les Borraginées et les  
Polémoniacées ; mais elles se distin-  
guent des premières par leur capsule  
à deux ou quatre loges déhiscences,  
et des secondes par la position res-  
pective des valves et des cloisons de  
cette même capsule.

On peut grouper les genres qui  
composent cette famille en deux sec-  
tions, suivant qu'ils offrent un seul  
ou deux styles.

#### † Un seul style.

*Argyreia*, Lour. ; *Maripa*, Aublet ;  
*Muruco*, Aublet ; *Enderbachium*,  
Juss. ; *Ipomea*, L. ; *Convolvulus*,  
L. ; *Polymeria*, Brown ; *Calystegia*,  
Brown ; *Calboa*, Cavanilles ; *Wil-  
sonia*, Brown.

#### †† Deux styles.

*Evolvulus*, L. ; *Cladostyles*, Humb.  
et Bonpl. ; *Eryube*, Roxburgh ; *Pa-  
rana*, Aublet ; *Cressa*, L. ; *Breweria*,  
Brown ; *Dufourea*, Kunth ; *Dichon-  
dra*, Forster ; *Cuscuta*, L., Juss.

(A. N.)

**CONVOLVULOIDES. BOT. PHAN.**  
(Moench.) Ce genre, formé aux dé-  
pens des Liserons et des Ipomées, dont  
les étamines sont velues à la base et  
le style muni d'un stigmate, n'a pas  
été adopté. V. LISERON et IPOMÉE.

(B.)

**CONVOLVULUS. BOT. PHAN. V.**  
LISERON.

**CONYZE. Conyza. BOT. PHAN.**  
Genre de la famille des *Synanthérées*,  
Corymbifères de Jussieu, tribu des  
Imulées de Cassini, et de la Syngé-  
nésie supérieure, L. Ce genre, dont  
le nom a été tiré de celui que por-

taient dans l'antiquité diverses Plantes de Composées, dont son établissement à Tournefort, Linné l'a ensuite adopté, sauf le retranchement des espèces avec lesquelles il a formé le genre *Baccharis*. Voici ses caractères : involucre composé de plusieurs folioles imbriquées, linéaires et nullement scarieuses ; réceptacle nu ; fleurs nombreux, tubuleux et réguliers ; ceux du centre sont hermaphrodites, ou rarement mâles par avortement, et ceux de la circonférence, femelles ; agrette poilue. Les plus grands rapports unissent ce genre avec celui des *Baccharis*, qui néanmoins s'en distingue suffisamment par le dichlisme de ses fleurs, indépendamment de la différence qu'offre son port. Quelle que soit la méthode que l'on adopte pour arriver à des coupes heureuses dans la vaste famille des Synanthérées, il est impossible de distraire ces deux genres pour les placer dans deux tribus distinctes, surtout si l'on veut donner à celles-ci le nom de naturelles. Il nous semble donc contraire aux principes des affinités d'adopter la séparation opérée par Cassini des Astérées et des Inulées, à l'aide des *Baccharis* et des *Conyza*. Un des botanistes dont la sagacité est secondée par l'esprit d'observation le plus profond, Kunth a si bien vu la liaison de ces deux genres, qu'il les place ensemble dans la tribu des VERNONIACÉES.

Les *Conyza* sont des Arbres, des Arbrisseaux ou des Herbes à feuilles alternes, décurrentes dans quelques espèces, à fleurs terminales, en corymbes ou en panicules, rarement solitaires. Le nombre de leurs espèces est très-considérable ; il s'élève aujourd'hui à plus de cent vingt, déduction faite de tous les *Gnaphalium*, *Baccharis* et autres Synanthérées qu'on y avait associées mal à propos ; elles sont pour la plupart indigènes des contrées chaudes tant de l'ancien que du nouveau continent. On n'en trouve dans toute la France qu'une seule espèce qui soit très-commune. C'est la *CONYZE RUDE*, *Conyza squar-*

*rosa*, L., Plante qui croît dans les terrains secs, les vignes et sur les bords des bois. Sa tige, haute de six à neuf décimètres, est droite, velue et rameuse ; elle porte des feuilles sessiles, ovales, lancéolées, et des fleurs jaunâtres disposées en corymbe terminal. Son odeur pénétrante et désagréable fait périr les Insectes, ce qui lui a valu le nom vulgaire d'HERBE AUX MOUTCHES. Les autres espèces européennes, au nombre de quatre, sont de petites Plantes sous-frutescentes, à fleurs jaunes et à feuilles étroites et blanches, qui leur donnent un air si particulier qu'on les reconnaît facilement au premier coup-d'œil. Dans le grand nombre des *Conyza* étrangères à la France ; nous citerons particulièrement comme modèle d'élégance et de beauté le *Conyza candidissima*, L., dont la tige, les involucre et le feuillage sont couverts d'un coton fin, serré et de la plus éclatante blancheur. Notre ami, le lieutenant de vaisseau Durville, nous l'a communiquée des rochers de Samos où elle croît en abondance.

Notre collaborateur Bory de Saint-Vincent a récolté dans les parties montagneuses et fort élevées de l'île de Mascareigne plus de vingt espèces de *Conyza* qu'il a communiquées au professeur De Candolle ; et dont douze au moins avaient échappé aux botanistes qui herborisèrent dans ces mêmes lieux. Ces Plantes, pour la plupart frutescentes, forment avec les Huberties et un Bléria de petites forêts de six à huit pieds de hauteur, d'un aspect particulier. Les plateaux qu'on nomme Plaines des Cafres et des Chicots en sont couverts. Une espèce herbacée qui croît sur les pentes inférieures est appelée Sauge par les créoles, parce qu'elle a l'odeur de la Plante dont on lui a donné le nom. Sa feuille desséchée est fort agréable à fumer.

Dix-huit espèces de *Conyza*, dont seize entièrement nouvelles, sont décrites dans la partie botanique du Voyage de Humboldt, publiée par Kunth. Il les a distribuées en deux

tions, selon que la Plante est her-  
ce ou frutescente. Parmi les Co-  
herbacées, Kunth a figuré les Co-  
*sophyafolia* et *Conyza gnapha-*  
*lies* (loc. cit. v. 4, t. 326 et 327). Les  
ariens donnent le nom d'*Ayagua-*  
au *Conyza floribunda*, Kunth. Ils  
ignent également sous le nom de  
goyo, le *Conyza Chingoyo*, es-  
frutescente que Kunth a décrite  
figurée (loc. cit. t. 328). Enfin l'es-  
enommée par Kunth *Conyza ripa-*  
était le type des genres *Tessaria*,  
iz et Pav., et *Gynketeria*, Willd.

(G.N.)

ONYZELLA. BOT. PHAN. (Dillen.)

1. d'*Erigeron canadense*, L. (B.)

ONYZOIDES. BOT. PHAN. (Ges-

.) Syn. d'*Erigeron aere*. (Tourne-

.) Syn. de *Carpesium*. (B.)

CONZAMBOE. BOT. PHAN. (L'E-

se.) Syn. de *Pancratium mariti-*

m, L. (B.)

COODO. MAM. (Marsden.) Qu'on

nonce *Coudo*. Le Cheval dans la

gue de Sumatra. (B.)

COODOYER. MAM. (Marsden.)

on prononce *Coudeyer*. Syn.

hippopotame à Sumatra. (B.)

COOK. OIS. Espèce du genre

perroquet, *Psittacus Cookii*, Temm.

PERROQUET. (DR.Z.)

COOK ET COOKE. FOIS. Espèce

déterminée du Labre des côtes d'An-

terre. (B.)

COOKIE. *Cookia*. BOT. PHAN. Et

a *Kookia*. L'Arbre que les Chinois

amment *Pampi* a été dédié au célè-

bre navigateur Cook par Sonnerat,

leur d'un Voyage aux Indes fort

imé pour les enseignemens qu'il a

urnis à l'histoire naturelle. Ce gen-

, de la Décandrie Monogynie, et

e Jussieu a placé dans la famille des

speridées, entre le *Murraya* et le

*trus*, offre les caractères suivans :

ice très-petit à cinq divisions; cinq

ales ouverts; dix étamines distinc-

, courtes, à anthères presque ar-

alies; ovaire pédicellé, hérissé, ova-

et pentagone; un style court, ter-

né par un stigmate capité. Le fruit

est une petite baie ponctuée, multilob-  
culaire et ne renfermant qu'une seule  
graine dans chaque loge. Selon Retz  
(Obs. bot. fasc. VI, p. 29), la baie du  
*Cookia* contient cinq capsules à se-  
mences solitaires et oblongues. Ce  
genre que Corrêa de Serra (Ann. du  
Mus. T. VI, p. 384) a voulu éloigner  
des Hespéridées ou Aurantiacées,  
parce qu'il n'en connaissait le fruit que  
d'après des documens inexacts, pa-  
rait à Mirbel (Bull. Philom. 1813, n° 75)  
et à Jussieu (Mém. du Mus. T. II, p.  
437) devoir y rester. Corrêa ajoute  
que son organisation le rapproche du  
*Quinaria Lohsium* de Louréiro ou  
*Lousium sylvestre* de Rumph., et doit  
former avec lui une nouvelle famille  
qui se placera naturellement entre les  
Orangers et les Guttifères, mais il  
n'assure pas que la Plante de Louréiro  
soit bien le *Cookia punctata* de Son-  
nerat. Plusieurs auteurs néanmoins  
n'hésitent pas à donner ces Plantes  
comme synonymes.

La COOKIE PONCTUÉE, unique es-  
pèce du genre, est un Arbre à feuilles  
pinnées dont les folioles sont lancéol-  
lées, entières, l'impaire plus grande.  
Son écorce est verrugneuse et ses pé-  
tiolules hispides. Les fleurs sont dis-  
posées en panicules, et leurs pédon-  
cules sont très-ramifiés. Elle croît na-  
turellement dans la Chine méridio-  
nale, et on la cultive à l'île de  
France. (G.N.)

\* COOLÉET MANÈS. BOT.

PHAN. Marsden donne ce nom à un  
Arbre de Sumatra qui produit une  
Cannelle médiocre; il paraît être  
une espèce de Laurier. (B.)

\* COONIET. BOT. PHAN. Syn. de  
Curcume à Sumatra où l'on distin-  
gue le *Mera* qui est employé dans  
l'assaisonnement, et le *Tummo* qui  
l'est dans la teinture et dans la méde-  
cine. (B.)

COO-OW ou COO-OX. OIS. Syn.  
de l'Argus, *Phasianus Argus*, Lath.,  
dans les Moluques. V. ARGUS.

(DR.Z.)

\* COOROUS. BOT. PHAN. Syn. de  
Carri. V. ce mot. (B.)

COPEVI. BOT. PHAN. Même chose que Copaliba. *V.* ce mot.

\* COPHER. BOT. PHAN. Syn. hêtre de *Lawsonia inermis*. (B.)

\* COPHOSE. *Cophosus*. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, famille des Carnassiers, tribu des Carabiques, indiqué sous ce nom par Ziegler dans sa collection et adopté par Dejean (Catal. des Coléopt. p. 13). Latreille pense que ce nouveau genre pourrait bien ne former qu'une division dans les Pterostiques de Bonelli. Les antennes plus courtes, le prothorax proportionnellement plus long, la forme du corps étroite et cylindrique, sont les caractères distinctifs les plus importants. L'espèce désignée par Dufschmidt, sous le nom de *Cylindricus*, peut être considérée comme le type du genre. Elle est originaire de Hongrie. (AUD.)

COPORAL. OIS. Syn. vulgaire à Cayenne de l'Engoulevent varié, *Carpodacus Cayennensis*, L. *V.* ENGOUTEUVENT. (DR..Z.)

\* COPOUN-GAUNE. POIS. (Risso.) Syn. à Nice de Scorpené jaune. (B.)

\* COPOUS ou CHERBOSA. BOT. PHAN. (Belon.) Il paraît que c'est la même chose que Chirbas, l'un des synonymes de Pastèque aux environs de Constantinople et dans la Troade. (B.)

\* COPRA. BOT. PHAN. (L'Écluse.) L'amande du Coco dépouillée et préparée pour être mise dans le moulin destiné à en extraire de l'huile. (B.)

\* COPRIDE. INS. Traduction du nom latin *Copris*, en français Bousier. *V.* ce mot. (AUD.)

\* COPRINARIUS. BOT. CRYPT. (*Champignons*.) Section du genre Agaric établie par Fries, et qui est très-voisine des *Coprinus* de Persoon. Ces Champignons se résolvent comme eux en une liquide noir; mais ils ne présentent pas la même singularité dans la disposition des sporules. Leurs capsules ont la même structure que celles des autres Aga-

rics. Ils croissent, comme les *Copris*, sur les fumiers. (AD. B.)

COPRINS. *Coprius*. BOT. CRYPT. (*Champignons*.) Persoon a donné ce nom à une des sections les plus remarquables du genre Agaric. Elle renferme la plupart des espèces qui croissent sur les fumiers; son caractère le plus facile à observer consiste dans la manière dont les lamelles se résolvent en une liqueur noire comme de l'encre à l'époque de la dissémination des sporules. Link a bien remarqué un autre caractère beaucoup plus difficile à observer, mais unique dans la famille des Champignons, qui consiste dans la disposition des sporules, dans les capsules (*Thecæ*, *Asci*) qui couvrent les lames du chapeau. Ces capsules sont beaucoup plus grandes que celles des autres Agarics. Elles sont éloignées les unes des autres et non rapprochées comme dans presque tous les Champignons, et au lieu de ne renfermer qu'un seul rang de sporules, elles contiennent quatre rangées parallèles. Ces caractères très-remarquables avaient engagé Link à séparer ces Plantes des Agarics, et à en faire un genre distinct; mais le reste de la structure de ces Champignons, leur forme, etc., se rapprochent tellement de celles d'autres espèces de vrais Agarics, que nous pensons qu'on doit ne les regarder que comme une simple section.

Tous les *Copris* sont minces, délicats; leur chapeau est membraneux en forme de cloche; leur pédoncule est fistuleux, très-fragile; ils sont de peu de durée, et finissent par se résoudre entièrement en une liqueur d'un noir foncé. Ces Champignons sont très-communs sur les fumiers. (AD. B.)

COPRIOLA ET COPRIOLE. BOT. PHAN. Noms vulgaires en Italie de *Plantago Coronopus*. *V.* PLANTAIN. (B.)

COPRIS. INS. *V.* BOUSIER et COPRIDE.

\* COPROPHAGES. *Coprophi*. INS.

**Le COPAÏER officinal, *Copaifera officinalis***, L., Jacq. (*Amet.* 155, t. 86), est un grand et bel Arbre touffu, d'une forme élégante, ordé de feuilles alternes composées de cinq à huit folioles ovales acuminées, entières, très-glabres; un peu luisantes, ponctuées et presque sessiles. Les fleurs sont petites, blanchâtres, et forment des grappes rameuses, placées à l'aisselle des feuilles. Leur calice est à quatre lobes un peu inégaux, étalés, décrits par Jacquin et Linné comme une corolle de quatre pétales, tandis que cet organe manque réellement. Les dix étamines sont libres, égales et étalées. Le fruit, que l'on n'a pas encore observé à son état parfait de maturité, est orbiculaire, comprimé, bivalve, contenant une ou deux graines. Cet Arbre croît naturellement dans diverses contrées de l'Amérique méridionale, au Brésil, etc.

C'est des incisions que l'on pratique à son écorce, que découle la substance résineuse ou Térébenthine connue vulgairement sous le nom de *Baume de Copahu*. Elle est extrêmement fluide, incolore lorsqu'elle est récente, devenant un peu citrine en vieillissant. Elle contient à peu près le tiers de son poids d'huile volatile. Son odeur est forte et pénétrante, sa saveur âcre, chaude et térébinthacée. Dans ces derniers temps, les médecins en ont fait un fréquent usage dans les maladies des voies urinaires, et surtout à une forte dose dans les blennorrhagies rebelles.

**Le COPAÏER DE LANGSDORFF, *Copaifera Langsdorffii***, Desfont. (*loc. cit.*, p. 377, t. 12), a été observé par Langsdorff au Brésil. Sa tige est ligneuse; ses feuilles paripennées, à folioles elliptiques, obtuses, au nombre de dix; ses fleurs sont en panicules et ses pétioles pubescens.

**Le COPAÏER DE LA GUIANE, *Copaifera guianensis***, Desfont. (*loc. cit.*, p. 376, t. 13), est indigène des forêts de la Guiane et croît dans le voisinage du Rio Negro. Il se distingue par ses folioles opposées, au nombre de six à huit, glabres, très-entières,

elliptiques, mucronées et ponctuées.

**COPAIFERA**. BOT. PHAN. *V.* COPAÏER. (*Ap. 24*)

**COPAIVA**. BOT. PHAN. *V.* COPAÏER.

**COPAJA**. BOT. PHAN. Même chose que *Copaia*. *V.* ce mot.

**COPAL, COPALE ou COPALTE**. BOT. PHAN. Matière résineuse improprement appelée Gomme, qui découle du *Rhus copallinum*, Arbre de l'Amérique, et qui, en desséchant, devient fragile, cassante, transparente, d'un blanc jaunâtre plus ou moins foncé. Elle est insoluble dans l'eau, et ne se dissout que très-difficilement dans l'Ether, l'Alcool et les huiles essentielles. Cette résine forme la base des vernis les plus solides. Les Portugais et les anciennes pharmacies la connaissaient sous le nom d'*Animum*.

(*DR. 2.*)

**COPALLINE**. BOT. PHAN. Matière résineuse qui découle du *Liquidambar styraciflua*, et dont l'Hirondelle à queue épineuse se sert, selon Bosc, pour coller les matériaux de son nid. On lui donne aussi le nom de **COPALME**. (*B.*)

**COPALLI-QUAHUITL**. BOT. PHAN. (Hernandez.) Nom mexicain du *Rhus copallinum*. *V.* SUMAC. (*B.*)

**COPALME**. BOT. PHAN. *V.* COPALLINE.

**COPALON**. BOT. CRYPT. L'un des noms vulgaires de l'Agaric élevé. (*B.*)

**COPALXOCOTI**. BOT. PHAN. Syn. mexicain de Savonnier, *Sapindus*. (*B.*)

**COPAYER**. BOT. PHAN. Pour *Copaier*. *V.* ce mot.

\* **COPAYERY**. BOT. PHAN. Mot donné dans le Dict. de Dérerville comme synonyme d'Arbre de la Folie, et auquel on renvoie, mais qui ne se trouve point dans l'ouvrage. (*B.*)

\* **COPEI**. BOT. PHAN. Syn. caraïbe de *Coccoloba uvifera*. (*B.*)

\* **COPERTOIVOILE**. BOT. PHAN. (Daléchamp.) L'un des noms vulgaires de *Cotyledon umbilicus*, L. (*B.*)

COPEVI. BOT. PHAN. Même chose que Copalba. *V.* ce mot.

\* COPHER. BOT. PHAN. Syn. hêtre de *Lawsonia inermis*. (B.)

\* COPHOSE. *Cophosus*. INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, famille des Carnassiers, tribu des Carabiques, indiqué sous ce nom par Ziegler dans sa collection et adopté par Dejean (Catal. des Coléopt. p. 13). Latreille pense que ce nouveau genre pourrait bien ne former qu'une division dans les Pterostiques de Bonelli. Les antennes plus courtes, le prothorax proportionnellement plus long, la forme du corps étroite et cylindrique, sont les caractères distinctifs les plus importants. L'espèce désignée par Dufschmidt, sous le nom de *Cylindricus*, peut être considérée comme le type du genre. Elle est originaire de Hongrie. (AUD.)

\* COPORAL. OIS. Syn. vulgaire à Cayenne de l'Engoulevent varié, *Campylorhynchus Cayennensis*, L. *V.* ENG-  
OULEVENT. (DR..E.)

\* COPOUN-GAUNE. FOIS. (Risso.) Syn. à Nice de Scorpène jaune. (B.)

\* COPOUS ou CHERBOSE. BOT. PHAN. (Belon.) Il paraît que c'est la même chose que Chirbas, l'un des synonymes de Pastèque aux environs de Constantinople et dans la Troade. (B.)

\* COPRA. BOT. PHAN. (L'Éoluse.) L'amande du Coco dépouillée et préparée pour être mise dans le moulin destiné à en extraire de l'huile. (B.)

\* COPRIDE. INS. Traduction du nom latin *Copris*, en français Bousier. *V.* ce mot. (AUD.)

\* COPRINARIUS. BOT. CRYPT. (*Champignons*.) Section du genre Agaric établie par Fries, et qui est très-voisine des *Coprinus* de Persoon. Ces Champignons se résolvent comme eux en une liquide noir; mais ils ne présentent pas la même singularité dans la disposition des sporules. Leurs capsules ont la même structure que celles des autres Aga-

rics. Ils croissent, comme les *Copris*, sur les fumiers. (AD. E.)

COPRINS. *Copria*. BOT. CRYPT. (*Champignons*.) Persoon a donné le nom à une des sections les plus remarquables du genre Agaric. Elle renferme la plupart des espèces qui croissent sur les fumiers; son caractère le plus facile à observer consiste dans la manière dont les lamelles se résolvent en une liqueur noire comme de l'encre à l'époque de la dissémination des sporules. Link a bien remarqué un autre caractère beaucoup plus difficile à observer, mais unique dans la famille des Champignons, qui consiste dans la disposition des sporules, dans les capsules (*Thecæ*, *Asci*) qui couvrent les bords du chapeau. Ces capsules sont beaucoup plus grandes que celles des autres Agarics. Elles sont éloignées les unes des autres et non rapprochées comme dans presque tous les Champignons, et au lieu de ne renfermer qu'un seul rang de sporules, elles contiennent quatre rangées parallèles. Ces caractères très-remarquables avaient engagé Link à séparer ces Plantes des Agarics, et à en faire un genre distinct; mais le reste de la structure de ces Champignons, leur forme, etc., se rapprochent tellement de celles d'autres espèces de vrais Agarics, que nous pensons qu'on doit ne les regarder que comme une simple section.

Tous les *Copris* sont minces, délicats; leur chapeau est membraneux en forme de cloche; leur péricule est fistuleux, très-fragile; ils sont de peu de durée, et finissent par se résoudre entièrement en une liqueur d'un noir foncé. Ces Champignons sont très-communs sur les fumiers. (AD. E.)

COPRIOLA ET COPRIOLE. BOT. PHAN. Noms vulgaires en Italie de *Plantago Coronopus*. *V.* PLANTAIN.

COPRIS. INS. *V.* BOUSIER et COPRIDE.

\* COPROPHAGES. *Coprophi*. INS.



Famille de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, établie par Latreille ( *Gener. Crust. et Insect.* T. II, pag. 75 ), et constituant aujourd'hui ( Règn. Anim. de Cuv. ) une division dans la famille des Lamellicornes. Ses caractères sont : antennes de huit à neuf articles ; chaperon arrondi presque demi-circulaire ; labre, mandibules et pièce terminant les mâchoires membraneux ; cette pièce large ou transversale ; palpes labiaux plus grêles ou allant en pointe vers leur extrémité supérieure ; écusson souvent nul ou distinct ; les deux pieds postérieurs plus rapprochés du bout de l'abdomen que dans les autres Coléoptères. A l'état de larve et d'insectes parfaits, les Coprophages se nourrissent des excréments des divers Animaux. Latreille divise cette famille en plusieurs genres qu'il groupe de la manière suivante :

I. Pieds de la seconde paire beaucoup plus écartés entre eux, à leur naissance, que les autres ; palpes labiaux très-velus, avec le troisième ou dernier article beaucoup plus petit que le précédent, ou peu distinct ; écusson nul ou à peine visible.

Genres : ATEUCHUS, GYMNOPLEURE, SISYPHE, ONITIS, BOUSIER, ONTHOPHAGE.

II. Tous les pieds séparés entre eux à leur naissance par des intervalles égaux ; palpes labiaux peu velus ou presque glabres, composés d'articles presque semblables et cylindriques ; un écusson très-distinct.

Genre : APHODIE.

V. ces mots.

(AUB.)

COPROSE ET CORNROSE. BOT.

PHAN. Syn. de Coquelicot. V. PAVOT.

(B.)

COPROSME. *Coprosma*. BOT.

PHAN. Ce genre, établi par Forster ( *Characteres Generum Plantarum*, p. 138, n° 69 ), avait d'abord assez mal été caractérisé pour que Lamarck l'ait placé parmi les Gentianées. Son ovaire adhérent et la structure de son fruit le rapportent aux Rubiacées,

ainsi que l'a indiqué Labillardière ( *Nov. - Hollandia Plant. Specimen*, T. I, p. 70 ). C'est à cet auteur que nous emprunterons la description des caractères génériques suivans : fleurs hermaphrodites ; calice supère à cinq ou six divisions profondes ; corolle infundibuliforme, pareillement à cinq ou sept découpures ; cinq ou sept étamines incluses dans la plante de Labillardière ; et exsertes dans les espèces de Forster ; deux styles très-longs et hérissés ; baie adhérente contenant deux coques accolées et des graines dont l'embryon à radicle inférieure est au centre d'un périsperme charnu. On y trouve des fleurs mâles et des fleurs femelles probablement résultantes d'avortemens. Les deux espèces que Forster a rapportées ont été publiées par Linné fils ( *Suppl.* 1788 ) sous les noms de *Coprosma lucida* et *C. foetidissima*. Ce sont deux Arbrisseaux indigènes de la Nouvelle-Zélande, dont le port ressemble à celui des *Phyllis*. La dernière de ces espèces exhale, selon Forster, une odeur d'excrémens tellement puante, qu'elle fait reconnaître facilement cette Plante, et on s'est servi de ce caractère pour former le nom générique. Labillardière a décrit et figuré ( *loc. cit.* t. 95 ) une troisième espèce qu'il a nommée *Coprosma hirtella*. C'est un Arbuste du cap de Van-Diemen à la Nouvelle-Hollande, à feuilles ovales, lancéolées, et possédant les stipules interfoliolaires qui caractérisent si bien les Rubiacées. Malgré l'anomalie du nombre de ses étamines, Labillardière le place dans la Pentandrie Digynie, L., parce que le nombre quinaire du système floral est le plus fréquent.

(O..N.)

\* COPS OU COPSO. POIS. L'un des noms de l'Esturgeon, selon Rondelet qui ajoute que Copse désigne l'*Acipenser Huso*. V. ESTURGEON.

(B.)

COPTIS. BOT. PHAN. Famille des Renonculacées, tribu des Helleborées de De Candolle, Polyandrie Polygynie, L. Placé d'abord dans les

**Hellébore** par Linné et Jussieu, ce genre en a été séparé par Salisb. (*Transact. Societ. Linn.* T. VIII, 305); et De Candolle (*Systema Regn. Veget.* p. 321) a adopté cette distinction. Voici ses caractères génériques tels qu'ils sont exposés dans ce dernier ouvrage : calice à cinq ou six sépales colorés, pétaloïdes et caducs; pétales en forme de petits capuchons; vingt à vingt-cinq étamines; six à dix capsules longuement stipitées, disposées en étoile, membraneuses, oblongues, terminées en pointe par le style persistant, à quatre ou à six graines. Ce genre, que distinguent suffisamment et son port et ses caractères, se compose de deux espèces indigènes des contrées boréales de l'un et l'autre continent. Ce sont de petites Plantes herbacées, vivaces et consistantes, à feuilles radicales longuement pétiolées, divisées en trois segmens dentés ou multifides, à fleurs blanches solitaires ou gémées au sommet d'une sorte de hampe, munies d'une très-petite bractée. Le *Coptis trifolia*, Salisb., *Helleborus trifolius*, L., croît dans les lieux humides et montueux du nord de l'Europe et de l'Amérique septentrionale, depuis le Canada jusqu'en Virginie. Le peuple de Boston emploie sa racine, qui est jaunâtre et purement amère sans mélange d'astringence, comme remède contre les aphtes de la bouche. L'autre espèce (*Coptis asplenifolia*, Salisb.) a été trouvée sur les côtes occidentales de l'Amérique boréale. On lui donne pour synonyme le *Thalictrum japonicum* de Thunberg (*Act. Soc. Linn.* T. II, p. 337). (G. N.)

\* **COPULATION. ZOOL.** Nous prendrons ce mot dans son acception la plus générale, et il nous servira à désigner l'acte de l'accouplement, quelle que soit d'ailleurs la manière dont il s'opère. Les recherches que nous avons fait connaître récemment, avec notre ami le docteur Prévost, sur l'histoire de la génération, jettent beaucoup de lumière sur les diverses circons-

jances de la Copulation, et nous permettent d'apprécier et d'expliquer les variations singulières qui s'y font remarquer. Nous allons parcourir ici quelques exemples, et nous montrerons ensuite quel est le lien commun qui peut les ramener à une loi générale. Le mâle adulte possède une liqueur prolifique caractérisée par la présence des animalcules spermatozooques; la femelle renferme des ovaires à l'intérieur desquels on remarque des corps globuleux de diverses dimensions : ce sont les œufs. Ceux-ci resteraient toujours inhabiles à se développer s'ils n'arrivaient au contact de la liqueur séminale. C'est afin de remplir cette condition que les Animaux se livrent à l'acte de l'accouplement, auquel ils sont d'ailleurs excités par le désir de se procurer une jouissance que la nature a su faire servir à la perpétuation des espèces.

Chez les Mammifères, le mâle est pourvu d'une verge qu'il introduit dans le vagin de la femelle, et qui sert à transporter ainsi tout près de l'ouverture de la matrice le liquide sécrété par les testicules. A l'instant de l'accomplissement, l'appareil génital de la femelle éprouve un état d'orgasme et d'irritation dont Blandell a donné le premier une description soignée. Il a vu chez les Lapines sacrificées au moment même où le mâle venait de terminer ses fonctions, le vagin et les cornes de la matrice se contracter rapidement, puis se dilater tout-à-coup et offrir les mouvements peristaltiques les plus prononcés. Mais tous ces phénomènes ne se passent point au hasard, et l'on voit qu'ils avaient évidemment pour but de faire passer dans les cornes le liquide déposé dans le vagin. Celui-ci se contractait par exemple dans un point quelconque de sa longueur, tandis qu'au même instant l'ouverture béante des cornes s'avancait avec rapidité, de manière à faire pénétrer dans leur intérieur la semence ainsi comprimée. Ces observations nous expliquent les détails de l'accomplissement des Mammifères, et suffisent pour mon-

rer que les mouvemens dont les ammes assurent avoir la sensation à l'instant de la conception, ne diffèrent probablement pas des précédens. Il est du moins bien certain que l'accouplement ne sera pas fécond, si la liqueur séminale ne peut pénétrer jusque dans la matrice, et qu'il ne parvienne à arriver qu'au moyen des contractions du vagin et d'une espèce de succion exercée par le museau de la femelle. Peut-être qu'il existe des lamelles chez lesquels le bout du museau peut atteindre l'orifice de la matrice, et nous avons quelque raison de penser que le Chien est dans ce cas. Quoiqu'il en soit, tous les Mammifères présentent cette espèce de Copulation qui amène la liqueur fécondante précisément dans l'organe où doivent se développer les fœtus.

Chez les Oiseaux et les Reptiles, c'est encore dans les oviductes ou les cornes de la matrice que se rend la liqueur fécondante, et l'acte qui sert à l'introduction consiste le plus souvent en une simple application de l'orifice du cloaque du mâle sur celui de la femelle. Les recherches de Geoffroy de Saint-Hilaire ont éclairé toutes les difficultés que ce mode d'accouplement pourrait offrir, et l'on connaît fort bien aujourd'hui comment les orifices des canaux déferens du mâle viennent seuls verser dans l'organe sexuel de la femelle la liqueur qu'ils reçoivent des testicules.

Dans les Grenouilles et les Crapauds, le mâle se place sur la femelle, la saisit vigoureusement au moyen de ses quatre pattes de devant et se cramponne elle par les petits tubercules dont ses joues se trouvent pourvues. Il attend dans cette posture la sortie des œufs, et les arrose au passage avec sa liqueur spermatique. Il paraît que la manière dont s'opère la fécondation des œufs chez les Poissons se rapproche beaucoup de ces conditions, à la près que le mâle et la femelle restent entièrement séparés. Ce ne se fait par conséquent qu'après la ponte que le mâle viendrait épancher le liquide prolifique, mais il est juste

d'avouer que nous connaissons peu les détails de cet acte dans cette classe d'Animaux. Il n'en est pas de même des Salamandres, et Rusconi nous a donné d'excellentes observations, qui viennent à l'appui de celles du célèbre Spallanzani. Le mâle se place à côté de la femelle, la caresse avec sa queue en la frappant légèrement, et répand en même temps dans l'eau sa liqueur spermatique. Il est probable que la femelle aspire cette eau spermatisée, car à l'instant où elle se sépare du mâle, elle va pondre des œufs fécondés sur les Plantes que renferme l'étang. D'après nos idées sur la génération, il faut qu'elle ait un réceptacle propre à contenir le liquide prolifique, et nous sommes portés à penser que la vessie urinaire se charge de cette fonction. Il serait curieux et important de rechercher les animalcules spermatiques dans l'appareil sexuel de la femelle fécondée, et ce moyen serait le seul qui fût propre à lever tous les doutes.

Enfin, dans les Mollusques et les Insectes, il se présente des particularités dignes d'attention. Quant à ces derniers, Audouin pense que la vessie qui existe constamment dans l'appareil génital de la femelle et qui vient s'ouvrir dans le vagin, doit être considérée comme le réservoir de la semence. Les œufs se fécondent par conséquent au passage et non point dans l'ovaire. Chez un Bourdon, Audouin a trouvé l'organe mâle engagé dans le tuyau de cette vessie. Les recherches de cet anatomiste seront d'ailleurs exposées, avec tous les détails convenables, dans la nouvelle Théorie de la génération que nous publions dans ce moment (Annales des Sciences naturelles, 1<sup>re</sup> année). Les observations que nous avons eu l'occasion de faire sur le Colimaçon, avec notre ami le docteur Prévost, montrent qu'il en est de même pour les Mollusques. Nous avons trouvé les animalcules spermatiques dans l'organe désigné sous le nom de vessie au long col par Swammerdam. On ne les y rencontre qu'après l'ac-

couplement et seulement dans l'Animal qui a fait fonction de femelle, car on sait, depuis les expériences de Gaspari, que bien que l'Escargot soit androgyné, l'accouplement s'opère de telle sorte qu'il n'en résulte qu'une fécondation. — Il est donc évident que la Copulation est toujours calculée de manière que le contact entre la liqueur spermatique et les œufs n'a lieu qu'après que ces derniers ont été expulsés de l'ovaire. Cet acte doit par conséquent éprouver beaucoup de modifications qui le mettent en harmonie avec les conditions d'existence de l'ovule. En effet, chez les Mammifères, l'édification utérine du fœtus exige que la fécondation s'opère dans le sein de la mère. Aussi la liqueur animale s'y trouve-t-elle portée pendant le coït. Chez les Oiseaux, l'action fécondante doit s'exercer dans un moment intermédiaire entre la chute de l'ovule et la formation de la coquille qui vient le recouvrir. La seule circonstance de l'existence d'une coque calcaire amène la nécessité d'une fécondation utérine dans les Reptiles et les Oiseaux, dont les organes semblent tracés sur le plan d'une fécondation extérieure. Cette dernière a lieu chez les Batraciens dont les ovules périssables sont tout aussi propres à la fécondation au moment de la ponte que lorsqu'on les prend dans les oviductes.

Les circonstances de la Copulation ont été généralement négligées, et nous espérons qu'elles attireront désormais l'attention des naturalistes par la liaison intime qui existe entre les phénomènes de cet acte et l'importante fonction de la génération. (D.)

COPIUS. BOT. PHAN. Pour Copous. V. ce mot. (B.)

COPY-BARA. MAM. Même chose que Caphara. V. ce mot. (A.)

COQ. *Gallus*. OIS. (Brisson.) Genre de l'ordre des Gallinacées. Caractères: bec médiocre, robuste, assez épais, un peu lame, courbé à la pointe; mandibule supérieure voûtée, convexe, plus longue que l'inférieure, dont la

base (sans tout chez les mâles) est garnie, du même côté, de nombreux charnières; narines placées latéralement près de la base du bec; ovules, en partie recouvertes d'une membrane épaisse; tête surmontée d'une crête charnue, ou d'un fort bouquet de plumes longues, qui retombent en panache sur le bec; un espace nu sur les joues; quatre doigts: trois devant, réunis jusqu'à la première articulation; un derrière, articulé sur la tarse et posant rarement à terre; un éperon long et courbé; ailes fortement concaves et arrondies; la première rémige la plus courte, la troisième et quatrième les plus longues; queue ordinairement formée de deux plans verticaux réunis sur une arête; les rectrices intermédiaires les plus longues, retombent en arc.

Quoique les espèces et variétés du genre Coq soient généralement et très-abondamment répandues sur tous les points de la terre où l'Homme vit en société, on n'a su pendant longtemps quelle patrie assigner à la souche originaire de ces Oiseaux, dont la domesticité a fait oublier et presque disparaître l'état sauvage. Les n'aurait même encore que des conjectures à cet égard, sans les recherches de Sonnerat. Ce voyageur a retrouvé le Coq sauvage dans la chaîne des Gats, qui sépare en deux grandes provinces la péninsule de l'Inde en-deçà du Gange: il en a rapporté l'espèce mâle et femelle. D'autres espèces ont, depuis, été trouvées dans l'immense archipel de l'Inde; et l'on assure qu'une autre encore a été aperçue dans la Guinée. La taille de cette dernière ne surpasserait guère celle du Pigeon. Ces Oiseaux, concentrés dans les forêts les plus épaisses, ne paraissent qu'accidentellement vers leurs limites; ils font remarquer une défiance et une ferocité qui contrastent avec la confiance et la douceur que témoignent nos Coqs domestiques, et qui, jusqu'ici, ont empêché que l'on pût recueillir des faits bien exacts sur leurs mœurs, leurs habitudes, et particu-

èrement sur tout ce qui concerne sa reproduction. Nous pourrions en revanche nous étendre longuement sur les faits que l'éducation du Coq reproduit chaque jour sous nos yeux ; mais comment se décider, dans un ouvrage où la place est précieuse, à entretenir le lecteur de choses qui ne peuvent lui être étrangères ? Comment tenter une esquisse après l'innombrable peinture que nous a laissée l'écrivain, qu'avec raison l'on a surnommé le Plume français ? Nous ne rappellerons donc point l'attention de nos lecteurs sur la noblesse et la grâce de la démarche du Coq, sur la fierté et le courage de cet Oiseau, qui, en développant et reprenant l'ascendant naturel dans des combats corps à corps, procurent souvent à l'Homme qui se pique de raison un amusement barbare ; sur sa vigilance, sur sa galanterie, sa tendresse, ses prévenances, ses soins envers des compagnes que, malgré leur multiplicité, il sait rendre toutes heureuses et fécondes ; sur la jalousie qui l'enflamme contre toute sorte de rivaux, particulièrement contre ceux de sa propre race ; sur son utilité par les ressources qu'il offre, dans tous les âges, comme aliment sain, léger et délicat, etc. Nous ne pouvons néanmoins nous dispenser, avant d'en venir aux détails spécifiques, de jeter un coup d'œil sur cet Oiseau dans la basse-cour dont il est l'hôte le plus précieux.

Le nombre des races élevées en domesticité est assez grand ; les unes le sont par pure curiosité, d'autres dans des vues de croisement avantageux ; la plupart pour leur utilité réelle, et parmi ces dernières, on paraît s'être arrêté à celle qui a généralement reçu le surnom de Coq et Poule domestiques. On choisit un Coq dont la taille ne soit ni trop élevée, ni trop basse ; d'une allure noble et lestée ; d'une voix bien sonore ; la poitrine large, les membres forts et nerveux, l'encolure épaisse. A l'âge de trois à quatre mois, il est en état de féconder les Poules qu'on lui donne, et dont on augmente progressivement le

nombre jusqu'à quinze et dix-huit, qui est jugé le plus favorable pour conserver la vigueur et la santé du sultan, et pour éloigner du sérail la jalousie et la discord. Les Poules, d'après l'observation, doivent être d'une taille moyenne, d'une constitution robuste, d'un caractère à la fois vif et tranquille, gai, quoique enduit au silence ; on les préfère surtout avec la tête grosse, les yeux très-animés, la crête flottante et la couleur du plumage noire ou fort sombre. Quoique assurées d'une nourriture abondante, les Poules, conduites par le Coq, sont constamment occupées à gratter la terre, à fouiller le fumier pour y chercher des alimens moins bons, sans doute, que le grain ou la paille qu'on leur distribue, mais enfin qu'elles recherchent avec un goût particulier ; or, il faut être attentif à leur procurer ce moyen de jouissance, qui, en définitive, ne laisse pas d'être avantageux, et qui quelquefois suffit à l'existence de ces Oiseaux. Dans cet état social, la Poule ne construit point de nid, et le Coq, non-seulement ne s'occupe pas de ces soins, mais ne songe pas même à les rappeler à la Poule : un enfoncement pratiqué négligemment dans la terre, dans le sable ou la poussière, et ordinairement dérobbé à tous les regards, reçoit, chaque jour, l'œuf que la Poule y dépose, et qu'elle finit par couvrir lorsque le nombre s'en est accumulé jusqu'à un certain point. Pour éviter ces incubations furtives, qui pourraient se faire à contre-temps et contre la volonté du fermier, celui-ci a soin de construire, à proximité de l'habitation, un appartement peu élevé, et disposé de manière que les Poules puissent y pondre tranquillement et commodément, et s'y retirer tous les soirs avec le Coq. La ponte est continue ; elle n'a d'interruption que pendant le temps de la mue qui, pour cet Oiseau, est vraisemblablement une époque périodique de maladie. Cette mue a lieu ordinairement vers la fin de la belle saison ou pendant l'hiver. La Poule, aussitôt après

la ponte, récite sa distance par des accens joyeux; ces chants de plaisir avertissent son propriétaire qui bientôt court recueillir le tribut journalier. Lorsque la saison favorable, les besoins du fermier ou la disposition de la Poule, qui s'annonce par un gloussement, déterminent l'incubation, on accumule sous la couveuse des œufs bien choisis, fécondés, dont le nombre puisse être facilement contenu sous l'aile de la Poule, dont on soigne particulièrement la nourriture pendant cette opération qui dure environ vingt jours.

Les petits sont nommés Poussins; ils mangent seuls en naissant; ordinairement on dispose autour d'eux des miettes de pain trempé, qu'ils digèrent plus aisément que tout autre aliment. La mère, autant qu'elle le peut, tient rassemblée sous son aile protectrice sa jeune couvée, toujours disposée à prendre l'essor et à jouer d'une entière liberté; on ne saurait voir sans attendrissement l'amour attentif de ces mères passionnées qui, tour à tour, grondent et caressent leurs petits, leur montrent la nourriture dont, souvent, elles se privent avec la dévotion la plus absolue. Après trois ou quatre ans, le Coq est susceptible de s'énervier, de perdre sa vigueur: il convient alors de le remplacer; les Poules peuvent donner pendant cinq ou six ans; mais passé ce temps, il est également avantageux de pourvoir à leur renouvellement.

Liné et beaucoup d'autres méthodistes ont confondu dans un seul genre, les Coqs et les Faisans. A la description du petit nombre d'espèces jusqu'ici connues, nous avons cru devoir ajouter l'énumération des races ou variétés de Coqs mentionnées dans les principaux ouvrages d'ornithologie et d'économie rurale. Les croisemens multipliés qu'ont éprouvés ces races, et les dégradations infinies qui en sont résultées, rendent cette énumération assez conjecturale.

COQ D'ADRIA, COQ ADRIATIQUE. Race de petite taille, vantée par les

anciens, et que l'on élevait particulièrement aux environs de l'antique Adria en Italie.

COQ AGATE. Variété dont les teintes du plumage ont de la ressemblance avec les couleurs qu'offrent certains Quartz-Agates.

COQ ALAS, *Gallus fuscatus*, Temm. Plumes de la nuque et du cou brunes à la base, d'un bleu irisé en violet vers le milieu, et d'un vert doré mêlé de noir à l'extrémité; plumes du dos brunes à la base, puis d'un noir doré, bordé de jaune terne; tectrices alaires semblables aux plumes dorsales, mais bordées de roux vif; rémiges d'un brun noirâtre; tectrices d'un vert doré; crête entière, non dentelée, un seul appendice membraneux sous le bec, l'une et l'autre d'un beau rouge violet ainsi que les autres parties nues de la tête; iris, bec et pieds jaunes; éperon très-aigu. Taille, deux pieds; celle de la Poule est de quatorze pouces; elle n'a en outre ni crête ni membrane sur la gorge; la peau nue qui entoure l'œil est d'un jaune rougeâtre; le sommet de la tête et le cou sont d'un gris brun; les parties supérieures d'un vert noirâtre doré, rayées et frangées de gris brun; la gorge blanche, duveteuse; les parties inférieures d'un cendré bruniâtre; les tectrices brunes, bordées de roussâtre. De Java où il est nommé *Ayam-Abas* (Coq des bois) par les Indiens.

COQ D'ALEXANDRIE. Variété du Coq domestique.

COQ ARDOISÉ. Variété du Coq domestique; elle est huppée; la couleur dominante de son plumage est le gris bleuâtre.

COQ ARGENTÉ. La variété précédente ornée de taches régulières d'un blanc pur.

COQ AYAMALAS. *Coq ALAS*

COQ DE BAHIA. Variété du Coq domestique, dont la taille est très-élevée; dans son jeune âge, il reste duveteux beaucoup plus long-temps que les autres variétés.

COQ DE BANKIVA, *Gallus Bankiva*, Temm. Plumes de la nuque; du cou, du dos, et tectrices alaires (à l'exception

tion des grandes qui sont noires irisées, d'un brun marron pourpres, rectrices caudales longues, pendantes, d'un jaune rougeâtre éclatant, rémiges noires, bordées de roux; parties inférieures et rectrices d'un noir ardoise, crête, appendices membraneux et parties nues d'un rouge assez vif; bec et pieds gris; iris jaune. Taille, dix à onze pouces, la queue étant relevée. De Java.

**COQ DE BANTAM**, *Phasianus pusillus*, Lath. Paraît être une variété de l'espèce précédente, du moins il lui ressemble par la taille et les couleurs; il a en outre les pieds garnis, au côté extérieur, de plumes assez longues qui descendent jusque sur les doigts. Cette espèce se distingue, dans nos basse-cours, par son courage et son audace.

**COQ BLANC À HUPPE NOIRE**. Variété du Coq huppé.

**COQ DE BRÈSSE**. Variété du Coq domestique.

**COQ DE CAMBOÛGE**. Race très-médiocre, dont les pattes sont fort courtes et les ailes pendantes; ce qui occasionne un sautiller presque continu dans la marche de ces Oiseaux.

**COQ DE CAUX**, *Phasianus Patavius*, Lath. Variété du Coq domestique, qui le surpasse en taille presque du double.

**COQ CHAMOIS**. Variété du Coq huppé; elle est d'un jaune tirant sur le fauve.

**COQ DE CHOLCIDIÉ**. Variété anciennement très-recherchée du Coq domestique.

**COQ À CINQ DOIGTS**, *Phasianus pentadactylus*, Lath. Variété du Coq domestique; elle a cinq doigts : trois en devant et deux en arrière. Cette monstruosité s'est transmise de génération en génération.

**COQ COMMUN**. *✓* **COQ DOMESTIQUE**.

**COQ COULEUR DE FEU**. Variété du Coq huppé.

**COQ OU FAISAN COULEUR DE FEU**. *✓* **COQ IGNICOLOR**.

**COQ À CULOtte DE VÉLOURS**. Variété du Coq domestique; elle a le

ventre et les cuisses d'un beau noir valeté, la poitrine tachetée de la même teinte, une touffe de plumes noires sous la crête, et un cercle de plumes blanches autour des yeux; le bec est très-pointu et les pieds sont grêles.

**COQ D'INDU**. *✓* **COQ D'INDU**. Race javanaise assez élevée.

**COQ DOMESTIQUE**, *Gallus domesticus*, Briss. Cette espèce, dont les couleurs du plumage ont extrêmement varié, se distingue des autres principalement par la crête d'un rouge vif, charnue, festonnée et souvent disposée en couronne, qui orne sa tête, et par les deux appendices membraneux, de même nature, qui pendent de chaque côté de la mandibule inférieure; sa queue est composée de quatorze rectrices relevées en deux plans verticaux et dont les deux intermédiaires, plus longues et fortement arquées, retombent en panache flottant; tarses armés d'ergots longs et fortement acérés. La Poule, beaucoup plus petite que le Coq, n'a point, comme lui, le cou et l'extrémité du dos couverts de plumes longues et étroites.

**COQ DORÉ**. Coq huppé dont la couleur dominante du plumage est le jaune doré fortement lustré.

**COQ À DUVET DU JAPON**, *Phasianus lanatus*, Lath. Plumage entièrement blanc, composé de barbules inadhérentes entre elles, ce qui donne aux plumes une apparence de duvet; crête, joues et parties nues de la gorge d'un rouge vif tirant sur le pourpre; bec et pieds d'un gris blenâtre foncé : les derniers sont robustes et couverts de plumes extérieurement jusqu'à l'origine des doigts. Longueur, vingt-huit pouces. La Poule est plus petite, et la couleur de son plumage tire sur le gris.

**COQ À ÉCAILLE DE POISSON**. Variété du Coq huppé, dont les nœuds blanches, maillees, ressemblent à des écailles.

**COQ DE LA FLÈCHE**. *✓* **COQ DE CAUX**.

**COQ FRISÉ**, *Phasianus crispus*,

**Lath.** Cette espèce ou variété, que l'on assure être originaire des parties méridionales de l'Asie, est remarquable par la singulière disposition de ses plumes qui sont retournées et ont un aspect frisé. Ses couleurs sont aussi variées que celles du Coq domestique, et sa femelle est de la taille de la Poule ordinaire. Il est très-sensible au froid, ce qui est cause sans doute de sa rareté dans les pays du Nord.

• **COQ DE GATES.** *V.* **COQ SONNERAT.**

**COQ DE HAMBOURG.** *V.* **COQ A CULOTTE DE VELOURS.**

**COQ HERMINÉ.** Coq huppé blanc avec quelques taches noires.

**COQ HUPPÉ, *Phasianus cristatus*, Lath.** Diffère du Coq domestique en ce que la crête, extrêmement petite, est environnée et cachée par une touffe de plumes ordinairement assez longues et étroites, retombant en panache sur le bec. Ce Coq est souvent privé des caroncules membraneuses de la mandibule inférieure. La Poule, assez semblable à son Coq, est plus petite; elle n'a point de longues plumes étroites sur le cou. Les couleurs de cette race, dont l'origine n'est pas bien connue, varient considérablement; en général, on préfère le noir avec la huppe blanche, ou le blanc avec la huppe noire.

**COQ HUPPÉ D'ANGLETERRE.** Variété à huppe très-petite et à jambes fort élevées.

**COQ HUPPÉ TOUT BLANC.** Aldrovande, qui a figuré cette variété, lui donne une huppe conique et pointue.

**COQ IONICOLOR, *Phasianus ignitus*, Lath.** Parties supérieures d'un noir irisé, ainsi que la poitrine et le ventre; tectrices alaires noires avec une large zone d'un vert doré à leur extrémité; croupion garni de plumes larges, d'un rouge orangé, irisé en pourpre et en violet; rectrices intermédiaires longues, d'un roux clair; flancs variés de rouge orangé brillant; huppe de la couleur du dos, formée d'un gros bouquet de plumes droites à barbeles décomposées, en éventail; une membrane d'un rouge violet sur la joue, se terminant en pointe à l'angle du

bec. Longueur, vingt-cinq pour la femelle est moins grande; la sirième; elle n'a point de membrane saillante aux joues, et d'un brun mouton varié de brun clair et de noirâtre. De Sumatra.

**COQ D'ITALIE.** *V.* **COQ DE CAUX.**

**COQ DE L'ISTHME DE DARIN.** Race de petite taille, dont la queue, dit-on, est droite et fort épaisse; elle a à pied une manchette de plumes.

**COQ IAGO, *Gallus giganteus*, Temm.** Espèce encore trop peu connue pour pouvoir en donner la description; tout ce que l'on sait de positif, c'est que sa taille surpasse celle de toutes les autres espèces. De Sumatra.

**COQ DE JAVA.** Race fort grande, très-élevée sur ses jambes, dépourvue de crête et de huppe, avec la queue longue et pointue.

**COQ JAVAN.** *V.* **COQ BAKIVA.**

**COQ LAINEUX.** *V.* **COQ A DEUX DU JAPON.**

**COQ DE LOMBARDIE.** *V.* **COQ DE CAUX.**

**COQ MACARTNEY, *Gallus Macartneyi*, Temm.** *V.* **COQ MONKOLOR.**

**COQ DE MADAGASCAR.** Race de très-petite taille encore peu connue.

**COQ DU MANS.** *V.* **COQ DE CAUX.**

**COQ DE MADIE.** Race de grande et forte taille, très-recherchée des anciens, mais qui est maintenant oubliée.

**COQ DE MELON.** *V.* **COQ DE MONT.**

**COQ DE MOZAMBIQUE, *Gallus Moria*, Temm.** Plumage entièrement noir, ainsi que la peau et le périoste; crête dentelée d'un violet; mandibule, ainsi que les appendices membraneux de la mandibule inférieure; bec et pieds d'un bleu noirâtre. De l'Inde, d'où l'on prétend qu'il a été transporté dans l'Amérique méridionale.

**COQ NAIN D'ANGLETERRE.** Race très-petite, de la grosseur d'un petit Pigeon; sa couleur, originairement blanche, s'altère par les croisements.

**COQ NAIN DE LA CHINE.** Race encore plus petite que la précédente, et bigarrée de diverses couleurs.

**COQ NAIN DE JAVA, *Phasianus* P.**



*ilia*, Leth. Race très-petite et dont les pieds sont extrêmement courts. Il y a beaucoup de ressemblance avec le Coq nain d'Angleterre. Le Coq NAIN DE FRANCE paraît être la même race qui aurait acquis un peu de force.

COQ NAIN PATTU. De la taille d'un geon ordinaire; plumage blanc ou au contraire varié de jaune doré.

COQ NAIN PATTU D'ANGLETERRE. Paraît être la race précédente qui aurait acquis une double crête.

COQ NÈGRE. *V.* COQ DE MOZAMBIQUE.

COQ NOIR A HUPPE BLANCHE. *V.* COQ HUPPÉ.

COQ DE PADOUE. *V.* COQ DE CAUX.

COQ PATTU D'ANGLETERRE, *Phasianus plumipes*. Race de moyenne taille, non huppée, avec les pieds enroulés.

COQ PATTU DE FRANCE. Race un peu moins forte que la précédente et qui diffère encore en ce que souvent les doigts sont, ainsi que les pieds, couverts de plumes.

COQ PATTU DE SIAM. Moins grand que le Coq domestique; entièrement nu; pieds emplumés.

COQ DE PIÉGU. *V.* COQ DE CAUX.

COQ DE PERSE. Race qui, d'après ce qu'en dit Chardin, a beaucoup de rapports avec le Coq de Caux.

COQ PÉRINET. *V.* COQ ARDOISÉ.

COQ (PETIT) DE PIÉGU. On assure qu'il n'est pas plus gros qu'une Tourterelle.

COQ DES PHILIPPINES. Paraît être la même race que le Coq huppé d'Angleterre.

COQ PIERRE. Variété du Coq huppé dont le fond du plumage est blanc orné de diverses teintes.

COQ PORTER-SOKE. *V.* COQ A DUVET JAPON.

COQ DE RHODES. Race très-grande dont on a négligé à cause de son peu d'utilité dans les basse-cours.

COQ SANS CROUPE. *V.* COQ WALLIKIKITI.

COQ SANS PLUMES. Race douteuse paraît n'être autre que le Coq domestique auquel on arrache les plu-

COQ SANS QUEUE, *Phasianus scutellatus*, Leth. *V.* COQ WALLIKIKITI.

COQ DE SANSEVARRA. Race potée qui, au rapport de Tavernier, est d'une taille gigantesque.

COQ A SIX DOIGTS. Monstruosité dans la race du Coq domestique.

COQ SONNERAT, *Gallus Sonnerati*, Vieill. Tête et cou garnis de longues plumes étroites, aplaties, à barbes dénouées et soyeuses, terminées par une espèce de palette ovale, d'un gris de perle luisant, bordée de roussâtre; plumes du dos longues, étroites, rayées de blanc et de noir; rémiges variées de roux et de blanchâtre, rayées de noir et de blanc; rectrices caudales longues, flottantes, d'un violet noirâtre, irisées; quatorze rectrices relevées en deux plans verticaux, les deux intermédiaires longues et arquées; poitrine d'un roux luisant; parties inférieures garnies d'un duvet noir et blanc; tête ornée d'une crête d'un rouge vif, aplatie sur les côtés et découpée; joues, côtés et dessous de la gorge nus, ainsi qu'une ligne longitudinale sur le sommet de la tête; une tache de très-petites plumes grises entre la crête et l'œil; bec et pieds noirâtres; ergots coniques, allongés et pointus. Longueur totale, vingt-huit pouces. La Poule est plus petite et diffère peu de la Poule domestique. De l'Inde.

COQ DE TANAGRA. Race ancienne sur l'existence de laquelle l'opinion n'est pas bien fixée.

COQ TOUT NOIR. Variété qui paraît identique avec le Coq de Mozambique.

COQ DE TURQUIE. Variété du Coq domestique, remarquable par la beauté de son plumage où s'étendent des nuances d'or ou d'argent sur un fond ordinairement blanchâtre; ailes noires; queue verte et noire; pieds bleuâtres; la tête quelquefois ornée d'une huppe.

COQ VEUF. Variété du Coq huppé; des petites taches blanches sur un fond noirâtre.

COQ VILLAGEOIS. *V.* COQ DOMESTIQUE.

COQ WALLIKIKITI, *Gallus scutellatus*.

*clatus*, Temm. Plumes des parties supérieures d'un roux orangé; celles de la nuque noires, bordées de jaune, longues, effilées, à barbules décomposées; rémiges d'un brun mat; tectrices alaires intermédiaires noires, irisées en violet; plumes du bas du dos longues, effilées, arquées, d'un brun violet irisé; celles des parties inférieures brunes, bordées de jaune orangé; bas de la gorge noir, à reflets violets et pourpres; crête entière d'un rouge brillant, ainsi que les deux appendices de la mandibule inférieure; joues, oreilles et partie de la gorge nues; point de queue ni même de croupion; bec et pieds d'un gris brun; éperons robustes et très-aigus. Longueur, quinze pouces. Cette espèce, à laquelle on avait donné, lorsqu'elle était moins connue, la Perse et successivement l'Amérique septentrionale pour patrie, est originaire de Ceylan où le nom de Wallikiki peut se traduire par celui de Coq sauvage; elle y construit son nid à peu près comme le font les Perdrix, il est composé d'herbes amoncelées sans ordre.

On a étendu le nom de Coq à beaucoup d'Oiseaux qui n'ont avec le genre dont il vient d'être question que peu ou point de rapports. Ainsi l'on a appelé :

COQ D'AMÉRIQUE (Frish), le Hocco. *V.* ce mot.

COQ DE BOIS, à la Guiane, le Coq de roche, *Pipra rupicola*, L. *V.* RUPICOLE. On donne encore le même nom au *Tetrao Urogallus*, L., et à la Huppe, *Upupa Epops*, L.

COQ DES BOIS D'AMÉRIQUE, le Tétrás Cupidon, *Tetrao Cupido*, Lath., et la Gélinoite à fraise, *Tetrao umbellatus*, L.

COQ DE BOIS D'ÉCOSSE (Gesner), le Tétrás rouge, *Tetrao Scoticus*, Lath.

COQ DE BOULEAU, le Tétrás Birkhan, *Tetrao Tetrix*.

COQ BRUANT, le Tétrás Auerhan, *Tetrao Urogallus*, L. *V.* TÉTRAS.

COQ DE BRUYÈRE BRUN ET TACHETÉ (Ellis), la Gélinoite tachetée, *Tetrao canadensis*, L.

COQ DE BRUYÈRE À FRAISE (Bafson), le *Tetrao umbellatus*, L.

COQ DE BRUYÈRE (GRAND), le Tétrás Auerhan, *Tetrao Urogallus*.

COQ DE BRUYÈRE À LONGUE QUEUE DE LA BAIE D'HUDSON, la Gélinoite à longue queue, *Tetrao phasianellus*.

COQ DE BRUYÈRE NOIR ET MARQUETÉ (Edwards), la Gélinoite tachetée, *Tetrao canadensis*. *V.* TÉTRAS.

COQ DE BRUYÈRE (PETIT) À DEUX FILETS À LA QUEUE, le *Ganga Cata*, *Tetrao Alchata*, L. *V.* GANGA.

COQ DE BRUYÈRE PIQUETÉ, le Tétrás des Saules, *Tetrao albus*.

COQ DE BRUYÈRE À QUEUE FOURCHUE, le Tétrás Birkhan, *Tetrao Tetrix*, L. *V.* TÉTRAS.

COQ DE CURAÇAO, le Hocco de Curaçao, *Crax globicera*, L. *V.* HOCO.

COQ D'ÊTRE, la Huppe, *Upupa Epops*, L. *V.* HUPPE.

\* COQ DIDO, d'après Gaimard, la grande Pie-Grièche de Levaillant (*Lanius corvinus*, Shaw) à Timor, dans les Moluques.

COQ D'INDE, le Dindon, *Meleagris Gallopavo*, L. *V.* DINDON.

COQ INDIEN, le Hocco de Guiane, *Crax Alector*, L. *V.* HOCO.

COQ DE LIMOGES, le Tétrás Auerhan, *Tetrao Urogallus*, L.

COQ DE MARAIS, la Gélinoite, *Tetrao Bonasia*, L. *V.* TÉTRAS.

COQ DE MER, le Canard à longue queue, *Anas acuta*, L. *V.* CANARD.

COQ DE MONTAGNE, le Tétrás Auerhan, *Tetrao Urogallus*, L. *V.* TÉTRAS. On donne encore ce nom, au cap de Bonne-Espérance, à diverses espèces d'Aigles.

COQ NOIR (Gesner), le Tétrás Rakkelhan, *Tetrao medius*, Meyer. *V.* TÉTRAS.

COQ PUANT, la Huppe, *Upupa Epops*, L. *V.* HUPPE.

COQ DE ROCHE, le Rupicole, *Pipra rupicola*, L., Buff., pl. enl. 39. *V.* RUPICOLE.

COQ SAUVAGE, le Tétrás à queue fourchue, *Tetrao Tetrix*, L. *V.* TÉTRAS. (DESS.)

Selon Maraden, les Malais désignent les Coqs sous le nom générique *Ayam*: *Ayam Mandar* est le Poulet; *Am Atas*, le Coq sauvage; *Ayam mkeiva*, une race de métis; *Ayam trogo*, une Poule des bois; *Ayam am*, une Perdrix, etc. (B.)

COQ. POIS. Nom vulgaire du *Zeus allus*. V. GAL. (B.)

COQ. MOLL. FOSS. L'un des noms vulgaires des Térébratules qu'on donne aussi Poule et Poulette. (B.)

\* COQ DE MER. CRUST. V. CALIPEPE.

\* COQ DORÉ. POIS. Syn. du *Zeus omer*, L., au Brésil. V. VOMER. (B.)

COQ DES JARDINS, HERBE  
OU COQ OU MENTHE COQ. BOT.  
FRAN. Noms vulgaires du *Tanacetum balsamita*, L., ou *Balsamita suaveolens*, Desf. V. TANAISIE et BALAMITE. (B.)

COQU. OIS. Syn. vulgaire et ancien du *Coqueu*, *Cuculus Canorus*, L. V. COCOU. (DR..Z.)

COQUALIN. MAM. Nom vulgaire du *Sciurus variegatus*, L. V. ÉCUREUIL. (B.)

\* COQUANT. OIS. Syn. vulgaire de Marouette, *Rallus Porzana*, L. V. PALLINULE. (DR..Z.)

\* COQUANTOTOTL. OIS. V. CAQUANTOTOTL.

COQUAR. OIS. Nom donné au coq provenant du croisement du coq avec la Poule de basse-cour. (DR..Z.)

\* COQUAR. BOT. PHAN. On donne ce nom, dans le midi de la France, à une variété très-double de la Rose de Provins. (B.)

COQUE. OIS. V. OEUF.

COQUE. INS. V. COCON.

COQUE. COCCA. BOT. PHAN. On désigne communément sous ce nom chacune des parties d'un péricarpe sec, plus ou moins sphéroïdal et présentant à son contour des bosses ou côtes bien manifestes, et ordinairement en nombre déterminé, séparées

par autant d'enfoncements ou de sillons longitudinaux, et se détachant les uns des autres par la séparation de leurs cloisons en deux lames. De là les noms de fruits *Bicoque*, *Tricoque*, etc. Cependant Gaertner a donné à ce mot une autre signification, en l'appliquant au fruit lui-même qui se compose ainsi de plusieurs parties séparables les uns des autres. Voici la manière dont il le définit: fruit pluriloculaire, oligosperme, muni d'une columelle centrale, s'ouvrant ordinairement par les cloisons en autant de loges distinctes et renfermant exactement une ou deux graines renversées. La paroi interne de ces loges est cartilagineuse ou même osseuse, et se rompt ordinairement avec élasticité en se dépoilant plus ou moins complètement de la partie extérieure du fruit.

La vaste famille des Euphorbiacées nous offre des exemples nombreux de Coques. C'est à cette espèce de fruit que, dans sa nomenclature carpologique, le professeur Richard donne le nom d'Élatérie, *Elaterium*, nom qui nous paraît devoir être préféré à cause des acceptions diverses données au mot Coque. V. ELATÉRIE. (A. R.)

COQUECULE. BOT. PHAN. Pour *Cocculus*. V. ce mot. (B.)

COQUE DU LEVANT OU COQUES DU LEVANT. BOT. PHAN. Fruits du *Menispermum Cocculus*. V. COCCULUS. (B.)

COQUELICOT. BOT. PHAN. Espèce fort commune du genre Pavot. V. ce mot. (B.)

COQUELOURDE. BOT. PHAN. Nom vulgaire appliqué au *Narcissus Pseudo-Narcissus*, à l'*Anemone coronaria* ainsi qu'au *Pulsatilla*, mais plus particulièrement à l'*Agrostema coronaria*. V. AGROSTÈME. (B.)

COQUELUCHE. OIS. (Montbeillard.) Syn. du mâle de l'Ortolan des Roseaux, *Emberiza Schanickus*, L. V. BRUANT. (DR..Z.)

COQUELUCHIOLE. *Cornucopia*. BOT. PHAN. C'est un genre de Plantes

de la famille des *Gymniniées*, qui ne comprend aujourd'hui qu'une seule espèce, le *Cornucopia catartica*, L., Beauv. *Agg.* t. 4, fig. 3, 4; L'enc. *Agg.* t. 40. Originaire d'Orient, cette petite plante est annuelle. Ses chaumes sont rameux et de six à huit poises de hauteur ; portant des feuilles dont la gaine est renflée et comme vésiculeuse. De la gaine des feuilles supérieures, qui sont courtes, naissent plusieurs pédoncules intégraux, recourbés, simples et terminés chacun par un involucre infundibuliforme, crénelé à son bord et strié longitudinalement. Dans l'intérieur de chaque involucre, on trouve un assez grand nombre de fleurs hermaphrodites, pressées les unes contre les autres et formant un capitule ovoïde, allongé, qui dépasse un peu l'involucre dans sa partie supérieure. Chaque fleur offre l'organisation suivante : la lépée est composée de deux valves carenées, égales, obtuses, mutiques, soudées l'une à l'autre par leur partie inférieure, quelquefois même jusqu'au milieu de leur hauteur. La glume est formée d'une seule paillette de la même hauteur et quelquefois plus longue que la glume, bifide et obtuse à son sommet, recourbée autour des organes sexuels qu'elle recouvre entièrement. Les étamines sont au nombre de trois. Leurs filets sont capillaires et leurs anthères bifides aux deux extrémités. L'ovaire est ovoïde, allongé, surmonté d'un style court et glabre qui se termine par deux stigmates capillaires et velus. Quelquefois il n'y a qu'un seul stigmate. La glumelle n'existe pas. Le fruit est recouvert par les écailles florales.

Ce genre fait partie de la section des *Agrostioides*. Il est très-voisin de l'*Alopecurus* dont il diffère par son involucre, par son style simple et ses écailles florales toutes mutiques, c'est-à-dire dépourvues d'arête. Plusieurs espèces qui y avaient été placées ont été portées dans d'autres genres. Ainsi le *Cornucopia alopecuroides*, L., est l'*Alopecurus utricula-*

*rus* de Schrader. Le *Cornucopia ul-tissimum* de Walther est l'*Elyostia* dispar de Michaux; les *Cornucopia hyemalis* et *perennans* de Walther sont partie du genre *Trichodium* de Richard. (A. R.)

### COQUELUCHON DE MOINE.

MOLL. Nom vulgaire d'une espèce du genre *Arche*. V. ce mot.

### COQUEMELLE. BOT. CRYPT.

(*Champignons*.) On donne ce nom ou celui de *Cocumelle* dans beaucoup de provinces, et particulièrement dans l'ouest de la France, à l'*Agaricus procerus* (*Agaricus colubrinus*, Bull., t. 78). Cette espèce, très-facile à reconnaître à son chapeau ou large parasol légèrement convexe, d'une couleur un peu bistre, couvert de taches d'un brun plus foncé, à son pédicule creux, renflé en un gros tubercule à la base, moucheté de brun, et qui porte vers sa partie supérieure un collier ou anneau libre : à la chair sèche, odorante, et est très-bonne à manger ; elle a un goût beaucoup plus délicat que le *Champignon de couche*, et elle est très-estimée dans les provinces où elle croît abondamment. Elle est connue dans quelques-unes sous le nom de *Grisette*.

Il paraît qu'on donne, dans le midi de la France, le même nom de *Coquemelle* ou *Coucounelle* à l'*Orange blanche* (*Agaricus ovoides*, DeCand., Fl. F., n. 562, 4). Cette espèce est aussi très-estimée. V. ORANGE. (AD. B.)

### COQUEMOLLIER. BOT. PHAN.

Nom vulgaire adopté par quelques botanistes comme la désignation française du genre *Théophrastée*. V. ce mot. (B.)

### COQUERELLE. BOT. PHAN.

La Noisette dans ses enveloppes avant son entière maturité. On a aussi donné ce nom à l'*Alkekengi*. V. PERSALIDE. (B.)

### COQUERET. BOT. PHAN.

Vieux nom français de l'*Alkekengi*, *Physalis Alkekengi*, donné par quelques bo-

nistes modernes pour celui du genre *Coccyzoides*. *V.* ce mot. (B.)

COQUESIGRUE. BOT. PHAN. Membre d'une chose que Coccigrua. *V.* ce mot. (B.)

COQUETON. BOT. PHAN. Vieux nom du Narcisse. (B.)

COQUETTE. POIS. Nom vulgaire d'une Brédée, espèce du genre *Chaetodon* des Antilles. (B.)

COQUETTE. INS. Nom vulgaire d'un *Cossus* de l'Hippocastane. *V.* Cossus. (B.)

COQUETTE. BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires du *Cyclame* d'Europe une variété de la *Laitue* cultivée. (B.)

COQUILLADE. ORN. (Buffon.) Syn. Cochevis, *Alauda cristata*, L. *V.* COQUETTE. (DR. Z.)

COQUILLADE. POIS. Espèce du genre *Blennius*. *V.* ce mot. (B.)

COQUILLAGE. MOLL. C'est ainsi que les écrivains du siècle dernier désignaient les Mollusques à coquilles. Cette expression n'est plus en usage ; elle est d'ailleurs particulièrement le nom de l'Animal qui possède la Coquille. (D. H.)

COQUILLE. MOLL. On entend par ce mot un corps testacé calcaire, le plus souvent extérieur, quelquefois intérieur, c'est-à-dire développé à l'épaisseur de la peau d'un animal mollusque, mais, dans tous les cas, destiné à protéger l'Animal ou certaines de ses parties contre les chocs extérieurs. Plusieurs Animaux, autres que les Mollusques, sont revêtus de tels protecteurs. Tels sont les Echinodermes ou Oursins, quelques Annelides, les Crustacés ; mais on ne peut confondre tous ces corps avec les véritables Coquilles. On distinguera les Oursins des Coquilles par leur porosité et leur cassure pommée, régulière, ce qui n'arrive jamais dans la Coquille dont la cassure est nette, quelquefois écailleuse ; on connaît les tests des Annelides, en ce qu'ils sont tubuleux, arqués ou irrégulièrement contournés sur eux-

mêmes, et ne renferment jamais de pièces accessoires comparables à des valves de Conchifères. Il est très-facile d'apercevoir les différences qui existent entre une véritable Coquille et le test d'un Crustacé : l'une est articulée à charnière dans deux de ses principales parties ; l'autre, au contraire, présente un grand nombre d'articulations pour les mouvements partiels des appendices ou des membres. Pour faciliter l'étude de la glossologie, nous diviserons cet article en trois parties : la première s'occupera des Coquilles des Cirrhipèdes, ou de la plupart des Multivalves des anciens ; la seconde, des Coquilles des Conchifères ou Bivalves ; et la troisième, de celles des Mollusques proprement dits ou Univalves.

#### *Des Coquilles multivalves.*

Les anciens, sous cette dénomination, rangeaient une multitude de corps différents : les Oursins, les Tuyaux marins, les Potée-Pieds, les Pholades, les Tarrets, etc. Aujourd'hui, que l'on a remis chaque chose à sa place plus convenable ; on ne peut plus entendre par Multivalves que les Coquilles des Cirrhipèdes, dont les parties ne sont point articulées en charnière, mais simplement soudées entre elles ou réunies par la peau elle-même où elles se sont développées. Nous renvoyons, pour beaucoup de détails, aux articles CIRRHIPÈDES ; BALANE, ANATIFE, et nous ajoutons seulement que l'on nomme *sériales*, dans les Cirrhipèdes pédonculés, des pièces dorsales symétriques, c'est-à-dire, qui, étant divisées par une ligne médiane, présentent deux parties parfaitement semblables, et *latérales*, celles qui forment, par leur plus ou moins grand nombre et par leur étendue variable, les parties latérales du test. Toutes ces pièces sont réunies au moyen du manteau ou de la peau dans laquelle elles se sont formées ; elles sont symétriques par paires, et ne sont point articulées ; quelquefois elles reposent les unes sur les autres par des biseaux réci-

proches. Dans les Cirrhipèdes sessiles ou fixes, toutes les pièces, le plus souvent soudées entre elles, viennent se grouper autour d'une cavité centrale occupée par l'Animal. Cette cavité est quelquefois ouverte inférieurement, mais elle est toujours close supérieurement par deux ou quatre petites pièces mobiles dont l'ensemble se nomme opercule.

### *Des Coquilles bivalves.*

Les Coquilles bivalves, ou formées de deux parties principales articulées à charnière, peuvent être considérées de plusieurs manières; mais avant tout, il est nécessaire de convenir dans quelle position nous les placerons, pour qu'il n'y ait point d'équivoque dans la position relative des parties. Si nous suivons ce que nous enseigne Linné, nous poserons la Coquille bivalve sur les crochets, de manière que le ligament se trouve en face de l'observateur. La valve droite est conséquemment à la droite, et la gauche à la gauche de celui qui observe la Coquille. Cette position, qui est arbitraire, n'a pas été admise par tous les conchyliologues. Bruguière, au lieu de placer le ligament devant l'observateur, le met à l'opposé, ce qui retourne la Coquille sur elle-même et sur le même plan; alors la valve qui, dans la manière de Linné, était à droite, est à gauche dans celle de Bruguière, et réciproquement. Une autre méthode a été proposée par Blainville dans le Dictionnaire des Sciences naturelles; il prétend que la manière la plus convenable est celle qui consiste à mettre la Coquille dans la position qu'elle a sur l'Animal, lorsqu'il marche devant l'observateur, c'est-à-dire placer la Coquille sur son bord tranchant, les crochets en arrière, le ligament en haut et en avant, ce qui fait que les valves restent réellement dans les mêmes rapports avec l'observateur, que dans la manière de Linné; la valve droite reste à droite et la valve gauche à gauche. Cette méthode vaut beaucoup mieux que les autres: aussi

nous l'adopterons, et au lieu de nommer base la région des crochets, nous dirons que c'est le bord antérieur; le bord inférieur est celui qui est libre et tranchant; le bord antérieur, quelquefois allongé, plus ou moins en bec, est celui qui donne passage aux siphons que porte l'Animal, et où vient s'insérer le ligament, et le bord postérieur, celui où se trouvent la courbure des crochets ainsi que la lunule. Nous donnerons tout à l'heure la définition de toutes ces parties; il y a également, pour la Coquille prise dans son ensemble, deux faces latérales qui correspondent à chacune des valves: ces faces sont bombées le plus ordinairement, quelquefois aplaties; d'autres fois l'une est bombée et l'autre plate. Nous examinerons bientôt tous ces détails.

On peut considérer les Coquilles des Conchifères, d'après leur habitation, en fluviatiles et en marines. Les fluviatiles sont celles qui vivent dans les eaux douces, et elles se distinguent en général par la nature et la couleur de l'épiderme qui les recouvre; celui-ci étant brun foncé ou vert foncé, et le plus souvent détruit, rongé vers les crochets: aussi dit-on que les Coquilles fluviatiles ont les crochets rongés ou cariés, lorsque l'épiderme et quelquefois même une partie de l'épaisseur du test se trouvent enlevés dans cet endroit. Il est plus difficile qu'on ne l'imagine vulgairement de préciser au juste les genres qui appartiennent à l'eau douce, pour les séparer de ceux qui ne se trouvent que dans la mer. En effet, des *Elmides* ont été trouvées dans le Nil, et des *Uvulles* dans le Danube; ce qui, d'après ces observations récentes et authentiques, nous jette dans un embarras que les anciens conchyliologues ne connaissaient pas. Quoi qu'il en soit, il est encore difficile, dans l'état actuel de la science, de décider si ce sont les Coquilles marines qui, subissant des modifications, ont peuplé les eaux douces, ou si ce sont, au contraire, celles des eaux douces qui, descen-

nes dans la mer, y ont éprouvé les changements considérables qui constituent la différence existante entre ces-ci et les dernières. On peut dire seulement, encore avec la circonspection nécessaire lorsqu'il est question d'un fait qui n'est pas absolument matériel, mais simplement probable, qu'il y a des Coquilles marines qui, s'habituant d'abord à vivre à l'embouchure des fleuves dans des eaux peu salées, sont insensiblement accoutumées à vivre dans un milieu différent, et ont prouvé, par ce changement, des modifications plus ou moins notables. On est de même pour quelques espèces fluviales, qui peu à peu sont venues des races marines en prenant tous les caractères de celles-ci, et ont conservé qu'une analogie éloignée avec leur type primitif. Les Coquilles marines se distinguent, en général, en ce qu'elles sont presque toujours dépourvues d'épiderme, et qu'elles sont ordinairement chargées de côtes, d'aspérités, de sillons, d'écailles, etc.

On peut également considérer les Coquilles bivalves, sous le rapport de la fixité, en *libres* et en *adhérentes*. Les Coquilles libres sont celles qui ne sont retenues par aucune attache et qui peuvent changer de lieu, à chaque moment, à l'aide du pied de l'Animal qui les habite. Les Coquilles adhérentes sont celles qui se fixent aux corps sous-marins, plus ou moins immédiatement par différens moyens. Les unes, comme les Ostracées et les Camacées, se fixent immédiatement, par la propre substance de la Coquille, sur les corps environnans; d'autres, comme les Dilacées et les Mallacées, se fixent au moyen de ce qu'on appelle *Bysus*; d'autres enfin ne sont fixées que par un ligament postérieur qui s'attache aux crochets, comme dans les Brachiopodes, les Térébratules, les Lingules. Sous le rapport de la manière particulière de vivre, on trouve parmi les Bivalves : des *Tubicoles* qui vivent dans l'intérieur d'un tube accessoire aux valves; des

*Leignicoles* qui habitent dans le bois; des *Pétricoles* qui ont la faculté de percer la pierre, en la dissolvant pour y demeurer à l'abri des accidens extérieurs; des *Arénicoles* qui vivent enfoncées dans le sable, etc. — Le plus grand nombre des Coquilles bivalves sont *symétriques*, c'est-à-dire formées de deux parties absolument semblables; quelques-unes pourtant ne le sont pas, et elles rentrent parmi celles que l'on nomme *Inéquivalves*. Les Coquilles *Equivalves* présentent deux valves semblables et égales dans toutes leurs dimensions; les *Inéquivalves* ont une valve plus grande ou plus profonde que l'autre. Parmi celles-ci, on en remarque qui sont *régulières*, et d'autres *irrégulières*; les premières sont celles dont tous les individus d'une même espèce sont absolument pareils; les Corbulées en sont un exemple. Les irrégulières présentent au contraire des différences dans les individus de même espèce, comme les Camacées et les Ostracées le font voir. — On entend par *Equilatérale*, une Coquille qui, partagée par une ligne médiane, dirigée des crochets vers le milieu du bord inférieur, présente deux parties semblables; *Subéquilatérale*, celle dont les deux parties sont presque semblables, et *Inéquilatérale*, celle dont les deux parties ne présentent aucune similitude. Toutes les Coquilles qui ne sont pas closes exactement, sont dites *baillantes*; c'est ainsi que les Tubicoles, les Pholadaires, les Solénacées, etc., remplissent toutes des Coquilles baillantes. Par opposition, on nomme *closes* toutes les Coquilles dont les bords rapprochés ne laissent aucune ouverture, comme dans les Conques soit marines soit fluviales. Toutes les fois que l'espace compris entre les crochets et le milieu du bord inférieur est plus grand que celui compris dans un diamètre opposé, on nomme la Coquille *longitudinale*, comme dans les Mytilacées; lorsque, au contraire, la ligne comprise entre le bord antérieur et le bord postérieur, est plus grande que celle qui descend perpendiculairement

des crochets, on dit que la Coquille est *transversale*, comme dans les Solénacées.

— Si l'on considère les accidens particuliers à quelques genres et même à quelques espèces, on dira qu'une Coquille est *auriculée*, toutes les fois que de chaque côté des crochets, ou d'un côté seulement, elle présentera des appendices saillans, comme dans les Peignes; qu'elle est *rostrée* lorsqu'une de ses faces, ou les deux, présentent à un des angles un appendice plus ou moins long, comme dans quelques Anatinés, quelques Tellines, etc.; *barbue*, lorsque l'épiderme qui la recouvre est divisé en un grand nombre de poils roides, comme dans quelques Arches; *tronquée*, si elle offre ses valves comme coupées dans une de leurs parties: quelques Donacées, quelques Bucardes en donnent des exemples. Quant à ce qui concerne la forme générale de la Coquille, on la dit *cylindrique* lorsque, également bombée des deux côtés, elle présente à peu près la forme d'un cylindre, comme quelques Modioles, surtout les Lithodomes, Cuv.; *orbiculaire*; lorsque les valves, prises dans leur centre, présentent leurs bords également ou presque également éloignés: telles sont quelques Cythérées, une Haliote à cause de cela nommée *orbiculaire*; *globuleuse*, quand les valves très-gonflées présentent chacune la forme exacte d'un hémisphère; *lenticulaire*, lorsque le centre, étant le point le plus élevé, diminue régulièrement en s'amincissant vers les bords, à peu près comme dans les Verres lenticulaires. On dit également qu'une Coquille est *comprimée* lorsque la cavité qui est entre les deux valves est peu considérable en épaisseur, la Coquille paraissant aplatie au-delà de ce qu'elle l'est ordinairement: la Cythérée écrite est une Coquille comprimée; *cordée*, toutes les fois qu'elle présente la forme d'un cœur, comme quelques Bucardes et surtout les Hémicardes, Cuv., ainsi que les Isocardes, etc.; *linguiforme*, lorsqu'elle est aplatie, allongée et oblongue, comme

les Vulselles et la Lingule; *naviculaire* ou *rhomboïdale*, celle qui approche dans la coupe *transversale* de la figure d'un petit bateau ou d'une nacelle, comme quelques Arches, les Cucullées, etc.; *courbée*, lorsqu'elle est comme ployée dans toutes les parties, et s'approche plus ou moins du demi-cercle: une très-petite espèce de Modiole fossile, ainsi que quelques Arches et des Cardites, en offrent l'exemple; *pliée*, toutes les fois que les valves présentent, l'une un pli saillant, et l'autre un pli rentrant, destiné à recevoir le premier: ce caractère est très-sensible dans toutes les Tellines. L'expression *linéaire*, enfin, s'applique à toutes les Coquilles dont une des dimensions surpasse l'autre de beaucoup, comme dans le Solen Sabre, le Solen Gatne, etc.

Pour mettre autant que possible de la méthode dans l'exposition des définitions nombreuses qui ont une application plus directe et qui sont d'une connaissance plus nécessaire, nous considérerons: 1<sup>o</sup> la face extérieure des valves; 2<sup>o</sup> leur face interne; 3<sup>o</sup> les bords; 4<sup>o</sup> les moyens que la nature a employés pour réunir et tenir en contact les deux valves principales et les parties accessoires lorsqu'elles en présentent.

1<sup>o</sup>. La face extérieure des valves est toute cette surface, le plus souvent convexe, comprise entre les crochets, la lunule, l'insertion du ligament et les bords. Cette surface est *lisse* lorsque, dans sa courbure, aucun de ses points ne s'élève plus qu'un autre. C'est ainsi que la Telline Soleil-Levant, que beaucoup de Solens, de Cythérées, etc., etc., sont des Coquilles lisses; *raboteuse*, lorsque des aspérités tronquées, relevées comme celles d'une rape, se présentent à la surface, comme dans la Telline raboteuse, vulgairement la Langue de Chat; *striée*, *sillonée* et à *côtes*: ces trois mots expriment la même chose quant au fond; il n'y a de différence que du plus au moins. Une Coquille est *striée* lorsque des enfoncemens et des élévations concentriques ou



youngantes, très-serrées et très-dé-  
 lées, se voient à la surface; elle est  
 lonnée lorsque ces alternatives  
 ut plus espacées et plus grosses, et  
 le est à côtes lorsque ces espaces sont  
 core plus grands et plus relevés.  
 es stries, sillons ou côtes, sont ai-  
 us, trachans, carrés ou arrondis;  
 a dit qu'ils sont *perpendiculaires*  
 u *longitudinaux* lorsque, partant  
 es crochets, ils viennent se termi-  
 er au bord de la Coquille, comme  
 les Vénérécordes, les Bucardes,  
 a; ils sont *obliques* lorsqu'ils cou-  
 ent obliquement les deux plans de  
 Coquille; ils sont *transverses*  
 and ils vont du bord antérieur au  
 ord postérieur, en suivant parallèle-  
 ment le bord inférieur de la Coquille.  
 n entend par Coquille *treillisée*  
 elle dont la surface présente ou des  
 ries, ou des sillons, ou des côtes per-  
 andiculaires, rencontrés ou traver-  
 sés par d'autres transverses. Cette  
 pression est synonyme de pectinée;  
*lamelleuse*, lorsque les stries ou les  
 llons, au lieu d'être obtus et élargis  
 la base, sont relevés en lames plus  
 moins minces, plus ou moins éle-  
 és et plus ou moins nombreuses.  
 est ainsi que cette belle Vénus lé-  
 utine, la Crassatelle lamelleuse,  
 c., sont des Coquilles lamelleuses. Il  
 a cette différence entre lamelleuse  
 feuilletée, que la première a un test  
 lide à la surface duquel on remar-  
 ue des lames saillantes, et qu'à la  
 conde c'est le test lui-même qui est  
 rmé de beaucoup de feuilletés réunis  
 nt les extrémités font souvent sail-  
 au dehors, comme dans les Hui-  
 s, par exemple; *crépue*, lorsque  
 surface étant lamelleuse, ces la-  
 es sont découpées régulièrement et  
 quelqfois traversées à angle droit  
 des sillons. La Pholade crépue et  
 elques autres du même genre, les  
 rbeilles, la Vénus crépue, présen-  
 t cette structure; *ondulée*, toutes  
 fois que les lames, les stries, les sil-  
 ls et les côtes, au lieu d'être dirigés  
 ulièrement d'un point vers un au-  
 tre, sont brisés plusieurs fois en fai-  
 ant divers angles: telles sont les

stries du Solen rose, les côtes de la  
 Moule de Magellan, de quelques Pin-  
 nes, de plusieurs Huîtres pétrifiées  
 ou fossiles, etc.; *nodulense*, lorsque  
 des séries plus ou moins régulières,  
 de petites élévations arrondies, se  
 montrent sur certains points de la  
 Coquille vers le corselet ou la lunu-  
 le. On l'appelle quelquefois *verru-  
 queuse*, telle est la *Venus verrucosa*,  
 et même *tuberculense*, lorsque des  
 élévations sont placées sur une base  
 plus large, comme dans quelques  
 Trigones pétrifiées; *rustinée*, lors-  
 que les côtes perpendiculaires dont  
 est garnie la surface se trouvent coup-  
 pées transversalement par des stries  
 d'accroissement. Les stries d'accrois-  
 sement se distinguent des autres en  
 ce qu'elles sont irrégulièrement espa-  
 cées, et sont même un défaut dans  
 la Coquille lorsqu'elles sont trop ap-  
 parentes.

Une Coquille *épineuse* est celle qui  
 présente sur toute sa surface ou seule-  
 ment sur quelques-unes de ses par-  
 ties, des cônes allongés, pointus, qui  
 y sont implantés par la base. Les épi-  
 nes sont courtes, longues, courbées,  
 tubuleuses. La Bucarde épineuse est  
 couverte d'épines sur toute sa surface;  
 la Cythérée épineuse n'en présente  
 qu'autour du corselet; elle est *écail-  
 leuse* lorsque les côtes ou la surface  
 présentent des éminences minces,  
 aplaties et saillantes, toujours sépa-  
 rées des voisines par une échancrure  
 qui se prolonge jusqu'à sa base, où  
 par l'espace qui sépare les sillons ou  
 les côtes sur lesquelles elles sont  
 fixées. Les écailles peuvent être sim-  
 ples, c'est-à-dire non découpées à  
 leur bord, comme dans les Bénéitiers.  
 Elles peuvent être découpées ou divi-  
 sées à leur circonférence en plu-  
 sieurs appendices inégaux, comme  
 dans la Came feuilletée. Elles devien-  
 nent quelquefois *tubuleuses* lorsque;  
 les deux bords venant à se rappro-  
 cher et à se confondre, elles présen-  
 tent un véritable tube cylindrique,  
 comme il arrive souvent dans la Bu-  
 ne rouge. Elles sont *surtées* quand el-  
 les sont placées les unes au-dessus des

autres sur des lignes parallèles ou sur les côtes de la Coquille, rangées de la même manière que des tuiles sur un toit; et enfin elles sont *voûtées* lorsqu'elles sont convexes d'un côté et concaves de l'autre. Une Coquille *rayonnée* est pour nous la même que celle qui est à côtes. Que les côtes partent d'un point ou d'un autre pour prendre une direction quelconque, ce ne sont pas moins des côtes, et nous pensons que Linné et Bruguière ont à tort séparé, par deux expressions deux choses semblables. Effectivement, ils ont entendu par rayons les côtes qui descendent des crochets vers le bord des valves, par Coquille rayonnée celle qui présente à sa surface cette disposition, comme la plupart des Peignes, et ils ont réservé le nom de côtes à celles qui suivent la direction des bords de la Coquille et qui lui sont parallèles. Nous croyons qu'il faut mieux désigner la direction des côtes, comme nous l'avons fait précédemment pour les stries, les sillons et les côtes, en perpendiculaires, longitudinales et obliques. Avant de terminer ce qui a rapport à la surface des valves, nous dirons que l'on est convenu d'appeler *capot* la partie la plus saillante de la Coquille; *désigne* cette partie convexe qui est au-dessous du ventre; et *timbe* la circonférence des valves depuis le disque jusqu'aux bords. Ces dénominations, qui ne sont presque plus usitées, présentent peu d'exactitude dans l'application qu'on en pourrait faire, puisqu'on ne peut en déterminer les limites qu'arbitrairement. Nous ajouterons également que l'on est convenu de nommer *carenée* la Coquille dont une partie offre une côte; *aiguë* et *saillante* semblable à une crête, comme dans les Bucardes, nommées Hémicardes par Cuvier, et *sinueuse*, lorsqu'une partie des valves et de leurs bords offre d'un côté un enfoncement, et de l'autre une partie saillante proportionnelle; comme la plupart des Térébratules, et surtout la Térébratule magellanique.

2°. La face interne des valves

est cette surface la plus souvent concave qui est en contact immédiat avec l'Animal renfermé entre les deux valves de la Coquille. Cette surface est limitée par la charnière et les bords, ou donne à ceux-ci une ligne ou deux de largeur. Cette face est presque toujours *lisse*; il arrive pourtant, et cela presque uniquement dans les Peignes, que les côtes qui sont à l'extérieur se voient à la partie interne, mais dans un ordre inverse; c'est-à-dire que les côtes saillantes en dehors sont creuses en dedans, tandis que les espaces qui les séparent et qui sont enfoncés sont saillies au dedans; mais en général et à l'exception des Coquilles très-minces, on peut juger, par la seule inspection de la face interne, des nombreux accidents de cette nature qui peuvent se trouver à l'extérieur. La concavité des valves ne répond pas toujours à la convexité de la face extérieure; cela arrive lorsque la Coquille est épaisse, la matière calcaire qui les forme étant déposée en bien plus grande quantité sous les crochets que vers les bords. Les valves sont rarement colorées en dedans; si quelquefois elles présentent des couleurs, ce n'est jamais que dans certaines espèces et nullement par familles ou par genres, et en général ce sont des teintes douces et fondues qui n'ont aucun rapport avec la coloration extérieure; quelques cas rares exceptés; presque toujours elles sont blanches ou nacrées. Cette couleur nacré paraît quelquefois être le propre de certains genres, comme celui des Mulettes, des Pernes, et surtout des Pintadines qui, à elles seules, fournissent presque toute la nacre employée dans les arts, et qui, de plus, produisent les perles si recherchées pour la parure. Nous remarquerons dans l'intérieur des valves des impressions qui sont les traces que l'Animal a laissées de son organisation. Les premières, les plus apparentes, les plus profondes; sont les *impressions musculaires*; Linné s'est servi avec avantage de ces impressions pour diviser les Conchifères.

res en deux ordres ; Conchifères à deux impressions musculaires , et Conchifères à une seule. Cette division repose évidemment sur des organisations différentes ; l'Animal qui avait deux muscles a laissé deux impressions , celui qui n'en avait qu'un n'en a laissé qu'une. On nomme *Vivipares* les Conchifères à deux muscles, et *Monomiaires* ceux à un seul muscle. Elles sont *latérales* lorsqu'étant au nombre de deux, l'une se dirige vers le bord antérieur et l'autre vers le bord postérieur ; elles sont ordinairement *semi-lunaires*, d'autres fois *quadrangulaires*, et dans le seul genre des *Lucines*, l'une d'elles s'allonge et se rétrécit en se dirigeant en avant. Lorsqu'il n'existe qu'une impression, elle est *centrale* ou presque centrale ; elle est alors le plus ordinairement *circulaire*, *enfoncée*, et d'autres fois elle est en *hache* ou *semi-lunaire*. Les autres impressions sont dues à ce que l'on nomme manteau ou enveloppe charnue et extérieure de l'Animal. Les diverses formes du manteau laissent diverses impressions ; le plus ordinairement c'est une impression linéaire qui suit la direction du bord inférieur depuis les attaches musculaires, et qui quelquefois vers l'angle antérieur se découpe en un angle plus ou moins grand, comme dans les *Tellines*, les *Cythérées*, etc. Quelquefois au-dessous du manteau et dans les *Lucines* particulièrement, on remarque de petites élévations qui paraissent correspondre à des glandes ou à des organes particuliers parsemés sur le manteau.

50. Les bords des valves comprennent toute la surface entre le bord extérieur et l'impression du manteau, c'est-à-dire à une ligne ou deux de largeur. Ils peuvent être *canaliculés* lorsqu'une partie de la circonférence intérieure des valves présente une gouttière, comme dans la *Venus Casina*, *simples* ou *lisses* quand ils n'offrent ni crénelures, ni dentures, ni stries, etc. ; *striés* lorsque des stries perpendiculaires se remarquent à leur surface ; elles aboutissent ordinaire-

ment à une dentelure très-fine ; *plissées*, lorsqu'ils sont composés de plis qui se reçoivent réciproquement dans chaque valve ; *canaliculés*, quand ils présentent une dentelure intérieure arrondie, comme dans quelques *Archées* ; et *dentées*, toutes les fois que les bords sont armés de dents protubérantes ou quadrangulaires, comme dans la *Bucarde perulosa*, la *Lucarde dentée* et d'autres.

Au commencement de cet article, nous avons distingué, d'après la position que nous avons adoptée pour examiner la Coquille, les bords en antérieurs, postérieurs, inférieurs et supérieurs. Ces bords, excepté le supérieur, ne présentent rien qui n'ait été indiqué plus haut, lorsque nous avons parlé des divers accidens qui se remarquent à la surface extérieure des valves ; mais le bord supérieur nous offre plusieurs choses qu'il est nécessaire de bien connaître ; ce sont les crochets, le corselet et la lunule.

Il arrive pourtant que le corselet et la lunule sont quelquefois placés de manière à appartenir, l'un au bord antérieur, l'autre au bord postérieur, et cela dépend uniquement de la forme générale de la Coquille. C'est ainsi que lorsque la Coquille est longitudinale, ces parties sont placées aux bords antérieur et postérieur, tandis qu'elles sont placées sur le bord supérieur, lorsque la Coquille est transversale.

Les *crochets* ou *sommets* sont des protubérances coniques plus ou moins recourbées l'une vers l'autre, et qui couronnent la charnière, c'est-à-dire qu'ils sont immédiatement au-dessus d'elle. Ils varient pour la forme. Ils sont aplatis ou presque nuls, lorsqu'ils ne font que ou presque pas de saillie venant se confondre dans le bord de la charnière, comme cela se remarque dans les *Solens Gagne*, *Silique*, *Sabre*, etc. Ils sont *aplatés* lorsqu'à la place d'une saillie on remarque une dépression remarquable. Ils sont *échancrés* lorsqu'ils s'inclinent l'un vers l'autre, en se dirigeant vers l'axe perpendiculaire de la Coquille, comme

dans les Pétoncles. Ils sont *recourbés* lorsqu'ils se dirigent vers la lunule. Cette direction est la plus ordinaire et la plus générale. Il n'y a que quelques espèces dans certains genres où l'on remarque le contraire, et, dans ces cas seulement, le ligament semble être placé dans la tunule par sa position et le rapport de forme et de direction des bords de la Coquille. C'est ce qui a lieu dans quelques *Donacées* et dans presque toutes les *Tectines* qui présentent par-là une exception à la règle générale, au moins pour les Coquilles régulières et *diffinitives*. Ils sont *cornus* lorsque, fort souvent prolongés, ils sont tournés en spirale plus ou moins régulière, comme dans la *Came* unicomme et les *Dicérates*. Ils sont *appuyés* s'ils se touchent; *écartés* si la distance qui les sépare est au moins d'une ligne; *éloignés*, si un plus grand espace les sépare, et *recouverts* si celui d'une valve recouvre ou cache une partie de celui qui lui est opposé, comme cela a lieu dans la *Bucarde* Cœur de Vénus. Ils sont *auriformes* lorsque, peu saillans et tournés en spirale, ils sont appliqués sur le ventre de la Coquille. Ils sont *obtusés* quand ils offrent une spirale qui a plus d'un tour, comme les *Isocardes*. Ils sont *riales* quand des côtes saillantes et onduleuses les garnissent, et *rongés* toutes les fois que l'épiderme qui les recouvre ou une portion de leur test sont enlevés et cariés; ces deux circonstances s'observent presque exclusivement dans les Coquilles fluviales.

Le *corselet*. Bruguière sépara du corselet l'*écusson* qui, à ce qu'il nous semble, doit en faire partie ainsi que les *lèvres*. La raison en est sensible, c'est que si l'on ôte les *lèvres* et l'*écusson* du corselet, il ne restera rien ou presque rien de ce dernier dans le plus grand nombre des Coquilles. Nous dirons en conséquence que le corselet est toute la partie antérieure des crochets, dans laquelle s'insère le ligament lorsqu'il est extérieur. Nous ajouterons qu'il est nécessairement séparé en deux parties, la moitié se

trouvant sur chaque valve. Il varie dans la forme; tantôt il est *allongé*, quelquefois *racourci*, d'autres fois *lancéolé*, *écussonné*. Il présente aussi des accidens qui lui sont communs avec ceux qui se remarquent à la surface des valves. Il est *épineux*, *lamelleux*, *carené*, *nu*. Il n'est pas nécessaire d'expliquer ce que c'est qu'un corselet allongé, raccourci, épineux, lamelleux, carené, nu. Ce que nous avons dit précédemment suffit pour faire apprécier ces mots à leur valeur. Il nous reste à dire seulement qu'il est *lancéolé*, lorsque présentant la figure d'un ovale allongé, cet ovale se termine inférieurement par une pointe plus ou moins aiguë; *écussonné*, lorsqu'il est séparé en deux parties par une ligne, ou par des stries, ou par un changement de couleur. Cet écusson peut être *canaliculé*, c'est-à-dire creusé en gouttière dans toute sa longueur, comme dans la *Donacée* Méroë; *litturé*, lorsqu'il présente des lignes colorées, semblables à des lettres mal écrites; et *replié*, quand le bord des lèvres est recourbé vers l'intérieur des valves.

On est convenu de nommer *lèvres* les bords de la Coquille qui sont compris dans le corselet; ces lèvres ne devraient pas être distinguées du reste des bords. Elles en font une partie essentielle, et elles en présentent toutes les modifications et tous les accidens. Un seul pourtant leur est particulier, c'est lorsque la lèvre d'une des deux valves étant plus avancée, elle recouvre l'autre dans toute sa longueur; elle est alors *appuyée*.

La *lunule* est cette partie ordinairement enfoncée, circonscrite par une ligne déprimée, qui se trouve au-dessous de la courbure des crochets. Ceux-ci se dirigeant presque toujours vers elle, chaque valve en présente la moitié. La lunule peut être *lancéolée*, *ovale-oblongue*, *ovale*, *en forme de croissant*. Tous ces termes n'ont plus besoin d'explication. Elle est aussi *bordée*, c'est-à-dire limitée par un bourrelet saillant; *dentée*, lorsqu'elle est circonscrite par des dents

des crénelures ; *cordée* , quand elle a la forme d'un cœur , et *ouverte* lorsque ses bords écartés présentent une ouverture ou un bâillement plus ou moins considérable , qui pénètre à l'intérieur des valves.

4°. Les *moyens d'union des valves* sont de deux sortes : la *charnière* et le *garnement*.

La *charnière* est cette partie du bord supérieur qui est modifiée de plusieurs manières pour assurer plus de solidité à l'articulation des valves. Les modifications de la charnière ont présenté des caractères faciles à saisir , pour établir des distinctions génériques. On s'est fondé ou sur l'absence des dents , ou sur leur présence en plus ou moins grand nombre , pour dire qu'une charnière est *édentée* ou *dentée* ; on a donné le nom de *Cardinales* aux dents principales qui la forment. En la considérant sous le rapport de sa forme générale , nous reconnaitrons qu'elle a le plus ordinairement celle du bord supérieur lui-même ; ainsi elle est *droite* lorsque ce bord est droit ; elle est *courbée* lorsqu'il se courbe ; elle est *repliée* lorsque lui-même est replié ; elle est *tronquée* lorsqu'il est tronqué. Lorsqu'elle est *anguleuse* , c'est qu'elle est en partie sur le bord supérieur et en partie sur le bord antérieur ou postérieur. La charnière est *terminale* lorsqu'elle est en dehors des crochets , comme dans les Limées , les Peignes , etc. Elle est *cauteuse* lorsqu'à la place des dents on remarque un bourrelet arrondi et lisse , les Glycimères , par exemple. Les dents de la charnière ont ces parties saillantes , séparées par des intervalles ou fossettes. Les dents sont *cardinales* , lorsqu'elles sont placées vis-à-vis le sommet des rochets. Une dent peut être unique sur chaque valve , comme dans les *Sorans* ; il peut y en avoir deux , et on nomme *postérieure* celle qui est du côté de la lunule , et *antérieure* , celle du côté du corselet ; s'il y en a trois , celle du milieu se nomme *médiane* ; il y en a un plus grand nombre , on

les nomme *sérielles*. Lorsqu'elles sont placées le long de la lunule ou du corselet , en suivant la direction du bord , on dit qu'elles sont *latérales*. Ces dents latérales peuvent être au nombre de deux : une de chaque côté des dents cardinales , comme dans les Cyprènes , les Cyclades et les *Helminx* , ou bien il n'y en a qu'une , comme dans les Cyprines. Si nous dirigeons notre attention vers les formes , nous verrons des dents *compennées* , comme si , étant molles , on les avait serrées entre les doigts : celle de la Mye en est un exemple ; nous en trouverons de *bifides* , c'est-à-dire creusées à leur sommet par une petite gouttière ; d'*auriculées* ou en *saillemens* , lorsqu'elles présentent une apophyse considérable et une extrémité plus ou moins arrondie pour recevoir le ligament , comme dans les *Liostomatidés* et quelques *Anatines* ; en *forme de M* , lorsqu'une dent mince et presque lamellaire est pliee sous une autre aigu , comme dans les *Mastresquellonacées* , lorsque deux surfaces opposées sont plus étendues que toutes les autres dimensions ; *irrégulières* lorsque sa saillie présente des enfoncemens ou des élévations qui n'ont rien de constant dans leur position ; *divisées* , lorsqu'une seule dent est divisée en plusieurs parties , comme celle de l'*Hyrie*.

Si l'on place une valve sur son côté convexe , sur un plan horizontal , et que les dents de la charnière y soient implantées perpendiculairement , on dira qu'elles sont *droites* ; elles seront *obliques* si elles forment un angle avec l'horizon , et *horizontales* lorsqu'elles seront parallèles au plan de l'horizon. Les dents sont *divergentes* quand , partant du sommet des crochets , elles se dirigent en rayonnant ; elles sont *parallèles* lorsqu'elles sont placées sur des lignes dont tous les points sont également distans ; quelquefois les dents , au lieu d'être lisses , comme dans la plupart des Coquilles , sont *striées* ou *sillonées* , comme dans quelques Mulettes , les Trigonies , les Plicatules ; quelquefois elles sont

*courbées* supérieurement, comme dans les *Corbulos*; en *forme de crochets*, comme dans les *Spondyles*. Elles sont *fixées*, lorsqu'elles retiennent en place les deux valves que l'on ne peut séparer sans les briser, comme dans les *Térébratules*. La lame perpendiculaire et saillante, qui coupe la cavité de la Coquille en deux parties inégales, qui sépare la cavité des crochets du reste, et sur laquelle se trouve la charnière, se nomme *lame cardinale*. Cette lame quelquefois n'existe pas, et la charnière repose sur le bord supérieur, comme dans la *Glycimère*.

Les *fossettes* sont les intervalles creux qui séparent les dents de la charnière; elles sont destinées à recevoir celles de la valve opposée. On consacre la même expression ou celle de *gouttière*, à la fossette présentant plus particulièrement cette forme, lorsque la charnière est sans dents, et que les deux valves ne sont retenues que par un ligament inséré dans la fossette; lorsque cette fossette est unique, elle se nomme *cardinale*, comme dans le *Marteau*; s'il y en a plusieurs sur une même ligne, comme les *Crenatules* et les *Pernes* en donnent un exemple, on dit alors qu'elles sont *sérielles*.

Le *ligament* est cette substance solide, cornée, destinée à réunir solidement les deux valves de la Coquille et à les ouvrir pendant la vie de l'Animal; quelle que soit sa position, il tend toujours à les ouvrir, parce qu'il est comprimé toutes les fois que les valves sont rapprochées; et, comme il est formé d'une substance très-élastique, elle tend constamment à reprendre le volume que la compression lui a fait perdre; il agit indépendamment de l'Animal qui est dépourvu de muscles destinés à ouvrir la Coquille; il suffit qu'il ne contracte plus ceux qui la ferment pour que le ligament agisse par son élasticité, pour qu'il l'entrebâille autant qu'il est nécessaire aux fonctions de l'Animal. Lorsque le ligament est *extérieur*, il est inséré à la partie supérieure ou

moyenne du corselet; et alors on le voit dans toute sa longueur; il est *extérieur enfoncé*, lorsque les saillies, sur lesquelles il est ordinairement fixé et que l'on nomme *nymphes*, sont enfoncées profondément sous les bords du corselet; il semblerait alors qu'il est interne, quoique réellement il soit externe; cela se remarque dans la *Vénus Zig-Zag*. Il est *intérieur* lorsqu'il ne se voit pas du tout à l'extérieur; il est placé alors sur une partie de charnière, dans une fossette particulière destinée à son insertion, comme dans les *Crassatelles*, les *Macres*, etc.; il est *interno-externe* lorsque le même ligament s'aperçoit à l'extérieur et à l'intérieur des valves, comme dans les *Huitres*, les *Limes*, etc.; il est *double* lorsqu'il y en a deux, l'un externe et l'autre interne, comme dans les *Amphidesmes*; il est *multiple* ou *interrompu* quand une série de cavités ou de fossettes, destinées à le recevoir, se montrent sur une même charnière, comme dans les *Pernes*, les *Crenatules*. Dans l'endroit où se terminent les nymphes inférieurement, on remarque un petit espace, une petite fente qui pénètre dans l'intérieur des valves: cette fente se nomme *suture*; et l'on dit que le ligament est *tronqué* lorsqu'il ne couvre pas la suture; il est *entier*, au contraire, lorsqu'il la recouvre entièrement; il est *bouillant* lorsque son extrémité inférieure est divisée en deux lames écartées; il est *saillant* toutes les fois qu'il se montre au-dessus des bords du corselet; il est *bombé* quand il est fortement saillant et recourbé sur lui-même, dans la *Galathée*, par exemple; il est *fourchu* lorsqu'il se bifurque pour se prolonger sous la courbure des crochets, comme dans les *Isocardes*; il est *long* lorsqu'il se prolonge sur tout le bord du corselet; il est *court* quand il n'en occupe qu'une petite étendue; il est *plat* ou *égal* toutes les fois qu'il est disposé comme une toile collée derrière la charnière, comme dans les *Cuculles*, les *Archés*; il est *marginal* lorsqu'il est

long du bord supérieur. Lorsqu'il est interne, il a la forme de la fossette elle-même sur laquelle il est implanté; il est ovale si la fossette est ovale; il est triangulaire, et c'est la forme la plus ordinaire; elle se trouve dans les Peignes, la plupart des Huîtres, les Plagiostomes, les Typhées, etc.

Il faut terminer ce qui a rapport aux Coquilles bivalves; nous ferons voir que dans les Coquilles qui ont une valve plus grande que l'autre, et surtout qui sont fixées, on ne peut de nommer *operculaire* la petite des deux, comme cela a lieu dans les Huîtres, les Gryphées, les Cames, etc. On est également venu qu'en mettant la préposition devant la plupart des mots que nous avons donné l'explication, remplacerait presque, ou une phrase équivalente; ainsi, on dit une Coquille qu'elle est *sabotée*, *cylindrique*, etc., lorsqu'elle est allongée ou plus raccourcie qu'un ovale ordinaire, ou lorsqu'elle approche de la forme cylindrique; on dit, dans le même sens, que la surface intérieure est *sublamelluse*, *subulée*, etc. Toutes les expressions analogues à celles-ci n'ont au reste nul besoin d'explication; on doit entendre au premier mot.

#### Des Coquilles univalves.

Les Coquilles univalves ou formées d'une seule partie, le plus souvent tournée en spirale, sont distinguées, d'après l'habitation, en terrestres, fluviatiles et marines. Les terrestres, dont les Animaux vivent à l'air libre à la surface de la terre, ne se distinguent pas facilement des Coquilles fluviatiles; et de certaines Coquilles marines. Elles sont pourtant généralement plus minces, ne présentent jamais d'épines; et très-rarement des tubercules; elles ont d'ailleurs la bouche arrondie, jamais canaliculée; seulement quelquefois anguleuse. Les Coquilles univalves fluviatiles; c'est-à-dire dont les Animaux vivent dans les eaux douces, tiennent pour

la forme, des Coquilles terrestres et des Coquilles marines. On les distingue néanmoins par leur épiderme qui est vert ou brun. Quelques-unes sont tuberculeuses; il en est parfois qui sont épineuses, et, à l'exception des Melanopsis, aucunes ne sont échancrées à la base. Les Coquilles marines sont généralement épaisses; présentent souvent des bourrelets, des épines ou d'autres traits d'une organisation particulière; le plus grand nombre est canaliculé à la base. Au reste, ces différences ressortiront mieux lorsque nous aurons considéré toutes les parties constituant les Coquilles; mais avant de passer outre, et pour qu'il n'y ait point d'équivoque relativement à la position des parties, nous indiquerons quelle position nous donnons à la Coquille pour l'examiner. Nous la supposons toujours, avec Bruguière et Blainville, placée sur l'Animal qui marche devant l'observateur, et nous nous figurons qu'elle est placée entre six plans; un inférieur et un supérieur horizontaux, un antérieur, un postérieur et deux latéraux; l'un de ceux-ci droit et l'autre gauche. Alors toutes les parties, dirigées dans l'un de ces plans, seront antérieures, postérieures, latérales, supérieures, inférieures. Si maintenant nous plaçons la Coquille sur l'Animal entre ces plans, nous verrons que la partie antérieure est toute cette face où se montre l'ombilic, et que l'on nomme également la base; la partie postérieure correspondra au sommet de la spire; la face inférieure renfermera la bouche de la Coquille, et cette portion de spire qui est au-dessus; la partie supérieure comprendra le dos de la Coquille et la partie de spire qui le surmonte; enfin, des deux faces latérales, la droite correspondra à la levre droite, et la gauche à la levre gauche de la Coquille.

Parmi les Coquilles univalves, on en trouve, et c'est le plus grand nombre, qui ont une cavité simple, continue, non interrompue par des cloisons; on dit alors qu'elles sont

*monothalamas* ou *uniloculaires*; elles sont au contraire *polythalamas* ou *multiloculaires* lorsque cette cavité est divisée par un nombre variable de cloisons, les Nautilites, les Ammonites, etc. Lorsque les Coquilles multiloculaires présentent à l'extérieur des traces de leurs cloisons, et que ces traces sont plus ou moins ressemblantes aux sutures qui unissent les os des Mammifères, on dit qu'elles sont *articulées*. Une Coquille est *canaliculée* ou *canalifère* lorsque de la base ou face antérieure part un canal plus ou moins long, ordinairement droit ou légèrement flexueux, comme dans les Fuseaux; elle est *échancrée* lorsque sa base, au lieu d'un canal, n'offre qu'une simple échancrure, comme dans les Pourpres, les Volutes, etc. Elle est *rostrée* lorsque le canal de la base se termine en un bec pointu, comme dans les Rostellaires. On nomme *globuleuse* une Coquille arrondie sur presque tous ses points, comme la plupart des Hélices, l'Hélice des jardins, les Natices, les Turbos, etc. On donne plus particulièrement le nom de *convexes* aux Coquilles dont l'ouverture est très-ample et très-évasée, comme dans quelques Patelles, des Calyptrées, etc. Si la surface extérieure de ces Coquilles est convexe, leur surface interne est *concave*; elle est *orbiculaire* lorsque la circonférence décrit un cercle, et qu'elle est d'ailleurs aplatie, les Nummulites, par exemple. *Discoïde* a la même signification qu'orbiculaire; *ovale* se dit d'une Coquille dont l'ensemble ou la coupe présente cette forme; *oblongue*, lorsque l'ovale est allongé; *ovoïde*, quand elle présente à peu près la forme d'un œuf; *canique*, lorsque sa forme est celle d'un cône plus ou moins aigu, comme les Troques, les Conilites, la plupart des Patelles; *conoïde*, lorsque sa forme approche de celle d'un cône; en *cône oblique*, quand la Coquille est conique, et que, placée sur sa base horizontale, elle se dirige obliquement en se courbant, comme les Calochons et quelques Patelles.

Une Coquille est *enroulée* ou *pointue* lorsqu'ayant une large base, son sommet est aigu, comme dans les Calochons, quelques Emarginules; elle est *perforée* quand le sommet est trouqué et remplacé par un trou, comme toutes les Fissurelles en donnent un exemple. *Enroulée* se dit des Coquilles dont le dernier tour enveloppe tous les autres en faisant disparaître l'ombilic et souvent la spire, comme dans les Bulles, les Ovules, les Porcelaines, les Cônes; *partiellement enroulée*, lorsque la Coquille est formée d'une simple lame courbée sur elle-même seulement d'un côté, comme dans la Bullée, la Dolabelle. Toutes les fois qu'une Coquille est enroulée de manière à laisser voir en saillie au-dehors les différens tours de cet enroulement, on dit qu'elle est *apirale* ou à *spire*; elle est *sans apire* lorsque cet enroulement ne paraît point au dehors, comme dans la plupart des Bulles; elle est *partie en spirale* quand elle a commencé à faire plusieurs tours de spire qui se terminent ensuite par une portion droite, comme dans la Litula.

*Tubuleuse* se dit d'une Coquille qui ayant commencé sa spire régulièrement, se disjoint pour se terminer en tube plus ou moins régulier; le Vermet en est le seul exemple pour les Mollusques; quelques Annelides présentent à peu près la même disposition; *déprimée*, *aplatie*, lorsque, ayant une large base, la spire de la Coquille se trouve très-courte, comme dans le Troque-Eperon, ou dans les Macrostromas, la Sigaret, l'Haliotride, etc. Elle est *droite*, lorsqu'étant placée sur sa base horizontale, elle s'élève perpendiculairement, comme la Bélemnite; elle est *arquée* lorsque, placée de la même manière, elle s'élève en décrivant un arc de cercle, comme les Hippurites, les Orthocères, etc. Elle est *anguleuse* lorsque, sa base étant aplatie, elle forme avec la spire un angle aigu comme dans les genres *Imperator* et *Calcar* de Montfort. Elle est *canalisée* lorsque, sur la surface de la spire,



s'élève une côte saillante et aiguë.

Souvent on a comparé la forme générale des Coquilles à des objets déjà connus. Aussi il y en a de *clypéiformes*, d'*ombrelliformes*, d'*auriformes*, de *cylindraccées*, de *cylindriques*, de *fusiformes*, de *pyriformes*, de *réniiformes*, de *lenticulaires*, de *sphériques*, de *naviculaires*, d'*infundibuliformes*. Ces expressions qui s'appliquent à des comparaisons assez exactes n'ont pas besoin d'explications; il nous suffira de donner un exemple de chacune d'elles: *clypéiformes*, les *Parmophores*; en *ombrelliformes*, les *Ombrelles* elles-mêmes que l'on nomme vulgairement *Parasols* chinois; *auriformes*, les *Oreilles* de mer des anciens ou *Haliotides*; *cylindraccées*, la plupart des *Maillots*; *fusiformes*, les *Fuseaux*; *pyriformes*, les *Pyrules*; *réniiformes*, les *Rénulines*; *lenticulaires*, les *Nummulites*, les *Placentules*, etc.; *sphériques*, les *Mélonies*; *naviculaires*, les *Argonautes*; *infundibuliformes*, le *Troque* concave, vulgairement l'*Entonnoir*, et d'autres dont l'*ombilic* est largement ouvert, comme dans les *Cadrans*. Enfin, on dit qu'une Coquille est *turriculée* quand la spire, formée d'un grand nombre de tours, s'élève en un cône allongé, comme les *Cérites*, les *Turritelles*, les *Vis*, etc. *Turbinées* se dit au contraire des Coquilles dont la spire est peu saillante et dont le dernier tour est presque enveloppant: les *Cônes*, les *Olives*, les *Turbinelles*, sont des Coquilles turbinées; on dit qu'elles sont à *diaphragme* lorsqu'une lame horizontale ou inclinée ferme une partie de l'ouverture de la Coquille, comme dans les *Navicelles*, les *Crépidules* et quelques *Calyptrées*.

Si nous considérons les Coquilles sous le rapport de leur consistance, nous en trouverons de *solides*, et c'est le plus grand nombre. Quelques-unes sont *osseuses*, c'est-à-dire qu'elles ont presque la structure et la fonction d'un os, comme celle des *Sèches*: quelques autres sont *cartilagineuses* quand elles ont

la consistance des cartilages qui revêtent les surfaces articulaires des os des Mammifères, comme celle des *Clios*, des *Limaciens*, des *Laplysies*.

Si on fait attention à la position qu'occupe la Coquille dans ses rapports avec l'Animal, on ne peut en trouver que de trois sortes: d'*externes*, lorsqu'elles sont entièrement extérieures: celles-ci sont en très-grand nombre; d'*interno-externes*, qui sont en partie internes et en partie externes, comme des *Bulles*, la *Spirule*; enfin, elles sont *internes* lorsqu'elles sont entièrement cachées par les parties molles de l'Animal, comme les *Dolabelles*, les *Sigarets*.

Toutes les dénominations dont nous venons de donner la signification, s'appliquent, comme on a dû le remarquer, d'abord à la forme générale ou d'ensemble de la Coquille univalve; ensuite à la consistance considérée également en général; enfin à sa position relative avec l'Animal. Il nous reste maintenant à donner celles qui sont relatives aux accidens indépendans de la forme, de la consistance et de la position, c'est-à-dire celles qui ont rapport à ce que l'on remarque à la surface. On voit, par exemple, des Coquilles dont on n'aperçoit pas toujours les couleurs, parce qu'elles sont cachées sous une enveloppe extérieure que l'on nomme *épiderme*, ou mieux *drap marin*, car ce n'est pas un véritable épiderme, comme nous le prouverons à l'article *MOLLUSQUE*. On en voit, au contraire, qui sont constamment dépourvues de cette croûte extérieure et qui se montrent avec tout leur coloris: celles-là sont nues, comme les *Porcelaines*, les *Olives*, etc. On en voit également qui sont pourvues d'une partie accessoire que l'on nomme *opercule*, lequel a la forme de l'ouverture de la Coquille, et destiné à la clore. Lorsque la Coquille présente cette partie, on la dit à *opercule* ou *operculée*, et sans *opercule* lorsqu'elle en est dépourvue. *Ornate*. Ensuite elles peuvent être *noduleuses*, lorsqu'elles présen-

tent des aspérités arrondies sur une large base; à côtes, lorsque des élevations ou protubérances, convexes ou aigües, descendent en suivant l'axe de la Coquille ou dans le sens de l'axe; telles sont les Harpes; *cerolées*, quand les côtes partent de l'ombilic ou du bord gauche de la Coquille pour se rendre en forme de ceinture vers la lèvre droite où elles se terminent, comme dans les Tournes, les Monotéres ou Licornes, etc. Lorsqu'une Coquille est épineuse, et que ces épines sont creusées, on la dit *tubifère*, comme le Rocher tubifère en donne un exemple. Elle est *allée* lorsque son bord droit se dilate largement, comme dans la plupart des Strombes et des Rostellaires. Elle est *digitée* quand ce même bord droit présente de longs appendices convexes, quelquefois noueux, en nombre variable, creusés en dessous en gouttière dans toute leur longueur, comme dans tous les Pterocères. On dit qu'une Coquille est *variqueuse* lorsque sa spire offre des bourrelets plus ou moins réguliers dans leur position, et qui ne sont autre chose que les traces des accroissemens successifs de la Coquille. Les varices sont *régulières* lorsqu'elles se montrent à des espaces toujours les mêmes, comme dans les Rochers; elles sont *opposées* quand il n'y en a que deux sur chaque tour, mais toujours éloignées de l'espace d'un demi-tour, comme dans les Ranelles; on dit alors que la Coquille est *bonité*. Elles sont *irrégulières* lorsqu'elles sont disposées sans ordre, comme dans les Tritons, quelques Cérites, etc. Enfin, elles sont *opposées* lorsqu'il y en a une du côté opposé à l'ouverture de la Coquille, comme dans quelques Tritons et quelques Cérites, dans le Cérîte Obélisque, par exemple. Les Coquilles univalves présentent souvent des accidens extérieurs semblables à ceux que nous avons remarqués à la surface des Coquilles bivalves. Ainsi nous en trouvons de *tissés*, *tuberculeux*, *épineux*, *écailleux*, *imbricés*, *lamellés*, *striés*, *sillon-*

*nées*, *rayonnées*, etc. Comme ces expressions ne changent point de valeur en s'appliquant à des Coquilles d'une autre classe, nous renvoyons à ce que nous avons dit en parlant des Bivalves au commencement de cet article.

Avant de parler et de définir les parties constituantes de la Coquille, nous dirons ce que l'on doit entendre par les dimensions ou diamètres. En général, les dimensions d'un corps sont limitées par l'espace qu'il occupe, et peuvent être prises dans la longueur, la largeur et l'épaisseur: ainsi, l'on devra entendre par longueur de la Coquille l'étendue de son axe, pris depuis le sommet de la spire jusqu'à la base. La largeur sera prise à la partie la plus saillante du dernier tour, et l'épaisseur se mesurera à l'endroit le plus élevé du dernier tour, en supposant une ligne perpendiculaire qui traverse l'axe de la Coquille. On distingue dans une Coquille plusieurs portions, mais il y en a deux principales et plus essentielles à bien connaître: ce sont la base et la spire. Si l'on examine tout ce qui se remarque de particulier dans chacune d'elles, on aura une idée complète, en y ajoutant ce que nous avons déjà dit plus haut de la terminologie des Coquilles. Nous diviserons donc la Coquille en base et en spire. Examinons d'abord la première de ces parties.

La *base* est la partie la plus saillante opposée au sommet. Elle peut être *tronquée*, c'est-à-dire coupée et aplatie, comme dans les Troques. Elle est *simple* ou *entière* lorsqu'elle ne présente ni échancrure ni canal, comme dans les Natices. La base comprend: 1° l'ouverture ou la bouche qui répond quelquefois à la face intérieure de la Coquille; 2° l'échancrure; 3° le canal; 4° l'ombilic.

1°. L'ouverture ou la *bouche* de la Coquille est cette partie ouverte, variable dans sa forme et ses dimensions, par laquelle l'Animal entre et sort de sa Coquille. L'ouverture prise dans sa forme en général est *longitudinale*, lorsqu'elle a plus de lon-

urque de largeur, et qu'elle est  
lleurs parallèle à l'axe de la Co-  
lle; *transversale*, au contraire, lors-  
elle est plus large que longue, et  
gée parallèlement au sens de la  
jeur, comme dans les Hélices. Elle  
*triangulaire*, *quadrangulaire*, *en*  
*issant* ou *lunulée*, *demi-ronde*,  
*ondie*, *circulaire*, *anguleuse*, lors-  
elle a ou trois angles, la Janthine;  
quatre angles, le Cadran; ou  
elle a la forme de croissant, le  
norbe, le Nautile; en demi-cer-  
les Nériles; presque circulaire, les  
rbes; tout-à-fait circulaire, les Cy-  
stomes; ou avec des angles varia-  
s, les Troques.

L'ouverture est *détachée* quand elle  
tout-à-fait libre comme celle du  
met, de quelques Scalaïres. Elle est  
*tée* ou *grimaçante*, lorsqu'elle est  
tée sur tout son pourtour, comme  
e de l'Anostome, de quelques Au-  
des, des Clausilies; *renversée*,  
nd, au lieu de se trouver dans le  
des autres tours, elle se dirige  
le sommet de la spire, comme  
ostome en offre le seul exemple;  
*ée*, toutes les fois qu'elle est très-  
de, comme celle des Macrostromes,  
rets, Haliothides, Stomate, Stoma-  
; *linéaire*, lorsqu'elle est plusieurs  
plus longue que large, comme  
s les Cônes, les Olives, les Porce-  
es; *étroite* se dit dans les mêmes  
onstances; *sinueuse*, lorsqu'elle  
ente plusieurs échancrures peu  
ondes et larges, comme dans la  
thiolaire. Elle est *oblique* lors-  
les bords sont coupés oblique-  
t au plan de l'axe. L'ouverture  
*closée* ou *fermée* lorsqu'une cloi-  
est placée sur les bords ou s'aper-  
dans le fond. Cette *cloison* est le  
souvent liasse et concave: quel-  
ois elle est convexe, et d'autres  
elle est sinueuse, enfoncée vers  
bords, comme dans les Ammoni-  
etc. Elle présente en outre diffé-  
accidens: elle est *fendue*, com-  
dans les Sphinctérules de Mont-  
*percée*, quand un ou plusieurs  
s'y remarquent. Lorsque ces  
aboutissent à un canal cylin-

drique qui traverse toutes les cloisons,  
on dit que la Coquille est *siphonculée*.  
Le siphon peut être unique ou doub-  
le; on n'en a jamais observé un  
plus grand nombre. Il varie dans sa  
position; c'est ainsi qu'il est *basal*  
lorsqu'il est placé le long du dos, de  
la Coquille, comme dans les Ammo-  
nites; il est *marginal*, lorsqu'il se  
trouve près d'un bord; il est *central*  
lorsqu'il occupe à peu près le centre  
des cloisons; il est en *entour*  
lorsqu'il s'évase en entrant dans cha-  
que cloison; enfin il est *articulé*  
quand chaque cloison présente une  
partie du siphon qui vient à la ren-  
contre de son voisin pour s'unir avec  
lui.

L'ouverture, considérée dans ses  
parties prises séparément, est compo-  
sée de bords ou de lèvres que Dra-  
parnaud a nommés *Péristome*. Il se  
distinguent en droit et gauche ou co-  
lumellaire; dans la position que nous  
avons assignée à la Coquille, le bord  
droit est à la droite de l'observateur,  
le bord gauche à sa gauche. Vus dans  
leur ensemble, les bords sont *bimar-*  
*ginés* ou formés de deux bords réu-  
nis; *continus*, lorsqu'ils n'offrent au-  
cune interruption dans leur contour,  
comme ceux des Cyclostomes; *déu-*  
*nis*, lorsqu'ils sont séparés dans une  
portion de leur étendue, comme dans  
les Hélices; *tranchans*, lorsqu'ils s'a-  
mincissent comme ceux des Omphro-  
les; *simples*, lorsqu'ils n'offrent au-  
cun accident particulier, comme dans  
les Planorbes, les Turbos, etc.; *échan-*  
*crés*, quand, dans un point quelcon-  
que de leur circonférence, ils ont une  
ou plusieurs échancrures, les Pleuro-  
tomes; *réfléchis*, lorsqu'ils se renver-  
sent au dehors en forme d'épaulement  
pour s'appliquer sur un bourrelet ou  
sur la columelle; *striés*, *crénelés*, *den-*  
*tés*, à *gouttière*, lorsqu'ils présentent  
des stries ou des crénelures, qu'ils  
ont des dents, ou des gouttières. Enfin ils  
sont *sinués* ou *sinueux*, quand on re-  
marque dans leur contour des échan-  
crures arrondies, peu profondes et  
larges; à *bourrelet*, lorsqu'un bour-  
relet plus ou moins prononcé les ter-

mince, comme dans quelques Cyclostomes; et renversée, toutes les fois que leur épaisseur diminue l'ouverture, comme cela a lieu dans les Colombelles.

Tout ce que nous venons de dire sur les bords pris dans leur ensemble peut s'appliquer particulièrement au bord droit de l'ouverture à l'exception de ceci : bords désunis, bords continus, qui ne peuvent s'entendre que pour les bords pris en même temps. Nous n'avons rien à ajouter qui concerne particulièrement ce bord. Nous examinerons sur-le-champ ce qui a rapport au bord columellaire ou gauche, et à la columelle elle-même.

Le bord gauche ou columellaire n'existe pas toujours; les Volutes, par exemple, en sont dépourvues. Le plus souvent il est renversé et appliqué sur la région columellaire qu'il revêt dans sa longueur. Présentant cette disposition dans le plus grand nombre des cas, ce bord est mince et laisse quelquefois apercevoir les couleurs de la Coquille, comme celui du Casque pavé. Il est *opais* comme dans quelques Nasses; *répandu*, lorsqu'il s'étend jusque derrière la columelle, ou qu'il couvre la face inférieure de la Coquille, comme dans la Struthiolaire, la Nasse Casquillon, la plupart des Casques. Il est *calieux* lorsqu'il se termine irrégulièrement par des éminences arrondies, comme dans les Natices. Il est *granuleux* lorsqu'il est parsemé de grains élevés, comme dans le Casque granuleux; il est *tuberculeux* lorsque ces grains sont plus gros et plus irréguliers. Le bord gauche est libre ou relevé, lorsqu'il borde la Coquille du côté de la columelle, de manière à se mettre à la même hauteur que le bord droit, comme il arrive dans quelques Fuseaux et dans presque tous les Rochers, et en général dans toutes les Coquilles dont les bords sont continus.

La columelle est cette partie du côté gauche qui se voit dans l'intérieur et qui fait partie, ou mieux qui s'applique sur l'axe de la Coquille. Elle présente un grand nombre de modifica-

tions qui généralement dépendent de bons caractères, soit pour former des genres, soit pour distinguer des espèces. Ces modifications sont les suivantes : *lisse*, lorsqu'elle ne présente d'aspérités d'aucun genre, comme dans les Fuseaux, les Pyrules, les Cônes; *plissée*, lorsqu'elle offre un ou plusieurs plis; ces plis sont distingués en obliques et en transversaux; *dentée*, quand les plis sont remplacés par des dents sur une columelle ordinairement tranchante, comme dans les Nérites; *calloses*, lorsqu'elle se termine par un bourrelet arrondi, souvent strié, comme dans les Ancillaires, les Olives; *ridée*, toutes les fois qu'elle présente des stries ou des sillons irréguliers et ployés sur eux-mêmes, comme dans plusieurs Casques; *striée*, lorsqu'elle offre une série de stries transversales et obliques, comme dans les Olives.

La columelle est *aplatie* lorsqu'elle paraît avoir été comprimée dans toute sa longueur, comme celle des Planaxes. Elle est *tranchante* quand son bord libre s'amincit beaucoup dans toute sa longueur, comme celle des Nérites et des Natices, surtout celle que l'on trouve dans la Seime; *septiforme*, lorsqu'elle semble faire par sa saillie une cloison ou un diaphragme, comme dans les Naticelles. Elle est *droite* lorsqu'elle suit la direction de l'axe de la Coquille, comme dans les Cônes; elle est *arquée* quand elle est courbée en arc de cercle, comme dans le plus grand nombre des Pourpres et des Buccines; *soix*, toutes les fois qu'elle paraît comme tordue sur elle-même, comme celle du Cérîte Telescope; *oblique*, lorsqu'elle prend une direction oblique à l'axe de la Coquille; elle est *tronquée* quand elle se termine brusquement, qu'elle est comme coupée transversalement avant d'avoir atteint la hauteur des bords, et ne se continue ni en échancrure, ni en canal, comme dans les Agathines; elle est *atténuée en pointe* lorsque, d'abord élargie, elle se termine par une pointe plus ou moins aiguë, comme dans la Pyrule Figure

la plupart des Buccins; elle est *saillante* quand elle dépasse les bords de la Coquille *intérieurement*, comme dans les Pyramidelles.

Il arrive quelquefois, mais cela est *très-rare*, que l'*ombilic*, au lieu d'être placé derrière la columelle, se *percé* dans son intérieur; dans la columelle est *porforée* si *oblique* est *petit*, comme dans les *umbilicelles*, et *ombilicquée* lorsque *oblique* est *largement ouvert*, comme dans les Ebouines.

4°. L'*échancrure* est cette sinuosité ou moins *profonde*, plus ou moins *oblique*, qui se voit à la base des Coquilles dites *échancrées*. Cette *saillie* varie peu quant à la forme; mais il faut la distinguer du canal, qui n'est pas toujours facile lorsque *anal* est *très-court*; aussi il arrive quelquefois que l'on se soit porté à confondre des Coquilles *canaliculées* avec celles qui ne sont qu'*échancrées*. Pour point commettre d'erreur à cet égard, il suffit de se souvenir que le canal n'est presque jamais *échancré*. Nous verrons des *échancrures* : *profondes* comme celle de la plupart des Volutes; nous en voyons de *superficielles* comme celle des Pourpres, des Melanoides; nous en trouvons quelques-unes qui sont *bordées*, comme celles de la Masse Casquillon, des Harpes, c'est-à-dire que leur contour est exactement suivi par un *bourrelet*.

5°. Le *canal* est ce prolongement creux en dessus, *concavé* en dessous, qui se remarque à la base des Coquilles; nommées à cause de cela *canaliculées*, et qui forme pour ainsi dire un appendice à l'axe de la Coquille; le canal offre quelques modifications qu'il est nécessaire de connaître : il peut être *très-court* ou *très-long*; et présenter ensuite tous les intermédiaires; il est *tronqué* lorsqu'il se termine comme s'il avait été coupé transversalement; il est *droit* lorsque sa direction est parallèle à celle de l'axe; il est *courbé* quand il forme un ou plusieurs arcs de cercle; il est *relevé* ou *ascendant* lorsqu'il se relève subitement vers le dos de la

Coquille, comme dans les Cassidaires et les Casques; il est *ouvert* lorsque dans toute sa longueur on aperçoit sa concavité découverte; il est *couvert* lorsqu'une lame cache sa concavité sans la fermer tout-à-fait, comme dans la plupart des Rochers; enfin il est *fermé* lorsqu'il présente la forme d'un véritable tuyau, la lame qui couvre sa concavité se réunissant aux deux bords, comme dans le Rocher tubifère et dans les Coquilles de notre genre Trifore.

6°. L'*ombilic* est cette cavité que l'on remarque au centre de la base de quelques Coquilles; et qui représente, comme le dit Bruguière, l'axe vidé, autour duquel la spire tourne dans ses accroissements. Cet *ombilic* est *simple*, s'il ne présente ni *dentelures*, ni *stries*, ni *sillons*; etc. Il est *fendu* lorsque la *lèvre gauche* ne l'a pas fermé entièrement, et qu'on n'aperçoit plus à la place qu'une petite fente, comme dans quelques Hélices, et notamment dans l'Hélice Vigneronne; il est *canaliculé* lorsqu'il a dans son intérieur une gouttière spirale, comme dans les Cadranis; il est *crênelé* lorsqu'il est entouré de granulations ou de *crênelures serrées*; il est *denté* quand il présente près de son ouverture une ou plusieurs excroissances obtuses, ou que sa cavité est remplie de petites saillies *dentiformes*.

Tous les tours de spirale qui composent la Coquille, pris dans leur ensemble, se nomment *Spire*. La spire présente trois choses : les tours de spire, le sommet et les sutures. Avant d'en parler, nous considérerons la spire dans son ensemble; et de puis l'aplatissement le plus complet, qui fait qu'une Coquille est *discoïde*, jusqu'au moment où tous les tours sont placés pour ainsi dire les uns au-dessus des autres, ce qui fait une Coquille *turriculée*, on trouve une suite d'intermédiaires qui font passer insensiblement d'une modification à sa voisine pour lier les deux extrêmes; dans ce cas la spire ne varie que du plus au moins : aussi les mots qui expriment ces simples changements n'ont

pas besoin de définitions. Nous passons donc de suite aux autres modifications qu'elle présente. La spire est *aiguë* lorsque l'ensemble de ses tours présente la forme d'un angle très-aigu, comme en général toutes les Coquilles turriculées; elle est *couronnée* quand tous les tours sont surmontés par un rang de tubercules plus ou moins saillans, comme dans le Cône Damier; en *forme de tête*, lorsque tous les tours réunis offrent un renflement remarquable, comme dans le Rocher Scorpion. Presque tout ce que nous avons dit sur la Coquille considérée d'une manière générale, et sur tout ce qui a rapport aux accidens extérieurs, peut s'appliquer à la spire prise aussi en général; nous ne répéterons pas ici des définitions de mots qui ont la même signification, et qu'il est si facile, d'ailleurs, d'appliquer parfaitement à l'objet qui nous occupe; il nous suffira de les indiquer: ainsi la spire, comme la Coquille, peut être *ovale*, *oblongue*, *discoïde*, *conique*, *pyramidale*, *aplatie*, *cylindracée*, *turriculée*, *turbinée*, *enroulée*, *bombée*, *bossue*, *tubuleuse*, *anguleuse*, *carénée*, *droite*, *voûtée*.

On entend par tour de spire une des circonvolutions de la Coquille autour de la columelle ou de l'axe. On les compte en suivant la direction de l'axe, et en prenant pour un celui où est l'ouverture. Ici peuvent s'appliquer la plupart des expressions que nous avons indiquées, pour désigner en général les modifications extérieures; nous nous contenterons de les rappeler. Les tours de spire peuvent être *lisses*, *noduleux*, à *côtes*, *cerclés*, *tubulifères*, *tuberculeux*, *épineux*, *écailleux*, *tûlés*, *variqueux*, *lamelleux*, *sillonés*, *striés*, *rayonnés*. Nous ajouterons que les tours de spire sont *bifides* quand ils sont séparés en deux parties à peu près égales par un sillon transversal et spiral comme la Coquille elle-même, comme dans la Vis crénelée; ils sont *canaliculés* lorsque leur bord supérieur est creusé par une gouttière qui se prolonge

jusqu'au sommet, comme dans le Cône Damier; ils sont à *rampe* lorsque leur bord supérieur, au lieu d'être creusé par une gouttière, est plat, et ressemble à une rampe pratiquée autour d'une tour pour atteindre son sommet, comme dans le Fusée en escalier; *cordonnés*, lorsqu'ils sont bordés par une côte saillante, comme dans le Ostré cordonné. Les tours tournent à *droite*, ou *sont droites*, lorsque, comme cela arrive dans le plus grand nombre des cas, la Coquille présente la disposition de parties que nous avons indiquées plus haut; les tours tournent à gauche ou sont *gauches*, lorsque la bouche doit se placer à la gauche de l'observateur, et que la columelle qui est à gauche se place à droite. Dans ce cas il y a une inversion totale dans la position des parties; mais comme ce n'est qu'une anomalie assez rare, nous n'a pas établi de démonstration nouvelle pour l'exprimer. Il y a des Coquilles qui naturellement tournent à gauche, et cela est constant dans une même espèce; il y en a d'autres où ce n'est qu'accidentel; aussi il est peu de genres où l'on ait eu quelquefois à remarquer cette anomalie. Trois seulement, d'après Bruguière, sembleraient n'en avoir point encore fourni d'exemple, et ce sont; parmi les Coquilles: *enroulées*, les *Cônes*, les *Porcelaines* et les *Bulles*.

Linné a nommé *sutures* les points de contact des tours de spire ou la ligne spirale qui marque la limite d'un tour à son voisin, et l'endroit où ces tours sont liés entre eux. Les *sutures* sont *canaliculées* lorsqu'elles sont placées au fond d'un petit canal qui les suit, comme dans les Ostrées; elles sont *saillantes* lorsqu'elles sont marquées par un bourrelet, une côte ou une carène. Elles sont *effacées* lorsque l'union d'un tour à son voisin est si intime qu'on a peine à l'apercevoir, comme dans les Ancillaires; elles sont  *doubles* lorsqu'un sillon qui leur ressemble est placé au-dessus d'elles, et les suit le long de la spire. Il est d'autres particularités

elles présentent ; mais qu'il suffit cliquer : il y en a de *crénellées*, *hueses*, d'*ondulantes*, d'*enfoncées*. Il est facile de comprendre que le *unus* est la partie supérieure la saillante de la spire et la plus exposée à la base. Le sommet, qui est le plus grand nombre des Coquilles n'est qu'un point ; ne présente un petit nombre de modifications lui soient particulières. On en remarque pourtant qui sont *pointus* ou *umins*, et c'est pour le plus grand nombre de Coquilles ; d'autres sont *enquies* ou *décollés*, lorsque cette rue de spire abandonnée par l'Animal est cassée, soit par lui-même ou par accident, et qu'il répare la suture en la fermant complètement, comme dans le Bulime décollé et autres ; quelquefois il est *mamelonné*, c'est-à-dire qu'il est obtus et demi-sphérique, comme dans la Volute couronne d'Ethiopie et d'autres du même genre ; *carie*, quand la pointe se dépouille de son épiderme, et que le test lui-même est rongé d'une manière analogue aux crochets des Bivalves d'eau douce. Cette particularité se remarque que dans les Coquilles fluviales. Le sommet ne peut être *enveloppé*, *enfoncé* ou *ombiliqué* que lorsque la Coquille, étant enroulée, porte la spire très-près des ords, et peut être couverte ou enveloppée par la matière calcaire que l'Animal dépose au-dehors, comme dans la plupart des Porcelaines ; il est entouré lorsque, dans le même cas, offre une dépression sans être caché tout-à-fait ; enfin il est ombiliqué, si plutôt il n'existe pas, lorsqu'il est remplacé par un enfoncement semblable à celui de l'ombilic, comme on le remarque dans quelques Bulles, et notamment dans la Bulle Ampoule et la Bulle cylindrique.

Le mot de Coquille, que nous venons de traiter dans ses généralités, est quelquefois devenu spécifique quand il est accompagné de quelque épithète, par exemple :

**COQUILLE DES RUSTRES.** Ce nom vulgaire s'applique ordinairement à

*l'Unio pictorum* qui se trouve abondamment dans nos rivières, et quelquefois à de véritables Moules marines dont les Coquilles servent aussi à recueillir des couleurs préparées pour la peinture.

**COQUILLE DE PHARAON.** C'est encore un nom appliqué à une Coquille qui en a déjà reçu plusieurs, et qui n'est autre que le Monodonthe vulgairement nommé Bouton de Camisole. V. ce mot, CLANCULUS et MONODONTE.

**COQUILLE DE SAINT-JACQUES.** On donne vulgairement ce nom à toutes les Coquilles du genre Peigne, qui, comme on le sait, étaient portées autrefois en colliers par les pèlerins ; mais les marchands appliquent plus particulièrement ce nom au *Pecten jacobæus*. (D. II.)

**COQUILLE. BOT. PHAN.** L'un des noms vulgaires de la Mâche. V. V. LÉRIANELLE. (B.)

**COQUILLE D'OR. INS. (Geoffroy.)** V. ADELE.

**\* COQUILLÈRE. BOT. CRYPT.** V. COQUILLES.

**COQUILLERS. BOT. CRYPT.** Paillet a formé sous ce nom une famille de Champignons qu'il appelle aussi Polypore Coquiller. C'est un dénombrement du genre Bolet de Linné. Ses espèces sont le Coquiller en plateau et le Coquiller en bouquets. Ces noms sont rejetés de la science. (D.)

**COQUILLES. BOT. CRYPT.** Paillet a recueilli ce nom trivial donné par le vulgaire à quelques Champignons, pour l'imposer à l'une de ses familles dont les espèces sont la *Coquille de l'Aune*, la *Coquille Tigre de l'Orme* et du *Noyer*, etc. Ce sont indifféremment des Agarics ou des Bolets. (D.)

**\* COQUILLO. BOT. PHAN. (Theodore de Bry.)** Palmier peu connu du Chili, qui est peut-être la même chose que Coquito. V. ce mot. (D.)

**\* COQUINKO. BOT. PHAN.** Sp. de Coco des Maldives.

**COQUIOULE. BOT. PHAN.** L'un

des noms vulgaires de l'*Avena sativa* et du *Festuca ovina*. (B.)

**COQUITO.** BOT. PHAN. Nom de pays du Jubba de Kunth. V. JUBBA. (B.)

**CORAB.** POIS. Nom arabe du *Scorber Ignobilis*, Forsk., qui appartient au sous-genre Caranx. (B.)

**CORACA.** POIS. Syn. d'Ombre, *Sciapa Umbra*, V. SCIENCE. (B.)

**CORA-CALUNGA.** BOT. PHAN. Syn. malabar de *Cyperus rotundus*, L. V. SOUCHET. (B.)

**CORACAN.** BOT. PHAN. Nom indien d'une espèce de Crotelle. V. ce mot. (B.)

**CORACAS.** OIS. Syn. grec du Corbeau, *Corvus Cornix*, L. V. CORBEAU. (DR. Z.)

**CORACES.** *Coraces.* OIS. (Vieillot.) Dénomination de la quinzième famille de la méthode de Vieillot. Elle renferme les genres CORBEAU, CASSIN, CASSE-NOIX, ROLLIER et autres dont les espèces ont le bec droit, épais, robuste et tranchant sur les bords des mandibules. (DR. Z.)

**CORACIAS.** OIS. Nom scientifique imposé par Linné au genre qui comprend les Rolliers. V. ce mot. Vieillot, d'après Brisson, a francisé ce nom et l'a appliqué à un genre qui n'est encore composé que de trois ou quatre espèces dont la principale forme le type de notre genre *Pyrrhocorax*. (DR. Z.)

**CORACIAS** ou **CORACITES.** MOLL. POSS. Nom que l'on employait autrefois pour désigner les Bélemnites de couleur noire. V. BÉLEMNITE. (D. H.)

**CORACINE.** *Coracina.* OIS. (Vieillot.) Genre de l'ordre des Insectivores. Caractères : bec gros, robuste, dur, anguleux, convexe en dessus, voûté, aplati vers la pointe qui est comprimée et ordinairement échancrée, un peu déprimé à la base qui est garnie de poils rudes et courts; mandibule inférieure droite, aplatie en dessous;

quatre plaques à la base du bec, arrondies, ouvertes en devant, fermées en arrière par une membrane quelquefois emplumée; pieds forts et même robustes; quatre doigts, trois antérieurs, presque égaux et plus longs que le tarse, l'externe uni à l'intermédiaire jusqu'à la première articulation, l'interne soudé à la base; ailes assez longues; les deux premières rémiges plus courtes que les troisième, quatrième et cinquième. Vieillot, créateur de ce genre, l'a composé de neuf ou dix espèces, dont la plupart avaient précédemment été confondues parmi les Corbeaux. Temminck, en retravaillant ce genre, en a séparé diverses espèces qu'il a réunies aux Echenilleurs de Cuvier; en revanche, il y en a ajouté d'autres que Vieillot avait laissées dans ses Cotingas, ainsi que celle dont il a formé son genre *Risibau*. Cette nouvelle composition qui nous a paru plus naturelle est celle que nous donnons ici. Les auteurs d'Oiseaux que l'on assure être fauconniers, sont encore peu connus. Le Brésil, dont presque toutes les Coracines sont originaires, étant en ce moment exploré par des naturalistes très-versés dans les différentes parties des sciences naturelles, il est à espérer que bientôt leurs recherches nous expliqueront plusieurs points encore trop obscurs de l'histoire de ces Oiseaux.

**CORACINE CENDRÉE.** *Ampelis cinerea*, Vieillot, Levaill., Oiseaux rares, pl. 44. Parties supérieures d'un gris cendré; les inférieures d'une teinte plus claire; rémiges et rectrices brunnâtres; bec et pieds noirâtres. Taille, neuf pouces environ. De l'Amérique méridionale.

**CORACINE CÉPHALOPTÈRE.** *Cornicina Cephaloptera*, Vieill.; *Cephalopterus ornatus*, Geoffroy, Annul. du Muséum, v. pl. 26. Tout le plumage d'un noir luisant irisé; tête garnie d'un bouquet de plumes flottantes et en partie décomposées, noires et blanches, qui retombent en panache sur le bec et l'occiput; un appendice membraneux sous la gorge, garni de plumes allongées qui se réunissent en



sceaux, laissent à découvert une partie de la peau du cou dont la couleur est bleue. Longueur, treize pouces. Du Brésil.

**CORACINE CHAUVÉ**, *Coraciagymnophala*, Vieill.; *Corvus calvus*, Lath., Vieill. Oiseaux rares et nouveaux, 1799. Parties supérieures d'un rouge unâtre; parties inférieures un peu plus pâles; sommet de la tête dépourvu de plumes; petites rectrices alaires brunes; les moyennes blanches, les grandes noirâtres; rémiges noires bordées de gris; rectrices noires, ainsi que le bec et les pieds; les jeunes ont la tête emplumée, grise, pointillée et blanchâtre. Taille, treize pouces. De la Guiane.

**CORACINE CHOUCAÏ**, *Coracina Pannensis*, Vieill. F. ECHENILLEUR CHOUCAÏ.

**CORACINE COU-NU**, *Coracina gyrodactyla*, Vieill.; *Gracula fistula*, Temm.; *Corvus audus*, Lath., Levaill. Oiseaux rares et nouveaux, pl. 45. Plumage noir, avec des reflets bleuâtres sur la queue et les rectrices alaires, ainsi que le bord extérieur des rémiges d'un gris bleuâtre; une grande partie du cou dénuée de plumes; un espace nu, jaunâtre au-dessous de l'œil; bec blanchâtre, noir à l'extrémité; iris orangé; pieds noirs. Taille, seize pouces. De la Guiane.

**CORACINE A FRONT BLANC**, *Coracina albifrons*, Vieill.; *Corvus pascuinus*, Lath. Parties supérieures d'un gris cendré; les inférieures d'un gris orangé; front blanc; sommet de la tête noir, ainsi que les rémiges et les rectrices qui en outre sont terminées de blanchâtre; gorge blanchâtre; bec et pieds noirs. Taille, dix pouces. Des îles de la mer du Sud.

**CORACINE NOIR**, *Coracina scutata*, Temm., pl. color. 40; *Coracina rubricollis*, Vieill.; *Coracias scutata*, Lath. Tout le plumage noir, à l'exception d'un plastron rouge vif qui s'étend depuis le haut de la gorge jusqu'en descendant sur la poitrine; bec jaunâtre; iris et pieds d'un gris blanchâtre. Taille, quinze pouces. La femelle a les yeux rouges plus ternes et moins

tranchés sur le fond noir. Elle a le bec brun. Du Brésil.

**CORACINE GYMNOCÉPHALE**, F. CORACINE CHAUVÉ.

**CORACINE GYMNODÈRE**, F. CORACINE COU-NU.

**CORACINE KAILORA**, *Coracina melanops*, Vieill.; *Corvus melanops*, Lath. F. ECHENILLEUR KAILORA.

**CORACINE ORNÉE**, F. CORACINE CÉPHALOPTÈRE.

**CORACINE PLANEAU**, *Querula rubricollis*, Vieill.; *Muscicapa rubricollis*, Lath., Buff., pl. enl. 381. Tout le plumage noir, à l'exception d'un large hausse-col pourpre qui couvre presque toute la gorge; bec et pieds noirs; iris brun. Taille, onze pouces. La femelle est entièrement noire. De la Guiane.

**CORACINE PONCEAU**, *Ampelis militaris*, Vieill.; *Coracias militaris*, Lath., Lesaill. Parties supérieures d'un beau rouge, un peu plus pâle sur les parties inférieures; tête et partie du cou ornées de plumes longues et effilées; bec cramois, entouré à sa base de soies roides et de petites plumes qui cachent les narines; pieds gris. Longueur, quinze pouces. La femelle est un peu plus petite; elle a les parties supérieures d'un cendré brunâtre, les rémiges brunes, les parties inférieures blanchâtres et la huppe plus courte. De la Guiane.

**CORACINE A VENTRE RAYÉ**, *Coracina fasciata*, Vieill.; *Corvus Novae Guineae*, Lath. F. ECHENILLEUR A VENTRE RAYÉ.

**CORACINE VERTE**, *Coracina viridis*, Vieill. Plumage d'un vert foncé; tête, cou et parties inférieures tachetés de blanc qui termine aussi les rectrices; bec très-robuste, comprimé sur les côtés d'un gris noirâtre. Taille, douze pouces. De la Nouvelle-Hollande. Espèce douteuse, quant à sa classification. (M. L.)

**CORACINO**, FOIS. F. CORACINE.

**CORACINES**, NOUVEAUX. VIEILL. NOUVEAUX DONNÉS AUX BÉLEMNITES. F. COU-NU.

\* CORAÇONCILLO. BOT. PHAN. Pour Corazoncillo. *V.* ce mot. (B.)

\* CORA-CORAS. REPT. OPH. (Lachênayc - Deshois.) Joli Serpent indéterminé d'Amérique, que les Portugais nomment Talieboebot. (B.)

\* CORACORHYNCUS. POIS. On compare au bec des Corbeaux le museau de ce Poisson de l'Inde, qui est trop peu connu pour qu'on le puisse classer. (B.)

\* CORAGHLAS. OIS. Syn. anglais du Héron, *Ardea cinerea*, L. *V.* HÉRON. (DR. Z.)

\* CORAI-CODI. BOT. PHAN. Espèce indéterminée de Bryone de la côte de Coromandel. (B.)

**CORAIL.** *Corallium*. POLYP. Genre qui termine l'ordre des Gorgoniées dans la section des Polypiers corticifères, la dernière des flexibles ou non entièrement pierreux. Lamarck le place à la tête de ses Polypiers corticifères, et Cuvier parmi les Isis. Ses caractères sont : Polypier dendroïde, inarticulé, ayant l'axe pierreux, plein, solide, strié à sa surface, et susceptible de prendre un beau poli, recouvert par une écorce charnue adhérente à l'axe au moyen d'une membrane intermédiaire très-mince, invisible dans l'état sec; cette écorce devient crétacée et friable par la dessiccation. Le genre Corail diffère de ceux qui composent l'ordre des Gorgoniées par la substance de l'axe; d'une nature tellement particulière que les auteurs l'ont classé, tantôt parmi les Madrépores, tantôt parmi les Isis, quelquefois parmi les Gorgones.

Le CORAIL ROUGE, *Corallium rubrum*, Lamk.; N., Genr. Polyp., p. 37, t. 13, f. 3, 14. Cette seule espèce du genre *Corallium* était connue dès la plus haute antiquité, et les Grecs, en la nommant Korallion, nom composé de deux mots qui signifient *j'orne la mer*, ne l'avaient appelée ainsi que parce qu'elle était pour eux la plus élégante production de l'empire de Neptune. Malgré cette antiquité, les nom-

breux auteurs qui ont écrit sur le Corail ont ignoré long-temps la véritable nature de cette belle substance. Théophraste en fait mention comme d'une Pierre précieuse. Pline en parle dans son Histoire naturelle, et désigne les lieux d'où le retiraient les pêcheurs; il fait connaître les propriétés médicales qu'on lui attribuait, ainsi que l'usage qu'on en faisait comme objet de luxe. De son temps, les Indiens avaient pour les grains de Corail la même passion que les Européens ont eue depuis pour les Perles. Les aruspices et les devins considéraient ces grains comme des amulettes, et les portaient comme un objet d'ornement agréable aux dieux; les Gaulois ornaient les boucliers, les glaives et les casques de cette production brillante; les Romains en plaçaient sur le berceau des nouveau-nés pour les préserver des maladies si dangereuses de l'enfance, et les médecins prescrivaient diverses préparations de Corail aux malades atteints de fièvres; d'insomnies, de crachement de sang, d'ophtalmies, d'ulcères, etc. Enfin Orphée, dans ses chants, a vanté le Corail, et Ovide, dans ses Métamorphoses, compare à ce Polypier les corps qui durcissent avec le temps ou par le contact de l'air. Tournefort, le père de la botanique française, à qui son enthousiasme pour les Plantes faisait regarder presque toute la nature comme appartenant au règne végétal, et aux yeux duquel les Pierres même végétales, Tournefort figura le Corail dans ses Institutions comme une Plante de la mer. Marsigli, imbu des principes du botaniste français, découvrant les Polypes du Corail, les décrivit comme des fleurs dont la corolle, composée de huit pétales ciliés, s'épanouissait sur des branches dépourvues de feuilles, et dont la couleur blanche était relevée par le rouge éclatant du rameau sur lequel cette fleur singulière se trouvait fixée. Enfin les travaux de Peyssonnel, Réaumur, Bernard de Jussieu, Donati, Ellis, en éclairant cette partie de la science, fixèrent dé-

initivement la nature du Corail dans la classe des Polypiers, et les firent considérer comme un des premiers échelons de l'organisation animale. Linné classa le Corail parmi les Madrépores, sous le nom de *Madrepora rubra*. Pallas confondit le Corail avec les Isis, et l'appela *Isis nobilis*. Solander et Gmelin, ne reconnaissant pas dans ce Polypier les caractères qui distinguent les Isis, crurent y trouver ceux des Gorgones, et le placèrent dans ce genre : le premier sous le nom de *Gorgonia preciousa*, et le second sous celui de *Gorgonia nobilis*. Enfin, Lamarck fait du Corail un genre particulier sous le nom de *Corallium*, adopté maintenant par Cuvier, Bosc et tous les zoologistes modernes. Le Corail est un Polypier qui ressemble parfaitement, mais en petit, à un Arbre dépourvu de feuilles et de rameaux, et n'ayant que le tronc et des branches. Il est fixé aux rochers par un large empatement, et s'élève tout au plus à trois décimètres (environ un pied). Il est composé d'un axe calcaire et d'une écorce gélatino-crétacée. L'axe égale le Marbre en dureté, même au fond de la mer; et c'est par un préjugé fondé sur l'ignorance que l'on a cru long-temps, et que le vulgaire croit encore qu'il durissait à l'air. Cet axe est formé de couches concentriques, faciles à apercevoir par la calcination; sa surface est plus ou moins striée; les stries sont parallèles et inégales en profondeur. Un corps réticulaire formé de petites membranes, de nombreux vaisseaux et de glandes remplies d'un suc laiteux, semble lier l'écorce à l'axe; ce corps réticulaire se trouve dans tous les Polypiers corticifères; l'écorce, d'une couleur moins foncée, d'une substance molle, est formée de petites membranes et de petits lamens très-déliés; elle est traversée par des tubes ou des vaisseaux, et ouverte de tubercules épars, clairsemés, à large base, dont le sommet est terminé par une ouverture divisée en huit parties. Dans l'intérieur

existe une cavité dans laquelle se retire un Polypier blanc, presque diaphane et mou; elle renferme les organes destinés aux fonctions vitales de l'Animal. Sa bouche est entourée de huit tentacules coniques, légèrement comprimés et ciliés sur leurs bords. Cette courte description est extraite de celle que Donati a donnée dans ses ouvrages; elle ne laisse rien à désirer sous le rapport de l'exactitude, et prouve que le Polype du Corail possède une organisation analogue à celle de l'Alcyon lobé; organisation qui doit exister plus ou moins développée dans tous les Polypiers corticifères. Le précieux Polypier qui fait le sujet de cet article, croît dans différentes parties de la Méditerranée et dans la mer Rouge. Quelques auteurs ont cru qu'il ne s'attachait jamais qu'aux voûtes des grottes sous-marines, et que ses extrémités étaient toujours tournées vers le centre du globe. C'est une erreur qui a été reconnue; l'on s'est assuré que le Corail se dirigeait dans tous les sens, et que chaque tronc était perpendiculaire au plan sur lequel il avait pris naissance. Il se trouve à différentes profondeurs dans le sein des eaux, et malgré la densité du milieu dans lequel il existe, toutes les expositions ne lui conviennent pas. Sur les côtes de France il couvre les roches exposées au midi; il est rare sur celles du levant ou de l'ouest; celles qui sont inclinées vers le nord en sont toujours dépourvues. On ne le voit jamais au-dessus de trois mètres de profondeur, ni au-dessous de trois cents. Dans le détroit de Messine, c'est du côté de l'orient que se plaît le Corail; le midi en présente peu; les roches du nord et de l'ouest sont privées de ce beau Polypier. On le pêche à une profondeur qui varie de cent à deux cents mètres. Dans ce détroit, que les chants d'Homère et de Virgile ont immortalisé, les eaux, étant frappées par des rayons solaires plus perpendiculaires que sur les côtes de France, sont pénétrées par la chaleur à une plus grande distance, et le Corail se trouve encore à plus de trois

seuls mètres ; mais alors sa qualité ne compense pas la peine, les risques et les nombreuses difficultés, que présente cette pêche. Sur les côtes de l'Afrique septentrionale, les corail-deurs ne commencent à le chercher qu'à trente ou quarante mètres de profondeur, et à une distance de trois à quatre lieues de la terre ; ils l'abandonnent lorsqu'ils arrivent à deux cent cinquante ou trois cents mètres. L'influence de la lumière paraît agir d'une manière très-énergique sur la croissance du Corail. Un pied de cette production animale, pour acquérir une grandeur déterminée, a besoin de trois ans dans une eau profonde de trois à dix brasses, de dix ans si l'eau n'est qu'à quinze brasses de profondeur, de vingt-cinq à trente ans à une distance de cent brasses de la surface, et de quarante ans au moins à celle de cent cinquante.

Le Corail des côtes de France, mieux choisi peut-être que celui des autres pays, passe pour avoir la couleur la plus vive et la plus éclatante ; celui d'Italie rivalise de beauté avec ce dernier ; sur les côtes de Barbarie, le Corail a plus de grosseur ; mais la nuance dont il est coloré est moins vive et moins brillante. On distingue dans le commerce jusqu'à quinze variétés de Corail, qui, à raison de leur variété de leurs couleurs, portent les noms de Corail écume de sang, Corail fleur de sang, Corail premier second, troisième sang, etc. Aucun n'est plus en usage en médecine, si ce n'est comme absorbant ; on s'en sert comme dentifrice, après lui avoir fait subir diverses préparations qui diffèrent très-peu les unes des autres ; elles consistent presque toutes à le réduire en poudre impalpable et à le consommer en bouillie. Si les médecins ont banni le Corail de leurs ordonnances, la mode capricieuse s'en est emparée de nouveau, et semble depuis plusieurs années s'être fixée pour employer cette brillante matière à une seule d'objets qui en ont considérablement augmenté le prix. Les diadèmes, les per-

gnes qui ornent, relèvent ou retiennent d'une manière si élégante les cheveux des jeunes personnes, sont garnis de grains de Corail, unis ou taillés à lucettes. Les colliers et les bracelets en sont quelquefois entièrement composés. L'Asie et l'Afrique recherchent toujours cette substance avec la même passion que du temps de Pline, et l'emploient aux mêmes usages. Maintenant encore le Siamois et le Sakhir indiens, s'en servent pour compter leurs prières. L'infatigable Bédouin, le désert Musulman, le corsaire d'Alger, ont-ils livrer au mauvais génie le corps de l'être chéri qu'on dépose dans la tombe, s'il n'était accompagné d'un chapelet de grains de Corail. Cette riche production en tout-ours le poignard de l'Asiatique effeminé, fait ressortir la blancheur de l'esclave de Circassie ou l'ébène de la noire Africaine ; elle embellit la simple bayadère, et donne de l'éclat à la couleur olivâtre de son teint.

Le Corail pâlit ; il devient quelquefois blanc et poreux, lorsqu'il est porté sur la peau dans un lieu très-chaud. Quelle que soit sa densité, quelque belle, quelque saine, que soit sa couleur, elle se détruit par la transpiration de certaines personnes.

C'est par erreur que l'on indique le Corail dans les différentes listes des pays chauds : le commerce le transporte dans tous les climats, chez tous les peuples ; mais c'est dans la Méditerranée seulement que croît, et se développe le plus précieux de tous les Polypiers. (LAM. X.)

L'on appelait anciennement CORAIL BLANC, dans les pharmacies, des rameaux d'Oculines ou de Caryophyllies, et CORAIL NOIR, les Anthipathes. V. ces mots. (B.)

CORAIL BOT. On a étendu ce nom à plusieurs Plantes dont le couleur de certaines parties ; on don- la forme rappelle le Corail, genre de Polypiers ; ainsi l'on a appelé :

CORAIL DES JARDINS, *Polypodium* *Corallodendron* et le *Capsicum* an-

um, d'où le mot provençal *Courda* désigne cette dernière Plante.

PETIT CORAIL, le Buisson ardent, *aspilus Pyracantha*, L.

CORAIL TERRESTRE, la plupart des nomyces, et particulièrement le *chen rangiferinus*, L. (B.)

\* CORAIL FOSSILE. POLYP. Cryptographes donnent souvent nom aux Polypiers fossiles rameux. Le vrai Corail n'a pas encore été trouvé fossile dans la nature. (LAM. X.)

CORATIONOILLOU. BOT. PHAN. Coraillonbillou. *F. comantou*. (B.)

\* CORAI-PILLOU. BOT. PHAN. pèce d'*Eleusine* et le *Schumia coratus* à la côte de Coromandel. (B.)

\* CORAI-PON. BOT. PHAN. Un uchet indéterminé de la côte de Coromandel. (B.)

CORAL. REPT. OPH. Syn. de *Boa strictor* sur les bords de la rivière s Amazones. (B.)

CORALLACHATES. MIN. (Plin.) atches couleur de Corail, ou parsees de points et de taches qui ont pparence de l'Or. (B.)

CORALLAIRES. POLYP. Blainville a donné ce nom à un ordre de lypiers dans lequel il réunit les res Corail, Isis et Gorgone. Il lui ne pour caractères d'avoir des Pores à huit tentacules penniformes bouche, communiquant entre eux plus ou moins grand nombre, au yen d'une pulpe charnue, conctile, entourant un axe central, caire ou corné, plein ou articulé, mant un Polypier phytoïde fixé aux ps sous-marins par un empale-nt de sa base. Cet ordre n'est pas ore adopté par les naturalistes. (LAM. X.)

\* CORALLARIA. REPT. PHAN. imph. Syn. d'*Adonanthura* et de *delupa*. *F. oca mois*. (B.)

CORALLINE. CORALLES. REPT. OPH. Cet ordre sous ce nom, et sur ens des Boas; un genre que Cu- n'a même pas mentionné. Il est

attribuant pour caractères: un corps cylindrique; une queue courte; des écailles nombreuses sur la tête, le corps et la queue; des rangées de doubles plaques sous le cou, des plaques entières sous le ventre et sous la queue. Il paraît que ces caractères qui par eux-mêmes seraient insuffisants, pourraient bien n'être même pas exacts. La seule espèce de Coralle mentionnée par le fondateur du genre est le *Boa Merremii* de Schneider, dont on ne connaît pas précisément la patrie, et qu'on suppose être un Serpent américain non venimeux. (B.)

CORALLIGÈNES - SCYTALES. POLYP. Nom que l'on a donné aux Polypes des Coraux. (LAM. X.)

CORALLIN ou CORALLINE. REPT. OPH. (Schæ; Thes; pl. de fr.) Probablement une espèce de *Boa* d'Amboine et une Vipère. (B.)

CORALLINAIRES. POLYP. Blainville donne ce nom à la seconde division de la deuxième classe de son troisième sous-règne, appelé Hétero-zoophes ou Agastrozoaires; il y place comme en dehors du règne animal les Corallines où il n'a pu découvrir d'habitans, et que R. Brown réclame, selon lui, dans le domaine de la botanique. (B.)

CORALLINE. REPT. OPH. *F. Corallin*. (B.)

CORALLINE. MOLL. Nom marchand du *Pecten sanguineus*. *F. Pecten*. (B.)

CORALLINE. *Corallina*. POLYP. Genre de l'ordre des Corallinées, auquel il sert de type, dans la division des Polypiers flexibles. Lamiarck le place parmi ses Polypiers corticifères. Cuvier en fait un groupe séparé auquel il conserve le nom de Corallines. Quelques naturalistes les regardent à tort comme des Végétaux. Voici le caractère de ce genre: Polypier phytoïde, articulé, rameux, tri-ehotome; axe entièrement composé de fibres cornées; écorce crétacée cellulaire; cellules invisibles à l'œil

nu. Les Polypiers auxquels nous conservons le nom générique de Corallines varient peu, et offrent toujours des tiges articulées, plus ou moins comprimées, plus ou moins rameuses et trichotomes. Leurs couleurs, lorsqu'elles sont fraîches, sont en général rougeâtres ou purpurines. Exposées peu de temps à l'action de l'air, de la lumière et de l'humidité, elles présentent une grande quantité de nuances plus éclatantes les unes que les autres. Depuis le rose tendre et vif jusqu'au brun terne ou verdâtre, on observe des gradations infinies; toutes les Corallinées deviennent blanches assez promptement par l'action des fluides atmosphériques. Les Corallines se trouvent à toutes les latitudes, à toutes les profondeurs, et sur les côtes des cinq parties du monde. On observe cependant que dans les mers équatoriales elles sont plus grandes, plus brillamment colorées, et d'une forme plus singulière ou plus élégante. Fixées ordinairement sur les rochers ou d'autres corps durs presque immobiles, elles y bravent l'action des vagues, et sont bien rarement jetées sur les rivages. Deux ou trois espèces seulement de Corallines sont parasites sur les Thalassiophytes, tandis que la presque totalité des Janies ne croissent ou ne se développent que sur ces Végétaux. La grandeur des Corallines varie peu; elle dépasse quelquefois un décimètre; en général elle est plus petite; nous n'en connaissons point au-dessous de deux centimètres.

Les anciens faisaient un grand usage de la Coralline officinale comme un puissant anthelmintique et un absorbant. Au commencement du dix-huitième siècle, l'usage de ce Polypier était presque tombé en désuétude; depuis il a été remis en vogue par la réputation que s'est acquise le *Gigartina Helminthochorton* (*Fucus Helminthochorton aut.*), vulgairement appelé Mousse de Corse, et dont les propriétés paraissent de même nature. Nous avons visité très-souvent

la Coralline officinale des pharmacies, et l'avons trouvée constamment mêlée avec une foule de productions marines polypeuses ou végétales, qui n'altéreraient en aucune manière son action sur l'économie animale. Il en est de même de la Mousse de Corse, dans laquelle nous avons reconnu plus de cent cinquante espèces de productions marines de tout genre. Bouvier de Marseille a donné une très-bonne analyse de la Coralline officinale, telle qu'elle existe chez les pharmaciens et dans les collections. Il l'a trouvée composée, sur mille grains, de : Sel marin, 10; Gelatine, 69; Albumine, 64; Sulfate de Chaux, 19; Silice, 7; Fer, 2; Phosphate de Chaux, 5; Magnésie, 23; Chaux, 420; Acide carbonique combiné avec la Chaux, 196; *idem* avec la Magnésie, 51; Eau 41. Total 1,000 grains. (Ann. de Chimie, T. VIII, p. 308 à 317.) Cette analyse ne diffère pas essentiellement de celle de la Mousse de Corse publiée par le même auteur; cependant on ne doit rien en conclure, parce qu'elles ont été faites sur des Polypiers dont l'espèce n'était pas bien certaine, et qui étaient dépouillés par la dessiccation, le froissement, l'exposition à l'air, à la lumière, à l'humidité, et peut-être encore par les lavages de beaucoup de substances animales, dissolubles ou friables. Il est probable qu'une analyse faite sur le Polypier en bon état, au sortir de la mer, et dont les Polypes seraient encore vivans, différencierait beaucoup de celle de Bouvier qui n'a opéré que sur un squelette dépouillé de toutes les parties animales.

CORALLINE OFFICINALE; *Corallina officinalis*, L., Gmel., *Syst. Nat.*, XIII, f. 1, p. 3838, n° 2; N., *Hist. Polyp.*, p. 283, n° 414. Aucune Coralline ne varie autant que l'Officinale; elle est dans ce genre ce que sont le *Fucus vésiculeux* et le *Chondrus polymorphe* parmi les Hydrophytes. Il est impossible de décrire ces nombreuses variétés à cause des nuances insensibles qui les lient entre elles. Néanmoins nous croyons qu'il serait

possible de distinguer quelques espèces confondues avec l'Officinale, si on trouvait des mots pour exprimer de légères différences dans les caractères, mais constantes et indépendantes de l'influence des positions, etc. Nous avons dans notre collection des variétés de la Coralline officinale recueillies sur les côtes de toute l'Europe, sur celles de l'Afrique septentrionale, des Canaries, au cap de Bonne-Espérance, sur les côtes de la Nouvelle-Zélande, du Japon et du Kamtschatka. Est-ce une seule et même espèce ?

**CORALLINE DE CUVIER**, *Corallina cuvieri*, N., Genr. Polyp., p. 24, t. 59, fig. 13-14. Elle est très-rameuse, à rameaux bipinnés avec des divisions fines partant de chaque article, et même imbriquées entre elles. Les articulations sont presque globuleuses dans les tiges, comprimées dans les rameaux et les divisions, et cylindriques dans les pinnules. Des ovaires globuleux terminent quelquefois ces dernières. Cette belle espèce de Coralline habite les côtes de l'Australasie. Nous l'avons dédiée à Aristote de notre siècle.

**CORALLINE GRÈLE**, *Corallina gracilis*, N., Hist. Polyp., p. 288, n. 425, fig. 10, f. 1, a, b. Elle est remarquable par sa tige élancée, se courbant avec grâce, ainsi que par ses rameaux nombreux et allongés, composés d'articulations rapprochées, cylindriques dans la partie inférieure du Polypier, comprimées dans les supérieures. Elle habite les mers australes.

**CORALLINE DE TURNER**, *Corallina turneri*, N., Hist. Polyp., p. 288, n. 426, pl. 10, fig. 2, a, b. Nous avons dédié cette Coralline, une des plus élégantes qui existe, à Dawson Turner, auteur de bons et magnifiques ouvrages sur les Plantes marines; elle offre des articulations cunéiformes, comprimées sur les côtés dans les tiges et les rameaux, et cylindriques dans leurs divisions. Elle se trouve dans les mers australes.

**CORALLINE DU CALVADOS**, *Corallina calvadosii*, N., Genr. Polyp., p.

23, t. 23, fig. 14, 15. Solander, dans Ellis, regarde cette espèce comme une variété de la Coralline officinale. Elle se rapproche davantage de la Coralline palmée, originaire d'Amérique. Elle diffère de l'une et de l'autre par ses articulations irrégulièrement comprimées, quelquefois zoncées et polymorphes. Nous l'avons trouvée sur les rochers du Calvados et dans les environs de Port-en-Bessin.

A ces espèces l'on doit ajouter les Corallines cuirassée, Sol. et Ellis. Méditerranée. — Corall. nodulaire, Pallas. Méditerranée. — Corall. allongée, Sol. et Ellis. Mers d'Europe. — Corall. polychotome, Lamx. Malte, Gibraltar, etc. — Corallin. lobée, Lamx. Canaries. — Corall. Cyprès, Esper. Ténériffe, Calvados. — Corall. écailleuse, Sol. et Ellis. Océan Européen. — Corall. granifère, Sol. et Ellis. Méditerranée, etc. — Corall. subulée, Sol. et Ellis. Antilles. — Corall. sagittée, *spec. nov.*, rapportée de l'Île-de-France par Quoy et Gaimard, ainsi que la Coralline à petites panicules. — Corall. frisée, Lamx. Australasie. — Corall. pilifère, Lamx. Australasie. — Corall. simple, Lamx. Amérique. — Corall. palmée, Sol. et Ellis. Mers d'Amérique. — Corall. prolifère, Lamx. Indes-Orientales. — Corall. pinnée, Sol. et Ellis. Habitation inconnue.

Il existe dans les collections un grand nombre d'espèces nouvelles de ce genre déjà si considérable: nous avons cru inutile de les mentionner.

Fortis, dans ses Mémoires pour servir à l'histoire naturelle de l'Italie, T. 1, p. 45, dit avoir trouvé des rameaux de Corallines fossiles dans les montagnes de Brendola en Italie. Ce fait est très-possible, puisque l'on découvre chaque jour des Flustres, des Alcyonées et d'autres Polypiers mous ou cornés parmi les débris de l'ancien monde. (LAM. X.)

\* **CORALLINE DE PAQUES**. NOT. CRYPT. (*Lichens.*) Syn. de *Stereocaulon pascale*. (B.)

**CORALLINÉES**. *Corallineæ*. Or-

dre de la division des Polypiers flexibles dans la section des Calcifères. Il a les caractères suivans : Polypiers phytoides formés de deux substances : l'une, intérieure ou axe, membraneuse ou fibreuse, fistuleuse ou plétie ; l'autre, extérieure ou écorce, plus ou moins épaisse, calcaire et parsemée de cellules polypifères, très-rarement visibles à l'œil nu dans l'état de vie, encore moins dans l'état de dessiccation. Les auteurs anciens avoient réuni, sous le nom de Corallines, tous les Polypiers flexibles, tels que les Sertulariées, les Tubulariées, etc. Les auteurs modernes ont conservé cette dénomination à un groupe d'êtres que nous avons cru devoir diviser en plusieurs genres, à cause des nombreux caractères que l'on y observe ; en effet, ces Polypiers diffèrent par le *facies*, la forme, la division des rameaux et par l'organisation, caractères essentiels qui ne permettent pas de douter que les constructeurs de ces élégans édifices, quoique présentant entre eux des rapports généraux, n'offrent des différences suffisantes pour constituer des genres ; nous ne pensons même pas qu'un naturaliste puisse attribuer à des Animaux de même forme les *Cor. Peniculus*, *Tuba*, *fiabellata*, *officinalis* et *rubens*, L. Tous les Polypiers de ce groupe ont été regardés par Linné comme des productions animales, à cause de la matière calcaire qui entre dans leur composition ; le naturaliste suédois avoit fondé son opinion sur ce principe, que tout être organisé dans lequel la Chaux entre comme principe constituant, ne peut être qu'un Animal. Spallanzani, considérant cette matière calcaire comme un dépôt des eaux de la mer, place les Corallines parmi les Végétaux, et prétend avoir découvert leurs graines. Les auteurs qui regardent, d'après Pallas et Spallanzani, les Corallines comme des Végétaux, disent que la Chaux est une terre primitive, et qu'elle n'est pas due uniquement aux Animaux ; que tous les efforts que l'on a faits jusqu'à présent pour découvrir les Polypes des Corallines ont été vains, et que

s'ils existoient, ils n'auroient point échappé, aux Ellis, aux Donati et à tant d'autres zoologistes célèbres ; mais si l'on considère les détails anatomiques de l'*Halimède Raquette*, figurés par Ellis, et principalement ceux de la *Coralline Rosière*, figurés dans Solander et Ellis, il sera facile de se convaincre de l'existence des Polypes, par celle des cellules qui leur servent de demeure. Les Corallines d'Europe ont leurs cellules polypenses d'une telle petitesse, et si sujettes à s'oblitérer, qu'il n'est pas extraordinaire qu'on n'ait pu les découvrir ; dans celles des mers équatoriales, les cellules sont beaucoup plus grandes, visibles même à l'œil nu, et il ne faut qu'une circonstance favorable pour faire découvrir les Animaux inconnus qui les habitent, et mettre à même d'étudier les divers phénomènes de leur nutrition, de leur croissance et de leur reproduction.

En parcourant les côtes du Calvados, nous avons trouvé plusieurs fois une *Coralline* très-grande, variété remarquable de la *C. officinalis* ; elle étoit couverte de filamens simples, longs d'un à deux millimètres, diphanes, ayant un mouvement particulier, et disparaissant pour peu que l'eau fût agitée, on qu'on exposât le Polypier à l'air ; dans ce dernier cas, nous n'avons jamais pu découvrir avec une loupe très-forte les débris de ces filamens, ni leur point d'attache, ou leurs cellules, si c'étoient des Polypes, ce dont nous doutons, n'ayant pu observer ces filamens que dans la belle saison seulement sur quelques individus, et jamais dans l'hiver. On dira sans doute que ces filamens sont des Conferves gélatineuses ; en adoptant cette hypothèse, les débris de ces Hydrophytes devraient exister détachés sur la surface des Corallines ; bien plus, tous les individus n'en seroient pas également pourvus. Et comme l'on ne découvre aucun débris de ces filamens, et que lorsque l'on se trouve dans les circonstances favorables pour les observer, on les voit épar-



le Polyptère, exécutant des mouvements particuliers, l'on est fondé à considérer comme les constructeurs de ces productions. Enfin dirons que les Nullipores, si répandus dans toutes les mers, et dont on n'a jamais pu découvrir les Animaux, ne sont pas des Polyptères par la raison qu'on n'a pu voir les Polypes? Cette manière de raisonner serait fautive et entraînerait à des erreurs sans nombre. Dans les rapports des êtres, il faut souvent avoir recours à l'analogie, de même que l'on ne peut séparer les Nullipores des Méduses, de même l'on doit réunir les Corallinées aux autres Polyptères flexibles.

Pallas regarde les Corallines comme des Plantes, et les place cependant parmi les Zoophytes douteux; il y a tout le *Diatyda pavonia* (*Fucus ponius auct.*), d'après sa ressemblance avec l'Udotée flabelliforme, et cétabulaire de la Méditerranée, à cause de sa substance, quoiqu'il ressemble dans ces êtres des différences de croissance et d'organisation. Il a également observé la composition des corallines tubuleuses dont nous avons mé notre genre *Galaxaura*; n'en ayant décrit qu'une seule espèce, il n'a pas trouvé des caractères assez distincts pour en faire un genre particulier. Aucun zoologiste n'a encore connu les Corallines des mers Indes; on doutait même qu'il y en eût. Bosc, dirigé par ce génie particulier qui distingue le philosophe naturaliste, a avancé qu'il devait en trouver, et peut-être en plus grande quantité que dans les autres parties du monde. En effet, Péron et Bosc ont rapporté de leur voyage plusieurs Corallines, plus élégantes, plus singulières dans leurs formes que aucune de celles que nous connaissons. Nous en avons reçu de très-belles de plusieurs autres naturalistes, principalement de Labillardière, Quoy, Gaimard, Leschenaux, etc.

On observe quelquefois dans les corallinées des genres *Corallina* et *Cladonia*, de petits globules plus ou moins volumineux et variant dans

leur substance; les tubercules que l'on trouve sur les *Asaphodes*, les *Halimèdes*, les *Udotées* et les *Mélombécies*, nous semblent analogues. Elles pensent que les vésicules des premières étaient uniquement destinées à les soutenir flottantes dans l'eau; mais ces vésicules sont rarement vides; nous les avons souvent trouvées solides ou remplies de petits grains dont la nature nous est inconnue. Ne serait-ce pas des ovaires renfermant des germes de nouveaux Polyptères? L'opinion d'Ellis n'est basée sur rien, tandis que celle que nous proposons est fondée sur l'analogie qui lie entre eux tous les Polyptères flexibles, se multipliant par des ovaires. Les Corallinées varient prodigieusement dans leurs formes; et l'on trouve tous les intermédiaires entre les Janies capillaires et filiformes, et les Udotées flabellées qui offrent une expansion plane, en forme d'éventail. La couleur des Corallinées varie peu; elle dépasse quelquefois un décimètre; en général elle est plus petite; nous n'en connaissons point au-dessous de deux centimètres. La couleur des Corallinées varie beaucoup dans l'état de dessiccation et de mort par l'action que les fluides atmosphériques ont exercée sur ces élégans Polyptères. Les collections en présentent de toutes les nuances depuis le blanc de neige jusqu'aux nuances les plus sombres et les plus foncées; en général elles sont parsemées de teintes jaunes, rouges, purpurines, vertes et bleues; toutes se fondent les unes dans les autres, en nombre plus considérable. Ces variations de couleur, très-souvent dans les mêmes espèces, rapprochent sous ce rapport les Corallinées des Floridées dont le tissu est presque aussi délicat que celui des corolles des Plantes, et cependant quelle énorme différence entre ces deux qui l'un ne peut toucher sans l'autre, et l'autre devient pierreuse presque solide qui renferme les Corallinées! Il faut donc en faire une nouvelle classe d'Hydrophytes. Dans l'état de vie les Corallinées sont en général rosâtres ou d'un vert d'herbe clair et brillant, avec des

nuances intermédiaires entre ces deux couleurs. Elles habitent toutes les latitudes, se trouvent à toutes les profondeurs et sur les côtes des cinq parties du monde. On observe cependant que dans les mers équatoriales elles sont plus grandes, plus brillamment colorées et d'une forme plus singulière ou plus élégante. Fixées ordinairement sur les rochers ou d'autres corps durs presque immobiles, elles y bravent l'action des vagues, et sont bien rarement jetées sur les rivages. Quelques espèces seulement de Corallinées sont parasites sur les Hydrophytes, tandis que la presque totalité des Janies ne croissent ou ne se développent que sur ces Végétaux.

Les Corallinées se divisent en trois sous-ordres : le premier se compose du genre *Galaxaura* à tige et rameaux tubuleux ; le second comprend les genres *Nésée*, *Janie*, *Coralline*, *Cymopolie*, *Amphiroë* et *Halimède* à rameaux articulés ; le troisième n'est composé que des *Udotées* sans aucune sorte d'articulations. V. ces mots.

(LAM..X.)

**CORALLINITES.** POLYP. FOSS. Les oryctographes désignent sous ce nom les Polypiers fossiles à petits rameaux. Ils appellent Corallites ceux dont les rameaux sont plus gros. (LAM..X.)

**CORALLINOIDES.** BOT. CRYPT. (*Lichens*.) Hoffman avait désigné sous ce nom quelques Lichens appartenant aux genres *Sphaerophoron*, *Streocaulon* et *Cornicularia* d'Achar. V. ces mots. (AD. B.)

\* **CORALLIOLE.** *Coralliola*. POLYP. Mercati donne ce nom à quelques Polypiers de l'ordre des Milleporées, principalement au *Millepora truncata*. V. ce mot. (LAM..X.)

**CORALLIS.** MIN. (Pline.) Probablement un Jaspe rouge que les anciens tiraient de Syène. (B.)

**CORALLITES.** POLYP. FOSS. V. CORALLINITES.

**CORALLODENDRON.** POLYP. Séba a figuré et décrit sous le nom de *Corallodendron* pervenue l'*Eschara*

*crustulenta* de Pallas, et le *Melitaea ochracea* sous le nom de *Corallodendron vulgare rubrum*. V. *ESCHARE* et *MELITÉE*. (LAM..X.)

**CORALLODENDRUM.** BOT. PHAN. C'est-à-dire *Arbre de Corail*. Espèces du genre *Erythrine* et du genre *Sophora*. Ce nom désignait une Rudolphe dans Plumier. (B.)

\* **CORALLO-FUNGUS.** BOT. CRYPT. (*Champignons*.) Vaillant a donné ce nom à quelques espèces de Clavaires rameuses de la section des *Ramaria* de Persoon, dont la forme rappelle celle des Polypiers ou du Corail. Il a aussi désigné sous le nom de *Corallo-Fungus argenteus* le *Byssus parietina* de Linné, ou *Hypha argentea* de Persoon, et sous celui de *Corallo-Fungus niger compressus*, le *Rhizomorpha subcorticalis*. V. *CLAVAIRES*, *HYPHA* et *RHIZOMORPHE*. (AD. B.)

**CORALLOIDE.** BOT. PHAN. (Gessner.) Syn. de *Dentaire ennéaphylle*. (B.)

**CORALLOIDES.** POLYP. FOSS. Guettard, dans ses Mémoires, a donné ce nom à plusieurs Fossiles difficiles à caractériser, à cause d'une ressemblance grossière avec des rameaux de Corail. Ils paraissent appartenir à plusieurs genres.

Des Gorgones ont été nommées Coralloïdes par quelques anciens auteurs. (LAM..X.)

**CORALLOIDES.** BOT. CRYPT. Tournefort, Vaillant, Micheli et Paulet ont donné ce nom aux espèces de Clavaires rameuses et analogues par leur forme à certaines espèces de Polypiers. Dillen a appliqué ce même nom à plusieurs espèces de Lichens des genres *Sphaerophore* et *Cénomyce*. Enfin, plus récemment, Bory de Saint-Vincent l'a employé dans son Voyage aux îles australes d'Afrique, pour désigner diverses espèces du genre *Cénomyce*. V. ces mots. (AD. B.)

**CORALLOPÈTRES.** POLYP. Nom appliqué indistinctement à tous les

lypiers fossiles par quelques anciens  
ctographes. (LAM..X.)

**CORALLORHIZE.** *Corallorhiza*.

r. PHAN. Haller le premier, dans l'Histoire des Plantes de la Suisse, propose ce nom pour une petite plante de la famille des Orchidées, remarquable par sa racine formée de ramifications irrégulières et rougeâtres, qui offrent quelque ressemblance avec les branches du Corail. Linné fit cette jolie Plante une espèce de son genre *Ophrys*, sous le nom d'*Ophrys corallorhiza*. Plus tard, Swartz, dans son Mémoire sur les Orchidées, transféra cette Plante dans le genre *Cymbidium*. Enfin R. Brown, dans la seconde édition du Jardin de Kew, et le professeur Richard, dans son travail sur les Orchidées d'Europe, en ont fait un genre distinct sous le nom de *corallorhiza*. Voici quels sont les caractères de ce nouveau genre : son pédoncule est légèrement pédicellé, un peu tordu à sa base surtout. Les cinq divisions du calice sont un peu inégales, étalées ou rapprochées en cascade. Le labelle est ovale oblong, légèrement canaliculé. A la base des divisions externes du calice et du labelle est une petite bourse ou pérule profonde, adhérente par son côté interne. Le gynostème est long, dressé, un peu canaliculé antérieurement. Le stigmat est concave, glanduleux, surmonté d'un petit appendice en méduse. L'anthere est terminale, s'ouvre d'avant en arrière par le moyen d'une sorte d'opercule. Elle se divise en deux loges principales subdivisées chacune en deux autres cavités qui chacune contiennent une masse globuleuse de pollen solide.

Deux espèces composent ce genre. La première est la *Corallorhiza Hallerii*, Sch. (Orch. d'Europe), ou *Ophrys corallorhiza*, L. Cette jolie Orchidée vit dans les Alpes, le Jura, etc. De sa racine qui se compose de tubercules allongés et irrégulièrement marronnés s'élève une tige simple, haute de six à dix pouces, dépourvue de feuilles qui sont remplacées par

quelques écailles engainantes, et terminée par une dizaine de fleurs blanchâtres, peu apparentes et formant un épi terminal. Son labelle est légèrement trilobé.

La seconde espèce, appelée par Willdenow *Cymbidium Odontorhizon*, est la *Corallorhiza Odontorhiza* de Nuttall. Elle croît en abondance dans la Pensylvanie, le New-Jersey. Elle diffère surtout de la précédente par sa racine plus rameuse, son labelle entier et marqué de pourpre. Du reste, ces deux espèces se ressemblent absolument par le port. (A.R.)

\***CORAMBÉ ET CORAMBLÉ.** BOT. PHAN. D'où probablement Corumb et Karumb des Maures. Noms grecs du Chou. (B.)

\***CORANÇONCILLO.** BOT. PHAN. Pour Corazoncillo. V. ce mot. (B.)

**CORASSIN.** POIS. Espèce du genre Cyprin. V. ce mot. Vulgairement Namburge et Coras en Hongrie. (B.)

\***CORATOE OU CURAÇA.** BOT. PHAN. Syn. d'*Agave vivipara* à la Jamaïque. (B.)

**CORAX.** OIS. Syn. grec du Corbeau noir, *Corvus Corax*, L. Aristote l'applique aussi au grand Cormoran, *Pelecanus Carbo*, L. V. CORBEAU et CORMORAN. (DR..Z.)

**CORAX.** POIS. Syn. de Trigle Hirondelle. V. TRIGLE. (B.)

**CORAYA.** OIS. Espèce de Batare, V. ce mot. (B.)

**CORAZON.** MOLL. C'est-à-dire Cœur. Syn. espagnol de Bucardo. V. ce mot. (B.)

**CORAZONCILLO.** BOT. PHAN. (L'Ecluse.) C'est-à-dire Petit Cœur. L'un des noms vulgaires de l'*Hypocistis humifusum*, donné quelquefois au *perforatum*. V. MULLEPERTUIS.

Les habitants de Carichana sur les rives de l'Orénoque donnent aussi le nom de Corazoncillo au *Convolvulus discolor*, Kunth (*Nova Genera et Sp.*

*Ant. T. III, p. 105; t. 319*), Plante dont ils emploient les feuilles en décoction comme remède contre la hémorrhagie. (N.)

**CORB.** ROIS. Espèce du genre Scieur. (B.)

\* **CORBAT.** OIS. Syn. vulgaire du grand Cormoran; *Pelecanus Carbo*; L. V. CORMORAN. (DR. Z.)

**CORBEAU.** *Corvus*. OIS. (Linné.) Genre de l'ordre des Omnivores. Caractères : bec droit, gros, comprimé sur les côtés, tranchant sur ses bords, courbé vers la pointe; narines placées à la base du bec, ovalaires, ouvertes, cachées par des poils dirigés en avant, qui entourent la base du bec; quatre doigts, trois en avant presque entièrement divisés, l'intermédiaire plus court que le tarse; un doigt; ailes longues, pointues; les deuxième et troisième rémiges plus courtes que la quatrième; rectrices ordinairement égales, quelquefois arrondissant la queue.

Il n'est pas de genre dont les principales espèces, confondues sous la seule dénomination générique de Corbeau, se retrouvent plus fréquemment et plus universellement; de même il est peu d'Oiseaux qui, sur toute l'étendue du globe, aient plus diversement fixé l'attention des Hommes. Considérés dans certains cantons comme des bienfaiteurs sans cesse occupés à purger la terre de Vers et d'Insectes, ou comme des envoyés du destin pour présider au sort des malades, on leur accorde toute espèce de protection; dans d'autres pays, au contraire, en butte aux persécutions dirigées contre des bandes affamées, leur tête mise à prix est l'objet d'un salaire public. Du reste, les persécutions que l'on exerce contre eux n'en diminuent pas sensiblement le nombre; leurs troupeaux n'en courent pas moins, pendant la saison morte surtout, nos routes et nos campagnes ensemencées par leurs passées paraissent pas occasionner de dommages considérables. Ils s'y procurent d'un pas grave et

tranquille; ils ne s'effraient point de l'approche de l'Homme, à moins que celui-ci ne soit armé d'un fusil, ce qu'ils savent distinguer d'assez loin pour se tenir hors de sa portée. Ils sont d'un caractère turbulent, bavard, querelleur, défiant, et, soit prévoyance ou manie, ce qui est plus probable, puisqu'ils ne paraissent pas conserver le souvenir de leurs actions, ils cachent tout ce qu'ils accumulent, surtout en fait de provisions superflues. Ils se font assez facilement à la domesticité, retenant les mots qu'on leur a répétés souvent dans leur jeunesse, et finissent par les entendre beaucoup de pureté dans la modulation. L'analogie de leurs sons s'étend à tout le genre; il est cependant quelques nuances particulières à différentes espèces; les unes, par exemple, aiment les longs voyages, cherchent les frimas, donnent une préférence exclusive à la vie sociale, etc., etc.; d'autres sont sédentaires, ne se montrent que par couples et dans toutes les saisons, etc. En général les Corbeaux sont monogames, et dès qu'ils ont contracté une union, elle paraît avoir de terme qu'à la mort de l'un des sexes. Il est peu d'Oiseaux dont l'instinct ou les facultés intellectuelles soient plus perfectionnées, si l'on en croit Dupont de Nemours, Mémoire sur l'instinct, lu à la classe des Sciences physiques et mathématiques de l'Institut de France, en 1806, académicien fort estimable, très-instruit, et bon philanthrope d'ailleurs, qui a passé deux hivers dans la société des Corbeaux, occupé à les observer dans l'état de liberté, ils ont un langage communicatif qu'il n'est pas impossible à l'Homme de comprendre. Cet observateur a même publié un fragment de son Dictionnaire d'un langage jusqu'ici non interprété, au moyen duquel il a traduit plusieurs de leurs mots. Il est à regretter qu'il n'ait point poussé plus loin ses recherches; il sût peut-être parvenir à entendre des conversations; à entretenir des correspondances avec les visiteurs des régions de l'équateur.

c quelques mots ils nous en au-  
rent plus appris que n'ont pu le  
Gay-Lussac et Biot à la suite  
d'un voyage des plus périlleux.

On a rendu son genre Corbeau  
très-nombreux en y admettant beau-  
coup d'espèces qu'il n'avait pu voir,  
dont par la suite on a fait des genres  
nouveaux, ou que l'on a cru devoir  
séparer dans d'autres genres cou-  
sins. Il est même quelques auteurs,  
comme Linné, de ce nombre, qui ont  
étendu la restriction jusqu'aux Pies  
aux Genis dont les caractères n'ont  
paru à Temminck assez distincts  
de ceux des Corbeaux pour les en sé-  
parer.

**CORBEAU** ou **CORNEILLE AQUATILE**.  
**L. V. CORBEAU CORNEILLE MAN-  
TÉE.**

**CORBEAU AUSTRAL**, *Corvus australis*,  
Gmel. Entièrement d'un noir  
jaunâtre, avec les plumes de la gorge  
brunes, peu serrées; bec épais à sa  
base et très-comprimé sur les côtés.  
Longueur, huit pouces. De l'île des  
Indes.

**CORBEAU À BEC CROISÉ**, *Corvus cur-  
virostris*, Dauidin. Variété présumée  
du Corbeau à duvet blanc, dont les  
deux mandibules seraient croisées  
l'une sur l'autre. De Porto-Rico.

**CORBEAU OU CORNEILLE BEDEAUDE.**  
**CORBEAU MANTÉLÉ.**

**CORBEAU BLANC**, *Corvus Corax al-  
bus*, Gmel. Variété accidentelle du  
Corbeau noir, qui est en partie ou to-  
tally blanche.

**CORBEAU CALÉDONIEN**, *Corvus  
calonicus*, L. Cendré avec le bec,  
la queue et les pieds noirs. Taille,  
dix-huit pouces. De la Nouvelle-Calé-  
donie. Espèce douteuse.

**CORBEAU DU CAP**. **V. CORBEAU  
D'AFRIQUE**, jeune âge.

**CORBEAU CENDRÉ**. **V. CORBEAU  
MANTÉLÉ.**

**CORBEAU OU CORNEILLE CHAUVÉ.**  
**CORBEAU FREUX**, adulte.

**CORBEAU DE LA CHINE**, *Coraciua  
sinensis*, Lath.; Rolle de la Chine,  
II., Buff., pl. enl. 620. Parties  
supérieures et inférieures d'un vert  
glaucé-marine pâle nuancé de vert

jaunâtre; front garni de plumes  
soyeuses rondes, dirigées en différens  
sens; plumes de la nuque longues,  
effilées, susceptibles de se redresser  
en huppe; les unes et les autres d'un  
vert jaunâtre; une bande noire, par-  
tant de l'angle du bec, entoure l'œil  
et la nuque; gorge et joues d'un  
vert jaunâtre; petites tectrices alaires  
brunes; rémiges brunes, olivâtres  
extérieurement et d'un brun marron  
à l'intérieur, les trois dernières pro-  
gressivement terminées de blanc ver-  
dâtre; bec et iris rouges; la mandi-  
bule supérieure entourée de quelques  
soies noires; pieds rougeâtres. Taille,  
onze à douze pouces.

**CORBEAU CHOUÇ**, *Corvus sparrow-  
hawk*, Frisch, Buff., pl. enl. 622.  
Plumage noir, irisé en vert et en vio-  
let; yeux environnés de petits points  
blancs renfermés dans un demi-cercle  
très-noir. Taille, douze pouces six li-  
gnes. Du midi de l'Europe. La plu-  
part des auteurs ont réuni cette es-  
pèce à la suivante dont ils la croient  
une simple variété.

**CORBEAU CHOUÇAS**, *Corvus Mone-  
dula*, L., Buff., pl. enl. 623. Parties  
supérieures noires, irisées en violet,  
ainsi que le sommet de la tête; occi-  
put et partie supérieure du cou cen-  
drés; parties inférieures noires; bec  
et pieds noirs; iris blanc. Longueur,  
treize pouces six lignes. La femelle  
est d'un noir moins brillant; elle est  
même grisâtre aux parties inférieures.  
On rencontre accidentellement des  
individus mélangés de blanc et même  
entièrement blancs. Habitans des  
tours, des clochers et des vieux châ-  
teaux, les Choucas y demeurent toute  
l'année; chez eux la saison des amours  
s'annonce par une recherche bruyan-  
te; les couples se réunissent ou se  
forment, se répandent dans les jar-  
dins où ils brisent les jeunes tiges  
d'Arbres ou d'Arbustes qui doivent  
servir à la construction ou à la répa-  
ration des nids qui sont toujours ras-  
semblés dans le même édifice ou sur  
le même Arbre, et souvent accolés:  
les uns contre les autres. La ponte est  
de cinq ou six œufs verdâtres parse-

més de quelques taches brunes. Les familles restent unies long-temps, encore après que les jeunes sont en état de pourvoir à leurs besoins; et c'est même alors que les pères leur témoignent plus de tendresse, tant ils semblent redouter le moment de la séparation.

**CORBEAU CHOUCAS GRIS DU BENGALÉ**, *Corvus splendens*, Vieill. Plumage d'un cendré bleuâtre à l'exception du sommet de la tête, des rémiges et rectrices, de la gorge, du bec et des pieds qui sont noirs. Taille, treize pouces.

**CORBEAU CHOUCAS MOUSTACHE**, *Corvus Hottentotus*, Lath., Buff., pl. enl. 226. Noir; plumes du dessus du cou longues et flexibles, formant une espèce de crinière; bec entouré de soies longues et étagées; queue longue. Taille, quatorze pouces. Du cap de Bonne-Espérance. Espèce rare et douteuse.

**CORBEAU A COLLIER. V. CORBEAU CHOUCAS.**

**CORBEAU COLOMBIEN**, *Corvus columbiana*, Wils., Ornith. amér., pl. 20, f. 2. Plumage d'une teinte isabelle plus foncée aux parties inférieures; rémiges bordées de noir bronzé; un trait blanc sur l'aile, formé par la bordure de quelques rémiges; rectrices blanches, les deux latérales noires; bec cendré; pieds noirs. Taille, treize pouces. De l'Amérique septentrionale.

**CORBEAU CORBINE**, *Corvus Corone*, L., Buff., pl. enl. 485. Plumage d'un noir lustré, irisé en violet; plumes de la poitrine larges et arrondies à l'extrémité; queue faiblement arrondie; bec et pieds noirs; iris brun. Longueur, dix-huit pouces. Varie accidentellement en gris roussâtre ou en brun. D'Europe. Les Corbines paraissent être également communes sur les deux continents, du moins dans leurs régions septentrionales; on les voit pendant l'hiver se réunir aux Frayonnes et aux Corneilles mantelées, et chercher en bonne intelligence la nourriture qui leur convient. Les troupes ne se

éparpillent même au milieu du jour. Les individus qui les composent vivent absolument en société; et d'un vol rapide, gaillard; ils ont le talent de se faire un brassement désagréable, les bois ou les bosquets qu'ils ont adoptés pour retraite de toutes les nuits. Le matin les ramènent ensemble aux champs pour y butiner de nouveau. Au printemps, ces grandes sociétés sont rompues; les couples fidèles dans leur union se choisissent un domaine où les ressources soient assurées, et s'occupent isolément de tout ce qui est relatif à leur future famille. Le nid qu'ils placent sur l'arbre le plus élevé, composé de branches épineuses entrelacées et mastiquées avec de la terre, est tapissé intérieurement de menues racines et d'herbes molles. La femelle pond cinq à six œufs blanchâtres, marqués de taches et de traits obscurs; que les deux sexes couvent alternativement pendant vingt jours avec une extrême persévérance, qui se change en tendresse non moins grande lorsque les petits sont éclos; on voit alors les Corbines résister avec un courage opiniâtre aux attaques que des Oiseaux de proie, supérieurs en force, dirigent contre la jeune famille dont ils sont très-friands, et parvenir quelquefois, après un combat sanglant, à mettre l'assaillant à mort. Les Corbines sont omnivores, se jettent sur les charognes et attaquent même à leur tour le petit gibier. Leur chair, noire et dure exhale une odeur fétide; elle est dédaignée du pauvre qui n'y a recours que dans les cas de disette absolue.

**CORBEAU CORNIFRONT**, *Corvus allicollis*, Lath., Levaill., Ois. d'Afr. pl. 50. Plumage noir lustré, avec une grande tache blanche sur le cou; cette tache forme de chaque côté une pointe qui s'étend sur la poitrine; ailes plus longues que la queue qui est étagée; bec très-courbé, noir à sa base qui est entourée de plumes rigides dirigées en avant, blanchâtre à la pointe. Taille, dix-huit pouces. De l'Afrique orientale. Levassant assure que cette espèce ne se contente pas de charo-

is, qu'elle attaque les Agneaux, les  
nes Gazelles, et qu'elle les dévore;  
souvent elle se perche sur le dos  
Buffes, des Elephans et des Rhi-  
céros, et recherche les larves d'in-  
sectes qui occupent les pustules dont  
beau de ces grands Mammifères est  
inaimablement couverte.

CORBEAU A DUVET BLANC, *Corvus  
cognatus*, Daud. Plumage noir  
à la base des plumes garnie d'un  
duvet blanc. Taille, dix-huit pouces.  
Antilles.

CORBEAU FRAYONNE OU FREUX,  
*Corvus frugilegus*, Lath., Buff., pl.

484. Plumage noir à reflets pour-  
pres; bec noir, raboteux, assez grêle  
et droit, blanchâtre à sa base qui est  
fronnée d'une peau nue et calleu-  
se d'un noir bleuâtre. Taille, dix-  
huit pouces six lignes. Cette espèce  
distingue par ses mœurs de la Corbiné  
à laquelle une similitude de plu-  
mage l'a fait souvent confondre. Elle  
habite les climats tempérés que dans  
l'hiver des frimas; aux approches  
du printemps, presque tous les Freux  
se retirent vers le Nord où ils s'occu-  
pent d'abord de leur reproduction.  
Leurs nids diffèrent de ceux des Cor-  
beaux en ce qu'il n'en est point de mas-  
sés de terre dans leur construction;  
ils sont en outre très-rapprochés les  
uns des autres sur le même terrain et  
sont sur le même Arbre. La ponte  
se compose de trois, quatre ou cinq œufs  
ovales, verdâtres, tachés de cendré  
noir. Les Freux ont beaucoup de  
difficulté pour leurs petits; ceux-ci,  
sortis du nid, ont la base du bec  
nue de petites plumes qui dispa-  
raissent bientôt par le frottement con-  
tinuel qu'éprouve cette partie que  
le jeune oiseau enfonce dans la terre pour y  
faire les graines; les Vers et les lar-  
vons dont il fait, ainsi que des fruits,  
son unique nourriture; il faut qu'il  
soit singulièrement tourmenté par la  
faim pour toucher aux charognes qui  
contrairement sont le mets favori des  
Corbines; du reste, les deux espèces,  
semblent criardes et nombreuses en  
troupe; couvrant même nos  
campagnes pendant l'hiver. La chair

du Freux, assez bonne et même déli-  
cate dans les jeunes, n'est point re-  
butee du pauvre comme celle du Cor-  
beau noir et des Corbines.

CORBEAU - GEAI AZURIN, *Graculus  
cyaneus*, Vieill. Tout le plumage  
d'un bleu d'azur; point de huppe ni  
d'aigrette sur la tête. Taille, treize  
pouces. Des Florides. Espèce douteu-  
se que quelques auteurs prétendent  
n'être qu'une variété du Geai de  
Steller.

CORBEAU - GEAI DE LA BAIE DE  
NOUTKA. V. GEAI DE STELLER.

CORBEAU-GEAI BLANCHE-COIFFE.  
V. CORBEAU-PIE BLANCHE-COIFFE.

CORBEAU-GEAI BLEU DE L'AMÉRI-  
QUE SEPTENTRIONALE, DU CANADA,  
et CORBEAU-GEAI BLEU HUPPÉ, *Corvus  
cristatus*, Lath., Buff., pl. 484.  
529. Parties supérieures d'un bleu  
cendré luisant; plumes du sommet de  
la tête longues et susceptibles de se  
relever en huppe; front noir; un col-  
lier de cette couleur entourant la  
gorge et formant une bande sur la  
nuque; tectrices alaires et rectrices  
d'un beau bleu d'azur, rayées de  
noir et terminées de blanc, à l'excepti-  
on des deux rectrices intermédiaires;  
rémiges noires, d'un bleu cendré à  
l'extérieur; gorge blanchâtre, bleu-  
âtre chez les adultes; poitrine d'un  
gris cendré qui s'éclaircit insensible-  
ment sur l'abdomen; bec et pieds  
noirs; iris bleuâtre. Taille, onze pou-  
ces. Très-commun dans l'Amérique  
septentrionale où ses habitudes sont  
à peu près celles de notre Geai d'Eu-  
rope.

CORBEAU - GEAI BLEU - VERT,  
*Graculus melanogaster*, Vieill., Lev.,  
Oiseaux de Paradis, pl. 44. Parties su-  
périeures et poitrine d'un cendré bru-  
nâtre nuancé de bleu et de vert; ré-  
miges et rectrices bleues, rayées de  
noir; croupion et abdomen noirs,  
ainsi que le bec et les pieds; iris Meh.  
Taille, douze pouces.

CORBEAU - GEAI BORÉAL. V. GEAI  
IMITATEUR.

CORBEAU-GEAI BRUN DU CANADA,  
*Corvus canadensis*, Lath. Parties su-  
périeures brunes, plus foncées sur la

tête; base du bec garnie de plumes blanchâtres; joues d'un gris roussâtre; ailes et queue brunes; celle-ci étagée et terminée de blanc; parties inférieures cendrées, avec la poitrine plus claire; bec et pieds noirs. Taille, dix pouces.

**CORBEAU-GEAI DE CARTHAGÈNE**, *Corvus argyrophthalmus*, Gmel. Noir, à l'exception de la poitrine, du bord extérieur des rémiges et d'une tache au bord de l'œil, qui sont d'un bleu foncé; extrémité des rectrices blanche. Taille, quatorze pouces. Latham pense que cette espèce n'est qu'une variété du Geai vert.

**CORBEAU-GEAI DE CATENNE**, *V. CORBEAU-PIE BLANCHE-COIFFE*.

**CORBEAU-GEAI DE LA CHINE A BEC NOIR**, *V. CORBEAU-PIE BLEUE A BEC NOIR*.

**CORBEAU-GEAI D'EUROPE**, *Corvus glandarius*, L., Buff., pl. enl. 481, Levaill., Ois. Par., pl. 40 et 41. Parties supérieures d'un roux vineux, avec le croupion blanchâtre; tête garnie de plumes assez longues d'un verdâtre rougeâtre, parsemé de quelques traits noirs; rectrices claires d'un bleu soyeux; rayé transversalement de nuances alternativement plus pâles et plus obscures; grandes rémiges noires avec la moitié du bord extérieur blanc; rectrices cendrées, noires à l'extrémité; parties inférieures d'un cendré rougeâtre; bec noir, blanchâtre à l'extrémité; iris bleu; pieds noirs. Taille, treize pouces. Les habitudes du Geai diffèrent peu de celles de la Pie; l'un et l'autre sont susceptibles de la même éducation, et on leur semble accorder la préférence au Geai; ce n'est qu'en faveur de la beauté de son plumage. Il est d'un naturel pétulant, fort bavard et très-curieux; il choisit de préférence pour sa nourriture les Glands, les Châtaignes, les fruits rouges et surtout les noix bulbeuses qu'il a l'art de découvrir et d'arracher avec le bec. Il construit assez négligemment son nid qu'ordinairement il place au sommet des Chênes les plus élevés; la ponte consiste en cinq œufs d'un gris

verdâtre, faiblement tacheté de brun. La tendresse du Geai pour ses petits est très-grande; il les garde même près de lui jusqu'à ce qu'ils ont ouvert le cou et réclament pour d'autres les mêmes soins.

**CORBEAU-GEAI GRIS-BLEU**. Paraît être le Geai azure dans son jeune âge.

**CORBEAU-GEAI IMITATEUR**, *Corvus imitator*, Lath.; *Corvus Sibiricus*, Gmel., Buff., pl. enl. 608. Parties supérieures d'un gris cendré; tête huppée noirâtre; petites rectrices claires et croupion d'un roux vif; rectrices intermédiaires cendrées, toutes les latérales rousses; parties inférieures roussâtres; abdomen d'un beau roux; bec noir avec sa base entourée de plumes blanches; pieds bruns. Taille, onze pouces. Des régions les plus septentrionales de l'Europe et de l'Asie.

**CORBEAU-GEAI LONGUE**, *Garrulus gulariculatus*, Cuv., Levaill., Ois. Par. pl. 42. Noir, avec un collier blanc sur la nuque; deux longues plumes formant une huppe; bec et pieds noirs; iris blanchâtre. Longueur, dix pouces trois lignes. De Java.

**CORBEAU-GEAI ORANGÉ**, Levaill., Ois. de Paradis, pl. 47. *V. CORBEAU-GEAI IMITATEUR*.

**CORBEAU-GEAI DU PÉROU**, *Corvus Peruvianus*, Lath., Buff., pl. enl. 655. Parties supérieures d'un beau vert pâle; sommet de la tête orné d'une couronne blanche; œil entouré, ainsi que la base du bec, de plumes d'un bleu céleste; nuque bleue; les trois rectrices latérales jaunes; gorge et devant du cou d'un noir pur; poitrine et parties inférieures jaunes; queue étagée; bec noirâtre. Taille, onze pouces.

**CORBEAU-GEAI (PETIT) DE LA CHINE**, *Corvus auritus*, Lath. Parties supérieures d'un gris cendré plus foncé sur la tête et le cou; rémiges et rectrices brunes; front blanc de même qu'une tache de chaque côté de la tête en dessous des yeux; gorge noire; parties inférieures d'un ocre clair; bec et pieds noirs; iris roussâtre. Longueur, neuf pouces.

**CORBEAU-GEAI DE SIBIRIE**, *Cor-*



*Sibiricus*, Gmel., Buff., pl. enl. 3. *V. GRAI IMITATEUR.*

**CORBEAU-GRAI DE STELLER**, *Corvus Stelleri*, Lath. Parties supérieures en noir pourpré; huppe brune, mées de plumes longues et étroites; trices alaires brunes et d'un bleu né; une partie des rémiges bleues yées de noir, les autres noires ardées de vert bleuâtre; rectrices nues avec la tige noire; parties inférieures d'un bleu céleste avec la gorge et la poitrine noires. Longueur, seize pouces. De l'Amérique septentrionale.

**CORBEAU-GRAI A TÊTE POURPRÉE**, *Corvus purpurascens*, Lath. Parties supérieures roussâtres avec la tête d'un rouge pourpré assez vif; ailes et queue noires; parties inférieures jaunes; bec cendré; pieds rougeâtres. Taille, douze pouces. De la Chine.

**CORBEAU-GRAI VERT**, *Corvus Sumatrensis*, Gmel.; *Corvus argyrophthalmus*, Lath. Parties supérieures vertes avec le sommet de la tête d'un vert foncé et marqué de bleu; rectrices alaires d'un vert irisé; rémiges brunes terminées de bleu; rectrices noires terminées de blanc; parties inférieures d'un vert foncé; bec noirâtre; iris blanc; pieds rougeâtres. Taille, dix-sept pouces. De l'Amérique méridionale.

**GRAND CORBEAU**, *Corvus major*, Gmel., Ois. d'Afr., pl. 51. Ne diffère du Corbeau noir d'Europe que par sa taille plus élevée, son bec plus fort et plus courbé. Ce Corbeau se retrouve aussi dans l'Inde.

**CORBEAU A GORGE BRUNE**, *Corvus corax*, Var., Lath. Noir, à l'exception de la gorge qui est brune. Taille, dix-sept pouces. De Sibérie.

**CORBEAU D'HIVER**. *V. CORBEAU MANTELÉ.*

**CORBEAU HOCHZANA**, *Corvus Mexicanus*, Lath. D'un noir azuré avec le bec et les pieds d'un noir mat. Taille, seize pouces. Du Mexique.

**CORBEAU HOUPETTE**, Vieill. (Pie houpette, *V.* pl. de ce Dict.). Parties supérieures, ailes et base de la queue d'un beau bleu; tête, front, cou,

gorge et poitrine supérieure noires; bas de la poitrine, parties inférieures et les trois quarts de la longueur des rectrices d'un blanc pur; bec dont la base n'est pas couverte de plumes dirigées en avant, noir ainsi que les pieds. Taille, seize pouces. Du Brésil.

**CORBEAU JACQUIN**. *V. CORBEAU MANTELÉ.*

**CORBEAU DE LA JAMAÏQUE**, *Corvus Jamaicensis*, Lath. Plumage tout noir; bec moins fort que celui du Corbeau; queue assez courte. Longueur, seize pouces.

**CORBEAU MANTELÉ**, *Corvus Corax*, L., Buff., pl. enl. 76. Parties supérieures et inférieures cendrées; tête, gorge, ailes et queue noires à reflet bronzé; bec et pieds noirs; iris brun. Taille, dix-neuf pouces. D'Europe. Ses mœurs ne diffèrent presque pas de celles du Freux; les deux espèces hivernent dans nos climats et regagnent au printemps les chaînes élevées et les pays septentrionaux. Les Corbeilles mantelées se nourrissent de graines, de fruits, de Vers, de Limaces, de Crabes et de petits Poissons; dans l'extrême disette seulement, on les voit se repaître de charognes dont elles ne mangent que par nécessité.

**CORBEAU MANTELÉ DE RUSSIE**. *V. CORBEAU CHOUCAS.*

**CORBEAU OU CORNEILLE MARINE**. Surnom de la Corneille mantelée, que lui a valu sans doute l'usage qu'elle fait des petits Poissons après les avoir saisis à la manière des Mouettes.

**CORBEAU MEUNIER**. *V. CORBEAU MANTELÉ.*

**CORBEAU MOISSONNEUR**. *V. CORBEAU FREUX.*

**CORBEAU NOIR**, *Corvus Corax*, L., Buff., pl. enl. 496. Entièrement d'un beau noir à reflets pourprés; queue fortement arrondie; bec noir, fort; iris d'un gris blanchâtre entouré d'un cercle brunâtre. Taille, vingt-quatre pouces. D'Europe. Reléguée dans les grandes forêts montagneuses, cette espèce se montre très-rarement dans les plaines; elle fait sa nourriture de petits poissons, de Lézards, de Lapins, de Canards; à défaut, elle se jette sur

les charognes. Son nid, placé dans les anfractués de rochers, dans les crevasses de vieilles murailles, est construit comme ceux des Oiseaux de proie; la ponte est de trois à six œufs d'un vert sale, tacheté et rayé de brun noirâtre.

**CORBEAU OU CORNEILLE NOIRE.** *V. CORBEAU CORBINE.*

**CORBEAU NOIR ET BLANC DE L'ÎLE DE FÉROÉ,** *Corvus leucophæus*, Vieill. Plumage d'un noir azuré, à l'exception du sommet et des côtés de la tête, de la gorge, du ventre, des rectrices alaires et des caudales inférieures, de la plupart des rémiges, qui sont d'un blanc pur; toutes les plumes entourées d'un duvet gris; bec très-long et noir. Taille, vingt-quatre pouces. Cette espèce est vorace et féroce; on assure qu'elle attaque les Moutons et même les Veaux, qu'elle leur crève d'abord les yeux, etc. Divers auteurs la regardent comme une variété du Corbeau noir.

**CORBEAU OSSIFRAGUE,** *Corvus Ossifragus*, Wilson. Entièrement noir; des cils très-longs à la base supérieure du bec dont l'inférieure est dénuée de plumes; les deux mandibules à bords rentrants, la supérieure échancrée vers la pointe; yeux très-petits, rapprochés de l'angle du bec; iris bleu; pieds forts; ongles crochus et grands. Longueur, seize pouces. De l'Amérique septentrionale.

**CORBEAU-PIE ACAHÉ,** *Corvus pileatus*, Illig.; *Pica Chrysops*, Vieill., Temm., pl. color. 58. Parties supérieures d'un beau bleu, un peu plus pâle à l'occiput; sommet de la tête, gorge, côtés et devant du cou noirs; deux taches bleues semi-circulaires au-dessus et au-dessous de l'œil; queue arrondie, terminée de blanc; parties inférieures blanches; bec et pieds noirâtres; iris jaune. Taille, treize pouces six lignes. De l'Amérique méridionale.

**CORBEAU-PIE DES ANTILLES,** *Corvus Caribæus*, Lath. Parties supérieures brunes avec la tête et le cou bleus; une tache blanche tiquetée de noir va de l'origine du bec à la nuque; un

collier blanc; crôupion et lectrices caudales jaunes; ailes d'un bleu verdâtre; numérotés de bleu; rectrices bleues rayées de blanc, les deux intermédiaires beaucoup plus longues, bleues et terminées de blanc. Taille, dix-huit pouces.

**CORBEAU - PIE BLANCHE-COIFFE,** *Corvus Cayanus*, Lath., Buff., pl. enl. 373. Parties supérieures d'un noir violet; sommet de la tête; cou, parties inférieures, extrémité de la queue d'un blanc pur; front, joues, gorge et devant du cou noirs; une tache blanche à l'origine du bec, une autre autour des yeux dont l'iris est brun; bec et pieds noirâtres. Taille, treize pouces. De la Guiane.

**CORBEAU-PIE BLEUE A BEC ROUGE,** *Corvus erythrorhynchus*, Lath.; *Coracias melanocephala*, *Coracias Sinensis*, Buff., pl. enl. 622, Levaill., Ornith. afr., pl. 57. Parties supérieures d'un cendré violet plus brun sur le dos, et tacheté de noir sur le sommet de la tête; une bande noire à l'occiput; rectrices étagées, bleues, bordées de blanc avec une tache de cette couleur vers l'extrémité qui est noire, les deux intermédiaires très-longues; front, cou et poitrine d'un noir velouté; parties inférieures d'un cendré rougeâtre clair; bec rougeâtre; iris orangé; pieds rouges avec les ongles blancs, longs et crochus. Longueur, dix pouces. De la Chine.

**CORBEAU-PIE BLEUE DROITE ET CORBEAU-PIE BLEUE ET NOIRE,** *Pica cyanomelas*, Vieill. Parties supérieures d'un bleu foncé, irisé; front, côtés de la tête, gorge, devant du cou noirs; sommet tirant sur le brun; bec et pieds noirs. Taille, treize pouces six lignes. De l'Amérique méridionale.

**CORBEAU-PIE BLEUE A TÊTE NOIRE,** *Corvus cyanocephalus*, L., Levaill., Oiseau d'Afr., pl. 58. Parties supérieures bleues; sommet de la tête garni de longues plumes dont la couleur ainsi que celle des joues et de la gorge est le noir; rectrices terminées de blanc; parties inférieures d'un blanc sale; bec noir; pieds bruns. Taille, onze pouces. De la Chine.

**CORBEAU-PIE A COU BLANC**, *Pica albicollis*, Vigill., Labill., Voya. pl. 59. Noir, à l'exception du cou et de la partie supérieure du dos et du ventre qui sont blancs; queue très-étagée; bec jaunâtre avec l'extrémité noire; pieds noirs. Longueur, vingt pouces. De la Nouvelle-Calédonie.

**CORBEAU-PIE CULOTTE DE FEU**.  
**CORBEAU-PIE RUFICAISTRE**.

**CORBEAU-PIE HOUPETTE**, *Corvus cristellus*, Temm., Ois. color., pl. 193 (V. pl. de ce Dictionnaire).  
**CORBEAU HOUPETTE**.

**CORBEAU-PIE A HUIT PENNES**.  
**CORBEAU-PIE RUFICAISTRE**.

**CORBEAU-PIE DES INDES A LONGUE QUEUE**.  
**CORBEAU-PIE DES ANTILLES**.

**CORBEAU-PIE AUX JOURS BLANCHES**, *Corvus olivaceus*, Lath. Parties supérieures d'un brun ferrugineux; tête noirâtre, fortement emplumée; rectrices étagées, les latérales bordées de blanc extérieurement; parties inférieures noirâtres avec la gorge et la poitrine variées de blanc; bec et pieds noirâtres. De la Nouvelle-Hollande.

**CORBEAU-PIE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE**.  
**CORBEAU-PIE A COU BLANC**.

**CORBEAU-PIE DU MEXIQUE**.  
**CORBEAU-PIE ZANOE**.

**CORBEAU-PIE PIAPAC**, *Corvus Sonnegalensis*, Lath., Buff., pl. enl. 538. Parties supérieures d'un noir lustré; les inférieures d'un noir mat; rémiges et rectrices latérales d'un brun noirâtre; ces dernières très-étagées et pointues. Taille, treize pouces. De l'Afrique méridionale.

**CORBEAU-PIE POURPRÉE**, *Corvus africanus*, Lath. Parties supérieures brunes; tête et cou d'un noir pourpré, avec chaque plume terminée de gris; rémiges bleuâtres à l'extérieur; rectrices blanches à leur extrémité; parties inférieures cendrées. Taille, vingt pouces. D'Afrique.

**CORBEAU-PIE BOUSSE DE LA CHINE**, *Corvus rufus*, Lath., Levaill., Ois. d'Afr., pl. 59. Parties supérieures d'un roux jaunâtre, avec la tête et le cou bruns; petites tectrices alaires

d'un roux cendré; les autres d'un gris clair; rémiges noirâtres; rectrices intermédiaires brunes à la base, grises dans l'autre moitié et terminées de blanc; parties inférieures d'un blanc roussâtre; bec et pieds noirs; iris roussâtre. Taille, dix pouces.

**CORBEAU-PIE RUFICAISTRE**, *Corvus ruficaster*, Lath., Levaill., Ois. d'Afr., pl. 55. Plumage noir, irisé en blanc; parties inférieures d'un roux clair, ainsi que les barbes extérieures des deux rémiges intermédiaires. Taille, douze pouces. D'Afrique.

**CORBEAU-PIE SAN-HIA**.  
**CORBEAU-PIE BLEUE A BEC ROUGE**.

**CORBEAU-PIE DU SÉNÉGAL**.  
**CORBEAU-PIE PIAPAC**.

**CORBEAU-PIE A TÊTE NOIRE**.  
**CORBEAU-PIE BLEUE A TÊTE NOIRE**.

**CORBEAU-PIE VAGABONDE**, *Corvus vagabunda*, Lath. Parties supérieures brunes; tête, cou et grandes rectrices alaires noirs; petites tectrices et rémiges intermédiaires d'un blanc bleuâtre; rectrices cendrées dans leur moitié inférieure; les intermédiaires entièrement noirs; parties inférieures d'un cendré bleuâtre; queue très-longue, étagée. Taille, seize pouces. Des Indes.

**CORBEAU-PIE VULGAIRE**, *Corvus Pica*, Lin., Buff., pl. enl. 488. Tête, gorge, cou, haut de la poitrine et dos noirs; rectrices très-étagées anguleuses brunes; scapulaires, poitrine et ventre blancs; bec, pieds et iris noirs. Taille, dix-huit pouces. D'Europe. Les Pies, dont les mœurs sont généralement connues, s'éloignent rarement des lieux qui les ont vues naître; la conformation de leurs ailes, très-courtes relativement à la longueur totale de l'Oiseau, s'oppose à tout voyage qui demanderait un vol élevé et soutenu. Se posent-elles à terre ordinairement, elles y sautillent plutôt qu'elles n'y marchent. De toutes les espèces de ce genre, aucune ne s'accoutume plus facilement à la domesticité; et ne retient plus vite les mots et les phrases qu'on leur apprend. Ces mots, répétés avec une volubilité fa-

tigante, ont donné lieu à un vil adage qui, dans la société, s'applique au babil insipide de la sottise, mais dont trop souvent on abuse envers le sere qui sait répandre tant de charmes sur ses moindres expressions. La Pie met beaucoup d'art dans la construction de son nid; elle le place au sommet des plus grands Arbres, le fortifie extérieurement avec des buchettes et du mortier de terre, le garnit en dedans de racines filamenteuses, et y pond quatre à cinq œufs d'un vert bleuâtre, parsemé de taches brunes. Pendant l'incubation, elle a continuellement l'œil au guet, se bat vigoureusement contre les Corneilles qui approchent du nid, et les oblige à fuir: la témérité de ce faible Oiseau est telle en ce moment, qu'on l'a vu attaquer même le Faucon qui cherchait à s'emparer de sa couvée. On rencontre quelquefois des Pies tout-à-fait blanches.

**CORBEAU-PIE ZANOE**, *Corvus Zanoe*, Lath. Plumage noir, à l'exception de la tête et du cou qui sont d'un brun fauve. Longueur, seize pouces. Du Mexique.

**CORBEAU A PLUMES GRISSES**: Paraît être une variété métiée provenant de la Corbine et de la Corneille maintenues; elle a le dos mélangé de noir et de gris. On la trouve assez communément en Sibérie.

**CORBEAU A RABAT**, *Corvus clericus*, Lath. Variété du Corbeau noir, dont quelques parties du corps sont blanches ou rousses.

**CORBEAU DE ROYSTON** et **CORBEAU SAUVAGE**. V. **CORBEAU MANTELÉ**.

**CORBEAU A SCAPULAIRE BLANC**, *Corvus dahuricus*, Lath., Buff., pl. enl. 327. Tête, gorge, des ailes et queue d'un noir luisant irisé; le reste du plumage blanc; bec et pieds noirs; queue arrondie, assez courte. Taille, onze pouces. De l'Afrique et de la Chine.

**CORBEAU OU CORNEILLE DU DÉSERT**, *Corvus*, Lath. V. **CORBEAU A SCAPULAIRE BLANC**.

**CORBEAU SOLITAIRE**. V. **CORBEAU NOIR**.

**CORBEAU DES TERRES AUSTRALES**, *Corvus*, Lath. V. **CORBEAU NOIR**.

**Corvus australis**, Lath. Plumage noir, irisé, avec les rémiges et les rectrices d'un brun noirâtre; les plumes de la gorge molles et peu serrées; bec très-épais à sa base et fort comprimé sur les côtés, noir ainsi que les pieds. Taille, dix-huit pouces. De l'Océanique.

**CORBEAU TIGRÉ**. V. **CORBEAU A SCAPULAIRE BLANC**.

**CORBEAU VARIÉ**, *Corvus Cacalot*, H. Variété du Corbeau noir, dont le plumage est tacheté de noir. Du Mexique.

**CORBEAU VAUTOURIN**. V. **CORBEAU CORBIVEAU**.

**CORBEAU VERSICOLOR**, *Corvus versicolor*, Lath. Plumage d'un brun sombre, irisé de vert et de pourpre; bec et pieds noirs. Taille fort élevée. Espèce douteuse. (Dn. 1.)

On a étendu le nom de Corbeau à plusieurs espèces d'Oiseaux très-différentes. Ainsi on a appelé :

**CORBEAU AQUATIQUE**, au Mexique, l'*Ibis Acalot*, *Tantalus mexicanus*, Lath. V. **IBIS**.

\* **CORBEAU DU BENGAL**, le *Corvus brachyurus*, L., Buff., pl. enlum. 258. V. **BRÈVE**.

**CORBEAU BLANC**, le Catharte Papa, *Vultur Papa*, L., au Paraguay. V. **CATHARTE**.

**CORBEAU BLEU** (Edwards), le Rollier vulgaire, *Coracias Garrula*, L. V. **ROLLIER**.

**CORBEAU CHAUVÉ**, le *Pyrrhocorax Coracias*, *Corvus Graculus*, L., dans sa vicillesse. V. **PYRRHOCORAX**.

**CORBEAU CHAUVÉ**, le *Corvus catvus*, Lath. V. **CORACINE**.

**CORBEAU DE CORNOUAILLES**, le *Pyrrhocorax Coracias*, *Corvus Graculus*, Gmel. V. **PYRRHOCORAX**.

**CORBEAU CORNU**, le Calao de Malabar, *Buceros malabaricus*, Lath. V. **CALAO**.

**CORBEAU DU DÉSERT**, le *Pyrrhocorax Coracias*, *Corvus Graculus*, L. V. **PYRRHOCORAX**.

**CORBEAU DES INDES**, le Calao des Moluques, *Buceros hydrocorax*, Lath. V. **CALAO**.

CORBEAU A MARCHE NOIR, le *Corvus melanops*, Lath. *V.* BOHEMILUS KAILORA.

CORBEAU DE MER, le grand Corbeau, *Pelecanus Carbo*, L. *V.* CORBRAN.

CORBEAU DU MEXIQUE, le *Corvus mexicanus*, Gmel. Syn. du Trouale Yapeu. *V.* ce mot.

CORBEAU DE LA NOUVELLE-GUINÉE, le *Corvus Nova-Guinea*, L. *V.*

HEVILLER A VENTRE BAYÉ.

CORBEAU NU, *Corvus nudus*, L. CORACINE.

CORBEAU DE NOIR, la Huotte, *rix Akub*, L. et l'Engouleurt, *Caprimulgus europæus*, L. *V.*

SOLETTE ET ENGOULEURT.

CORBEAU DE PARADIS, le Tyran de vana, *Muscicapa Tyrannus*, Lath. GORE-MOUCHE.

CORBEAU RHINOCÉROS, le Calao rhinocéros, *Buceros Rhinoceros*, Lath. *V.* CALAO.

CORBEAU A VENTRE JAUNE, le *Corvus flavus*, L.; Geni à ventre jaune, *id.*, pl. enlum. 249. *V.* GORE-MOUCHE. (B.)

CORBEAU DE MER. POIS. Même rose que Corax. *V.* ce mot. (B.)

CORBEDWYN. BOT. PHAN. Syn. llois de *Betula nana*. *V.* BOULEAU. (B.)

CORBEGEAU, ou CORBIGEAU.

S. Syn. vulgaire du Coarlis d'Europe, *Scolopax arcuata*, L. *V.* COUR-

S. (OR. 2.)

CORBEILLE. *Corbis*. MOND. Ce

mot établi par Cuvier (Règn. Anim.

II, p. 480), avec la *Venus fimbriata*

Gmelin, a été adopté par presque

les conchyliologues. En effet, il

présente des caractères saillans qui le

distingueraient facilement. Megerle l'a

opposé sous le nom de *Fimbria*;

Guignière, dans les planches de l'Encyclopédie, l'avait placé parmi les Lucines, et Lamarck l'avait également

mis au nombre de celles-ci, lorsqu'il adopta dans son Histoire des Anim.

II, p. 536, 1818. Il donne les caractères suivans : co-

quille transverse, équivalve, sans pli

irrégulier au bord antérieur, ayant les crochets courbés en dedans et opposés; deux dents cardinales, deux dents latérales, dont une plus rapprochée de la charnière; impressions musculaires simples. Ce genre est évidemment des rapports avec les Tellines par sa charnière; il n'en diffère que par le pli irrégulier qu'elles ont toutes, et dont il est presque toujours dépourvu; il se rapproche également des Lucines par la charnière, mais il ne présente pas leur impression musculaire en languette. Il a d'autant plus de rapports avec les Tellines, que par une anomalie singulière on a observé un individu de la collection de feu Valenciennes, qui est actuellement dans la riche collection de Dacles, présentant un plissement, semblable à celui des Tellines. Ce genre est peu nombreux en espèces; une seule à l'état frais est vivante, et deux fossiles. Nous allons les faire connaître.

CORBEILLE ENFLÉE, *Corbis fimbriata*, Cuv. (Règn. Anim. T. II, p. 480) et Lamk. (Anim. sans vert. T. V, p. 536). C'est la *Venus fimbriata* de Lamarck, figurée dans l'Encyclopédie (pl. 286, fig. 3, A, B, C). Cette Coquille, qui vient de l'océan Indien, est ovale, transverse, gonflée, élégamment striée; les stries coupées perpendiculairement par des lames obtuses et onduleuses qui suivent la direction des bords; ceux-ci sont obtus et crénelés. Elle est longue de deux pouces et large de deux et demi.

CORBEILLE PÉTONCLE, *Corbis Petunculus*, Lamk. (Anim. sans vert. T. V, p. 537), DeFrance (Dict. des Sciences Nat.). Cette belle et grande Coquille fossile, que l'on ne connaissait que des falaises de Valognes, a été également trouvée aux environs de Paris, à Parny et à Chaumont. Sa forme est presque orbiculaire, plus aplatie que l'épave vivante, striée suivant la longueur et lamelleuse suivant les bords. Les lames sont simples dans toute leur longueur, excepté vers le bord antérieur de la Coquille où elles sont crénelées. Les bords sont crénelés et épa-

L'individu de notre collection a trois, pouces trois lignes de long sur trois, pouces six lignes de large.

**CORBEILLE LAMELLEUSE**, *Corbis lamellosa*, Lamk. (Anim. sans vert. loc. cit.), *Lucina lamellosa* (Ann. du Mus. T. VII, p. 257, et T. XII, pl. 42, fig. 3), figurée dans l'Encyclopédie (pl. 286, fig. 2, 3, n. c). Cette espèce, plus petite que les deux précédentes, présente également une forme elliptique. Elle est finement striée longitudinalement, et les stries sont coupées par des lames saillantes, quelquefois assez écartées entre elles, simples dans toute leur étendue, excepté vers le côté antérieur de la Coquille où elles sont dentées. Cette espèce est généralement plus inéquilatérale que les deux précédentes, et ses bords crénelés sont moins épais. Cette Coquille se trouve abondamment aux environs de Paris, à Grignon, à Parhe et d'autres lieux. Elle a quelquefois deux pouces trois lignes de large et un pouce neuf lignes de long. Le test est proportionnellement plus mince que dans les deux autres espèces. On en trouve à Brachewx près Beauvais une variété dont les stries sont plus fines, les lames plus nombreuses, les bords plus épais et plus finement crénelés.

(D. H.)

**CORBEILLE D'OR**. BOT. PHAN. Nom vulgaire de l'*Alyssum saxatile*, mérité par le bel effet que produisent au printemps ses fleurs cultivées dans nos jardins. *V. ALYSSON*. (B.)

**CORBEL**. ois. Syn. ancien du Corbeau noir, *Corvus Corax*, L. *V. CORBEAU*. (DR. Z.)

**CORBI**. REPT. SAUR. (Dapper.) L'un des noms arabes du Crocodile. (B.)

**CORBI-CALAO**. ois. (Levaillant.) Syn. du Phaléon cornu, *Meliphaga corniculata*, Temm. *V. PHILEDON*. (DR. Z.)

**CORBICHET**. ois. Syn. vulgaire du Courlis, *Scolopax arcuata*, L. *V. COURLIS*. (DR. Z.)

**CORBICHONIA**. BOT. PHAN. (Dombey.) *V. TALINUM*.

**CORBICULE**, *Corbicula*, Linn. Ce genre, proposé par Megerle pour la *Tellina fluminalis* de Gmelin et d'autres espèces voisines, présente des caractères absolument semblables à ceux des Cyrènes. Effectivement, trois dents cardinales et deux dents latérales conviennent au genre de Megerle comme à celui de Lamarck. Le genre Cyrène étant plus généralement adopté, nous y renvoyons. *V. CYRÈNE*. (D. H.)

**CORBIGEAU**. ois. *V. CORBEGEAU*.

**CORBILLARD** du **CORBILLAT**. ois. Syn. vulgaire du jeune Corbeau. (DR. Z.)

**CORBIN**. ois. Syn. ancien du Corbeau noir, *Corvus Corax*, L. *V. CORBEAU*. (DR. Z.)

**CORBINE**. ois. Espèce du genre Corbeau, *Corvus Corone*, L., Buff., pl. enlum. 483. Oiseau d'Europe. *V. CORBEAU*. (DR. Z.)

\* **CORBIS**. ois. Syn. vulgaire de la Corbine, *Corvus Corone*, L. *V. CORBEAU*. (DR. Z.)

**CORBIS**. MOLL. *V. CORBEILLE*.

\* **CORBIVEAU**. ois. Espèce du genre Corbeau, *Corvus albicollis*, Lath., Levaill., Oiseaux d'Afrique, pl. 50. *V. CORBEAU*. (DR. Z.)

\* **CORBULAIRE**, *Corbularia*, Bot. Genre indiqué par Salisbury dans les Transactions de la Société Horticultrice de Londres, vol. 9, p. 340-351, et caractérisé par Haworth (*Suppl. Panth. sicculent. et Narcissorum Revisio*, p. 126). Ces auteurs l'ont établi aux dépens du genre *Narcissus* de Linné, dont il n'est ni probablement être considéré que comme une section de même que les genres *Ajax*, *Quetta*, *Schizanthus*, *Gonyolobos*, *Phyllogae* et *Hermione*. *V. tous ces mots* à l'exception du premier qui, dans les espèces de ce genre, n'est pas enraciné, mais se trouve ici très-aussi comme une racine. Le *Corbularia* se compose de Narcisses dont les diamètres secondaires et corollaires ont leurs filaments et leurs étamines dans la périgone.

sont insérés sur le tube lui-même et trois à la base de ce tube; les segments du périanthe sont étroits, plus petits que la couronne qui est très-grande et turbinée. Les espèces de Corbulaires sont au nombre de cinq, savoir : *Corbularia tenuifolia*, *C. lobulata*, *C. obesa*, *C. albicans* et *C. Bulbocodium*. Ce sont des Plantes indigènes des pays montagneux de la péninsule espagnole, que l'on cultive dans les jardins d'Angleterre, et qui sont remarquables par leurs feuilles filiformes et creusées en gouttières.

Le genre *Ajax* a une organisation bien semblable à celle du précédent, c'est-à-dire qu'il n'est, comme lui, qu'une section du grand genre *Narcissus* de Linné et qu'il offre les mêmes caractères génériques. V. NARCISS. De légères modifications dans les organes de la reproduction ont paru suffisantes pour les différencier : ici les étamines sont droites, leurs filets sont libres, égaux, insérés à la base du tube, un peu adhérens à ses côtés et souvent trois fois moindres que la couronne, laquelle est grande, égale aux segments du périanthe, et en forme de coupe évasée. Haworth énumère quatorze espèces d'*Ajax* qu'il divise en deux sections, selon la longueur relative du tube du périanthe. Mais à en juger d'après les descriptions elles-mêmes, nous ne pouvons voir dans plusieurs d'entre elles que de simples variétés. Il est difficile, par exemple, de considérer comme espèces distinctes de l'*Ajax festalis*, Salisb., ou *Narcissus Pseudo-Narcissus*, L., les *Ajax serratus*, *spurius* et *nobilis*. Ce sont des Plantes européennes, pour la plupart indigènes des pays méridionaux, très-printanières, munies de bulbes uniques, arrondis inférieurement et coniques supérieurement, à feuilles planes, canaliculées, striées de grosses nervures, et plus ou moins glauques.

**CORBULE.** *Corbula*, MOLL. Ce genre a été établi par Bruguière dans les planches de l'Encyclopédie; et com-

me il offre des caractères saillans et bien tranchés, il a été adopté par presque tous les conchyliologues qui l'ont suivi; mais il a varié dans la place qu'il a occupée dans la série. Bruguière, le confondant avec quelques espèces d'Anatines, l'a placée près des Myes et des Capses qui renferment aussi les Sanguinolaires. Lamarck (*Animaux sans vert.*, 1801), ne considérant que l'inégalité des valves, l'a éloigné, mais à tort, de sa véritable place, pour le mettre, ainsi que les Pandores, en relation avec les Houlettes et les Anomies qui appartiennent à un ordre différent. Quoiqu'inéquivalve, la Corbule est une Coquille régulière dont le test est compacte et solide, qui présente deux impressions musculaires, ce qui doit la remettre dans l'ordre et près des genres où Cuvier l'a placée, à côté des Mactres. Lamarck (*Anim. sans vert.* T. V, pl. 494, 1818) l'a replacée dans ses rapports les plus convenables en la séparant, avec la Pandore, en une famille distincte qui a des rapports avec les Mactracées. Il a satisfait au caractère de l'inégalité des valves, anomalie presque unique dans les Coquilles Dimyaires régulières, et à celui de l'insertion du ligament qui est interne, comme dans les Mactres. Voici, d'ailleurs, les caractères qu'il lui donne : coquille régulière, inéquivalve, inéquilatérale, point ou presque point bâillante. Une dent cardinale sur chaque valve; conique, courbée, ascendante, et à côté une fossette; point de dents latérales; ligament intérieur fixé dans les fossettes. Les Corbules sont généralement des Coquilles d'une taille fort médiocre : elles sont rares et recherchées à l'état vivant; certaines espèces fourmillent à l'état fossile dans certaines localités du calcaire grossier désagréé des environs de Paris. Les espèces les plus remarquables sont :

**CORBULE AUSTRALE.** *Corbula australis*, Lamk. (*Anim. sans vert.* T. V, p. 495, n. 1). Cette espèce, une des plus grandes du genre, est ovale, très-inéquilatérale, un peu baa-

lante latéralement; son bord antérieur est allongé, subprostré, anguleux; elle est blanchâtre, les crochets peu proéminens. Une de ses variétés est plus petite et plus comprimée antérieurement. Elle a un pouce quatre lignes de largeur, et se trouve notamment à la Nouvelle-Hollande au port d'Ardo Georges.

**CORBULE BILLONNÉE**, *Corbula subcata*, Lamk. (Syst. des Anim. sans vert., p. 107, et Hist. des Anim. sans vert., T. V, p. 495, n° 2), figurée dans l'Encyclopédie (pl. 230, fig. 1, A, B, C). Celle-ci présente de gros sillons à l'extérieur: elle est épaisse, bombée, ovale, subrayonnée, subinéquilatérale; ses crochets sont proéminens, d'un rouge pourpre; le reste de la Coquille est brunâtre ou verdâtre. C'est avec doute qu'on l'indique de l'océan Indien; elle n'a que neuf à dix lignes de largeur.

Parmi les espèces fossiles, nous citerons d'abord:

La **CORBULE GAULOISE**, *Corbula gallica*, Lamk. (Ann. du Mus. T. VII, p. 466), figurée dans les Vélins, (n° 40, fig. 3), et probablement que c'est elle que l'on a voulu représenter dans l'Encyclopédie (pl. 230, fig. 3, A, B, C). Cette espèce est sans contredit la plus grande du genre. Nous en possédons un individu qui a un pouce neuf lignes de large. C'est à tort que Lamarck (Anim. sans vert. T. V, p. 497, n° 13) a établi l'espèce qu'il a nommée *Corbula à petites côtes*; ce n'est réellement, comme il l'avait d'abord dit dans ses Annales (*loc. cit.*), que la petite valve de la *Corbule gauloise*. Comme il est rare de rencontrer encore réunies les valves d'un même individu de cette espèce, il n'est pas étonnant qu'on en ait fait deux espèces; mais comme nous avons eu occasion, dans nos recherches aux environs de Paris, d'en recueillir huit ou dix individus parfaits, nous a été facile de rectifier cette erreur. Cette Coquille est ovale, transversale, ventrue; ses crochets très-proéminens; la plus grande valve est lisse, tandis que l'autre présente no-

dinairement des petites côtes inégales, peu saillantes; elle est très-point brillante; les dents cardinales sont remarquables par leur saillie. On trouve fréquemment cette Coquille à Grignon, à Patne, à la Chapelle près Senlis, etc.

**CORBULE À GROS SILLONS**, *Corbula exarata*, N. Cette *Corbule* très-belle et très-rare, que nous avons trouvée à l'état fossile à Saint-Félix près Beauvais dans les calcaires grossiers; est remarquable par sa taille autant que par les gros sillons transverses réguliers qui se remarquent sur la valve inférieure, tandis que la supérieure est lisse, ovale, transversale, inéquilatérale; la valve inférieure est très-grande, bombée, à crochet très-saillant, très-inéquivalve; la valve supérieure subtriangulaire, lisse, ou présentant de petites côtes longitudinales inégales, semblables à celles que nous avons indiquées sur la valve supérieure de la *Corbule gauloise*, à crochet peu saillant; elle est généralement très-aplatie, et nous l'aurions regardée comme appartenant à une espèce distincte, si nous n'en avions trouvé nous-mêmes un individu complet qui est figuré dans les planches de ce Dictionnaire. La valve inférieure est longue d'un pouce trois lignes, large d'un pouce et demi. La valve supérieure est longue seulement de onze lignes, et large d'un pouce deux lignes. (P. H.)

\* **CORBULEES. MOLL.** Lamarck, en établissant cette famille, a rempli une indication très-juste. Et effet les *Corbulees* ne peuvent se rapporter à aucune famille de mollusques. Leur ligament intérieur les rapproche sans contredit des *Mytilacées*; mais l'inégalité constante de leurs valves les éloigne de tout ce qui les environne. La régularité de la coquille les distingue d'ailleurs fort loin des *Cardines*, et plus loin encore des *Ostracées* ou des *Pectinides*. Cette famille, qui a d'autres caractères que ceux de la famille précédente, ligament intérieur, est particulière aux *Corbules* et aux *Mytilus*.



se composent seulement des genres *Corbule* et *Pandora*. *V.* ces mots. (D. H.)

**CORCOAT.** BOT. CRYPT. Syn. gallois de *Lichen tartareus*, L. (B.)

**CORCELET.** INS. *V.* CORSELET.

**CORCHORON.** BOT. PHAN. Selon *Cesalpin*, c'est le nom que l'antiquité donnait au Mouron rouge. Il est devenu la racine du mot *Corchorus*. *V.* CORÈTE ou CORETTE. (A.)

\***CORCHORDS.** POIS. Ce mot, qui chez les anciens désignait une Plante, a été également appliqué à un petit Poisson dont on ne sait rien, sinon que sa chair était peu recherchée. (B.)

**CORCHORUS.** BOT. PHAN. *V.* CORÈTE ou CORETTE.

**CORCONTA.** BOT. PHAN. La Courge chez les Basques où ce nom, qui vient évidemment de *Cucurbita*, prouve que les Courges y ont été introduites au temps des Romains. (B.)

\***CORGOLEN.** BOT. PHAN. (Ruiz et Pavon.) Nom de pays du genre *Azara*. *V.* ce mot. (B.)

\***CORCOPAL.** BOT. PHAN. (C. Bauhin.) Probablement une espèce de Jacquier et peut-être l'*Integrifolius*. (B.)

\***CORCORADA.** POIS. Poisson absolument indéterminé de l'Inde, que *Marcozaff* et *Ray* disent avoir la chair préférable à celle de tous les autres. (B.)

**CORCOROS** ET **CORCORUS.** BOT. PHAN. Pour *Corchorus*. *V.* CORÈTE ou CORETTE.

\***CORCULUM.** BOT. PHAN. *V.* EMBRYON.

\***CORCURBORCHIS.** BOT. PHAN. Dans le tableau qui est en tête de l'ouvrage de *Du Petit-Thouars*, intitulé : *Histoire des Orchidées des îles australes d'Afrique*, c'est ainsi que se trouve désignée une sous-division de la seconde section des Orchidées; mais ce mot est ainsi écrit par erreur typographique. *V.* *CORYMBORCHIS*. (G. N.)

\***CORDA.** BOT. CRYPT. *V.* CHORDA.

\***CORDA ANGUINA** ou **CORDA**

**MARINA.** toun. Des Oursins fossiles, en général du genre *Spatangus*, portant ce nom dans les ouvrages des anciens naturalistes. *Klein* a particulièrement appliqué le dernier de ces noms à une section des *Pleurostyes*; l'une des classes qu'il avait établies parmi les Oursins. (M. N.)

\***CORDE POIS.** *V.* LAMPROIE.

**CORDE A VIOLON.** BOT. PHAN. *V.* ACHYRE.

\***CORDE.** *Cordeum.* BOT. Ayant la figure d'un cœur. Cet adjectif s'emploie pour désigner les corps plats dont la figure approche plus ou moins de celle d'un cœur de carte à jouer. En général, la plupart des naturalistes confondent ensemble les expressions destinées à représenter la figure des corps et celles qui s'appliquent à leur forme. Il y a cependant une très-grande différence entre elles. Les expressions figuratives ne peuvent s'employer que pour les corps planes; les expressions formaires au contraire ne conviennent qu'aux corps munis des trois dimensions, la largeur, la longueur et l'épaisseur. Ainsi les mots *Ovale*, *Cordé*, *Elliptique*, etc., étant des expressions figuratives signifiant qui a la figure ovale, celle d'un cœur ou d'une ellipse, ne peuvent être employés que pour des corps planes, tels que les feuilles, les pétales, etc.; tandis que les mots *Ovoïde*, *Cordiforme*, *Ellipsoïde*, étant des expressions formaires signifiant qui a la forme d'un cœur, d'un cœur ou d'une ellipse, ne peuvent s'appliquer qu'à des corps munis des trois dimensions, tels que des fruits, des bourgeons, des bulbes, des tubercules, etc. C'est donc à tort que l'on voit la plupart des naturalistes négliger ces différences, et dire des feuilles *ovoïdes*, des fruits *ovales*. Nous croyons avoir suffisamment fait sentir l'impropriété de ces expressions. (A. R.)

**CORDELIÈRE.** MOILL. Par une de ces comparaisons qui sont loin d'être justes, et qui sont consacrées dans le vulgaire plutôt par habitude que par raison, on a donné ce nom à des

Coquilles qui sur un fond blanc présentent des séries de nœuds ou d'aspérités bleuâtres ou brunes, les comparant ainsi à la corde qui servait à ceindre les cordeliers. (B.H.)

\* **CORDELIÈRES.** BOT. PHAN. Nom vulgaire des diverses Amaranthées à longues panicules, que l'on cultive dans nos jardins. (B.)

**COR DE MER.** MOLL. (Bondelet.) Syn. de *Murex olearium*, L. (B.)

**CORDERA.** BOT. PHAN. V. KORDERA.

**GORDIA.** BOT. PHAN. V. SÉBESTIER.

**CORDIÈRITE.** MIN. Même chose que Dichroïte. V. ce mot.

\* **CORDIFORME.** ZOOLOG. BOT. Qui a la forme d'un cœur. Cette épithète ne s'applique qu'aux corps solides et épais : ainsi on dit un fruit, une graine cordiformes, etc. V. CORDÉ. (A.B.)

**CORDILIA.** BOT. PHAN. V. CORDYLIE.

\* **CORDISTE.** *Cordistes.* INS. Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Pentamères, famille des Carnassiers, tribu des Carabiques, établi par Latreille (Hist. des Coléopt. d'Europe, 1<sup>re</sup> livr., p. 77) aux dépens des Odacanthes de Fabricius, et correspondant au genre *Calophæna* de Klug. Nous avons exposé à ce mot les caractères génériques, et nous avons présenté à l'article CARABIQUES un tableau qui fait voir les rapports qu'il a avec les genres Casponie et Odacanthie. Dejjean (Catal. des Coléopt. p. 2) mentionne deux espèces qu'il désigne sous les noms de *maculatus* et *acuminatus*; la première est nouvelle et la seconde avait été décrite sous ce nom par Olivier. L'une et l'autre sont originaires de Cayenne. (AUD.)

\* **CORDML.** BOT. PHAN. Syn. masculin de *Cuscuta corniculata*, plante qui pourrait bien ne pas appartenir au genre auquel on la rapporte. (M.)

**CORDON BLEU.** OIS. Espèce du genre *Cotinga*, *Amphisp. Cotinga*, L. K. GERMER. On a aussi donné ce

nom à une espèce du genre *Gras-Bec*, *Fringilla bengalensis*, L. V. GRAS-BEC. (DR.Z.)

**CORDON BLEU.** MOLL. Nom marchand d'une espèce du genre *Ampullaire*. V. ce mot. (B.)

\* **CORDONCILLO.** BOT. PHAN. Nom donné par les habitants de la république de Vénézuëla, entre Guigue et Villa-de-Curá, au *Peperomia speciosa*, Kunth (*Nova Genera et Sp. Amer.* 1, p. 69). V. PÉPÉROMIE. (G.N.)

**CORDON DE CARDINAL.** BOT. PHAN. Nom vulgaire du *Polygonum orientale*, L. V. RENOUÉE. (B.)

**CORDONNIER.** OIS. Syn. vulgaire du Goéland brun, *Larus Catarrhactes*, L. V. MAUVE. (DR.Z.)

**CORDONNIER.** POIS. Nom vulgaire d'un Poisson indéterminé du golfe de Guinée, qu'on dit avoir deux barbillons aux côtés de la bouche, et grogner comme le Cochon. (B.)

**CORDONNIER.** INS. Nom vulgaire de la Noctonecte dans le midi de la France, par allusion aux mouvements que font ses avirons quand cet insecte nage. (B.)

\* **CORDON NOIR.** OIS. Espèce du genre Sylvie, *Sylvia melanoleucos*, L., Ois. d'Afrique, pl. 150. V. SYLVIE. (DR.Z.)

**CORDON OMBILICAL.** ZOOLOG. ET BOT. V. FŒTUS, FRUIT ET GÉNÉRATION.

\* **CORDONS PISTILLAIRES.** *Chordæ pistillares.* BOT. PHAN. Outre les vaisseaux destinés à porter la nourriture aux jeunes ovules renfermés dans l'intérieur de l'ovaire, on en rencontre d'autres dans les parois de cet organe, auxquels paraît être confié le soin de transmettre aux jeunes embryons l'action vitale, au moment où la fécondation s'opère. C'est à ces vaisseaux généralement disposés par faisceaux simples ou ramifiés, que l'on a donné

**ma de Cordons pétilleux.** En tal, ils se couvrent avec les vaisseaux nourriciers du péricarpe et tiennent les nervures de Mirbel. s'étendent depuis les ovules aux- s'ils parviennent en traversant l'ophosperme, jusqu'au stigmate ils se changent insensiblement en tissu cellulaire plus ou moins fin élicat. Leur nombre est en général rigoureusement déterminé, et correspond exactement au nombre des oosphermes ou de leurs divisions. **PISTIL.** (A. B.)

**CORDUBA ou CORRUDA.** BOT. N. (L'Ecluse.) Syn. d'*Asparagus bifolius* en Espagne, où diverses espèces d'Aspéruges acrochantes et à filles poignantes remplissent les rans incultes. (B.)

**CORDYLE.** *Cardylus.* REPT. SAUR. Un-genre et espèce du genre Stel- lion. V. ce mot. (B.)

**CORDYLE.** *Cordyla.* INS. Genre l'ordre des Diptères, famille des mocrères, tribu des Tipulaires, dé par Meigen, et qu'on peut réu- , suivant Latreille (Règn. Anim. Nat.), au genre Simulie. Les an- nes sont courtes, grosses, en forme fuscau et perforées comme dans Bibions. Mais elles sont composées douze articles, et la tête ne présente d'yeux lisses, ce qui est un carac- e distinctif. La forme générale du ps et les pieds épineux rapprochent Cordyles des Mycétophiles. Meig- n (Descr. syst. des Diptères d'Eu- pe, T. 1, p. 274) décrit deux pèces. Il désigne la première sous le n de *Cordyla fusca*, et figure la e et une des ailes; la seconde es- ce porte le nom de *Cordyla crassi- nis*. Elle est représentée en entier (b. 10, fig. 1). (AUD.)

**CORDYLE.** BOT. RHAN. Pour cordylic. V. ce mot. (B.)

**\*CORDYLÉE.** REPT. SAUR. Excré- ens de Lézards, soit du Stellion, it du vrai Cordyle, soit enfin du minor, que des empiriques employè- nt comme médicament. (B.)

**\*CORDYLÉE.** *Cordylis.* BOT. RHAN. Genre fondé par Loureiro (P. C. chin., II, p. 500) pour un Arbre de la Monadelphie Polyandrie, L., mais qui n'a pas encore été rapporté à l'une des familles naturelles. Il of- fre pour caractères : calice campanulé à quatre découpures; corolle nulle; étamines nombreuses et monadel- phes; ovaire libre surmonté d'un style; baie pédicellée, uniloculaire et polysperme. Le *Cordylis africana* est un grand Arbre dont les branches sont très-étalées, garnies de feuilles alternes et ailées, à folioles glabres, petites et obcordées. Les fleurs nom- breuses sont supportées par des pé- doneaux solitaires et latéraux. Lou- reiro l'a trouvé sur les côtes orien- tales de l'Afrique. (B.)

**\*CORDYLINÉ.** *Cordylina.* BOT. RHAN. Genre établi par Commerson, et faisant partie de la famille des As- paraginées, et de l'Hexandrie Mono- gynie, L. Son calice est campanulé, caduc, à six divisions égales; les six étamines sont insérées à la base de ces divisions; leurs filets sont subu- lés, glabres, non dilatés dans leur partie moyenne, comme dans les *Dracana*, ni à leur partie supérieure, comme dans les *Dianella*. Les anthè- res sont bifides à leur base; l'ovaire est à trois loges polyspermes, surmon- té par un style que termine un stigi- mate trilobé. Le fruit est une baie globuleuse généralement à trois loges contenant plusieurs graines, très-ra- rement une seule par l'avortement des autres.

Ce genre ne se compose que de trois espèces qui ont quelque ressemblance avec certains Palmiers. Elles sont vivaces et sous-frutescentes; leurs feuilles sont très-allongées, entières, striées longitudinalement; leurs fleurs consti- tuent des panicules ramenses; elles sont en général articulées avec le pédicelle qui les supporte. Des trois espèces qui forment ce genre, l'une a été mentionnée par Commerson sous le nom de *Cordylina hahichrysa*. Thunberg l'avait placée dans le genre *Dracana*, et Lamarck parmi les *Dis-*

**CORDYLINE** est un cap de Bonne-Espérance et sur les îles de France et de Bourbon. La seconde est le *Cordylina* de R. Brown, qui croît à la Nouvelle-Hollande; enfin la troisième a été décrite par Kunth (in *Humb. et Bonpl. Voy. Gen.*) sous le nom de *Cordylina parviflora*. Elle est originaire du Mexique. (A. R.)

**CURDYLOCARPE.** *Cordyllocarpus*. NOT. PHAN. Desfontaines, dans sa Flore Atlantique, est l'auteur de ce genre qui fait partie de la famille des Crucifères et de la Tétradynamie siliqueuse; et que De Candolle place dans sa tribu des Cakiliées. On peut caractériser ce genre de la manière suivante : les quatre sépales sont dressés et égaux; les pétales sont onguiculés à leur base; leur limbe est entier; les filets des étamines sont dépourvus de dents; les siliques sont cylindriques, un peu toruleuses, indéhiscentes, renflées dans leur partie supérieure en un appendice globuleux, monosperme, hérissé de pointes, et surmonté par le style qui est persistant; les graines sont au nombre de trois à quatre dans chaque silique; elles sont ellipsoïdes et comprimées.

Ce genre ne se compose que d'une seule espèce, *Cordyllocarpus muricatus*, Desf., Fl. Atl. 2, p. 79, t. 152. C'est une Plante annuelle dont la tige est dressée, rameuse, glabre ou légèrement poilue, portant à sa base des feuilles lyrées, et dans sa partie supérieure des feuilles lancéolées; les fleurs sont jaunes, et forment des épis allongés. Desfontaines a trouvé cette Plante sur la lisière des champs dans le royaume d'Alger. Ce genre, voisin de l'*Erucaria*, s'en distingue surtout par la structure de la silique. (A. R.)

**CORÉ.** ins. Pour Corée. V. ce mot.

**CORÉA.** ois. (Gaimard.) Syn. de *Corasseau*, *Tringa Ochropus*, L., à Oubylée, Mowée et Wahou, îles Sandwich. (B.)

**CORÉA.** not. PHAN. Le *Coris monspeliensis* en Portugal où cette Plante est fort commune. (B.)

**CORÉA OURIOL** ois. (Gaimard.) Syn. d'Echassier grêle à Sandwich. (B.)

**COREDULA.** ois. On prétend que c'est un Oiseau de proie qui ne mange que le cœur des Animaux qu'il chasse. Du reste il est totalement inconnu. (B.)

**CORÉE.** *Corseus*. ins. Genre de l'ordre des Hémiptères, section des Hémiptères, établi par Fabricius aux dépens du grand genre *Cimex* de Linné, rangé d'abord par Latreille (Considér. génér. p. 254) dans la famille des Corisies, à laquelle il avait donné son nom, et placé ensuite (Rég. Anim. de Cuv.) dans celle des Gécorisies. Ses caractères sont : antennes droites, toujours découvertes, de quatre articles, dont le dernier plus court que le précédent est renflé ou en massue, insérées au bord supérieur du museau, au-dessus d'une ligne idéale tirée des yeux à l'origine du labre; bec courbé, presque parallèle au corps, de quatre articles un peu différents en longueur; tarse à trois articles, dont le premier et le dernier longs. Ces insectes ont en général la tête trigone, sans cou apparent, enfoncée dans le prothorax, supportant des yeux proéminents, mais petits. Le prothorax est étroit antérieurement et large à la partie postérieure. Le cousson triangulaire et très-apparent. Les élytres égales à l'abdomen en longueur; elles sont coriaces avec l'extrémité membraneuse. Les pattes sont longues et grêles. L'abdomen est déprimé sur sa face inférieure et relevé sur les côtés.

Les Corées ont de très-grands rapports avec les Alydes qu'on pourrait à la rigueur leur associer. En effet, ce dernier genre fondé par Fabricius n'en diffère guère que par la forme du dernier article des antennes, qui est allongé, presque cylindrique et de la longueur du précédent. Il partage ce caractère et ressemble d'ailleurs beaucoup aux Lygées, et surtout aux Coris qui sont des Alydes très-allongés. Les Corées se rencontrent souvent l'été sur plusieurs Plantes. Il en

upent. le son au moyen de leur ; et se nourrissent aussi dans leurs érens états de toutes sortes d'In-tes. Les femelles pondent une onde quantité d'œufs qu'elles col-ent sur les feuilles à côté les uns des tres. Ce genre est assez nombreux espèces européennes.

Le CORÉE BORDÉ, *Coreus marginatus* ou le *Cimer marginatus* de Lin- , décrit par Geoffroy (Hist. des Ins. 1, p. 446) sous le nom de Punaise oreilles, peut être considéré comme type du genre. Il a été figuré par oist (Icon. Cimic. fasc. 1, p. 20, t. 3, . 20). Cette espèce répand une forte eur de l'Homme. On la trouve aux virons de Paris.

Le CORÉE PORC-ÉRIC, *Coreus Hy- r de Linné*. Cet Insecte bizarre r sa forme a été rencontré aux en- ons de l'Inde. Il y est très-rare, et trouve assez communément dans le iede la France. Sparmann a re- cilli un échantillon de l'Inde-Espérance e espèce voisine de celle-ci, et qui le *Coreus paradoxus* de Fabricius. n en trouve une bonne figure dans atlas du Dict. des Sciences Natu- lles publié par L'érault. (AUD.)

\* CORÉÈNE. MAM. Variété dans espèce Mongolique ou Altaïque du ure Homme. V. ce mot. (B.)

CORÉGONE. *Corogonus*. POIS. us-genre de Salmon. V. ce mot. (B.)

\* CORÉGARAS. OIS. C'est-à-dire orbeau de Corée. Oiseau japonais u connu et fort rare dont on offrit a individu en présent à l'empereur, rapport de Kœmpfer. (B.)

CORELLIANA. BOT. PHAN. (Plins.) arité de Châtaigne fort estimée à une qu. Corellius Chevalier l'avait itroduite par le moyen de la greffe. (B.)

\* CORÉMBLOEM. BOT. PHAN. Mental.) Syn. belge de Bluat, *Cen- urea Cyanus*, L. (B.)

COREMIUM. BOT. CRYPT. (*Mucé- mées*.) Ce genre, établi par Link , Bert. Mag. 1809, p. 19), est voisin

des genres *Penicillium*, *Aspergillum*, etc. Il est ainsi caractérisé : filamens entrecroisés en forme de capitule sti- pité ; capitule et stipe couverts de fi- lamens en pinceau qui portent des sporidies éparses.

Ce genre a l'aspect des *Stilbum* et des *Isaria*, mais il est évidemment formé par des filamens simplement entrecroisés et non réunis en une seule masse. Link n'en décrit qu'une seule espèce sous le nom de *Coremium glaucum* ; elle croît sur les fruits confits qui se sont pourris. Le *Monilia Penicillus* de Persoon appartient probable- ment à ce genre. (AD. B.)

CORÉOPE, BOT. PHAN. V. CO- RÉOPSIDE.

CORÉOPSIDE. *Coreopsis*. BOT. PHAN. Famille des Synanthérées, Co- rymbifères de Jussieu, tribu des Hé- lianthées de Cassini, et Syngénésie frustrangée. Linné vetra des genres *Bidens* et *Coron. solis* de Tournefort, quelques espèces dont il fit un nou- veau genre qu'il nomma *Coreopsis*. Les auteurs ont ensuite ajouté à ce- lui-ci un grand nombre de Plantes dont quelques-unes doivent en être séparées. Ces additions étrangères ont fait varier les caractères génériques quel'on a pourtant fixés de la manière suivante : calathide radiée ; fleurons du disque tubuleux, nombreux et hermaphrodites ; ceux de la circonfé- rence sur un seul rang, en languet- tes et neutres ; involucre formé de plusieurs folioles disposées sur deux rangs, les extérieures foliacées et éta- lées, les intérieures appliquées et presque membraneuses ; réceptacle plane et paléacé ; akènes comprimés, terminés par deux barbes persistan- tes, non crochues et nues selon Kunth, se confondant avec des rudimens de *squamellules barbellulées* d'après Cassini. Ce genre est composé de Plan- tes herbacées ou quelquefois mais ra- rement frutescentes, à branches et à feuilles opposées, le plus souvent partagées en un grand nombre de segmens filiformes ; à fleurs termi- nales et ordinairement jaunes.

Quarante espèces à peu près ont été décrites soit sous le nom de *Coreopsis*, soit sous d'autres noms génériques. Ainsi les *Coreopsis amplexicaulis*, *C. fistula* et *C. heterophylla* de Cavanilles, ont été réunis par Persoon qui en a fait le genre *Simsia*. Ce dernier n'a pas été admis, car il existe un autre *Simsia* fondé par R. Brown, et placé dans la famille des Protéacées. Le *Coreopsis alata*, Pursh, et le *C. procera*, Ait., forment le genre *Actinomeris* de Nuttall. Moench a voulu aussi séparer le *Coreopsis lanceolata*, L., sous le nom de *Coreopsoides*. V. tous ces mots.

La plupart des *Coreopsides* habitent les contrées boréales de l'Amérique; leur culture est assez facile en Europe, dans les jardins d'agrément qu'elles continuent d'embellir quand le règne des autres fleurs a cessé. C'est en effet au commencement de l'automne que ces Plantes fleurissent chez nous; à cette époque, plusieurs espèces, et entre autres les *Coreopsis serotina*, Jacq., *C. tripteris*, L., *C. verticillata*, L., et le *C. tinctoria*, espèce introduite récemment en Europe, produisent des corymbes élégans de fleurs dont les rayons, d'un jaune intense, contrastent élégamment avec le blanc obscur de leur disque. (G.N.)

\* **COREOPSIDÉES.** *Coreopsidae*. BOT. PHAN. Section formée par H. Cassini dans la tribu des Hélianthées, famille des Synanthérées. Elle est caractérisée par un ovaire tétragone, comprimé antérieurement et postérieurement, de sorte que son plus grand diamètre est de droite à gauche. Cette section comprend les genres *Bidens*, *Heterospermum*, *Glossocardia*, Cassini; *Coreopsis*, *Cosmos*, *Dahlia* ou *Georgina*, *Syphium* et *Parthenium*. Les *Ferbesina* et les *Spilanthis*, que l'on regardait comme voisins des *Bidens*, tellement que Lamarck avait fondu en un seul ces deux derniers genres (*Bidens* et *Spilanthis*), se trouvent maintenant distribués dans deux sections différentes,

suivant l'importance attachée par Cassini à la diversité de l'organisation de leurs fruits. (G.N.)

**COREOPSOIDES.** BOT. PHAN. Genre proposé par Moench pour le *Coreopsis lanceolata*, L., dont les achenes sont marqués et un peu différens, quant à la forme, de ceux des autres *Coreopsis*. Sa dénomination est trop vicieuse pour qu'on ne lui en substituât pas une autre, si on se déterminait à l'adopter; mais ce cas n'est pas probable, attendu le peu de gravité des caractères. (G.N.)

\* **CORÉREVA.** ÉCHIN. (Gaimard.) Syn. d'*Holothuria* Owybée, Mowée et Wabou; îles Sandwich. (S.)

**CORETA.** BOT. PHAN. (Brown.) *Jam.* p. 147. Espèce du genre *Corchorus*. V. **CORÈTE** ou **CORÈTE**. (H.)

**CORÈTE** ou **CORÈTE**. *Corchorus*. BOT. PHAN. Famille des Tiliacées et Polyandrie Monogynie; L. Ce genre, fondé par Tournefort et adopté par Linné, offre les caractères suivans: calice à cinq divisions profondes et caduques; cinq pétales; étamines en nombre indéfini, à anthères arrondies; un à trois stigmates portés sur un style court qui quelquefois n'existe pas; capsule allongée en forme de silique à deux ou cinq loges polyspermes. Dans une savante dissertation sur les Malvacées, Tiliacées et Buttnériacées, publiée en 1822, Kunth observe que le genre *Antichorus* mériterait à peine d'être distingué du *Corchorus*, puisqu'il n'en diffère que par le nombre quaternaire des parties. Ces deux genres ont d'ailleurs le même faciès. Les Corètes sont des Plantes herbacées ou rarement des Arbrisseaux, qui habitent les climats chauds de l'Amérique et des Indes-Orientales. Elles ont des feuilles simples, quelquefois munies, à la partie inférieure du limbe, de dents qui se prolongent en une barbe sétacée; les fleurs sont petites, jaunes et axillaires. Le nombre des espèces décrites n'est pas très-considé-



charnus. Au-dessous d'eux et vers leur origine est une nageoire verticale, placée dans le sens de la longueur du corps, d'une grande transparence, et de forme ovale; du point où elle s'attache partent des lignes qui, comme des rayons, se dirigent vers différents endroits du contour de l'ovale. Vers le mois de juillet ou d'août ces larves se transforment en nymphes. Celles-ci ressemblent pour l'arrangement et la disposition des jambes à celles de plusieurs autres Tipules; mais elles ont deux appendices qui s'élèvent au-dessus de leurs têtes. Grêles et aplaties à leur origine, ces sortes de cornes s'élargissent et se rétrécissent de nouveau pour finir en pointe assez aiguë. La nymphe tient ordinairement leur extrémité au-dessus de la surface de l'eau, et on ne peut guère douter qu'elles ne soient des organes respiratoires. Réaumur croit que ces parties, dont la surface examinée au microscope paraît chagrinée, sont formées par les deux corps antérieurs en forme de rein qu'on aperçoit dans la larve. Quoiqu'il en soit, l'extrémité postérieure des corps présente deux nageoires égales et semblables, foliacées, transparentes et parcourues par deux rameaux trachéens. L'état de nymphe dure peu de temps, et on voit souvent l'insecte parfait au bout de dix ou douze jours.

La *Corèthra culiciforme*, *Corèthra culiciformis* ou la *Tipula culiciformis* de Degée (Mém. Ins. T. VI, p. 372, t. 23, fig. 3-12) qui a été étudiée cette espèce avec le même soin que Réaumur la précédente. La larve ressemble assez à celle de la Corèthre à antennes plumeuses; elle a toujours une position horizontale, ce qui la distingue de celle des Cousins. Sa tête grosse, arrondie, distincte du corps, n'offre pas de crochets, mais simplement des barbillons. La nageoire caudale est remplacée par un assemblage de poils placés en rayons et qui sert évidemment à la natation. Les organes qui ressemblaient à des reins se retrouvent également, mais

ils affectent aux deux extrémités du corps une toute autre forme. Ils sont oblongs et paraissent être des réservoirs d'air. La nymphe présente aussi deux cornes qu'elle fait sortir de l'eau afin de respirer.

Latreille pense qu'on doit rapporter au genre *Corèthra* la *Tipula crucifera*, *Tipula crucifera*, représentée par Slabber dans ses Observations microscopiques. Elle est, dit-il, très-voisine de la *Corèthra culiciforme*.

(AUD.)

\* **CORETT.** POIS. (Nieuhoff.) Espèce de Scombre que Pison appela *Alba Coretta*, qui paraît le *Guarapucu* de Marcgraaff, et qui pourrait être l'*Albicor* de Sloane. (B.)

**CORETTE.** BOT. PHAN. *V. CORETTE.*

**COREVIA ET KORAVIA.** BOT. PHAN. Syn. arabe de Carvi. (B.)

\* **COREX.** OIS. (Klein.) Syn. pris pour le Serin, *Fringilla Serinus*, L. *V. GROS-BEC.* (DE Z.)

**CORF.** OIS. Syn. vulgaire de la Corbipe, *Corvus Corohe*, L. *V. CORBEAU.* (DE Z.)

**CORF ET CORFO.** POIS. (Gesner.) Syn. de *Scienza Umbra*. (B.)

**CORGNE ET CORGNIOLA.** BOT. CRYPT. Et non *Corgue*. Noms italiens appliqués à un Champignon qui paraît être l'*Agaricus Eryngii*. (B.)

**CORGNO OU ACURNI.** BOT. PHAN. Fruits du Cornouiller appelé Acurnier dans le midi de la France. (B.)

\* **CORGOLOIN.** GÉOL. (Saussure.) Nom d'une espèce de Marbre de Bourgogne; c'est un Calcaire oolithique assez compacte, homogène, dur et susceptible de poli. (B.)

**CORGUE.** BOT. CRYPT. *V. CORGNE.*

**CORI.** MAM. Syn. de Cochon d'Inde dans l'Amérique espagnole. *V. CORAIE.* (B.)

**CORIACES.** *Coriaceæ.* INS. Famille de l'ordre des Diptères établie par Latreille, et embrassant le grand



genre Hippobosque de Linné, qui appartient (Règn. Anim. de Cuv.) à la famille des Pupipares. P. ca mot. (AUD.)

# \* CORIACESIA ET CALLICIA:

**NOT. FRAN.** Les anciens donnaient ce nom à une ou deux Plantes qu'ils n'ont indiquées que par la propriété vraie ou supposée de faire coaguler l'eau sous forme d'une gelée. (S.)

# CORNAIRE. *Coriaria*. **NOT. FRAN.**

Quoique la structure de ce genre soit parfaitement connue, on n'a pu néanmoins jusqu'à présent le rapporter avec certitude à aucun des ordres naturels établis. Aussi allons-nous donner quelques développemens à ses caractères, afin de tâcher d'en faciliter la classification naturelle. Il se compose de quatre à cinq espèces; trois sont originaires du Pérou, une de la Nouvelle-Zélande et une des contrées méridionales de l'Europe. C'est cette dernière, la seule que nous ayons été à même d'observer vivante, que nous aurons particulièrement en vue en décrivant les caractères du genre *Coriaria*.

Les fleurs sont généralement polygames, tantôt monoïques, tantôt diques; leur calice est persistant, à cinq divisions égales et dressées; les étamines, au nombre de dix, saillantes et deux fois plus longues que le calice; leurs filets sont grêles et distincts; leurs anthères ovoïdes, allongées, intorses et à deux loges, qui s'ouvrent par un sillon longitudinal; en face et en dehors de chacune des étamines qui alternent avec les lobes du calice, on trouve une écaille dressée, épaisse, convexe en dehors, recourbée sur les pistils, et à peu près de la même longueur que le calice, lesquelles ont été considérées par Linné et un grand nombre d'auteurs comme une corolle formée de cinq pétales; les pistils sont au nombre de cinq, insérés sur un réceptacle charnu, peu développé, et adhérens latéralement entre eux; ils sont attachés au réceptacle par leur moitié supé-

rieure seulement, d'inférieure restant libre; chaque pistil se compose d'un ovaire ovoïde, allongé, terminé en pointe à la partie supérieure, à une seule loge qui renferme un ovule renversé, et remplissant exactement la cavité de la loge; de la partie supérieure et un peu latérale de l'ovaire, naît un long stigmaté filiforme, subulé et glanduleux, trois ou quatre fois plus long que le calice, un peu recourbé en dehors dans sa partie supérieure. Le fruit offre la structure suivante: le calice persiste, et ses lobes s'épaississent un peu; ils sont d'abord étalés, puis se renversent. Les cinq écailles dont nous avons fait mention prennent un très-grand accroissement; elles s'allongent, deviennent charnues, épaisses, et forment cinq cornes saillantes au-dessus des fruits. Ceux-ci sont au nombre de cinq, disposés sous forme d'étoile et dedans des cinq appendices charnus. Chacun d'eux est ovoïde, terminé en pointe à son sommet, strié et légèrement charnu extérieurement; il reste indéhiscent, et contient une graine renversée, composée de son tégument propre, et d'un gros embryon ayant la même direction, et dont les cotylédons sont épais et charnus.

Les espèces qui forment ce genre sont des Arbustes ou des Arbrisseaux dont les rameaux sont souvent anguleux et garnis de feuilles opposées, simples, sessiles et dépourvues de stipules; les fleurs sont soit nées ou en épis; l'espèce que l'on voit assez fréquemment dans les jardins est la Cornaire à feuilles de Myrte, *Coriaria myrtifolia*, L., *Flor. Cliff.* C'est un Arbuste rameux haut de cinq à six pieds, et qui croît naturellement dans le midi de la France, en Espagne et en Barbarie, aux lieux secs et pierreux des côtes bien exposés. Ses feuilles sont ovales, allongées, aiguës, légèrement pétiolées, marquées de trois nervures. Ses fleurs sont d'une teinte pourpre obscure. On la cultive en pleine terre sous le climat de Paris. (A. R.)

**CORIANDRE.** *Coriandrum*. BOT. PHAN. Famille des Ombellifères, Pentandrie, Digynie, L. Ce genre, fondé par Tournefort, adopté par Linné et Jussieu, est ainsi caractérisé : involucre nul ou composé d'une seule foliole linéaire ; involucelles de plusieurs folioles ; calice à cinq dents ; pétales infléchis et cordiformes, les extérieurs plus grands ; akènes sphériques ou didymes. L'organisation de ce genre le place dans la section des Cicutariées (Ach. Rich., Bot. médicale, p. 467) avec les genres *Conium*, *Aethusa* et *Cicutaria*. C. Sprengel le fait entrer dans sa tribu des Snyrmiées, et adopte la séparation du *Cor. testiculatum*, L., proposée par Hoffmann pour en former le genre *Bisfora* ; seulement, et on ne sait pourquoi, il change la désinence de celui-ci, et l'appelle *Bisforis*.

La CORIANDRE CULTIVÉE, *Coriandrum sativum*, L., Plante originaire d'Italie, mais que sa culture extrêmement facile a presque naturalisée en France, porte des fleurs blanches, rosées, plus grandes à la circonférence de l'ombelle. L'involucre général manque, mais chaque ombellule est munie à sa base d'un involucrelle de quatre à huit folioles linéaires. Le fruit est un diakène globuleux, couronné par les dents du calice et les styles, et séparable en deux portions hémisphériques ; la racine est annuelle, fusiforme, surmontée d'une tige un peu rameuse, couverte de feuilles à segments très-croisés, les inférieures bipinnatifides, celles du collet de la racine presque entières ou incisées-cunéiformes. Toute la Plante, lorsqu'elle est fraîche, exhale une odeur de Fumaise, d'où elle a tiré son nom ; mais les fruits acquièrent par la dessiccation une odeur et une saveur si agréables, que les confiseurs et les liquoristes en font une grande consommation comme un des meilleurs aromates et condiments indigènes. En médecine ils passent pour stomachiques et carminatifs.

La CORIANDRE TESTICULAIRE, *Co-*

*stidanthum testiculatum*, L., *Bisfora testiculata*, Hoffm., est remarquable par son involucre monophylle solitaire, ses fleurs égales et ses fruits didymes bosselés, ayant deux pores au sommet du raphé. Elle habite les contrées méridionales de l'Europe. Maischall de Bieberstein (*Suppl. Fl. Taurico-Caucas.*) distingue deux espèces dans le *Coriandrum testiculatum* de sa Flore, n. 568. En adoptant le genre proposé par Hoffmann, il nomme l'une *Bisfora rutilans*, qui est particulière aux champs de la Taurie où elle croît si abondamment que son odeur, pénétrante et désagréable, se fait sentir de fort loin. La seconde, qu'il appelle *Bisfora flocculosa*, serait la même que non e espèce occidentale.

Divers auteurs ont à tort fait entrer dans le genre Coriandre des Plantes qui appartiennent certainement à d'autres genres ; ainsi on a nommé *Coriandrum Oculis*, le *Oculus virosus* ; *C. maculatum*, la grande Ciguë ; *C. Cynapium*, l'*Aethusa* ou la petite Ciguë ; et *C. latifolium*, le Saum ou la Berle à larges feuilles. (G. N.)

**CORIAR.** ois. Syn. anglais de la Perdrix grise, *Tetrao Perdix*, L. V. PERDRIX. (DR. Z.)

**CORARIA.** BOT. PHAN. V. CORAIRE.

\* **CORICARPE.** *Conicarpus*. BOT. PHAN. Nouveau genre de la famille des Malvacées et de la Monadelphie Polyandrie, indiqué par Auguste Saint-Hilaire dans son premier Mémoire sur le Gynobase (Mém. Mus. 10, p. 160), et qui se compose de deux espèces encore inédites, recueillies par cet habile botaniste dans le Brésil. Les caractères principaux de ce genre consistent dans son double calice à cinq divisions, dans sa corolle formée de cinq pétales entiers. Son androphore est cylindrique, chargé d'étamines dans toute sa longueur. L'ovaire est à cinq loges parfaitement distinctes, insérées obliquement par leur base sur un réceptacle court et conique. Le style est simple et linéaire, non sur les lobes de l'ovaire, mais sur la ré-

pectacle qui est un véritable gynobase. Les stigmates sont au nombre de dix. Dans chaque loge on trouve un seul ovule dressé et très-rapproché de la paroi voisine du style. Ce genre est voisin de l'*Urena*. (A. R.)

**CORICUS.** FOR. P. SUBLER et LABRE. (R.)

**CORIDE.** *Coris.* BOT. PHAN. Une petite Plante, qui croît en abondance dans les lieux découverts et pierreux des provinces méridionales de la France et de l'Espagne, constitue ce genre de la famille des Primulacées et de la Pentandrie Monogynie. L. Le *Coris Mouspelienais* offre à peu près le port d'une Bruyère. Sa tige est sous-frutescente à sa base, étalée, très-rameuse, cylindrique, pubescente, longue de huit à dix pouces. Les feuilles sont épaisses, très-nombreuses, sessiles, étroites, linéaires, planes, glabres, légèrement mucueuses. Les fleurs sont roses et forment un épi terminal à la partie supérieure des ramifications de la tige. Chacune d'elles est sessile, et offre un calice vésiculeux cylindrique, à dix stries qui se terminent chacune par une dent aiguë. L'entrée du calice est garnie de cinq lames triangulaires conniventes, et qui la bouchent exactement lorsqu'elles se rapprochent. Chacune de ces lames offre vers son milieu une grosse glande sessile. La corolle est monopétale irrégulière, longuement tubulée à sa base, évasée dans sa partie supérieure qui présente cinq lobes écartés inégaux, obtus, bifides, dont trois supérieurs sont plus longs. Les cinq étamines sont insérées vers le milieu du tube de la corolle; elles sont opposées aux lobes de son limbe, caractère qui s'observe dans presque tous les autres genres de la famille des Primulacées. Les filets sont subulés; les anthères d'abord ellipsoïdes, obtuses à leurs deux extrémités, deviennent plates et dentelées lorsque le pollen s'en est échappé. L'ovaire est globuleux, entouré à sa base d'un disque annulaire qui en est à peine distinct.

Le style est long, grêle et terminé par un stigmate simple, orbiculaire et comme pelté. Cet ovaire offre une seule loge presque totalement remplie par un gros trophosperme qui en occupe les deux tiers inférieurs, qui est porté à sa base par un pédicule central, et adhère par son sommet à la base du style au moyen d'un prolongement manifeste. La face supérieure du trophosperme offre cinq petites fossettes superficielles contenant chacune un ovule attaché par sa face inférieure. Le fruit est renfermé dans l'intérieur du calice qui est persistant. C'est une capsule globuleuse déprimée, offrant cinq sutures qui ne sont marquées que dans la moitié supérieure et par lesquelles elle s'ouvre en cinq valves. Le trophosperme remplit encore presque à lui seul l'intérieur de la capsule. Cette structure du trophosperme est extrêmement remarquable et n'existe pas dans les autres genres de la même famille. (A. R.)

\* **CORIDESTRAES.** ZOOL. Animal marin qu'on ne peut rapporter exactement aux Poissons, et qui est mentionné dans Hesychius. (B.)

**CORIDON.** INS. Nom vulgaire donné par Geoffroy au *Papilio Janira* de Linné. (AUB.)

**CORIGUAYRA.** MIN. Syn. américain de Sarigua. P. DIELPHE. (B.)

\* **CORIM.** MIN. Syn. de Quartz commun. (LAC.)

**CORIMBE.** BOT. PHAN. Pour Corymbe. P. ce mot. (B.)

**CORINDE.** *Corindum.* BOT. PHAN. Espèce du genre *Cardiosperma*, P. an mqi, dont le nom a été étendu à tout le genre dans les Dictionnaires précédents. (B.)

**CORINDON.** *Corund* et *Corundum.* MIN. L'une des espèces de la classe des Pierres, dont le caractère essentiel est d'être composée d'Alumine pure, et d'avoir pour forme primitive un rhomboïde aigu de  $86^{\circ} 58'$  et  $93^{\circ} 22'$ . Les joints parallèles aux faces de ce rhomboïde ne se montrent avec netteté que dans une partie des cris-

taux; dans d'autres ils sont à peine sensibles, et l'on aperçoit alors des joints surnuméraires dont la direction est perpendiculaire à l'axe du rhomboïde primitif. La pesanteur spécifique du Corindon varie entre 3,9 et 4,3. C'est la Pierre la plus dure après le Diamant. Il possède la réfraction double à un faible degré. Il est infusible au feu du chalumeau. Les Acides sont sans action sur lui. Klaproth a obtenu, par l'analyse du Corindon bleu, dit Saphir oriental, 98,5 d'Alumine sur 100 parties, et 2,5 de Chaux et d'Oxide de Fer. Le Corindon du Bengale, dit Spath adamantin, lui a donné 89,56 d'Alumine, 5,60 de Silice et 1,25 d'Oxide de Fer. — Le système de cristallisation de cette substance est remarquable par le grand nombre de doubles pyramides hexaèdres qu'il présente; presque toutes les variétés de formes semblent avoir pour type immédiat le prisme à six pans; mais il est facile de les faire dériver du rhomboïde à l'aide de décompositions intermédiaires sur les angles latéraux. Il existe un cas où la double pyramide hexaèdre peut résulter d'un décroissement ordinaire sur les mêmes angles; et ce résultat est réalisé dans une variété de Corindon qu'Haüy nomme ternaire, parce que les lames qui la produisent décroissent de trois rangées de molécules en largeur. Parmi les variétés les plus communes, qui partagent avec la précédente la forme du dodécaèdre bipyramidal, nous citerons le Corindon assorti du Pégu, dont les pyramides sont beaucoup plus allongées. Dans d'autres cristallisations, plusieurs dodécaèdres se combinent soit entre eux, soit avec le prisme hexaèdre régulier; et dans quelques-uns, les faces du rhomboïde primitif repaissent vers les deux sommets.

Si l'on considère maintenant l'ensemble des variétés du Corindon relativement à la texture, on pourra le partager avec Haüy en trois séries principales sous les noms de Corindon hyalin, Corindon harmophane et Corindon compacte, suivant que leur cas-

sure sera vitreuse, ou lamellaire, ou terne; ou bien avec d'autres minéralogistes, en deux sous-divisions dont l'une comprendra tous les cristaux transparents sous le nom de Saphir, de Télésie ou de Gemme orientale, et l'autre sera composée des cristaux opaques qui ont été décrits sous la dénomination de Spath adamantin, et dont le rapprochement avec la Pierre orientale est dû aux recherches de Romé de l'Île. Le Corindon hyalin se présente dans la nature sous les couleurs les plus variées; et, vu sa grande dureté et l'intensité de son éclat, il fournit au commerce des lapidaires un grand nombre de Pierres dont quelques-unes sont presque estimées à l'égal du Diamant, lorsqu'elles jouissent de toute leur perfection. Les principales teintes sont celles de rouge cramoisi, de bleu d'azur et de jaune, et les variétés qui les présentent portent dans le commerce les noms de Rubis, de Saphir et de Topaze d'Orient. Quelques cristaux sont en partie limpides, et en partie colorés; d'autres offrent par réflexion une couleur différente de celle que la réfraction fait apercevoir. Le Corindon prismatique de la côte de Malabar présente sur sa base une teinte de bronze, que le poli rend très-sensible. Certaines variétés montrent dans la même direction, c'est-à-dire sur un plan perpendiculaire à l'axe, une étoile blanchâtre à six rayons qui, lorsque ce plan est un hexagone, tombent perpendiculairement sur le milieu des côtés. Les lapidaires désignent ces variétés par le nom d'Astérie. Le Spath adamantin se rencontre souvent en doubles pyramides allongées, et plus ou moins déformées par des arrondissemens et des renflemens qui les ont fait comparer à un fuseau; de-là le nom de fusiforme que l'on donne à cette variété. Le Corindon, en se mêlant au Fer, constitue une variété de mélange; qu'on appelle le Corindon ferrifère ou l'Émeril. Sa cassure est granulaire; sa couleur est le brun, le gris blanchâtre; et quelquefois le rougeâtre. Son action

sur l'aiguille simantée est très-sensible. Sa poudre est d'un grand usage dans les arts, pour polir les Métaux, les glaces et les pierres fines.

Le Corindon paraît appartenir exclusivement aux terrains primitifs, et principalement aux terrains granitiques. Celui de la Chine, qui se rapporte à la modification nommée harnophane, est sous la forme de petites masses d'un gris obscur, dans un Granite qui renferme de la Fibrolite et du Fer oxydé en masse. Le Corindon du Thibet est dans une roche analogue, mélange de Stéatite verdâtre. On a trouvé au Saint-Gothard, près d'Ayrola, des Corindons qui paraissent avoir aussi un Granite pour gangue. A Gellivara, en Suède, c'est le Fer oxydulé qui enveloppe immédiatement le Corindon. Le Corindon compacte, qu'on a découvert près de Mozzo en Piémont, est engagé dans un Feldspath altéré, qui paraît provenir de la décomposition d'un Granite. Le Corindon harnophane de Carnate a pour gangue immédiate une substance blanche lamellaire, qui a beaucoup d'analogie avec le Feldspath, et à laquelle Bournon a donné le nom d'Indianite.

Le Corindon hyalin n'a été trouvé jusqu'ici qu'en cristaux épars dans des terrains d'alluvion, au Pégu, dans l'île de Ceylan, et en France sur les bords du ruisseau d'Espailly, près la ville du Puy. Quant au Corindon granulaire ou à l'Emeril, on ne connaît son gisement que dans une seule localité, à Oelsenkoph en Saxe, où il est engagé dans des couches de talc subordonnées à un Schiste primitif.

(G. DEL.)  
CORINDUM. BOT. PHAN. Dans Tournefort, ce mot est synonyme de Cardiosperme; Adanson et Murch ont prétendu le rétablir. (B.)

CORINE ou CORINNE. PHAN. Espèce du genre Antilope. V. ce mot. (B.)

CORINE. BOT. V. CORYNE.

CORINGIA. BOT. PHAN. Ce nom, que Persoon a adopté pour un petit

groupe de Crucifères du genre *Brassica* de Linné, est employé dans le *Systema Vegetabilium universale* de De Candolle, pour désigner une section du genre *Erysimum*. Elle est caractérisée par un style court, des pétales dressés et des glandules situées entre le pistil et les étamines. Ce sont des Plantes en général très-glabres, à feuilles amplexicaules, et à fleurs blanches ou jaunes pâles. Elle ne renferme que trois espèces dont deux étaient les *Brassica alpina* et *Br. orientalis* de Linné. Adanson et Heister ont employé le mot de *Couringia*, pour exprimer le même genre que celui de Persoon. (G. N.)

CORINOCABRE. BOT. PHAN. V. CORYNOCABRE.

CORINTHEN. BOT. PHAN. Ce nom, qui, chez les Allemands, désigne le Raisin de Corinthe, a été étendu au Groseillier rouge. (B.)

CORION. BOT. PHAN. (*Hippocrate*). Syn. de Coriandre. (*Dioscoride*). Syn. de Sainfoin commun. (*Hedysarum Onobrychys*).

CORIOPE. BOT. PHAN. Pour Coréopside. V. ce mot. (B.)

CORIOPHORE. *Coriophora*. BOT. PHAN. Espèce du genre *Orchis*, qu'on a aussi nommée *Coriosmitès*. V. ORCHIS. (B.)

CORIOTRAGEMATODENDROS. BOT. PHAN. Nous ne citons ce nom, donné par Plukenet à deux espèces de *Myrica*, que pour faire remarquer quel abus les botanistes avant Linné faisaient des étymologies pour composer des noms presque impossibles à prononcer et surtout à retenir. (B.)

CORIPHÉE. OIS. Espèce du genre Sylvie, Levaill. (Ois. d'Al. pl. 120, fig. 1 et 2). V. SYLVIE. (B. Z.)

CORIS. ROIS. Genre institué par Lacépède, qui n'a pas été adopté et qui rentre parmi les Labres. V. ce mot. (B.)

CORIS. MOLL. L'un des noms vulgaires du *Cypræa Moneta*. V. CYPRÉE. (B.)

**CORIS**, *bot.* **RIAN**, *V. CORIS*, *ru*

**\* CORISANTHÉRIE**, *Corisanthéria*, *bot.* **RIAN**. Les auteurs appellent ainsi la onzième classe de sa méthode, qui renferme les Viscéaux dicotylédons à corolle monopétale épigyne, dont les anthères sont distinctes et non soudées. Telles sont les Dipsacées; les Valérianées; les Rubiacées, les Caprifoliacées et les Loranthées. (A. R.)

**CORISE**, *Corixa*, *ins.* Genre de l'ordre des Hémiptères, section des Hétéroptères, établi par Geoffroy (Hist. des Ins. T. 1, p. 477), et rangé par Latreille (Rég. Anim. de Cuv.) dans la famille des Hydrocorises avec ces caractères : antennes insérées et cachées sous les yeux, très-courtes, en forme de cône allongé, de quatre articles dont le dernier plus grêle et pointu; bec fort court et triangulaire, strié transversalement, percé d'un trou à son extrémité; pieds antérieurs beaucoup plus courts que les autres, courbes, terminés par un tarse d'un seul article, comprimé, cilié et sans crochets; les autres pattes allongées avec les tarses de deux articles; deux longs crochets à l'extrémité des tarses de la seconde paire; point d'écusson; élytres couchées horizontalement. Si on ajoute à ces caractères que les Corises ont une forme allongée, le corps aplati avec la tête large et verticale, les yeux triangulaires, le prothorax plus développé transversalement que d'avant en arrière, et prolongé en une pointe dans ce dernier sens, on pourra distinguer facilement ce genre de celui des Naucorés, et principalement de celui des Notonectes qui l'avoi sine d'avantage.

Ces Insectes sont aquatiques, ils nagent avec facilité à l'aide de leurs tarses postérieurs qui sont élargis, allongés et munis de poils roides, mais ils ne se tiennent sur le dos, mais constamment sur le ventre. Cette partie de leur corps présente inférieurement les deux rangs de stigmates, et ils viennent souvent à la surface de l'eau pour faire ces ouvertures en contact avec l'air. Les Corises sont

communières elles se nourrissent d'Insectes aquatiques qu'elles sucent à l'aide de leur bec. Ce bec est très-aigu, et lorsqu'on les saisit, elles cherchent à l'insinuer dans la peau : la douleur qui suit cette piqure est très-sensible, et il en résulte quelquefois un gonflement assez considérable. Ce genre est peu nombreux en espèces.

La **CORIS** **ATAÏE**, *Cor. ataiæ*, *Fabr.*, peut être considérée comme type du genre. Geoffroy n'en connaissait pas d'autre; il l'a décrite avec soin, et en a donné une figure assez médiocre (pl. 2, fig. 2). On la trouve abondamment en Europe, dans les étangs et les mares. (AUD.)

**CORISIES**, *Corisia*, *ins.* Famille de l'ordre des Hémiptères, section des Hétéroptères, établie par Latreille qui lui assignait pour caractères : gaine du suçoir formée de quatre articles distincts et découverts; labre très-prolongé au-delà de la tête, en forme d'âlène et strié en dessus; tarses ayant toujours trois articles distincts, dont le premier presque égal au second ou plus long que lui. Les Corisies sont rangées (Rég. Anim. de Cuv.) dans la famille des Géocoris. V. ce mot. (AUD.)

**CORISPERME**, *Corispermum*, *bot.* **RIAN**. Genre de la famille des Chenopodées, établi par Linné, et ainsi caractérisé : périsperme divisé en deux parties, supportant une, deux, trois, quatre ou cinq étamines; deux styles; cariopse ovale comprimée, plane d'un côté, bossue de l'autre, entourée d'un rebord membraneux, et non recouverte par le périsperme. Quoiqu'on place communément ce genre dans la Monandrie Digynie, L., peut-être serait-il plus convenable de le rapporter dans la Pentandrie, comme Kitahel l'a proposé. Il ne serait pas alors éloigné des *Salsola* et des *Sarcocolla*, avec lesquelles il a beaucoup d'affinité de port et de structure. Les Corispermes sont des Plantes herbacées, à racines filées et garnies de feuilles opposées, ment striées, à fleurs sillonnées, et

ines, etc. On en connaît  
un douzaine d'espèces qui croissent  
sur les bords salins de l'an-  
n équiment et principalement vers  
littoral des mers Méditerranée,  
aspénne, et du lac Baïkal en Sibirie.  
est probable qu'on en trouve d'autre  
dans les mêmes pays de l'ori-  
ent. *hyssopifolius* parmi les  
général de la Flore Française, et  
on l'a trouvé aussi dans les environs  
de Montpellier une espèce identique  
à la *Scaloparia pilidum* de Ki-  
bel; du moins c'est ce qu'autorise  
présumer, la diversité de l'aspect de  
la plante. (G.N.)

\*CORITHAIX. ois. Illiger a donné  
nom au genre Touraço. (M. Z.)

\*CORIUM. BOT. GRÆC. (*Chamae-  
pitys*.) Nom donné par Vibol aux  
silets du sous-genre que Persoon a  
nommé *Poria*. Ces espèces ont quel-  
fois l'aspect du cuir, et sont étar-  
tes sur les morceaux de bois presque  
sans chapeau distinct; elles font par-  
tie du genre Polypore de Bries. (A. B.)

\*CORIVE. BOT. PHAN. (De Can-  
tolle.) Petite variété de Châtaigne. (N.)

CORIXA. INSECT. CORISE.

CORIZÈME. BOT. PHAN. Pour  
horizème. (E.)

\*CORIZIOLA. BOT. PHAN. (Rau-  
olf.) Syn. de Scamponée dans la  
avant. (B.)

\*CORKBOON. BOT. PHAN. (Mont-  
l.) Syn. de Liège en Belgique. Les  
anglais disent Cork-tree. (A.)

CORRIE. BOT. PHAN. (MONT-  
L.)

CORK-TREE. BOT. PHAN. (MONT-  
L.)

CORLI, CORLIS, CORLU, COUR-  
FU ET COURLUI, ois. Syn. vul-  
gaires de Courlis. *Scalopax arcuata*,  
P. COURLIS. (D. Z.)

CORLIEU. ois. Espèce du genre  
Courlis. *Scalopax Phalaropus*, L., Buff.;  
enl. 840. K. *Corax*. Comme on  
sait que le genre *Corax* est

son genre Courlis. On a encore ap-  
pelé.

CORLIU BLANC (Catesby), l'oiseau  
blanc d'Amérique.

CORLIU BLANC, l'oiseau blanc.

CORLIU ROUGE, l'oiseau rouge.

CORMARAN ou CORMORAN. ois.

Syn. vulgaire de grand Cormoran;  
*Pelecypus Carbo*, L. N. Cormoran.

CORMIER. BOT. PHAN. Nom vul-  
gaire du Sorbier domestique dans le  
midi de la France où l'on appelle  
comme le fruit de cet arbre. (A.)

CORMORAN. ENSE. ois. *Hy-  
drocorax*, Vieill. Genre de l'ordre  
des Palmipèdes. Caractères: bec as-  
sez long, droit, comprimé, arrondi  
en dessus; mandibule supérieure  
sillonée, très-courbée à la pointe;  
l'inférieure comprimée, plus courte,  
obtus et peu courbée; narines bi-  
néaires, placées à la base du bec  
qui est engagé dans une petite mem-  
brane qui s'étend sur la gorge qui est  
une ainsi que la face; pieds courts,  
robustes, retirés dans l'abdomen;  
quatre doigts réunis par une seule  
membrane, l'extérieur le plus long,  
celui de derrière articulant intérieu-  
rement; l'ongle du doigt intermédiaire  
dentelé en scie; ailes rudimentaires; la  
première rectrice plus longue que la  
deuxième qui est la plus longue.

Les Cormorans appartiennent à  
cette petite division que Cuvier a qua-  
lifiée de Totipalmes, et qui, peu nom-  
breuse en espèces comme en genres,  
ne comprend que les Oiseaux dont la  
conformation du pied offre la plus  
grande ressemblance avec la main  
antique. Grands consommateurs de  
Poissons, de ceux de rivière surtout,  
ils les poursuivent avec une rapidité  
extraordinaire. Dès que le Cormoran  
a aperçu la proie qui nage paisible-  
ment au sein du fleuve, en un clin-  
d'œil il plonge, saisit d'une de ses  
rues la victime qui cherchait à  
vain à se dégager de la fatale mait-  
tance, et la ramène, en s'aidant de  
l'autre pied, à la surface de l'eau.

la, par une manœuvre agile, de Poisson lancé en l'air, retombant immédiatement la tête la première, et trébuchant sans résistance de la part des nageurs dont les rayons sont alors naturellement couchés en arrière, dans le gosier très dilatable de l'Oiseau. Si ce dernier manque d'adresse; ce qui arrive rarement, le Poisson n'a point pour cela échappé à la voracité de son terrible adversaire; il est de nouveau saisi, et lancé jusqu'à ce que sa chute se soit faite d'une manière convenable. Dans plusieurs pays on a réussi à utiliser l'habileté des Cormorans à la pêche, et on les a amenés à rendre au pêcheur les mêmes services que le chasseur obtient du Faucon qu'il a dressé. Cette pêche, autrefois très-usitée en Angleterre, l'est encore; à ce que l'on assure, dans toute la partie orientale de l'Asie: le Cormoran domestique, portant au cou un anneau assez juste, debout sur l'extrémité de la nasse que dirige son maître, plonge, s'élance sur le Poisson qu'il a aperçu; et le rapporte au bord avec une fidélité dont sans doute le plus sûr garant est l'anneau qui interdit l'entrée du Poisson dans l'estomac du Cormoran. La plupart de ces Oiseaux, aussi bons voliers que grands nageurs, recherchent la société de leurs congénères; hors la saison des amours; pendant laquelle ils sont constamment appariés; on les voit presque toujours par petites troupes. Leur grande consommation de nourriture en fait le fléau des étangs, et les empêche de rester long-temps sédentaires dans le même canton. Le Poisson dont ils paraissent le plus friands est l'Anguille; du moins c'est celui que l'on a trouvé plus souvent dans l'estomac des Cormorans qui ont été examinés. Leur chair fétide et noire est un aliment qui répugne; aussi n'en fait-on usage que par nécessité. Le Cormoran est du petit nombre des Palmipèdes doués de la faculté de voler, et c'est ainsi que, sur les plages désertes, ils se tiennent au sommeil. C'est aussi sur des Arbres plus souvent que dans des emplacements

de rochers, qu'ils étendent leurs ailes composées d'herbes fines, placées au milieu d'un tissu grossier de joncs. Le pont ordinaire est de trois ou quatre coussinets parfaitement ovales.

Les Cormorans avaient été confondus par Linné avec les Fous, les Frégates et les Pélicans, sous cette dernière dénomination.

**CORMORAN AFRICAIN**; *Pelecanus africanus*; Gmel. **CORMORAN NOIR**, jeune âge.

**CORMORAN D'AUSTRALIE**; *Pelecanus cirrhatus*; Gmel. Parties supérieures noires avec une tache blanche sur les tectrices alaires; nuque ornée d'un faisceau de plumes longues et droites, dont l'extrémité s'incline sur le front; un espace nu entourant l'œil; quatorze rectrices; parties inférieures blanches; bec et pieds d'un brun jaunâtre. Taille, trente pouces. De l'Australasie.

**CORMORAN CAUCASIEN**; *Pelecanus paracuratus*; Lath. Parties supérieures noires avec une bande blanche sur les tectrices alaires; côtés de la tête nus, rouges et couverts de carapaces membraneuses; bec gris, grêle; front blanc, avec une caroncule au-dessus de l'œil; parties inférieures blanches; bec moult; iris blanc; pieds rougeâtres. Taille, vingt-deux pouces. De l'Australasie.

**CORMORAN DE LA CHINE**; *Pelecanus sinensis*; Lath. Parties supérieures d'un brun noirâtre; les inférieures blanches; taches de brun sur la gorge blanche; douze rectrices; bec jaune; iris bleu; pieds noirs. Cette espèce est telle que les Chinois s'en servent à la pêche.

**CORMORAN D'INDOCHINE**; *Pelecanus nasutus*; Lath. Parties supérieures brunes; un bouquet de plumes noires sur la tête; et une autre plus petite sur la nuque; une longue bande blanche de chaque côté du cou; membrane aréolaire de l'œil saillante; tectrices alaires brunes avec une tache noire à l'extrémité de chacune d'elles; rectrices et rectrices noires; gorge et parties inférieures d'un brun noir; iris rouge.



tre; pieds jaunâtres. Les jeunes n'ont point de huppe, leur gorge est blanchâtre; ils ont aussi des traits de cette couleur sur le ventre. Taille, vingt-quatre pouces. Australasie.

GRAND CORMORAN, *Pelecanus Carbo*, L., Buff., pl. enl. 927. Parties supérieures d'un brun bronzé, avec le bord des plumes d'un noir verdâtre irisé; quatorze rectrices noires ainsi que les rémiges; parties inférieures d'un noir verdâtre; un large collier blanchâtre sous la gorge; membrane aréolaire de l'œil d'un jaune verdâtre, ainsi que la membrane ou poche gutturale; bec noirâtre; iris vert; pieds noirs. Taille, vingt-sept à vingt-neuf pouces. Plumage d'amour: une huppe de longues plumes irisées sur la nuque; des plumes effilées blanchâtres sur la tête, le cou et les cuisses; le collier parfaitement blanc. Les jeunes ont les plumes des parties supérieures cendrées, bordées de brun, les parties inférieures cendrées, variées de blanchâtre. La femelle diffère peu du mâle. Du nord des deux continents.

CORMORAN GRIS-BRUN, *Hydrocorax fuscescens*, Vieill. Parties supérieures brunes avec les plumes bordées de cendré, qui est aussi la couleur de la tête, du cou, des tectrices alaires et caudales; parties inférieures blanches; bec noirâtre; pieds bruns. Longueur, vingt-quatre pouces. De l'Australasie.

CORMORAN LARGUE, *Pelecanus cristatus*, Lath. Parties supérieures bronzées, avec le bord de chaque plume noir; rémiges et rectrices noires; le reste du plumage d'un vert foncé; douze rectrices courtes; bec effilé, brun, jaunâtre à sa base; iris vert; pieds noirs. Dans la saison des amours, une touffe de plumes larges et épaisses couronne le sommet de la tête, indépendamment de la huppe composée de plumes subulées, qui garnit l'occiput. Taille, vingt-six pouces. Des parties les plus septentrionales de l'Europe.

CORMORAN LIU-TZÉ. V. CORMORAN DE LA CHINE.

CORMORAN MAGELLANIQUE, *Pele-*

*cantus magellanicus*, Lath. Parties supérieures noires avec des reflets verdâtres sur la tête et le cou; membranes des joues et de la gorge rougeâtres; une tache blanche derrière l'œil; parties inférieures blanches; bec noir; pieds bruns. Taille, vingt-sept pouces. De la Terre-de-Feu.

CORMORAN NIGAUD, *Pelecanus Graculus*, Gmel. Plumage d'un noir verdâtre mat, avec les tectrices alaires cendrées, bordées de noir; membranes aréolaire de l'œil et gutturale d'un jaune rougeâtre; douze rectrices très-longues, très-étagées; bec noir en dessus, rougeâtre en dessous; iris brun; pieds noirs. Taille, vingt-quatre pouces. Plumage d'amour: une touffe de longues plumes vertes, irisées sur l'occiput; de petites plumes effilées; soyeuses, blanches sur la tête, le cou et les cuisses; parties supérieures d'un noir verdâtre, bronzé avec les plumes bordées de noir velouté. Les jeunes ont un peu de cendré sur la gorge; les parties supérieures sont cendrées, bordées de brun; les inférieures brunes, etc. C'est alors le petit Fau de Cayenne; Buff., pl. enl. 974. Des deux continents.

CORMORAN NOIR, *Hydrocorax niger*, Vieill. Entièrement noir; avec le bec rougeâtre. Taille, dix-huit pouces. Des Indes.

CORMORAN NOIR ET BRUN, *Hydrocorax melanoleucus*, Vieill. Parties supérieures noires; sous-voile; joues et parties inférieures blanches; bec et pieds noirâtres. Taille, vingt-pouces. D'Australasie.

CORMORAN OURIL, *Pelecanus Urile*, Lath. Parties supérieures d'un noir irisé; tête et cou d'un vert noirâtre; quelques plumes blanches éparses sur le cou; parties inférieures noires; membrane aréolaire rouge; bec d'un vert rougeâtre; pieds noirs. Longueur, vingt-quatre pouces. De la Sibérie.

PETIT CORMORAN. V. CORMORAN NIGAUD.

PETIT CORMORAN D'AFRIQUE. V. CORMORAN NIGAUD, jeune âge.

CORMORAN PYGMÉE, *Pelecanus Pygmaeus*, Lath. Parties supérieures cen-

de couleur chaque plume bordée de noir brillant; bec cou et parties inférieures d'un noir verdâtre; des petits points blancs au-dessus des yeux; membranes aréolaires et gutturales noires; doigts échagés; langues et trachées; bec et pieds cendrés. Longueur, vingt-un pouces. Les jeunes ont la tête d'un brun noirâtre, la gorge blanche; les parties inférieures d'un cendré blanchâtre, etc. Le plumage d'adulte est plus brillant, les plumes du cou et des ailes ont la lige blanche. Du nord de l'Europe où il est répandu.

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

**CORMORAN TACHÉ.** *F. Cormoran taché.*

puissent se rapporter. En effet, Coquilles qui aignent trois dents médiales et six dents latérales sont pour nous tout-à-fait nouvelles, nous n'avons, été conduits par l'attention, d'après les espèces indiennes qui appartiennent toutes au Cycloclade, nous aurions eu peine à connaître l'erreur. *V. CYCLOCLADE.* (D. H.)

**CORNE D'ABONDANCE.** MOLL. est le nom que l'on donne vulgairement à l'Huître plissée. *V. HUÎTRE.* (D. H.)

**CORNE D'ABONDANCE.** BOT. *Fr.* (Champignons.) Nom vulgaire *Merulius cornucopioides* de Pers. (*Peziza cornucopioides*, Bull. t. 1. p.). — Paulet a donné ce même nom à une espèce d'Agaric qu'il a figurée p. 28, fig. 1-3, de son Traité des champignons. (AD. B.)

**CORNE D'AMMON.** MOLL. russ. Tout le monde sait que l'on représente Jupiter Ammon la tête armée de deux cornes de Bélier enroulées sur les mêmes et presque dans le même plan, observant une forme analogue à celles des Coquilles pétrifiées appelées Ammonites. On leur a conservé long-temps le même nom qui a été remplacé dans les ouvrages de conchylogie, par celui d'Ammonite. *V. AMMONITE.* (D. H.)

**CORNE DE CERF.** BOT. Ce nom a été donné à diverses Plantes très-différentes, telles qu'au *Plantago coronopus*, à une espèce de *Sysymbrium*, à une Sauge, à un *Hypoxylon*, etc. (B.)

**CORNE DE CERF; CORNE DE DAIM.** BOT. ORYCT. Ce nom est donné à quelques espèces d'*Hymenium* du sous-genre des *Heritium*, à quelques Clavaires et aux espèces de *Sphaeria* à tiges rameuses, telles que le *Sphaeria Hypoxylon* (*Clavaria Hypoxylon*, L.) et le *Sphaeria digitata* (*Clavaria digitata*, Bull. tab. 220), auxquelles on trouve quelque ressemblance avec les bois de Cerfs. (AD. B.)

**CORNE DE DAIM.** POLYX. Des Millepores grands et rameux portent

ce nom dans quelques auteurs européens et chez les marchands d'objets d'histoire naturelle. On l'a appliqué, mais rarement, aux Millepores de Linné. (LAM. K.)

**CORNÉE.** ZOOL. Première membrane de l'œil. *V. ce mot.* (B.)

**CORNÉENNE.** MIN. Ce nom a été donné par les auteurs à des Minéraux bien différens. Brongniart l'adopte pour désigner un Minéral caractérisé par Dolomieu, et qui a pour type la pâte brune tirant sur le violet des Variolites de Drac (*Mandelstein*). Les caractères qu'il lui assigne sont: d'être généralement compacte et solide, d'avoir la cassure raboteuse ou irrégulière, l'aspect terne; et de répandre par l'insufflation une odeur argileuse très-sensible. Ce Minéral est difficile à casser, fait rebondir le marteau et offre une sorte de ténacité qui l'éloigne du Wake en le rapprochant du Basalte; il a souvent assez de dureté pour ne point se laisser rayer par le Cuivre qui y imprime sa trace. Le Fer même à quelquefois de la peine à l'entamer.

La Cornéenne se présente rarement seule et en masse; elle est presque toujours la base de diverses roches mélangées. C'est une pâte qui les réduit, et dans laquelle on ne peut voir à l'œil nu et même à l'aide de la loupe aucune aggrégation distincte de Minéraux différens. Brongniart ne doute cependant pas que la Cornéenne ne soit réellement le résultat de l'aggrégation de plusieurs espèces minérales qui, réduites en particules d'une grande ténuité, échappent à nos sens: le résultat de leur mélange est regardé par lui comme homogène. Cette homogénéité étant admise, on peut considérer cette pâte comme espèce réelle et rigoureuse; car elle ne peut être regardée avec certitude comme de l'Amphibule compacte et terne, ni comme du Pyroxène: elle ne se rapporte à aucune des variétés du Quartz qui portent les noms de Silex cornéens de Jaspe schistoïde (*Kieselschiefer*); ce n'est ni une Argile, ni un Basalte, ni un Schiste ou Wake; c'est donc une

espèces minérales qui doit être désignée et caractérisée séparément des roches mélangées dont elle fait la base.

Toutes les variétés de Cornéenne appartiennent presque toujours sur l'acier à la même dureté, elles se fondent assez facilement en un émail noir et brillant. Ce dernier caractère les distingue du Schiste, lorsqu'elles en ont la texture, et du Jaspe schisteux, quand leur dureté les en rapproche. On a analysé plusieurs variétés de Cornéennes, et l'on a vu dans leurs principes constitutifs une permanence et une constance de proportion fort remarquables. En prenant le terme moyen de toutes ces analyses, on voit qu'en général ce Minéral est composé d'environ cinquante parties de Silice, quinze d'Alumine, six de Chaux, une de Magnésie, dix-huit de Fer, et six de Soude et de Potasse.

Les Cornéennes ont été regardées par beaucoup de minéralogistes, comme un mélange intime et invisible d'Amphibole et d'Argile; mais aucune observation directe ne le prouve. Le nom de Cornéenne a été admis par presque tous les minéralogistes qui lui ont donné des acceptions très-variées. Nous allons chercher à en éclaircir la synonymie. Les Cornéennes compactes et les Cornéennes Trapp de Brongniart, présentent entre elles si peu de différences, que ces deux variétés ont été désignées indistinctement par le nom de Cornéenne ou celui de Trapp. Cronstedt et Wallerius ont employé ce dernier nom pour désigner des Roches de Norwège et de Suède, qui appartiennent non-seulement aux Cornéennes Trapp, mais à la pâte des Roches composées, que Brongniart nomme Variolite, et dont la Variolite de Drac est le type. Faussa a employé le nom de Trapp dans ce sens, et, par conséquent, les Roches homogènes, qu'il nomme ainsi, appartiennent toutes à la vraie Cornéenne. Ce minéralogiste paraît le seul qui ait circonscrit l'espèce dans les limites que Brongniart, en lui appliquant le nom de Trapp, Haüy a donné à celui de Roche Cornéenne.

La Variolite de Drac, dont la pâte ou base appartient à la vraie Cornéenne, mais il a réuni sous ce nom trois autres Roches dont la pâte paraît différente: depuis, il a changé le nom de Cornéenne en celui d'*Aphanite*. Le genre *Corneus* de Wallerius, qu'il divise en *Corneus Trapezius* et *Corneus fissilis, durior et mollior*, est la deuxième et peut-être la troisième variété du professeur Brongniart. Les Pierres vulgairement nommées Pierre de Corne et Roche de Corne ou *Hornstein* des Allemands, sont, tantôt des Silex, tantôt des Pétrosilex: ce sont le plus souvent, selon De Saussure, des Diabases à petits grains, des Eurites schistoïdes noirâtres, etc. Laméthrie comprend sous le nom de Cornéenne une seule des variétés de la Cornéenne de Brongniart; enfin Cordier a appliqué ce nom à des Schistes argileux tendres, etc., et a donné pour caractère, à ce genre, de ne renfermer aucune concrétion en forme d'amande. Ce caractère, tout-à-fait opposé à celui de la Variolite de Drac dont la pâte est le type du genre Cornéenne tel que nous l'adoptons, fait croire qu'il a en vue des Minéraux très-différents de ceux que nous allons décrire.

Brongniart a établi trois variétés de Cornéenne.

La CORNÉENNE COMPACTE est solide, compacte, difficile à casser, la cassure est raboteuse, passant à la cassure conchoïde. Nous donnerons comme exemples de cette variété, la pâte brune de la Variolite de Drac que Dolomieu, avons-nous dit, considère comme une Cornéenne bien caractérisée; la pâte noirâtre des Variolites du Derbyshire, appelées *Trapsone*, etc.;

La CORNÉENNE TRAPP est dure; elle use le Fer, mais n'est point scintillante; son grain est fin, terreux, absolument mat, et surtout homogène, même au microscope. Le Trapp se distingue du Basalte, parce que ce dernier offre toujours dans sa cassure un grain un peu cristallin, et dans la poussière des grains de quartz à la texture. La couleur du Trapp est ordi-

ement, noire ; mais il y en a de grise, de bleuâtre et de verdâtre : brisée en morceaux parallépipédiques, et a quelquefois la cassure choïde. Le mot Trapp signifie essier, et l'on donne ce nom à cette idité, parce que, en raison de sa dureté, les montagnes qui en sont composées, présentent, dans leurs fentes escarpées des espèces de grates. Faujas fit ressortir, des petits staux de Felspath, de Trapps dont la surface a été polie en les frottant pendant quelques jours dans l'Acide sulfurique étendu d'eau.

Trapp est très-commun dans diverses parties de la Suède ; il est rare dans les autres parties de l'Europe.

Le sommet de la colline nommée le Mont-Donnon de Minguette, près de Thionville dans les Vosges, en est formé.

La CORNÉENNE LYDIENNE est dure, terne, compacte : elle est plus dure que le Trapp et n'a pas sa texture parallépipédique. La Lydienne se laisse rayer par le Fer et par le cuivre, lorsqu'on agit avec l'angle qu'on pointe d'un morceau de ce dernier métal ; mais si c'est avec sa partie plane ou arrondie, elle en reçoit la trace.

Cette propriété de recevoir la trace du cuivre, distingue cette Cornéenne du chiste, qui est toujours rayé par ce métal et n'en reçoit jamais la trace. C'est sur cette propriété qu'est fondé l'usage que l'on fait de cette Pierre pour juger par aperçu du titre de l'Or ; elle porte vulgairement le nom de Pierre-de-Touche. Les anciens la connaissaient sous celui de Lydienne ; mais il n'en vient plus de Lydie. Celles dont on fait usage actuellement, viennent de Saxe, de Bohême et de Silésie. On ne peut cependant assurer que les Pierres-de-Touche de ces pays se rapportent toutes à la Cornéenne dont nous nous occupons ; il est même probable que plusieurs sont des Basaltes.

Lodovici (Dict. du commerce, Leipsick, 1768) dit que les Pierres-de-Touche se trouvent près de Hildesheim et de Goslar. Il paraît qu'on se sert aussi pour le même usage du Basalte de Stolpen en Misnie.

La Pierre-de-Touche des orfèvres de Paris, est la véritable Cornéenne Lydienne ; on dit qu'on la trouve dans le Rhône près de Lyon. Outre l'emploi qu'en font les orfèvres, on s'en sert pour polir le Sable de Calcaire marneux dur de Landon, qui est employé à la destruction des grands monuments.

Les Cornéennes appartiennent aux terrains primordiaux, anciens et récents. Elles se présentent en masses dans lesquelles la stratiification n'est pas sensible, tantôt elles sont composées de couches épaisses, tantôt de couches minces. Voyez le gissement, les articles V. et TRAPPITE.

\* CORNEILLAR. BOT. CORN. LON. ois. Nom vulgaire de Corbeaux.

CORNEILLE, ois. V. C. On a appelé CORNEILLE le *Corvus Eremia*, et CORNI-CORNQUAILLES, le *Corvus L. P. PYRROCORAX*.

CORNEILLE. BOT. PH. des noms vulgaires de la L. commune.

\* CORNEJA, ois. Syn. de la Corbine, *Corvus Cor. CORBEAU*.

CORNELIA. BOT. PH. duin.) Syn. d'*Ammanla* l. Plante originaire de la Ch. s'est, dit-on, naturalisée.

CORNEROTTE. ois. Syn. du moyen Duc, *Strix Ot. CHOUETTE-HIBOU*.

CORNES. ZOOL. Faisces ou tubuleux formés d'une reticulaire de fibres épidermiques à la composition chimique, et logues aux poils.

La meilleure manière de tracer cette analogie, c'est de tracer la Corne du Rhinocéros la base de celles des vie et surtout du Buffle du C. Bosus masqué, au poil du polame. En séparant des

La Corne d'un Rhinocéros se trouve une grande ressemblance avec le bouquet de filamens rugueux et grossiers, qui termine chaque poil de la moustache ou de la queue de l'Hippopotame. Le corps même de ce poil, au-delà du bouquet, est absolument semblable à la corne des Bœufs ou des Moutons, à la dureté près. Mais la cohésion des fibres n'est guère inférieure à celle de la Corne des Rhinocéros. La structure juteuse des Cornes sera donc évidemment démontrée pour qui aura pu examiner les poils de l'Hippopotame.

En définissant le mot Cornes, nous en avons déjà distingué deux espèces : les faîceaux tubuleux ou Cornes creuses ont des chevilles osseuses qui sont des prolongemens de l'os frontal ; les faîceaux pleins ou Cornes solides reposent par une base plane ou peu concave sur les os du nez par l'intermédiaire du derme qui, à cet endroit, prend plus de cohésion. Il est une troisième espèce de Cornes qui, sous le rapport anatomique et physiologique, tient le milieu entre les Cornes creuses et le bois des Cerfs. Ce sont les Cornes de la Girafe.

Voici, d'après Cuvier (Anat. comp. T. II, leç. 14), le mécanisme de la formation des Cornes creuses qui sont un des caractères des genres Bœuf, Antilope, Chèvre et Mouton.

1°. Au troisième mois de la conception, dans le genre Boeuf, l'os frontal du fœtus, encore cartilagineux, ne diffère en rien d'un frontal ordinaire. Mais au septième mois, en partie ossifié, chaque frontal développe un petit tubercule par le soulèvement de quelques lames osseuses. Bientôt ces tubercules procèdent et soulèvent la peau qui devient même calleuse en cet endroit : après la naissance, le prolongement osseux entraîne devant lui la callosité qui se durcit et devient Corne en s'allongeant. La gaine du prolongement osseux est donc à l'origine le derme même ; mais la texture du derme change par son adossement à l'os : c'est ainsi que la peau

que nous avons vu, s'applique aussi au  
derme. On a vu, en effet, que le derme  
est formé d'une partie malaisée à péné-  
trer, la partie épaisse, le derme profond ou  
de compression, dans lequel se trouvent  
que la partie superficielle du derme  
de peau entraînée par le prolonge-  
ment osseux, continue la structure  
de la fibre cornée. L'allongement  
de la gaine se fait par la production con-  
tinuëlle des fibres de la base, im-  
médiatement sessiles sur la peau qui, en  
cet endroit, offre une structure par-  
ticulière: *V. PEAU*.

2°. Dans la Girafe, les chevilles osseuses sont cylindriques, ne prennent qu'un accroissement en hauteur et en diamètre vers le bas; elles se terminent par une face plane; le fourreau de peau qui s'élève par la cheville, ne change pas de nature; il continue de produire des poils semblables à ceux du reste du corps; seulement la surface terminale est calleuse, et les poils y sont usés par les frottemens que l'animal fait subir à cette partie: le quart inférieur de cette cheville osseuse est dilaté par d'énormes cellules coniques à celles du frontal. Cette cheville n'est pas, comme dans les Cerfs, les Boeufs, les Antilopes, etc., une continuation de l'os frontal. Sur la jeune Girafe rapportée par Delalande, la base de chaque Corne, déjà longue d'environ trois poices (la moitié de sa longueur totale), est séparée du frontal et du pariétal, par un espace membraneux; c'est comme un os vorinien, dont les rayons osseux ne se sont pas encore rencontrés avec le bord externe des os voisins.

5°. Les Cornes des Rhinocéros, simples ou doubles, suivent les espèces, reposent sur l'intermédiaire du derme sur les os du nez soudés ensemble et fort épais. Quand on scie cette Corne en travers, dit Cuvier, on peut distinguer à la loupe une infinité de pores, indices des intervalles qui séparent les poils agglutinés : si la section est faite sur la longueur, on s'assure, nombreuse, longitudinaux et parallèles, démontrent

ore cette structure. Nous avons vu mêmes dispositions à l'œil nu sur le os du poit de l'Hippopotame, tant plus aisément que les fibres nées sont agglutinées d'une manière moins serrée, et que, se séparant en bouquet dès le second quart de leur longueur, on peut suivre plus facilement leur continuité. On peut avec vérité que chaque poil de l'hippopotame est une petite Corne. Dans le Rhinocéros unicolore, ce os et le derme sous la base de la Corne, il y a une sorte de matière tacée interposée, qui se solidifie à la mort par l'évaporation. Il en est probablement une semblable dans les autres espèces.

Les organes les plus analogues aux cornes dans les Manuifères, sont les ergots tubuleux des pieds de derme dans les mâles de l'Echidné et de l'Ornithorinque : c'est une véritable Corne creuse canaliculée sur son axe comme les crochets venimeux de la Vipère pour l'écoulement du liquide probablement vénéreux. Mais il n'y a aucune cheville osseuse, ainsi que nous nous en sommes directement assurés avec notre ami Laland, conservateur du Muséum d'Anatomie comparée.

Chez les Oiseaux, les tarses des alliées, parmi les Echassiers, ceux du Kamichi et autres Macroptyles; les doigts de l'aile dans le même Kamichi et autres Echassiers, dans l'Oie de Gambie chez les Palmipèdes, et enfin dans les oiseaux, sont aussi armés de productions très-analogues aux Cornes; néanmoins, leur cohésion les rend peut-être encore plus comparables aux ongles. Enfin chez les Oiseaux, les protubérances osseuses de la tête, dans les Calaos, la Pintade, le Casoar, sont revêtues d'une gaine ou calotte de matière réellement cornée, quoiqu'on n'y voie pas de disposition fibreuse. Ces protubérances osseuses sont creusées d'innombrables cellules dans le Casoar et les Calaos; mais dans le Crax Pauri et dans une espèce dont on ne connaît que le crâne mutilé, et

qui sans doute sera le type d'un genre nouveau, cette protubérance est d'une dureté pierreuse.

Nous parlerons, au mot DENT, de la Corne qui revêt les mâchoires des Oiseaux et de quelques Reptiles; au mot ONGLE, de la Corne des pieds des Ruminants et des Solipèdes. Dans ces articles et celui de chacun des genres cités ici.

\* CORNES. MOLL. On a appliqué improprement ce nom aux tentacules des Limaçons.

\* CORNES. RIS. Ordinairement les Antennes. V. ce mot.

CORNET ET CORNETE. MOLL. Autrefois (et c'est D'Argenville qui l'avait pour ainsi dire consacré), on donnait ce nom à toutes les Coquilles du genre Cône; on l'appliquait même quelquefois à des Olives. Il n'est pas besoin de dire que ce nom avait été donné pour la ressemblance que l'on trouvait entre un Cornet de papier et la forme de ces Coquilles. Les habitants des bords de la Manche nomment aussi Cornets les Calmars. V. ce mot.

CORNET. BOT. PHAN. On appelle ainsi les appendices variés creux et évasés, que l'on observe dans certaines fleurs irrégulières. Ainsi, dans la fleur des Asclépiades, on trouve cinq Cornets. Les pétales de l'Ascololie des Hellebores, ont souvent été décrits sous le nom de Cornets.

\* CORNET A BOUQUIN. MOLL. V. ARGONAUTE.

\* CORNET DE MILLE POINTS. MOLL. Syn. de Cône Tigre. V. Cône.

CORNET DE POSTILLON, CORNET DE SAINT-HUBERT ET CORNET CHAMBRE. MOLL. Noms vulgaires employés pour désigner la Spirule. V. ce mot.

CORNICABRA. BOT. PHAN. Nom vulgaire en Espagne du Térébenthin.

\* CORNICHE. MOLL. V. CARRASSON.

CORNICHON. BOT. PHAN. Variété du Concombre étiuvé, qui se confit

1. **OBJETIVO.** El presente documento tiene como objetivo describir el proceso de desarrollo de un sistema de gestión de recursos humanos (SGRH) para una empresa ficticia denominada "Empresa XYZ".

2. **ALCANCE.** El alcance del proyecto se limita al desarrollo e implementación de un SGRH que permita gestionar el ciclo de vida de los empleados, desde la contratación hasta la jubilación, incluyendo la gestión de nóminas y la formación.

3. **JUSTIFICACIÓN.** La implementación de un SGRH eficiente es fundamental para la empresa XYZ, ya que permitirá optimizar los recursos humanos, reducir costos operativos y mejorar la productividad de los empleados.

4. **ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS.** Se realizaron entrevistas con los departamentos de Recursos Humanos, Finanzas y Operaciones para identificar las necesidades y requisitos del sistema. Los requisitos principales son:

- 4.1. Gestión de la nómina y pagos.
- 4.2. Control de asistencia y horarios.
- 4.3. Gestión de vacaciones y bajas.
- 4.4. Evaluación de desempeño.
- 4.5. Formación y desarrollo de personal.

5. **DISEÑO DEL SISTEMA.** El diseño del sistema se basó en los requisitos identificados y se estructuró en tres niveles:

- 5.1. **Diseño de Alto Nivel:** Se definió la arquitectura general del sistema, incluyendo la base de datos y los módulos principales.
- 5.2. **Diseño de Nivel Intermedio:** Se detalló la estructura de los datos y los flujos de información entre los módulos.
- 5.3. **Diseño de Nivel Bajo:** Se especificó la implementación técnica de cada módulo, incluyendo el código fuente y los procedimientos de instalación.

6. **IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS.** La implementación del sistema se realizó en etapas, comenzando con la instalación de la base de datos y los módulos de gestión de nómina y asistencia. Se realizaron pruebas exhaustivas para verificar el correcto funcionamiento del sistema y la satisfacción de los usuarios.

7. **CONCLUSIONES.** El desarrollo e implementación del SGRH para la Empresa XYZ se completó exitosamente, cumpliendo con todos los requisitos identificados. El sistema permitirá a la empresa gestionar sus recursos humanos de manera más eficiente y efectiva.

8. **RECOMENDACIONES.** Se recomienda a la Empresa XYZ que continúe monitoreando el uso del sistema y realice ajustes necesarios para optimizar su rendimiento y satisfacer las necesidades cambiantes de la organización.

9. **ANEXOS.** Se adjuntan los siguientes documentos como anexos:

- 9.1. Documento de Requisitos.
- 9.2. Diagrama de Flujo de Datos.
- 9.3. Código Fuente del Sistema.
- 9.4. Manuales de Usuario.

10. **FECHA DE ELABORACIÓN.** El presente documento fue elaborado el día 15 de mayo de 2024.

11. **SIGNATURAS.**

12. **OTROS DATOS.**

13. **OTROS DATOS.**

14. **OTROS DATOS.**

15. **OTROS DATOS.**

16. **OTROS DATOS.**

17. **OTROS DATOS.**

18. **OTROS DATOS.**

19. **OTROS DATOS.**

20. **OTROS DATOS.**

21. **OTROS DATOS.**

22. **OTROS DATOS.**

23. **OTROS DATOS.**

24. **OTROS DATOS.**

25. **OTROS DATOS.**

26. **OTROS DATOS.**

27. **OTROS DATOS.**

28. **OTROS DATOS.**

29. **OTROS DATOS.**

30. **OTROS DATOS.**

31. **OTROS DATOS.**

32. **OTROS DATOS.**

33. **OTROS DATOS.**

34. **OTROS DATOS.**

35. **OTROS DATOS.**

36. **OTROS DATOS.**

37. **OTROS DATOS.**

38. **OTROS DATOS.**

39. **OTROS DATOS.**

40. **OTROS DATOS.**

41. **OTROS DATOS.**

42. **OTROS DATOS.**

43. **OTROS DATOS.**

44. **OTROS DATOS.**

45. **OTROS DATOS.**

46. **OTROS DATOS.**

47. **OTROS DATOS.**

48. **OTROS DATOS.**

49. **OTROS DATOS.**

50. **OTROS DATOS.**

51. **OTROS DATOS.**

52. **OTROS DATOS.**

53. **OTROS DATOS.**

54. **OTROS DATOS.**

55. **OTROS DATOS.**

56. **OTROS DATOS.**

57. **OTROS DATOS.**

58. **OTROS DATOS.**

59. **OTROS DATOS.**

60. **OTROS DATOS.**

61. **OTROS DATOS.**

62. **OTROS DATOS.**

63. **OTROS DATOS.**

64. **OTROS DATOS.**

65. **OTROS DATOS.**

66. **OTROS DATOS.**

67. **OTROS DATOS.**

68. **OTROS DATOS.**

69. **OTROS DATOS.**

70. **OTROS DATOS.**

71. **OTROS DATOS.**

72. **OTROS DATOS.**

73. **OTROS DATOS.**

74. **OTROS DATOS.**

75. **OTROS DATOS.**

76. **OTROS DATOS.**

77. **OTROS DATOS.**

78. **OTROS DATOS.**

79. **OTROS DATOS.**

80. **OTROS DATOS.**

81. **OTROS DATOS.**

82. **OTROS DATOS.**

83. **OTROS DATOS.**

84. **OTROS DATOS.**

85. **OTROS DATOS.**

86. **OTROS DATOS.**

87. **OTROS DATOS.**

88. **OTROS DATOS.**

89. **OTROS DATOS.**

90. **OTROS DATOS.**

91. **OTROS DATOS.**

92. **OTROS DATOS.**

93. **OTROS DATOS.**

94. **OTROS DATOS.**

95. **OTROS DATOS.**

96. **OTROS DATOS.**

97. **OTROS DATOS.**

98. **OTROS DATOS.**

99. **OTROS DATOS.**

100. **OTROS DATOS.**

101. **OTROS DATOS.**

102. **OTROS DATOS.**

103. **OTROS DATOS.**

104. **OTROS DATOS.**

105. **OTROS DATOS.**

106. **OTROS DATOS.**

107. **OTROS DATOS.**

108. **OTROS DATOS.**

109. **OTROS DATOS.**

110. **OTROS DATOS.**

111. **OTROS DATOS.**

112. **OTROS DATOS.**

113. **OTROS DATOS.**

114. **OTROS DATOS.**

115. **OTROS DATOS.**

116. **OTROS DATOS.**

117. **OTROS DATOS.**

118. **OTROS DATOS.**

119. **OTROS DATOS.**

120. **OTROS DATOS.**

121. **OTROS DATOS.**

122. **OTROS DATOS.**

123. **OTROS DATOS.**

124. **OTROS DATOS.**

125. **OTROS DATOS.**

126. **OTROS DATOS.**

127. **OTROS DATOS.**

128. **OTROS DATOS.**

129. **OTROS DATOS.**

130. **OTROS DATOS.**

131. **OTROS DATOS.**

132. **OTROS DATOS.**

133. **OTROS DATOS.**

134. **OTROS DATOS.**

135. **OTROS DATOS.**

136. **OTROS DATOS.**

137. **OTROS DATOS.**

138. **OTROS DATOS.**

139. **OTROS DATOS.**

140. **OTROS DATOS.**

141. **OTROS DATOS.**

142. **OTROS DATOS.**

143. **OTROS DATOS.**

144. **OTROS DATOS.**

145. **OTROS DATOS.**

146. **OTROS DATOS.**

147. **OTROS DATOS.**

148. **OTROS DATOS.**

149. **OTROS DATOS.**

150. **OTROS**



*ejo, Corniola, Cornisa et Corni-*  
des Espagnols. Syn. italien de  
ouille. (B.)

ORNIX. ois. Nom scientifique  
de l'espèce du genre Corbeau. (V.  
BEAU. (DR..Z.)

CORNOUILLE. BOT. PHAN. Fruit  
Cornouiller, (B.)

CORNOUILLE. *Cornus*. BOT.  
N. Ce genre se compose d'une  
gaine d'espèces, dont les deux  
s environ sont originaires des dis-  
ses contrées de l'Amérique septen-  
nale. Ce sont toutes des Arbris-  
sux ou des Arbustes, portant des  
lles simples opposées, rarement  
ornées, dépourvues de stipules, et  
de petites fleurs généralement blanches  
ou de divers modes d'inflorescence ;  
mais plus généralement elles sont  
posées en cime, rarement en pa-  
nicle. Quelquefois elles sont accom-  
pagnées d'un involucre formé de plu-  
sieurs folioles. Dans toutes, l'ovaire est  
globuleux, adhérent, couronné par le  
bord du calice qui offre quatre dents,  
quelquefois très-petites, et par un  
style épigyné, concave à son centre  
pour l'insertion du style; celui-ci est  
simple, et se termine par un stigmate  
globuleux également simple. La co-  
rolle est formée de quatre pétales éta-  
lés, ordinairement sessiles; les éta-  
mines, en même nombre que les pé-  
tales, alternent avec eux. Les an-  
thères sont à deux loges, tournées  
vers le centre de la fleur. Ces étami-  
nes s'insèrent en dehors du bourrelet  
formé par le disque. Coupé en travers,  
l'ovaire présente deux loges; dans  
chacune desquelles existe un seul  
ovule attaché vers la partie supé-  
rieure. Le fruit est une drupe charnue,  
globuleuse, ombiliquée à son sommet,  
contenant un noyau osseux à deux  
lobes monospermes.

Ce genre a été placé dans la famille  
des Caprifoliacées de Jussieu. Mais sa  
corolle vraiment polypétale, ses éta-  
mines immédiatement épigynes, for-  
ment des caractères assez saillants,  
pour que nous ayons cru devoir con-  
sidérer ce genre, ainsi que le Lierre

qui offre les mêmes particularités,  
comme le type d'un nouvel ordre na-  
turel, formant le passage entre les  
Caprifoliacées et les Araliacées; c'est-  
à-dire entre les Monopétales et les  
Polypétales épigynes, et auquel nous  
avons donné le nom d'Hédéracées.  
(V. Botanique médicale, 2<sup>e</sup> part. Pa-  
ris, 1823).

Nous citerons parmi les espèces de  
ce genre, les suivantes :

Le CORNOUILLE MALE, *Cornus  
mascula*, L., est un Arbre de moyenne  
grandeur qui abonde dans nos bois.  
Son tronc est inégal, peu élevé, et  
d'une très-grande dureté. Il se divise  
en branches très-nombreuses sur les-  
quelles s'épanouissent des petits bou-  
quets de fleurs jaunes, qui se mon-  
trent avant le développement des  
feuilles; celles-ci sont opposées, ova-  
les, aiguës, entières, légèrement pu-  
bescentes à leur face inférieure. Les  
nervures sont convergentes et paral-  
lèles. Les fleurs forment des petits  
sertules ou ombelles simples, compo-  
sées de dix à quinze fleurs pédicellées,  
et environnées à leur base d'un invo-  
lucre de quatre folioles régulières,  
égales entre elles et jaunâtres. A ces  
fleurs qui s'épanouissent dès le mois  
de février, succèdent des drupes  
ovoïdes de la grosseur d'une Cerise,  
mais allongées, ordinairement rouges,  
quelquefois jaunes extérieurement.  
Elles ont une saveur acerbe assez  
agréable. On les mange dans les cam-  
pagnes sous les noms de *Cornes* ou  
*Cornouilles*.

Le CORNOUILLE SANGUIN, *Cornus  
sanguinea*, L., forme un Arbrisseau  
d'un port élégant, qui figure agréa-  
blement dans nos jardins et nos bos-  
quets. Sa hauteur est d'une dixaine  
de pieds environ. Ses rameaux sont  
dressés, filés, d'un rouge plus ou  
moins vif, surtout aux approches de  
l'hiver. Ils sont ornés de feuilles op-  
posées, pétiolées, ovales, aiguës, en-  
tières, plus grandes que dans l'es-  
pèce précédente et également pubes-  
centes à leur face inférieure. Les  
fleurs sont blanches et forment une  
cime étalée à la partie supérieure des

ramifications de la tige. Ces fleurs sont remplacées par de petites drupes globuleuses, pisiformes, onihiliquées, d'une couleur noirâtre à l'époque de leur parfaite maturité. Cet Arbrisseau est indigène des forêts de l'Europe. On le trouve également dans l'Amérique septentrionale.

Le CORNOUILLER BLANC, *Cornus alba*, L. Pour le port, cette espèce ressemble beaucoup à celle qui précède. Comme elle, c'est un Arbrisseau de huit à dix pieds d'élévation, ayant ses rameaux effilés, verdâtres et parsemés de tubercules. Ses feuilles sont pétiolées, ovales, aiguës, entières, encore plus grandes que dans le Cornouiller sanguin, glabres des deux côtés, glauques et blanchâtres à leur face inférieure. Les fleurs qui sont blanches constituent une cime ombelliforme au sommet des principales ramifications de la tige. Les fruits sont pisiformes, d'une couleur blanche, lacteuse, et comme transparente, lorsqu'ils sont mûrs. On cultive fréquemment cet Arbrisseau dans nos jardins d'agrément. Originaire de l'Amérique septentrionale, il passe très-bien l'hiver en pleine terre sous le climat de Paris.

Plusieurs autres Cornouillers sont encore cultivés dans nos jardins; tels sont :

Le CORNOUILLER A FLEURS, *Cornus florida*, L. qui, dans l'Amérique septentrionale, sa patrie, peut acquiescir une trentaine de pieds d'élévation. Il se fait surtout remarquer par ses fleurs petites, jaunâtres, disposées en sertules, environnés d'un involucre de quatre grandes folioles blanches, irrégulièrement cordiformes, en sorte qu'au premier abord, chaque sertule ressemble à une grande fleur blanche.

Le CORNOUILLER DU CANADA, *Cornus Canadensis*, L., L'Héritier (*Cornus*, T. 1), offre le même mode d'inflorescence; mais c'est un petit Arbuste rampant, presque herbacé, dont les feuilles supérieures sont verticillées.

Le CORNOUILLER A FEUILLES ALTERNES, *Cornus alternifolia*, L'Hérit. (*loc. cit.* T. VI), se distingue par ses

feuilles alternes, ovales, aiguës, blanchâtres à leur face inférieure. Ses fleurs blanches forment des cimes déprimées.

Le CORNOUILLER SOYEUX, *Cornus sericea*, L'Hérit. (*loc. cit.* T. II), a ses feuilles ovales, aiguës, pubescentes et comme ferrugineuses inférieurement. Ses fruits sont d'une belle couleur bleue.

Les Cornouillers ne sont pas difficiles sur la nature du terrain, et leur culture n'exige presque aucuns soins. Ils réussissent mieux à l'ombre que dans les lieux trop exposés au soleil. On les multiplie de graines, de marcottes, ou en greffant les espèces exotiques sur le Cornouiller mâle. (A. R.)

CORNTREON. BOT. PHAN. Le *Cornus mascula* dans l'île d'Anglesey. *V.* CORNOUILLER. (B.)

CORNU. ZOOL. Espèce des genres Choetodon et Blennie; c'est aussi un Caméléon. *V.* ces mots. (B.)

CORNU. BOT. PHAN. Espèce du genre Coudrier. *V.* ce mot. (B.)

CORNUCOPIE. MOLL. FOSS. Espèce d'Hippurite fossile, décrite par le docteur Thompson. *V.* HIPPURITE. (D. H.)

CORNUCOPIE. BOT. PHAN. *V.* COQUELUCHIOLE.

CORNUE DIGITALE. MOLL. Nom vulgaire du *Pterocera Lambis*, Lamk. Espèce du genre *Pterocera*. *V.* ce mot. (B. M.)

CORNUELLE. BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires de la Maëro. (B.)

\* CORNUET. BOT. PHAN. Sci. vulgaire de *Bidens tripartita*. *V.* BIDENT. (B.)

\* CORNUHAMMONIS. MOLL. Klein, dans son Ostracologie, désignait ainsi la Spirule. *V.* ce mot. (D. H.)

CORNULACA. BOT. PHAN. *V.* CORNULAQUE.

CORNULAIRE. *Cornularia*. POLYP. Genre de l'ordre des Tubularides dans la division des Polypiers flexibles, à cellules non irrégulières, ou cellulifères, établi par Lamarck dans la section de ses Polypiers vaginifères.

Il lui donne pour caractères : un corné fixé par sa base, à ti-imples, en forme de long entonnoir, contenant chacune un Polype, pes solitaires terminaux à bouche de huit tentacules pinnés disposés sur un seul rang. Les Cornules, quoique placées parmi les Tubulaires, présentent une organisation plus compliquée que celle des autres de cet ordre, et nous ne nous point qu'on ne les place avec les Tubiporées, lorsque ces Animaux sont mieux connus. D'après les figures que l'on en a données, pl. 473 Encyclopédie méthodique, figures inédites dans Cavalini, les Polypes ont la bouche au centre d'un petit disque entouré de huit tentacules ciliés ; le disque se voit un corps cylindrique enfermé dans une large enveloppe, de la base de laquelle partent huit filamens qui se perdent dans l'intérieur du tube. Cette description diffère presque pas de celle que nous doit faire du Polype des Lobulaires, de celui du Tubipore musqué : ainsi l'on ne doit pas considérer comme exacte la classification des Cornules. La Polypier présente une tige rampante, stolonifère, qui supporte des jets épars, en forme de cornet ou de long entonnoir à surface ridée transversalement, de substance coriace et de couleur jaunâtre. Ces caractères éloignent les Cornulaires de tous les genres connus.

Ce genre n'est encore composé que d'une seule espèce, la CORNULAIRE RIBÉE, *Tubularia Cornucopiae*, Cavalini, Polyp. mar., p. 250, tab. 9, fig. 11, 12. Elle se trouve dans la Méditerranée. Nous croyons que c'est par erreur que Pallas l'indique dans les mers d'Amérique. (LAM. X.)

**CORNULAQUE.** *Cornulaca*. BOT. FRAN. Delile, dans la Botanique du grand ouvrage d'Egypte, a décrit et figuré (p. 62, t. 22) sous le nom de *Cornulaca monacantha* une plante voisine des *Salsola*. Voici les caractères que cet auteur assigne à son nouveau genre : involucre épais, formé

de poils pressés autour du calice entre trois bractées ; calice persistant à cinq divisions dont une seule porte, sur le milieu de sa face dorsale, une épine dressée ; les cinq étamines qui sont hypogynes ont leurs filets réunis à leur base en un tube membraneux terminé par cinq dents obtuses, alternées avec les filets anthérifères ; la graine est déprimée, l'embryon est roulé en spirale.

Ce genre, ainsi que l'indiquent les caractères énoncés ci-dessus, est très-voisin de la Soude, dont il diffère surtout par l'absence des cinq appendices membraneux qui, dans le genre *Salsola*, bouchent l'ouverture du calice, par ses filets monadelphes et l'épine de son calice. Il se rapproche surtout du genre *Kochia* de Roth, dont il diffère par son embryon roulé en spirale. (LAM. XI.)

**CORNULUS.** BOT. FRAN. (Heister.) Une espèce de Cornouiller. (LAM. XII.)

\* **CORNUO.** ROIS. Probablement une Clupe qui remonte la Loire avec l'Alose à laquelle on dit qu'elle ressemble beaucoup, dont la chair, peu estimée, fait la nourriture des poissons, et qui n'est pas encore déterminée. (LAM. XIII.)

**CORNUPÉDES.** MAM. Désignation vieillie et peu usitée des Animaux qui ont les pieds munis de corne. (LAM. XIV.)

**CORNUS.** BOT. FRAN. V. CORNUILLER. (LAM. XV.)

**CORNUTIE.** *Cornutia*. BOT. FRAN. Vulgairement Agnatha. Plante, le premier, fait connaître ce genre, et figure la plante qui le constitue (Plum. Gen. 32, t. 106, f. 1). Elle a été adoptée par Linné et Jussieu qui l'ont caractérisée ainsi : calice court à cinq dents ; corolle beaucoup plus longue, dont le limbe est à quatre divisions inégales ; étamines dont deux exertes ; style très-long terminé par un stigmate bifide ; base monosperme entourée par le calice persistant. Gayacore, de la Didymaea Angiospermie, L., a été placé par Jussieu

dans la famille des Gattiliers ou Verbénacées. Il ne se compose que d'une seule espèce, le *Cornutia pyramidata*, arbres des Antilles et de la côte de Cam-pêche, dont les feuilles sont ovales, très-entières, et les fleurs disposées en panicules terminales, allongées et portées par des pédoncules trichoto-mes. Jussieu indique avec doute, comme congénère de cette Plante, le *Tittius*, Rumph (Amboin. T. III, t. 90). Mais la différence de patrie de ces deux Arbres donne à penser que leur réunion n'est que conjecturale; d'ail-leurs, observe l'illustre auteur du *Genes Plantarum*, le limbe de la corolle dans la Plante de Rumph est à cinq lobes. (G. N.)

**CORNUTIOIDES.** BOT. PHAN. Syn. de *Prenna*. *K.* ce mot. (N.)

**CORO.** POIS. (Lacépède.) Espèce du genre *Sciène*. (N.)

**\*CQROCORO.** POIS. (Marcgraaff.) Boisson des mers du Brésil, dont la chair est bonne à manger, qui paraît être voisine des Perches, mais qui n'est pas déterminé. (N.)

**COROKORBEI.** MOUL. (Gai-nard.) Syn. de Nautile à la terre des Papous. (N.)

**COBOLLARES.** ACHIN. Nom donné par Klein à un genre d'Our-sins dans son ouvrage sur les Echinodermes; il n'a pas été adopté. (LAM. X.)

**COROLLE.** *Corolla.* BOT. PHAN. La plus intérieure des deux envelop-pes florales d'un périanthe double. C'est, en général, la partie de la fleur la plus apparente, celle qui, par l'é-clat et la variété des couleurs dont elle est peinte, la délicatesse de son tissu, l'odeur suave qu'elle exhale fait souvent, attire principalement les regards du vulgaire, et constitue ces yeux le véritable fleur. Le pé-rianthe simple ne doit jamais être considéré comme une corolle, quels qu'ils soient d'ailleurs sa forme, son tissu, sa coloration, etc. La présence de la Corolle nécessite constamment celle d'un calice. Toutes les fois en effet qu'il n'existe qu'une seule enve-loppe florale autour des organes sexuels, cette enveloppe unique est

un calice. Telle est l'opinion profes-sée par le savant auteur du *Genes Plantarum*, et par tous les botanistes sectateurs de la méthode des familles naturelles. *V.* le mot *CALICE* où nous avons développé ce principe. On a dit que le calice était un prolongement de la partie externe de l'écorce, et la Corolle un appendice du liber. Cette opinion nous paraît peu exacte : au-cune des deux enveloppes de la fleur n'est un prolongement de l'écorce; elles reçoivent leurs vaisseaux de l'in-térieur de la tige.

La Corolle peut être formée d'une seule pièce; on dit alors qu'elle est monopétale. Elle peut être composée de plusieurs pièces distinctes, tombant séparément les unes des autres, et qu'on nomme pétales; dans ce cas, la Corolle est appelée polypé-tale. Considérée d'une manière géné-rale, la Corolle peut être régulière ou irrégulière. Nous étudierons bientôt cet organe sous ces divers points de vue, qui servent de caractères pour la distinction des Végétaux et leur classification. La structure anatomi-que de la Corolle est à peu près la mè-me que celle des feuilles : ce sont des vaisseaux provenant de la tige, se ra-branchant, s'anastomosant entre eux, et formant un réseau dont les mailles sont remplies par un tissu cellulaire lâche et peu résistant. Parmi ces vais-seaux on trouve des trachées roulées en spirale, qui existent surtout dans la nervure moyenne de certains péta-les. Ces organes ont la plus grande analogie avec les filets des étamines, et l'on voit fréquemment ces derniers se changer en pétales. Cette transfor-mation se fait en quelque sorte sous nos yeux dans les fleurs qui dou-blent. Ce phénomène en effet n'est que le résultat du changement des fi-lets staminaux en pétales. On peut en quelque sorte suivre pas à pas tous les degrés de cette transmutation : on voit successivement les filets s'é-largir, devenir minces, planes, et à mesure qu'ils absorbent les fluides destinés au développement de l'étami-ne, l'anthere se flétrit, diminue, et

limit par disparaître complètement. Rien ne prouve ni la grande analogie, et en quelque sorte l'identité qui existe entre ces deux organes : aussi plusieurs auteurs pensent-ils que les pétales ne sont jamais que des étamines transformées et stériles. La famille des *Renoulatées* nous offre un grand nombre de faits propres à étayer cette opinion.

Étudions maintenant les modifications principales de la Corolle.

*De la Corolle monopétale.* — La Corolle monopétale offre à considérer trois parties, savoir : le tube ou partie inférieure, plus ou moins rétréci et tubuleuse ; le limbe qui surmonte le tube, et qui est tantôt évasé et tantôt plane, et la gorge ou ligne de démarcation entre le tube et le limbe. Chacune de ces trois parties, par les variations qu'elle éprouve, sert à fournir des caractères de genres ou d'espèces. Il est une chose digne de remarque, c'est que, lorsque la Corolle est monopétale, elle porte constamment les étamines, et détermine, par conséquent, leur insertion. Ce caractère sert à distinguer les Corolles vraiment monopétales des pseudomonopétales qui, généralement, ne doivent pas être attachés aux étamines. Plusieurs genres de la famille des *Rutacées* offrent des exemples de cette dernière conformation. La Corolle monopétale peut être régulière ou irrégulière ; dans le premier cas, on dit qu'elle est : 1° campanulée, campaniforme ou en cloche, lorsqu'elle n'a point de tube, et qu'elle s'évase insensiblement de la base vers le sommet, de manière à ressembler à peu près à une cloche, par exemple, des *laseris*, les *Campanules*, etc. ; 2° infundibuliforme ou en entonnoir, quand son tube est surmonté d'un limbe qui va en s'évasant, comme dans le *Tabac* ; 3° hypocratérisiforme, si le tube est long et terminé par un limbe plane, ainsi qu'on l'observe dans le *laseris*, le *Lilium* ; 4° rotacée ou en roue, celle dont le tube est excessivement court ou nul,

et le limbe étalé à plat ; telle est celle de l'*Anagallis*, de la *Boitracée*, 5° urcéolée, quand elle est presque globuleuse et resserrée à son brifice comme celle de certaines *Bruyères*.

La Corolle monopétale irrégulière porte également différents noms, suivant sa forme. Ainsi on l'appelle : 1° bilabée, lorsque son limbe est partagé en deux lèvres écartées l'une de l'autre ; de là le nom de *Labiées* donné aux Plantes qui présentent cette conformation, comme la *Sauge*, le *Thym*, etc. ; 2° personnée, quand les deux lèvres sont rapprochées, comme dans la *Linsite* ; 3° anmale, quand sa forme est bizarre, et ne peut être rapportée ni à la Corolle bilabée, ni à la Corolle personnée ; celle de la *digitalis*, de l'*Utriculaire*, etc. La Corolle monopétale irrégulière et anmale présente assez fréquemment à sa base un appendice creux en forme de sac ou de corne, et qu'on nomme éperon ; de là le nom de *Corolle éperonnée* donné à celle qui offre cette particularité.

*De la Corolle polypétale.* — La Corolle monopétale tombe d'une seule pièce ; la Corolle polypétale au contraire tombe en autant de pièces qu'il y a de pétales. Cependant il y a certaines Corolles vraiment polypétales qui se détachent d'une seule pièce, telle est, par exemple, la Corolle d'une sorte de *Malvacées* dont les cinq pétales sont soudés à leur base par la substance des filets des étamines. Un autre caractère propre à distinguer ces deux espèces de Corolle, c'est que la Corolle polypétale ne donne réellement jamais attache aux étamines. Le nombre des pétales est extrêmement variable ; il est tantôt déterminé, tantôt indéterminé. Il y a des Corolles de deux, de trois, de quatre, de cinq, de six pétales ; de là les noms de Corolle dipétale, tripétale, tétrapétale, pentapétale, hexapétale. Lorsque le nombre est plus considérable et indéterminé, on dit simplement de la Corolle qu'elle est polypétale. La figure, la forme, la grandeur, la dis

position des pétales sont, les variations. En général, l'ent. pétale se compose de deux parties, l'apophyse de la base ou partie, large, et supérieure, et l'onglet, ou partie, inférieure, plus ou moins longue, et rétrécie. — De même que la corolle monopétale, la polypétale peut être régulière ou irrégulière. D'après le nombre, et la disposition générale des pétales, la corolle polypétale régulière prend les noms : 1° de cruciforme, quand elle est formée de quatre pétales égaux, et disposés en croix, comme dans toutes les Crucifères ; 2° rosacée, composées de cinq pétales et les en forme de Rose, comme dans la famille des Rosacées ; 3° carvophylle, formée de cinq pétales longuement onguiculés et séparés dans la corolle tubuleuse, comme l'Ocaillet, le Sureau, l'Agrostemma, etc. La corolle polypétale irrégulière porte le nom de papilionacée quand elle se compose de cinq pétales inégaux et irréguliers, mais qui, affectant constamment une même disposition respective, ont reçu des noms particuliers. Ainsi on nomme étendard le pétale supérieur plus grand que les autres qu'il enveloppe généralement ; ailes, les deux pétales latéraux qui sont égaux et semblables entre eux ; carène, les deux pétales inférieurs également semblables et souvent soudés par leur côté inférieur. La famille des Légumineuses nous offre des exemples de cette forme de corolle. La corolle polypétale est dite anormale quand ses pétales sont inégaux et dissimilaires, mais n'offrent pas la disposition qui constitue la corolle papilionacée, par exemple, celle de la Capucine, de la Fraxinelle, des Violettes, etc.

Assez généralement, le nombre des pétales est le même que celui des étamines, et, dans ce cas, ils alternent avec elles. Quelquefois cependant les pétales, au lieu d'alterner avec les organes sexuels mâles, leur sont opposés. Cette circonstance assez rare est importante à noter, et fournit un caractère souvent fort utile pour distin-

guer certaines familles. Ainsi les pétales sont opposés aux étamines dans tous les genres qui composent la famille des Boraginées, dans la Vigne, etc. Il en est de même quand la corolle est monopétale. Les lobes de son limbe alternent généralement avec les étamines. Il est fort rare qu'elles leur soient opposées, ainsi qu'on le remarque dans la famille des Primulacées, par exemple. (A. R.)

**COROLLE, EE.** *Corollaris*, d. BOT. PHAN. Qui est munie d'une corolle. Expression qui signifie qu'on désigne les plantes où simplement les fleurs munies d'une corolle, c'est-à-dire d'un périanthe double. (A. R.)

**COROLLIFERE.** *Corolliferus*. BOT. PHAN. Ce mot a la même signification et s'emploie dans le même sens que celui de Corollé. (A. R.)

**\* COROLLIFLORES.** BOT. PHAN. Végétaux dont les fleurs sont munies d'une corolle hypogyne. Ce mot est employé par opposition à celui de Calyciflores. (A. R.)

**\* COROLLULE.** *Corollula*. BOT. PHAN. Plusieurs auteurs appellent ainsi la corolle des fleurs dans les plantes de la famille des Syanthérées. (A. R.)

**COROMBAR.** BOT. PHAN. d'Anderson. Une espèce de Cassia du Sénégal. (A. R.)

**CORONA.** BOT. PHAN. d'Anderson. Une espèce de Cassia du Sénégal. (A. R.)

**CORONA, ou CORONILLA DE ESPAGNE.** le *Globularia Alypum* en Espagne. (A. R.)

**CORONA, ou CORONILLA DE REX,** le Nigelle et le *Coronilla Kalendina*. (A. R.)

**CORONA REX, ou CORONILLA DE SOL,** l'*Helianthus annuus*, L. en Espagne et en Italie. (A. R.)

**CORONA DE CHRISTO,** divers *Thapsus*. (A. R.)

**CORONA SOLIS,** un groupe de plantes dans Tournefort, qui renferme les *Helianthes*, les *Rudbeckia*, les *Coreopsis*, etc. (A. R.)

**CORONAIRES**. *Coronaria*. Nomme par Klein à un genre d'Orchidées dans son ouvrage sur les lichénies; il n'a point été adopté. (M. B.)

**CORONDE**. BOT. PHAN. L'un des noms de la Cannelle à Ceylan. (B.)

**CORONE**. ORN. Spangues conservé Latin pour désigner la Coraline; mais Corone, L. K. Gossau. (M. B.)

**CORONELLA**. BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires du Mélilot dans les dialectes méridionaux. (B.)

**CORONELLE**. *Coronella*. REPR. H. (Laurenti.) Y. COULEUVRE.

**CORONEOLA**. BOT. PHAN. Plume signait sous ce nom quelque Rose sauvage, dont on faisait des couronnes. Cæsalpin le donne au *Gea tinctoria*. D'autres ont étendu la Lysimache commune, d'où est ut-elle, pour le nom vulgaire de laquelle, sous lequel on a quelquefois désigné cette dernière Plante. (B.)

**CORONILLA DE FRAYLE**. BOT. PHAN. *Coronilla*. (M. B.)

**CORONILLE**. *Coronilla*. BOT. PHAN. Famille des Légumineuses, Diaplye Déandrie, L. Sous ce même nom Linné réunit les genres *Emerus*, *suridus* et *Coronilla* notés par Cornéfort. Cette réunion, quant à l'émier de ces genres, fut d'après les mémoires de Cornéfort, et adoptée par Miller qui fit revivra *Emerus*, et en notés les espèces. A l'égard du *suridus*, Ghorstner, Monach, Jacquin et Jacquin ne firent point de difficulté pour en séparer du *Coronilla*. Necker lui avait donné inutilement le nouveau nom de *Boudieris*; De Gandolle (Fl. Française, 11<sup>e</sup> édition), tant en adoptant le genre, l'orthographe dénotant en celle de *suridus*. Si, ayant égard à l'organisation certainement bien différente de celui-ci, on admet sa distinction, et que l'on conserve la réunion de *Emerus*, sous le *Coronilla*, à avec les autres, il n'y a pas de caractères, on trouvera pour ce der-

mier genre les caractères suivants : caule droit; persistant; bilabié; à cinq dents, dont deux supérieures rapprochées, et trois inférieures plus petites; standard de la même longueur à peu près que les ailes; pétales inférieurs d'un onglet souvent plus long que le calice; légume cylindrique, très long, divisé en un moyen d'articulation (peu apparent) dans le *Coronilla Emerus*, en plusieurs segments non soudés; graines cylindriques et oblongues. Les *Coronilles* sont des Herbes ou rarement des sous-arbrisseaux qui ont leurs feuilles imparipennées, les stipules distinctes de la pétiole, et les fleurs en ombelles, soutenues par des pédoncules axillaires ou terminaux. On en a décrit une vingtaine d'espèces; sans correspondre quelques Plantes que certains auteurs y ont ajoutées, comme, par exemple, le *Coronilla Sesban* de Willdow, qui se rapporte au *Sesbania aegyptiaca* de Persoon. D'un autre côté il est d'ailleurs que le *Coronilla cretica*, L., doit être séparé pour former le genre *Attolobium*, ainsi que Desvoux l'a proposé dans le Journal de Botanique. (M. B.)

Les *Coronilles* peuvent à juste titre être regardées comme natives de la région méditerranéenne; puis qu'à l'exception du *Coronilla varia* qui se trouve par toute l'Europe, et du *C. minima*, que l'on rencontre dans l'intérieur jusque près de Saint-Pierre, elles sont indigènes du midi de la France; de l'Espagne; de l'Italie et de la Grèce. Une d'entre elles, il est vrai, se trouve en Colombie selon Loaire; et Planter en a décrit une autre de l'Amérique méridionale. Parmi les espèces de ce joli genre, nous ne mentionnons ici que les deux plus intéressantes.

La *CORONILLE EMERUS*. *Coronilla Emerus*, L. *Emerus myrtilloides* Miller (Icones, tab. 484), est un Arbrisseau dont le port a quelque analogie avec celui du *Begonia* d'Inde; mais qui est glabre dans toutes ses parties. Ses fleurs sont petites et cor-

folioles ovales, obtuses et comme tronquées au sommet, les stipules petites et caduques. Les fleurs sont jaunes avec une nuance rougeâtre au dehors de l'étendard, au nombre de deux à trois sur chaque pédoncule; ceux-ci sont extrêmement multipliés, ce qui donne à la Plante un aspect très-flou; les onglets des pétales sont, dans cette espèce, extraordinairement longs. Cet Arbrisseau croît spontanément dans la France méridionale; il est surtout fort commun le long de la chaîne du Jura, aux environs de Genève et en Savoie, où l'abondance de ses belles fleurs jaunes le fait remarquer au milieu des haies et des buissons. La culture en a fait un Arbruste domestique, et il est maintenant répandu dans tous les parcs et les jardins d'agrément. Ses feuilles, douées de propriétés purgatives, lui ont valu le nom vulgaire de **SÈNE DATARD**. On lui donne aussi les noms de **FAUX BAGUENAUDIER** et de **SECURIDACA DES JARDINIERS**.

La **CORONELLE SIGARRÉE**, *Coronilla varia*, L., a ses tiges couchées, cannelées et longues de cinq à six décimètres. Aux aisselles de ses feuilles ailées avec l'impaire naissent des pédoncules supportant dix à douze fleurs disposées en couronnes, dont le mélange agréable des couleurs rose, blanche et violette, ajoute encore à leur élégante symétrie. Cette Plante qui croît abondamment dans les fossés, sur le bord des chemins et des champs, est respectée par les bœtiens, auxquels un instinct admirable a sans doute appris qu'elle était nuisible; peut-être aussi ne la trouvent-ils pas de leur goût, quand, d'ailleurs, ils peuvent se procurer un meilleur pâturage. (G.N.)

\* **CORONOB** ET **MORONOB**.  
BOT. RHAN. Syn. de *Moronobea* d'Aublet. V. ce nom. (G.)

**CORONOPE**. *Coronopus*. BOT. RHAN. Haller, Gaertner et Lamarck ont donné ce nom à un genre de Crucifères que Smith (*Fl. Brit.* 2, p. 591) a beaucoup étendu. Dans les Mémoires

de l'Américaine Société d'Histoire Naturelle de Paris pour l'an vii, et dans la Flore Française, DeCandolle en avait retranché les espèces dont le silicule est échancré au sommet et didyme, et avec lesquelles il avait constitué le genre *Senebiera*. L'examen d'un plus grand nombre de Crucifères a plus tard déterminé ce savant (*Syst. Veg. Nat.* 2, p. 521) à réunir les deux genres sous le nom commun de *Senebiera*. V. ce mot. Le *Coronopus*, malgré son antériorité, a disparu de la famille des Crucifères, parce que dans les divers auteurs ce mot désigne un grand nombre de Plantes très-différentes. Ainsi, le *Coronopus* de Dioscoride est évidemment le *Plantago Coronopus*, L.; le *Coronopon* de Plin. paraît être une Cinarocéphale; dans Tragus c'est le *Myosurus minimus*; dans Ruellius enfin, il désigne le *Cochlearia Coronopus*, L., ou *Senebiera*, D. C. Pour se reconnaître au milieu d'une telle confusion, il était convenable de supprimer ce mot comme non-générique, ou de le conserver pour la section des Plantains, dont le *Plantago Coronopus* est le type, ainsi que Tournefort et plusieurs auteurs anciens d'un très-grand poids l'ont admis. (G.N.)

#### CORONOPIFEUILLE. BOT. CRYPT.

Pour *Coronopifolia*. V. ce mot.

#### CORONOPIFOLIA. BOT. CRYPT.

(*Phanerophytes*.) Stackhouse, dans la deuxième édition de sa Nécécide Britannique, donne le nom de *Coronopifolia* à son vingt-troisième genre composé d'une seule espèce, le *Pharus coronopifolius* de Purner. Il appartient à notre genre *Gentiana*. V. ce mot.

#### CORONULE. *Coronula*. BOT. C.

Ce genre était resté confondu avec les *Balanus*; ce sont les anciens conchologues le plaçant parmi les *Mollusques*. Lamarck (*Anim. sans vert.* T. v, p. 386), apercevant des caractères propres à en faire un genre distinct, le proposa et le plaça parmi les *Cirripèdes* sessiles, à côté de la *Tubicinelle* avec laquelle il a beaucoup de rapports. Leach, qui fit subir de



nelles divisions aux Cirrhipèdes (ce mot), adopta le genre de Larrick; mais il fit avec lui et deux autres sa famille des Coronulides qui est première de son second ordre. Larrick l'a caractérisé de la manière suivante : corps sessile, enveloppé d'une coquille, faisant saillir seulement des bras petits, sétacés, irréguliers; coquilles sessile, paraissant bivalve, mais réellement formée de pièces soudées, suborbiculaire; conoïde ou en cône rétus, tronquée aux extrémités, à parois épaisses, intérieurement creusées en cellules rayonnantes; opercule de quatre valves obliques. Les bords de la coquille ne descendent jamais ce bourrelet qui forme les bords de celle des Tubicillides, et encore moins cette série d'anneaux circulaires et horizontaux qui composent celle de ces dernières. L'ouverture est ovale et arrondie, fermée en partie par l'opercule qui est trop étroit pour la remplir, et en partie par une membrane mince qui adhère au pourtour. La cavité intérieure est conique et entièrement tapissée par le manteau; la lame qui recouvre les cellulosités, et qui dans les Balanes est toujours incomplète, est ici entière et descend jusqu'au fond. On a remarqué que l'un des caractères des Balanes est d'être fermées inférieurement par une lame testacée, adhérente; mais les Coronules, l'ouverture inférieure est simplement close par une membrane assez épaisse. La coquille dont l'épaississement va en augmentant vers la base est composée d'une multitude de lames rayonnantes, dont les unes sont complètes, c'est-à-dire qu'elles s'étendent de la paroi interne à la paroi externe, tandis que d'autres, intermédiaires partent de la paroi externe pour ne s'avancer que jusqu'au milieu de la cavité qu'elles laissent entre elles les premières. Les Coronules sont toutes adhérentes par leur base. Le plus grand nombre se fixe sur la peau des grands Animaux marins, s'y enfonce de quelques lignes et s'y montre quelquefois en grande abondance; d'autres

se fixent sur les Tortues, même sur toutes espèces de corps durs, sous-marins, comme des Coquilles, etc. Ce genre est peu nombreux en espèces; trois seulement sont connues, ce sont les suivantes :

**CORONULE DIADÈME**, *Coronula Diadema*, Lamk. (Anim. sans vert. T. v, p. 387, n. 2); *Lepas Diadema*, Linné (p. 3208, n. 4); *Balanus Diadema*, Bruguière (Encycl. n. 18, pl. 295, fig. 13 et 14). Cette Coronule est subcylindrique, tronquée, hexangulaire; les angles sont formés de quatre côtes longitudinales, crénelées inférieurement par des lignes de points élevés, très-serrés. Les intervalles des angles sont lisses; l'ouverture est ovale, subhexagone, fermée par l'opercule et la membrane où il est placé. Nous possédons un individu de cette espèce qui a été desséché avec soin; voici ce qu'il nous a offert : un opercule bivalve, semi-lunaire, en croissance, petit, remplissant à peine le quart de l'ouverture supérieure qui du reste est close par une membrane qui est probablement une partie du manteau desséché. Cette membrane est fendue entre les deux cornes du croissant de l'opercule, et son bord est garni d'une portion membraneuse libre, qui l'entoure comme un jabot. Cette même membrane était destinée sans doute à clore cette partie de l'ouverture que l'opercule, par sa petitesse, ne pouvait fermer.

**CORONULE RAYONNÉE**, *Coronula balanaris*, Lamk. (loc. cit. n. 2); *Lepas balanaris*, L. (loc. cit. n. 5); *Pediculus balanaris*, Chem. (Conch. t. 3, t. 99, fig. 845 et 846); *Balanus balanaris*, Brug. (Encycl. pl. 165, fig. 17 et 18). Celle-ci se distingue facilement de la précédente; elle est orbiculaire, convexe, pourvue de six rayons droits, striés transversalement; les intervalles qui séparent les rayons sont également striés, mais les stries sont rayonnantes en partant du sommet pour se diriger à la base. Linné dit que l'opercule est seulement formé de deux parties, et qu'il est presque membraneux.

**CORONULE DES TORTUES**, *Coronula testudinaria*, Lamk. (loc. cit. n. 3); *Lepas testudinarius*, L. (loc. cit. n. 6); *Pelticulus testudinarius*, Chem. (Conch. t. 8, pl. 99, fig. 847 et 848); *Ferrina testudinaria*, Rumph (Mus. t. 48, fig. k), et *Balanus testudinarius*, Brug. (Encycl. pl. 165, fig. 15 et 18). Cette espèce est généralement plus aplatie que les deux autres; elle est convexe, blanche, son ouverture est ovale, fermée par un opercule quadrivalve. Elle présente six rayons étroits, stricts transversalement et séparés par des espaces lisés. La cavité intérieure est plus grande inférieurement que supérieurement. C'est le contraire dans la Coronule Diadème. (D. H.)

**CORONULIDES**, *Coronulides*. **MOLL.** Famille nouvelle proposée par Leach pour circonscrire avec plus de précision et pour séparer des Animaux qui, quoique ayant beaucoup de rapports, présentent pourtant des différences notables. **BALANIDES**. Les genres de cette famille se reconnaissent par le défaut de lame testacée, fermant l'ouverture inférieure de la Coquille; cette ouverture étant close seulement par une membrane plus ou moins mince, et le test formé de deux lames, l'intérieure, l'antérieure; réunies par une multitude de cloisons rayonnantes. Les genres qui la composent sont Coronule, Tabiconelle, Chelonobie. (D. H.)

**COROPHIE**, *Corophium*. **CRUST.** Genre de l'ordre des Amphipodes, établi par Latreille et ayant pour caractères: quatre antennes, les inférieures beaucoup plus grandes que les deux supérieures, en forme de pieds, coudées, grosses, et dont la dernière pièce n'est composée que de trois articles, et paraît se terminer par un petit trochet. Ces Crustacés ont plusieurs points de ressemblance avec les Talitres; mais ils s'en distinguent par les articles peu nombreux de la dernière pièce des antennes. Ils avoisinent singulièrement les genres Podocère

et Jasse de Leach, que Latreille (Règne Animal de Cuvier) leur a réunis. Les Corophies ont le corps presque cylindrique, les yeux saillans, comprimés; leur tronc est divisé en sept anneaux supportant chacun une paire de pattes; la première paire et la seconde sont terminées par une main ou serre monodactyle; ces doigts sont crochus, mobiles et presque égaux entre eux. Suivant d'Orbigny qui a donné (Journ. de physique, t. 93, pag. 194) des détails curieux sur ces Crustacés, il existe près de la base inférieure des pieds des femelles, à l'exception de la première paire, des lames membraneuses en forme d'écailles, dont la réunion forme une espèce de poche; elles servent à retenir les œufs et même les petits, jusqu'à ce qu'ils aient acquis assez de force pour s'isoler. L'abdomen est également divisé en sept anneaux qui offrent chacun en dessous une paire de fausses pattes, sous forme de filets divisés en deux branches très-mobiles et analogues aux pieds nageurs et branchiaux des Stomatopodes. L'extrémité de l'abdomen est courbée en dessous et munie d'appendices natatoires.

On ne connaît encore qu'une espèce propre à ce genre, le *COROPHUS LONGICORNE*, *Coroph. longicornis*, Latr., ou le *Cancer grossipes* de Linné, et le *Gammarus longicornis* de Fabricius. Il a été représenté et décrit par Pallas (*Spicilegium Zoologicum*, p. 59, t. 1, fig. 9) sous le nom d'*Oniscus volutator*. On en trouve une meilleure figure dans l'Encyclopédie méthodique (24<sup>e</sup> partie, pl. 328, fig. 7 et 8). D'Orbigny (*loc. cit.*) a fait connaître les mœurs de ces singuliers Crustacés qui paraissent se multiplier pendant la belle saison. En automne, on en observe de toutes les grandeurs, et l'on rencontre souvent des femelles portant des œufs ou des petits depuis le mois de juin jusqu'au mois de septembre. Ils ne sautent point, comme les Talitres et les Crevettes, et ne marchent point sur le côté, mais sur le ventre et dans une position horizon-

ornejo, Corniola; Cornisa et Cornidos des Espagnols. Syn. italien de cornouille. (B.)

CORNIX. ois. Nom scientifique une espèce du genre Corbeau. (V. CORBEAU. (DR..Z.)

CORNOUILLE. BOT. PHAN. Fruit u Cornouiller, (B.)

CORNOUILLER. *Cornus*. BOT. PHAN. Ce genre se compose d'une vingtaine d'espèces, dont les deux tiers environ sont originaires des diverses contrées de l'Amérique septentrionale. Ce sont toutes des Arbrisseaux ou des Arbustes, portant des feuilles simples opposées, rarement ternes, dépourvues de stipules, et dont les fleurs généralement blanches suivent divers modes d'inflorescence; mais plus généralement elles sont disposées en cime, rarement en panicule. Quelquefois elles sont accompagnées d'un involucre formé de plusieurs folioles. Dans toutes, l'ovaire est globuleux, adhérent, couronné par le limbe du calice qui offre quatre dents, quelquefois très-petites, et par un disque épigyné, concave à son centre pour l'insertion du style; celui-ci est simple, et se termine par un stigmate glanduleux également simple. La corolle est formée de quatre pétales étalés, ordinairement sessiles; les étamines, en même nombre que les pétales, alternent avec eux. Leurs anthères sont à deux loges, tournées vers le centre de la fleur. Ces étamines s'insèrent en dehors du bourrelet formé par le disque. Occupé en travers, l'ovaire présente deux loges, dans chacune desquelles existe un seul ovule attaché vers la partie supérieure. Le fruit est une drupe charnue, globuleuse, ombiliquée à son sommet, contenant un noyau osseux à deux loges monospermes.

Ce genre a été placé dans la famille des Caprifoliacées de Jussieu. Mais sa corolle véritablement polypétale, ses étamines immédiatement épigynes, forment des caractères assez saillants, pour que nous ayons cru devoir considérer ce genre, ainsi que le Lierre

qui offre les mêmes particularités, comme le type d'un nouvel ordre naturel, formant le passage entre les Caprifoliacées et les Araliacées, c'est-à-dire entre les Monopétales et les Polypétales épigynes, et auquel nous avons donné le nom d'Hédéracées. (V. Botanique médicale, 2<sup>e</sup> part. Paris, 1823).

Nous citerons parmi les espèces de ce genre, les suivantes :

Le CORNOUILLER MÂLE, *Cornus mascula*, L., est un Arbre de moyenne grandeur qui abonde dans nos bois. Son tronc est inégal, peu élevé, et d'une très-grande dureté. Il se divise en branches très-nombreuses sur lesquelles s'épanouissent des petits bouquets de fleurs jaunes, qui se montrent avant le développement des feuilles; celles-ci sont opposées, ovales, aiguës, entières, légèrement pubescentes à leur face inférieure. Les nervures sont convergentes et parallèles. Les fleurs forment des petits sertules ou ombelles simples, composées de dix à quinze fleurs pédicellées, et environnées à leur base d'un involucre de quatre folioles régulières, égales entre elles et jaunâtres. A ces fleurs qui s'épanouissent dès le mois de février, succèdent des drupes ovoïdes de la grosseur d'une Cerise, mais allongées, ordinairement rouges, quelquefois jaunes extérieurement. Elles ont une saveur acerbe assez agréable. On les mange dans les campagnes sous les noms de *Cornues* ou *Cornouilles*.

Le CORNOUILLER SANGUIN, *Cornus sanguinea*, L., forme un Arbrisseau d'un port élégant, qui figure agréablement dans nos jardins et nos bosquets. Sa hauteur est d'une dizaine de pieds environ. Ses rameaux sont dressés, effilés, d'un rouge plus ou moins vif, surtout aux approches de l'hiver. Ils sont ornés de feuilles opposées, pétiolées, ovales, aiguës, entières, plus grandes que dans l'espèce précédente et également pubescentes à leur face inférieure. Les fleurs sont blanches et forment une cime étalée à la partie supérieure des

sois pommé Pomme Gannelle. *V. Co-*  
*ROSSOLIER* et *ANONE*. (B.)

*COROSSOLIER*. BOT. PHAN. Syn.  
d'*Asimina esculenta*, L., dans les co-  
lonies françaises. *V. ANONE*. (B.)

*COROSSOLO*. OIS. Syn. italien du  
Merle de roche, *Turdus saxatilis*. *V.*  
*MERLE*. (DR..Z.)

\* *COROTTAL*. BOT. PHAN. Une  
Bryone indéterminée de la côte de  
Coromandel. (B.)

*COROUOCO*. REPT. OPH. Vi-  
père brésilienne peu connue et très-  
venimeuse. (B.)

*CO-ROUJHO*. OIS. Syn. vulgaire  
du Rossignol de muraille, *Motacilla*  
*Phoeniceus*, L. *V. SYLVIE*. (DR..Z.)

\* *COROUKAI*. BOT. PHAN. L'un  
des noms vulgaires de l'*Eleusine Co-*  
*riacana* à la côte de Coromandel. (B.)

\* *COROWIS*. OIS. Syn. présumé  
de *Loxia philippina*. *V. Gros-Bec*.  
(DR..Z.)

*COROYA*. OIS. Espèce du genre  
Batara, *Turdus Coroya*, L., Buff.,  
pl. enl. 701. *V. BATARA*. (DR..Z.)

*COROYÈRE*. BOT. PHAN. L'un  
des noms vulgaires de *Rhus Coriaria*  
et de *Coriaria myrtifolia*, L. *V. SU-*  
*MAC* et *CORIAIRE*. (B.)

*COROZO*. BOT. PHAN. Nom de  
pays de l'*Alfortia oleifera* et du *Mar-*  
*tinexia caryotaefolia*, *V. ALFORTIE* et  
*MARTINÉZIE*. (B.)

*CORP*. POIS. (Gesner.) Vieux  
nom du *Sciana Umbra*. *V. SCIÈNE*.  
(B.)

\* *CORPQO*. BOT. PHAN. Nom qu'on  
donne aux Moluques à un Arbuste  
peu connu, mentionné par Rumph  
sous le nom d'*Olas arpitans*, *Corpuo*  
*Labi-Labi*, et qui paraît être une  
*Apocynée*. (B.)

\* *CORPS*. On nomme Corps tout  
ce qui est susceptible d'exercer sur  
nos organes une influence quelcon-  
que, de produire en nous une sensa-

tion physique. Les Corps diffèrent  
par leurs propriétés que les métho-  
distes pourraient diviser en naturel-  
les et en chimiques. Les propriétés  
naturelles seraient celles qui s'offrent  
directement à nos sens, telles que la  
consistance soit solide, liquide ou  
fluide; la pesanteur ou densité, la du-  
reté, la forme, la couleur, la transpa-  
rence, l'éclat, la sonorité, l'odeur, la  
saveur, etc., etc. On considérerait  
comme chimiques les propriétés qui  
ne se développent que par le secours  
de divers agens dont on fait successi-  
vement usage. Ces propriétés sont:  
l'électricité, le magnétisme, la pola-  
rité, la capacité pour le calorique ou  
calorique spécifique, l'affinité, la té-  
nacité, la fusibilité, la combustibi-  
lité, l'inflammabilité, la comburi-  
té, la dissolubilité, l'acidité, l'alcalini-  
té, etc. *V. ces mots*. Les Corps sont  
considérés comme simples, lorsque  
ayant épuisé sur eux tous les moyens  
connus de la chimie, il n'a plus été  
possible d'amener ces Corps à une sé-  
paration en principes différens. Ils  
sont composés tant que, subissant l'é-  
preuve des réactifs, ils ne présentent  
pas le caractère de l'homogénéité chi-  
mique.

On a proposé de diviser les Corps  
en organiques, c'est-à-dire doués de  
la vie et se perpétuant par généra-  
tion, et en inorganiques, ayant été  
produits par dépôts successifs ou par  
agrégation régulière ou irrégulière:  
mais cette division, étant susceptible  
d'un grand nombre d'exceptions, n'a  
point reçu une application aussi gé-  
nérale qu'on avait cru d'abord  
qu'elle pouvait l'être. On a encore  
divisé les Corps en pondérables et  
impondérables. *V. MATIÈRE*. (DR..Z.)

\* *CORPS COTYLÉDONAIRE*.  
BOT. PHAN. *V. COTYLÉDON*.

\* *CORPS LIGNEUX*. BOT. PHAN. *V.*  
*BOIS*.

\* *CORPS RADICULAIRE*. BOT.  
PHAN. *V. RADICULE*.

*CORR*. OIS. Syn. anglais du Hé-  
ron, *Ardea cinerea*, L. *V. HÉRON*.  
(DR..Z.)

es. Il lui donne pour caractères : polypier corné fixé par sa base, à filets simples, en forme de long entonnoir, contenant chacune un Polype; les Polypes solitaires terminaux à bouche unique de huit tentacules pinnés disposés sur un seul rang. Les Cornulaires, quoique placées parmi les Tubulaires, présentent une organisation plus compliquée que celle des animaux de cet ordre, et nous ne savons point qu'on ne les place avec les Tubiporées, lorsque ces Animaux sont mieux connus. D'après les figures que l'on en a données, pl. 473 de l'Encyclopédie méthodique, figures placées dans Cavalini, les Polypes ont la bouche au centre d'un petit disque entouré de huit tentacules ciliés; mais le disque se voit un corps cylindrique enfoncé dans une large enveloppe, de la base de laquelle partent les huit filamens qui se perdent dans l'intérieur du tube. Cette description diffère presque pas de celle que nous doit faire du Polype des Lobulaires, de celui du Tubipore musicien; ainsi l'on ne doit pas considérer comme exacte la classification des Cornulaires. La Polypier présente une lige rampante, stolonifère, qui supporte des jets épars, en forme de cornet ou d'un long entonnoir à surface ridée universellement, de substance corne et de couleur jaunâtre. Ces caractères éloignent les Cornulaires de tous les genres connus.

Ce genre n'est encore composé que d'une seule espèce, la CORNULAIRE RIDE, *Tubularia Cornucopia*, Cavalini, l'yp. mar., p. 250, tab. 9, fig. 11, 12. Elle se trouve dans la Méditerranée, nous croyons que c'est par erreur que Blas l'indique dans les mers d'Amérique. (L.A.M.X.)

**CORNULAQUE.** *Cornulaca*. BOT. FR. Delile, dans la Botanique du grand ouvrage d'Égypte, a décrit et nommé (p. 62, t. 22) sous le nom de *cornulaca monacantha* une Plante marine des Salsola. Voici les caractères que cet auteur assigne à son nouveau genre : involucre épais, formé

de poils pressés autour du calice entre trois bractées; calice persistant à cinq divisions dont une seule porte, sur le milieu de sa face dorsale, une épine dressée; les cinq étamines qui sont hypogynes ont leurs filets réunis à leur base en un tube membraneux terminé par cinq dents obtuses, alternes avec les filets anthérifères; la graine est déprimée, l'embryon est roulé en spirale.

Ce genre, ainsi que l'indiquent les caractères énoncés ci-dessus, est très-voisin de la Soude, dont il diffère surtout par l'absence des cinq appendices membraneux qui, dans le genre Salsola, bouchent l'ouverture du calice, par ses filets monadelphes et l'épine de son calice. Il se rapproche surtout du genre *Kochia* de Roth, dont il diffère par son embryon roulé en spirale. (L.A.M.X.)

**CORNULUS.** BOT. FRAN. (Heister.)

Une espèce de Cornouiller. (L.A.M.X.)

\* **CORNUO.** ROIS. Probablement une Clupe qui remonte la Loire avec l'Alose à laquelle on dit qu'elle ressemble beaucoup, dont la chair, non estimée, fait la nourriture des pauvres; et qui n'est pas encore déterminée. (L.A.M.X.)

**CORNEPEDES.** MAM. Désignation vieillie et peu usitée des Animaux qui ont les pieds munis de corne. (L.A.M.X.)

**CORNUS.** BOT. FRAN. Cornouiller. (L.A.M.X.)

**CORNUTIE.** *Cornutia*. BOT. FRAN. Vulgairement Agaveanth. Plante à laquelle le premier, fait connaître ce genre, est figurée dans la Plante qui le constitue (Plum. Gen. 32, Ic. 106, f. 2). Elle a été adoptée par Linné et Jussieu qui l'ont caractérisé ainsi : calice corré à cinq dents; corolle beaucoup plus longue, dont le limbe est à quatre divisions inégales; étamines dont deux exertes; style très-long terminé par un stigmate bifide; base monosperme entourée par le calice persistant. Ce genre, de la Didymiea Antigonosperme, L., a été placé par Jussieu

gamoïde de *Genista tinctoria*, L. *V. G.*  
*Genista tinctoria*, L. *V. G.*

**CORRIGIOLE.** *Corrigiola*. BOT.

PHAN. Genre de la famille des Portulacées et de la Pentandrie Trigynie, L., ainsi caractérisé : calice persistant, à cinq divisions membraneuses et blanchâtres sur les bords ; cinq pétales très-courts ; cinq étamines à anthères incombantes ; trois stigmates sessiles. Le fruit est une sorte de noix recouverte par le calice, arrondie et trigonèbre, renfermant une seule graine attachée par un cordon ombilical au fond de la noix. Ce genre que Vaillant avait désigné autrefois sous le nom impropre de *Poligonifolia* ne diffère réellement du *Tetraphyon*, (suec.) lequel a une grande ressemblance de port, que par l'organisation de son fruit, ici monosperme, sans placenta proéminent, dans l'autre polysperme avec un placenta central. On n'en connaît que trois espèces dont deux indigènes de France. Celle qui a servi de type au genre, la *Corrigiola des rives*, *Corrigiola littoralis*, L., est une Plante couchée et traçante, à feuilles stipulées et à fleurs blanches très-petites et ramassées en bouquets aux extrémités des rameaux et des tiges. Elle habite toute la France méridionale et centrale jusqu'à la latitude de Paris où elle se trouve encore assez abondamment, surtout à Saint-Léger. La seconde espèce, *Corrigiola telephiifolia*, Pourret, qui n'était autrefois regardée que comme une variété de la précédente, croît dans les Pyrénées-Orientales et aux environs de Narbonne. Willdenow a aussi distingué sous le nom de *Corrigiola capensis* une Plante du cap de Bonne-Espérance que Thunberg avait confondue avec le *Corrigiola littoralis*. (G. N.)

**CORRINANTHOA.** BOT. CRYPT. Du Dictionnaire de Détéville. Pour *Conianthos*. *V.* ce mot. (B.)

**CORRIOLA.** BOT. PHAN. Syn. de *Corrigiola* dans plusieurs dialectes du midi de l'Europe. (B.)

\* **CORRIONE BIONDO.** ORS. Syn.

italien du Court-Vite isabelle *Charadrius gallicus*, Gmel. *V. Court-Vite*. (D. L.)

**CORROGA BARZA.** ORS. Syn. garde de la Corneille mentelée, *Corvus Corax*, L. *V. CORBEAU*. (D. L.)

**CORROSON.** ORS. Même chose que *Correso*. *V.* ce mot.

**CORROYERE.** BOT. PHAN. Même chose que *Coroyère*. *V.* ce mot.

**CORRUDA.** BOT. PHAN. *V. COR-DUBA*.

**CORS.** MAM. Parties des cornes ou andouillers qui dans les Cerfs sortent de la tige qu'on nomme Perche en terme de vénerie. *V. CERF*. (B.)

**CORSAC ou KORSAC.** MAM. Syn. d'Adire ou Adive, *V.* ces mots et *CHIEN*. (B.)

\* **CORSAIRE.** ORS. (Sonant) Nom donné par les marins à l'Epervier, *Falco Nisus*, L., quand il voltige au-dessus de la Méditerranée pour prendre les Cailles à leur passage. (D. L.)

**CORSELET.** INS. C'est le premier anneau du thorax, qui a pour caractères de ne jamais supporter d'ailes et de donner insertion à la première paire de pattes ; on s'est beaucoup mépris et on a jeté une grande confusion dans le langage, lorsqu'on a appliqué, dans certains ordres d'Insectes, le nom de Corselet à l'ensemble du thorax. *V.* ce mot et *PROTHORAX*. (AUD.)

**CORSELET.** MOLL. Le Corselet est cette partie, dans les Coquilles bivalves, où le ligament s'insère lorsqu'il est extérieur. *V.* ce que nous en avons dit à l'article *COQUILLE*. (D. L.)

\* **CORSINE.** *Corstina*. BOT. CRYPT. (*Hépaltiques*.) Le genre décrit d'abord sous ce nom par Raddi dans les *Opusculi scientifici di Bologna*, Vol. II, 1818, a été publié peu de temps après par Treviranus (*Jahrb. der Gewächskunde von Sprengel, Schrader und Link*, 1820), qui l'a désigné par le nom de *Gueutheria*. Le nom de Raddi, étant le plus ancien, doit être adopté ; mais

n doit observer que si ces auteurs ont décrit deux Plantes du même genre, ces Plantes, quoiqu'apportées sous deux A la même figure de Micheli, *Nov. Gen. pl.* 100, t. 57, fig. 1, paraissent former deux espèces très-distinctes. Ces Plantes poussent sur la terre humide des frondes d'un beau vert, semblables à celles des Marchanties, mais dont la surface est régulièrement réticulée, ce qui les distingue au premier aspect des feuilles des Marchanties et des Jungmannies, avec lesquelles on pourrait sans cela facilement les confondre. Ces feuilles présentent, vers leur partie moyenne, plusieurs petites excavations recouvertes par une sorte d'involucre formé d'une, de deux ou de trois petites folioles insérées au pourtour de cette excavation. Sous cet involucre, on trouve de deux à cinq capsules enveloppées chacune dans une coiffe membraneuse indéhiscente; ces capsules renferment des spores dépourvues d'élaters ou filaires en spirale. Cette description s'applique également aux deux espèces, si ce n'est que Raddi n'a pas parlé de l'enveloppe membraneuse propre à chaque capsule. Les deux espèces de ce genre ayant été confondues, nous allons indiquer leurs différences.

**CORSUM MARCHANTIODE**, *Corsinia marchantioides*, Raddi, loc. cit. t. 1, fig. 1; *Riccia major* Coriandri spore, etc., Micheli, *Nov. Gen. pl.* 106, t. 57, fig. 1; *Riccia coriandri*, Sprengel. Anleit. 3. Frondes de plus d'un pouce de long, à deux ou trois lobes profonds, réunies en rosette par leur base; involucre formé d'une seule foliole qui recouvre les capsules comme une sorte d'opercule; le reste attachée à un des côtés du pourtour de l'excavation qui renferme les capsules; celles-ci sont au nombre d'une à cinq. Cette espèce, observée d'abord en Italie, croît aussi aux environs de Paris dans les parties humides de la forêt de Montmorency où nous l'avons recueillie.

**CORSUM ODORANS**, *Corsinia genolens*, *Gueutheria graveolens*, Trevisan, loc. cit. Ses frondes sont toutes

simples et n'ont que trois à quatre lignes de long. Chaque involucre est formé de deux ou trois petites folioles courtes et denticulées au sommet; il recouvre deux ou trois capsules. Elle croît en Allemagne.

Ce genre se rapproche par ses caractères beaucoup plus des Ligionies et des Spherocephales, que des véritables Riccies dont il est parfaitement distinct. (AD. B.)

\* **CORSIUM**. NON. SPAN. (Thalophrastrate.) Probablement la *Calocallis*, espèce du genre *Arum*, L. (Gouan, it.)

**CORSOIDE**. MIN. (Pisc.) Pierre comparée par les anciens aux cheveux gris de l'Homme, qui conséquemment ne saurait être un Jaspé, et qui paraît être l'Amiante. V. ce mot. (B.)

**CORTALE**. *Cortalus*. MOLL. Ce genre de Montfort est un de ceux qu'il conviendrait de conserver. Quoique microscopique, il présente une transition remarquable entre les Polythalamies dont les têtes s'enroulent sur un même plexe, et ceux dont la spire s'élève en cônes allongés, comme dans la Turritelle. Il présente la forme d'un Trochus, et le type en a été pris dans les figures de Saldani. (*Testac.* t. 85, vas. 162, X.) Voici ses caractères : coquille libre, univalve, chitineuse, à spire saillante, élevée en cônes, base aplatie, bouche triangulaire, ouverte, recevant verticalement le retour de la spire; des carènes et estomac; cloisons unies. L'espèce qui sert de type au genre est le *Cortalus Pagodus*, Coquille mince, diaphane, irisée, dont on voit les cloisons à travers la test; elle est carénée, et sa carène est découpée en festons; elle n'a qu'une ligne de diamètre. On la trouve dans la Méditerranée, particulièrement à Livourne. (D. L. B.)

**CORTAPAO**. OIS. Syn. portugais du grand Pic noir, *Picus principalis*, L. V. Pic. (DA. Z.)

\* **CORTELENA**. BOT. FRAN. (Sanguier.) L'un des noms vulgaires du *Palliseria spiralis* en Lombardie. (N.)

**CORTESIE.** *Cortesia.* BOT. PHAN.  
Un Arbrisseau des Pampas de Buenos-Ayres a reçu ce nom générique de Cavanilles (*Icon. Rar.* 4, p. 53, t. 377) qui lui assigne pour caractères : calice monophyllé à cinq dents, persistant et velu sur ses deux faces ; corolle monopétale, à cinq découpures dont le tube égale celui du calice, et le limbe est étalé ; cinq étamines externes ; ovaire libre, ovale, surmonté d'un long style bifide et de deux stigmates globuleux ; fruit bacciforme, ovale, pulpeux, et contenant deux semences planes d'un côté et convexes de l'autre. Le fruit ainsi décrit ne conviendrait guère à celui d'une Borraginée, quoiqu'on ait rapporté ce genre à la famille de ce nom ; mais en admettant ces affinités, il y a eu sans doute erreur, soit sur le nombre, soit sur la nature des parties qui le composent, et si c'est bien une Borraginée, elle doit se placer dans la section de celles à fruit en baie, à côté des *Tournefortia*, *Parsonia*, etc. D'un autre côté, le rapprochement que l'auteur fait de cette plante avec le *Rochefortia* de Swartz, que l'on indique dans la famille des Rhamnées, donne à penser qu'on doit être en garde sur l'adoption de ce qu'en a dit à ce sujet Cavanilles. Au surplus, la **CORTESIE CONEIFORME**, *Cortesia coniformis*, Cav., unique espèce de ce genre dédiée à la mémoire de l'intéropale Fernand Cortès, conquérant du Mexique, est une Plante dont les tiges, hautes d'un mètre et plus, sont très-rameuses, et portent des feuilles alternes, sessiles, canéiformes, à trois lobes mucronés et munis de tubercules de chacun desquels sort un poil blanc et caduc. Les fleurs sont solitaires, non pédonculées et le plus souvent terminales. (G..N.)

**CORTEZA DE LOXA.** BOT. PHAN.  
C'est-à-dire *Ecorce de Loxa* ou de *Loja*. L'un des noms espagnols, passé dans la pharmacie, du *Cinchona officinalis*. F. QUINA. (N.)

**CORTICAIRE.** *Corticaria.* INS.  
Genre de l'ordre des Coléoptères, section des Tétramères, établi par

Marsham (*Naturalist*), ayant, suivant ce naturaliste, les caractères : antennes foliées ; tête proéminente et élytres bordées ; cornéaire, le plus souvent genre, qui ne paraît se par aucun entomologiste les *Lyctes* de Fabricius désignées sous le nom de *punctatus* et *Cacujus* d

**\* CORTICIFÈRE.** A l'ordre des Acalèphes f. Lesueur pour des Animaux des Zoanthes. Ce sont dont les parois s'encrent dire de matières sablonneuses les unes contre les autres de larges expansions à corps sous-marins. Tell près les expressions du Journal de physique compte du Mémoire de les Actinies. Ne le nous ne pouvons donner détail sur ce genre, ni qui le composent. Ce sont les côtes de l'Amérique.

**\* CORTICIFÈRES.** Dans la même section de la division des piers flexibles ou non pierreux. Les corticifères sont d'être composés de substances : une extérieure loppante, nommée écorce ; l'autre appelée centre, soutient la partie ordres appartiennent à ce sont ceux des Spongiogoniées et des Isidiées.

**CORTICIUM.** BOT. (pignons.) Persoon a donné ce nom une section des renfermant les espèces dues et entièrement à l'une de leurs surfaces qui les supportent, et libre est recouverte par seminaire. F. d'Am.

**CORTICULAIRE.**



d'après Leman; le nom employé par Lulde, pour désigner une dent fossile indéterminée. (B.)

\* **CORTICUS.** INS. Dejean (Catal. des Coléopt., p. 67) désigne sous ce nom un petit genre voisin de l'*Orthocerus* de Latreille ou *Sarrotrium* de Fabricius. On n'en connaît jusqu'à présent qu'une seule espèce, le *Corticus Cellis*, Dej. Elle n'a guère qu'une demi-ligne de longueur; on l'a trouvée en Dalmatie. (AUD.)

**CORTINARIA.** BOT. CRYPT. (*Champignons.*) Sous-genre d'Agarics, dans la méthode de Persoon, caractérisé par un tégument filamenteux qui forme sur les feuillets un réseau semblable à une toile d'Araignée, dont une partie adhère au pédicule, et l'autre au bord du chapeau.

Plusieurs espèces d'Agarics, remarquables par leurs couleurs agréables et brillantes, appartiennent à ce sous-genre; telles sont toutes les variétés de l'*Agaricus araneosus* figurées par Bulliard, t. 250, t. 432, t. 344, et de l'*Agaricus castaneus*, Bull., t. 268, etc. (AD. B.)

**CORTINE.** Cortina. BOT. CRYPT. On donne ce nom à une sorte de frange filamenteuse qui entoure le chapeau de plusieurs Champignons du genre Agaric, et qui est produite par les débris d'un tégument membraneux très-mince qui couvrait le dessous du chapeau avant son développement complet, tégument qui s'est déchiré par suite de son extension. V. TÉGUMENT. (AD. B.)

\* **CORTOM.** BOT. PHAN. Même chose que Chartram. V. ce mot. (B.)

\* **CORTOMI.** BOT. PHAN. (Rumph.) Syn. de *Cassytha corniculata* dans l'Inde. (B.)

**CORTON.** MAM. Le Mulet chez les Espagnols. V. RAT. (B.)

**CORFUSE.** *Cortusa.* BOT. PHAN. Famille des Primulacées, Pentandrie Monogynie, L. Ce genre, que Tournefort confondait avec l'Androsace et quelques Primules, sous le nom

d'*Auricula Ursi*, a été distingué par Linné qui lui a donné les caractères suivans: calice à cinq divisions; corolle rotacée dont l'anneau qui entoure la gorge est situé très-haut, ou, en d'autres termes, dont le tube s'élargit insensiblement en un limbe à cinq lobes; cinq étamines à anthères adnées et filiformes; un seul stigmate; capsule s'ouvrant par le sommet en cinq valves, selon Linné, et en deux valves, d'après Gaertner.

La **CORFUSE** DE MATTHIOLI, *Cortusa Matthioli*, L., Jacq. (*Icones*, t. 32), a des feuilles radicales au nombre de trois ou quatre, pétiolées, arrondies et divisées en plusieurs lobes peu profonds et très-dentés, hérissées de poils épars; les fleurs d'une couleur rose violette forment une sorte d'ombelle au sommet d'une hampe cylindrique haute d'un à deux décimètres. Il est à regretter qu'une plante aussi élégante soit très-rare dans la nature et dans l'état sauvage. Elle est exclusivement le partage des Alpes d'Italie et d'Autriche; car, quoiqu'on ait dit Lapeyrouse, il est certain qu'on ne l'a rencontrée ni dans les Pyrénées, ni même sur le revers occidental des Alpes françaises et piémontaises. Bory de Saint-Vincent l'a trouvée en abondance sur les monts qui environnent le lac d'Halstadt dans la Haute-Autriche. C'est à cette plante que l'on a imposé, pour la première fois parmi les modernes, un nom patronimique. L'Ecluse, en la dédiant à son ami Cortusus, a fait revivre un usage accrédité chez les anciens, et dont on accuse plusieurs auteurs contemporains d'abuser, sans réfléchir que ces noms patronimiques valent mieux que les noms génériques significatifs qui finissent presque toujours par devenir contradictoires.

Il existe en Sibérie une autre Cortuse qui a le calice plus long que sa corolle. C'est le *Cortusa Gmelini*, Linné (*Amoen.* II, p. 346) dont Gmelin a donné une figure (*Flora Sibérica*, IV, t. 43, fig. 1708) (G. N.)

**CORU.** BOT. PHAN. (Daléchamp.)

Appétins de l'Asie orientale, qui paraît voisine des *Tabernaemontana* et du *Nerium antidysentericum*. (B.)

**CORUDALE.** BOT. PHAN. (Adanson.) Syn. de Laurier. (B.)

**CORUJA.** OIS. Syn. portugais de Hudotte, *Strix Stridula*, L. F. CHOUETTE. (DR. Z.)

\* **CORUMB.** BOT. PHAN. F. CORAMBE.

**CORUNDUM.** MIN. F. CORINDON.

**CORUZZ.** OIS. Syn. italien du Courlis de terre, *Charadrius edicnemus*, L. (DR. Z.)

\* **CORVA.** POIS. (Delaroché.) Syn. de *Sciana nigra*, Bloch. F. SCIÈNE. (B.)

\* **CORVETTO.** POIS. (Gesner.) Syn. de *Sciana Umbra*. F. SCIÈNE.

\* **CORVINA.** POIS. (Delaroché.) Syn. de *Sciana cirrhosa*, L., aux îles Baléares. F. SCIÈNE. (B.)

\* **CORVINE.** POIS. Syn. de *Sparus chilensis*. F. SPARE. (B.)

**CORVISARTIE.** *Corvisartia*. BOT. PHAN. Le docteur Mérat, dans sa Flore Parisienne, a proposé l'établissement de ce genre dans la famille des Synanthères Corymbifères pour l'*Inula Helenium*, L. Ce genre a ensuite été adopté par H. Cassini. Néanmoins il nous paraît difficile d'établir un caractère générique uniquement fondé sur la forme des écailles de l'involucre, dont les extérieures sont foliacées et dilatées dans le genre *Corvisartia*, tandis qu'elles sont minces et étroites dans les autres espèces d'*Inula*. Cette différence étant la seule entre ces deux genres, nous pensons que tous deux doivent demeurer réunis. F. INULE. (A. R.)

\* **CORVO.** OIS. Syn. de Corbeau en Italie où l'on nomme *Corvo imperiale*, le *Corvus Corax*; *Corvo marino*, le Cormoran; *Corvo mezzano*, le *Corvus Corone*; *Corvo Picalo*, le *Corvus Monedula*. (B.)

\* **CORVO.** POIS. Même chose que *Corvello*, F. ce mot. (B.)

**CORVUS.** OIS. Nom scientifique du genre Corbeau. F. ce mot. (DR. Z.)

\* **CORYBANTES.** MYOL. FOSS. L'un des vieux noms des Bélemnites. F. ce mot. (W.)

**CORYBAS.** BOT. PHAN. La Plante décrite par Salisbury (*Parad. Lond.*, t. 83), sous le nom de *Corybas aconitifolius*, paraît être la même que le *Coryzanthus bicalcarata* de Brown. F. CORYSANTHES. (A. R.)

**CORYCION.** *Corycium*. BOT. PHAN. Quelques Orchidées du cap de Bonne-Espérance, auparavant éparses dans les genres *Ophrys*, *Satyrum* et *Arcthusa*, ont été réunies en un même genre par Swartz, dans son travail sur les genres de cette famille. Les Corycions ont l'ovaire légèrement tordu en spirale; quatre des divisions du calice sont extérieures, dressées; les trois supérieures sont rapprochées, soudées entre elles, et forment un casque terminé à sa partie postérieure et inférieure par deux bosses obtuses, creusé d'un sillon profond dans toute sa longueur; la division inférieure est également dressée, légèrement bombée dans sa partie inférieure, tronquée à son sommet. L'organisation et surtout la position des deux divisions internes est extrêmement singulière, et forme le caractère tranché de ce genre. Du sommet du gynostème, au-dessus de l'anthère, naissent: 1° antérieurement le labelle, qui est petit, spatulé, crénelé à son bord, rétréci et onguiculé inférieurement; 2° un peu au-dessus du labelle, également au sommet du gynostème, deux appendices membraneux plates de champ, arrondis à leur partie antérieure, se prolongent insensiblement à leur partie postérieure en une sorte de queue recourbée qui recouvre la face postérieure du gynostème, et descendent ainsi jusqu'au fond du casque. Ces deux appendices sont soudés à leur partie antérieure et inférieure, et paraissent être ou du moins remplacer la sixième division du calice. Le gynostème est court et porte

l'anthère, à sa base antérieure et antérieure; celle-ci se compose de deux loges ovoïdes ou globuleuses un peu écartées l'une de l'autre, s'ouvrant par un sillon longitudinal et contenant une masse pollinique caudiculée à sa base, qui se termine par un rétinacle. Ces deux masses polliniques; et par conséquent l'anthère qui les renferme, nous ont paru renversées; ce qui expliquerait la singulière position du labelle et de la division interne du périnthe.

Swartz rapporte à ce genre quatre espèces, toutes originaires du cap de Bonne-Espérance, savoir : *Corycium orbanchoides*, Sw., qui est le *Satyrion orbanchoides* de Linné et de Thunberg, et qui se distingue par ses feuilles étroites, linéaires et presque distiques. La seconde, *Corycium crispum*, Sw., est l'*Arethusa crispata* de Thunberg. Ses feuilles sont élargies et engainantes à leur base, allongées, mucueuses sur leurs bords, et terminées par une longue pointe. Elle est figurée dans Buxbaum, Cent. 3, T. XI. Les deux autres sont les *Corycium vestitum* et *Cor. bicolor*. Celles-ci ont été mentionnées par Thunberg sous le nom générique d'*Ophrys*.

(A. R.)

**CORYDALE.** *Corydalis*. Linn. Genre de l'ordre des Névroptères, famille des Planipennes, tribu des Hémirobia (Règn. Anim. de Cuv.), établi par Latreille aux dépens du genre *Hemerobius* de Linné et ayant pour caractères : cinq articles à tous les tarses; premier segment du tibia, grand, en forme de corselet; ailes couchées sur le corps; mandibules fort courbées, étroites, pointues, avancées, en forme de cornes; antennes sétacées. Latreille (*loc. cit.*) réunit les *Corydales*, les *Chauliodes* et les *Sialis* au genre *Semblide*. On n'en connaît encore qu'une espèce :

La **CORYDALE CORNUX**, *Corydalis cornuta* ou l'*Hemerobius cornutus* de Linné et de Fabricius. Elle a été décrite et représentée par Degér (*Mém. Ins. T. III, p. 559, pl. 27, fig. 1*) et par Pelisot de Beauvois (*En-*

sect. recueillis en Afrique et en Amérique, 1<sup>re</sup> livr., Névropt., pl. 1, fig. 1). Cet Insecte a été trouvé dans l'Amérique septentrionale. (AUD.)

**CORYDALIDE.** *Corydalis*. MONTAN. Le genre *Fumeterre* avait été placé dans la famille des Papavéracées dont il se rapproche par plusieurs points, mais dont il s'éloigne cependant par des caractères importants. De Candolle a pensé que ce genre devait être considéré comme le type d'un nouvel ordre naturel. Déjà Gaertner avait divisé le genre *Fumaria* en deux, appelant *Capnoides* les espèces dont le fruit est une capsule uniloculaire et polysperme; C'est ce genre *Capnoides* de Gaertner que Ventenat a nommé plus tard *Corydalis*, nom qui a prévalu. Rabin le genre *Corydalis* lui-même a été successivement divisé en plusieurs autres genres peu distincts, de sorte qu'aujourd'hui on compte six genres dans la famille des *Fumariacées*, qui se compose uniquement du genre *Fumaria* de Linné. Les caractères qui distinguent le genre *Corydalis* sont : qu'il a été circonscrit par les travaux récents des auteurs, et en particulier par De Candolle (*Syst. Nat. II, p. 113*); sont : calice formé de deux sépales opposés, généralement très-petits et caducs, souvent prolongés à leur base au-dessous de leur point d'attache; corolle tubuleuse et composée de quatre pétales irréguliers et inégaux, quelquefois légèrement soudés entre eux par la base. Le supérieur est le plus grand; il se prolonge à sa partie inférieure au-dessous de son point d'attache en un éperon obtus et plus ou moins recourbé; le pétale inférieur est de la même forme et de la même largeur que le supérieur, mais n'offre point d'éperon; les deux latéraux sont égaux et semblables, et presque entièrement recouverts par les deux pétales supérieur et inférieur. On compte six étamines diadelphes; chaque androphore, dont l'un est supérieur et l'autre inférieur, est plane,

était, et porte à son sommet trois anthères, dont la moyenne est biloculaire, et les deux latérales uniloculaires (structure singulière, propre à toutes les Plantes qui composent la famille des Fumariacées); l'ovaire est allongé, comprimé, et se termine insensiblement en un style grêle qui couronne un stigmate glanduleux et simple. Le fruit est une capsule allongée, comprimée à une seule loge, contenant plusieurs graines réniformes attachées à deux trophospermes sutureux. Cette capsule s'ouvre en deux valves.

Dans le second volume du *Systema Naturale Vegetabilium*, De Candolle décrit vingt-huit espèces de ce genre. Ce sont toutes des Herbes annuelles creuses, ayant la racine fibreuse ou formée d'un tubercule charnu, la tige herbacée, simple ou rameuse, quelquefois nue ou simplement écaillée dans sa partie inférieure, portant des feuilles décomposées alternes, rarement opposées; des fleurs jaunes ou purpurines, disposées en épis terminaux. Toutes ces espèces, ainsi que le remarque De Candolle, croissent dans l'hémisphère boréal. On en trouve sept en Europe, dix dans l'Asie septentrionale, deux en l'Auride, deux en Orient qui sont les seules dont les feuilles soient opposées, quatre au Japon et deux dans l'Amérique septentrionale. Parmi les espèces indigènes de ce genre nous ferons mention des suivantes :

La CORYDALIDE JAUNE, *Corydalis lutea*, D. C., Fl. Fr., *Fumaria lutea*, L., *Capnoides lutea*, Gaertner (de Fr. 2, p. 165, t. 115, f. 3). D'une racine fibreuse s'élevant plusieurs tiges grêles, hautes de huit à dix pouces, charnues, portant des feuilles découpées profondément en un grand nombre de lobes ou folioles pétiolées, obtuses, d'un vert glauque; les fleurs sont jaunes et forment un épi terminal. Cette espèce qui est vivace croît dans les lieux humides et dans les fentes des vieux murs.

La CORYDALIDE BULBEUSE, *Corydalis bulbosa*, D. C., Fl. Fr., *Fu-*

*maria bulbosa*, L. Un tubercule solide, irrégulièrement arrondi, enveloppé de tuniques membraneuses, donne naissance par sa partie inférieure à des fibres radicales, et par sa partie supérieure à une tige d'abord simple, nue inférieurement où elle porte des écailles au lieu de feuilles. Celles-ci, au nombre de deux à trois seulement, naissent de la partie supérieure de la tige; elles sont trois fois divisées en pétioles, portant des folioles oblongues entières ou trifides; la tige se termine par un épi de fleurs purpurines assez petites, supportées par des bractées multifides. Cette espèce croît dans des lieux ombragés et humides de l'Europe tempérée.

La CORYDALIDE TUBÉREUSE, *Corydalis tuberosa*, D. C., Fl. Fr. Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, dont elle diffère par son tubercule généralement creux, par sa tige feuillée dès sa base, par ses folioles cunéiformes, ses fleurs plus grandes et ses bractées indivises. Elle se montre dans les mêmes localités.

On cultive quelquefois dans les jardins la *Corydalis nobilis*, Jacq., Hort. Vind., t. 116, originaire de Sibérie. La racine de celle-ci est tubéreuse, souvent creuse; sa tige est simple et dépourvue d'écailles; ses feuilles sont bipinnées à lobes cunéiformes, incisés au sommet. Ses fleurs d'un jaune pâle et assez grandes constituent un épi terminal.

Plusieurs Plantes, d'abord placées dans ce genre, en ont été séparées pour former des genres nouveaux. Ainsi les *Corydalis cucullaria* et *Cor. spectabilis* de Persoon forment le genre *Diclytra*. V. ce mot. Le *Corydalis fungosa*, Vent., constitue le genre *Adlumia*. V. ce mot. Le *Corydalis vesicaria*, Pers., le genre *Cysticapnos*. V. ce mot. Le *Corydalis enneaphylla*, D. C., Fl. Fr. Suppl., le genre *Sarcocapnos*. V. ce mot. (A. A.)

GORYDALION. BOT. PHAN. Dioscoride désignait une Fumeterre sous ce nom dont on a tiré le nom du genre Corydalide, *Corydalis*. V. ce mot. (A.)

**CORYDALOS.** ois. Syn. grec de la Calandre; *Alauda Calandra*, L. V. **ALOUETTE.** (DR..Z.)

\* **CORYDON.** INS. Nom donné par Geoffroy (Hist. des Ins. T. II, p. 49) au *Papilio Janira* de Linné. (AUD.)

**CORYDONIX.** ois. Syn. latin de Toulou, nom que Vieillot a appliqué au genre Coucal. V. ce mot. (DR..Z.)

**CORYDORAS.** rois. Genre établi par Lacépède qui lui attribue pour caractères la position de la bouche au bout du museau; une dorsale double; pas de dents; de grandes lames à chaque côté du corps et de la queue; des pièces larges et dures qui couvrent la tête; point de barbillons, et plus d'un rayon à chaque nageoire du dos. Cuvier n'a même pas fait mention de ce genre qui paraît appartenir à la famille des Siluroïdes, et dont une seule espèce a été mentionnée. On ne connaît pas la patrie de celle-ci qui a été dédiée à Geoffroy de Saint-Hilaire; la couverture de ses narines est double; la caudale est fourchue; les lames latérales disposées sur deux rangs très-larges et hexagonales. Le second rang de la dorsale est denté. (B.)

**CORYDOS.** ois. (Aristote.) Syn. grec d'Alouette. V. ce mot. (PR..Z.)

**CORYLUS.** BOT. PHAN. V. COU-  
BRIER.

**CORYLLUS.** ois. V. CHRYLUS.

**CORYMBE.** *Corymbus.* BOT. PHAN. Mode particulier d'inflorescence dans lequel un nombre plus ou moins considérable de fleurs sont portées sur des pédoncules partant de points différents de la tige, mais arrivant tous à la même hauteur. Le Sorbier, la Matricaire, la Millefeuille et plusieurs autres Corymbifères en offrent des exemples. Ce mode d'inflorescence a la plus grande analogie avec la cime et l'ombelle. V. ces mots. (A. R.)

\* **CORYMBETRA.** BOT. PHAN. (Ruell.) L'un des synonymes grecs de Lierre. V. ce mot. (B.)

**CORYMBIFERA.** BOT. PHAN. Nom

donné par Rai à l'*Achillea microrphylla*, L. (B.)

**CORYMBIFÈRES.** *Corymbiferae.* BOT. PHAN. Ce groupe, établi par Vaillant dans la famille des Synanthérées, correspond à peu près aux Radiées de Tournefort. Il a été adopté par Jussieu dans son *Genera*. Si l'on voulait chercher dans cette division de la vaste famille des Synanthérées une réunion bien naturelle de genres ayant tous entre eux des rapports intimes, ce groupe, que Jussieu considère comme une famille distincte, n'offrirait pas cet avantage. En effet, il existe de très-grandes différences entre les genres extrêmement nombreux qui le composent. Cependant il n'est point impossible de caractériser les Corymbifères de manière à les distinguer des Chicoracées et des Carduacées, qui sont les deux autres grandes sections des Synanthérées. Les travaux de plusieurs botanistes modernes sur cette famille, et en particulier ceux de Cassini, de R. Brown et de Kunth, ont fait voir qu'elle ne présentait aucune coupe bien nette ni bien tranchée, et que, pour coordonner ses genres de manière à conserver leurs affinités mutuelles, il fallait établir un grand nombre de petits groupes ou tribus naturelles. Mais tous ces auteurs s'accordent sur ce point, qu'il est impossible d'assigner à ces tribus des caractères tranchés. C'est dans l'ensemble de leurs différents organes floraux qu'il faut saisir les ressemblances d'après lesquelles on peut les réunir. Nous allons donc faire connaître les caractères généraux des Corymbifères, après quoi nous indiquerons les divisions qu'on leur a fait subir.

Les capitules sont tantôt tous flo-  
culeux, c'est-à-dire entièrement composés de fleurons tubuleux et réguliers; tantôt, et plus fréquemment, ils sont radiés, c'est-à-dire que leur centre est occupé par des fleurons, et leur circonférence par des demi-fleurons. Dans le premier cas, les fleurons sont tous hé-

maphrodites, ou les uns sont hermaphrodites, les autres unisexués ou même neutres. Quand les capitules sont ainsi flosculeux, les Corymbifères ressemblent beaucoup aux Carduacées. Cependant elles en diffèrent par les caractères suivants : 1° jamais leur réceptacle ou phoranthe n'est chargé d'un aussi grand nombre de soies ou de paillettes, que dans les Carduacées. Quand il en porte, il n'y en a jamais qu'une seule pour chaque fleur, tandis qu'on en compte toujours plusieurs pour chacune d'elles dans toutes les Carduacées ; 2° un caractère commun à toutes les Carduacées, c'est qu'au sommet de leur style, immédiatement au-dessous du stigmate, on trouve un renflement plus ou moins considérable, généralement chargé de poils glanduleux auxquels Cassini donne le nom de collecteurs. Ce renflement, qui forme le caractère distinctif des Carduacées, n'existe jamais dans les Corymbifères. Mais quand les capitules sont radiés, ce qui est beaucoup plus fréquent, la distinction entre ces deux familles est très-facile, puisque les Carduacées sont toujours flosculeuses. Les fleurons qui occupent le centre sont généralement hermaphrodites, tandis que les demi-fleurons sont unisexués mâles ou femelles, stériles ou fructifères. La corolle des premiers a son limbe tantôt régulièrement évasé et à cinq dents, tantôt à quatre ou même à trois dents seulement. Il en est de même des demi-fleurons qui présentent un nombre variable de dents à leur sommet. L'involucre varie beaucoup dans sa forme, le nombre et la disposition des écailles ou folioles qui le composent. Le phoranthe ou réceptacle n'offre pas des différences moins nombreuses. Il est plane, concave ou convexe, et même presque conique, nu ou garni d'écailles, de soies, d'alvéoles, etc. Le style et le stigmate fournissent dans les modifications qu'ils présentent des caractères d'une haute importance pour la formation et la coordination des genres. Il en est de même du fruit dont

la forme présente des variations sensibles, et qui tantôt est nu, tantôt couronné par un simple bord membraneux, tantôt par une aigrette de la structure présente de précieux caractères génériques.

Si maintenant nous étudions le port et les caractères généraux qui présentent les Corymbifères dans leurs organes de la végétation, nous verrons que ce sont tantôt des Herbes herbacées annuelles ou vivaces tantôt des Arbustes ou même des Arbrisseaux ; que leurs feuilles, généralement alternes, mais quelquefois opposées, sont ou simples ou profondément divisées en lobes plus ou moins nombreux ; leurs fleurs ou capitules sont assez communément disposés en corymbe : de-là leur nom de Corymbifères ; mais très-souvent ils n'ont pas ce mode d'inflorescence, et sont ou solitaires ou diversement groupés.

Dans son *Genera Plantarum*, Jussieu a divisé les Corymbifères en sections artificielles dont les caractères sont principalement tirés du réceptacle nu ou paléacé, des frus couronnés ou non par un aigrette ou des fleurs flosculeuses ou radiées, etc. Henri Cassini, avons-nous dit, rejetant la division primaire des Syanthérées en trois grandes familles, dispose les divers genres d'abord placés dans les Corymbifères en treize tribus qui sont : 1° les Vernoniées ; 2° les Eupatoriées ; 3° les Astérostylées ; 4° les Tusilagines, 5° les Mutisiées ; 6° les Denticionées ; 7° les Astérées ; 8° les Inulées ; 9° les Athémidiées ; 10° les Ambrosiées ; 11° les Hélianthées ; 12° les Calandulées ; 13° les Arctotidées. Ces tribus dont quelques-unes pourraient être facilement réunies, tant leur distinction est difficile ; sont certainement beaucoup plus naturelles que les sections établies par le célèbre auteur de *Serra*, mais elles ont le grand inconvénient de ne pouvoir être nettement définies, et ne peuvent, par conséquent, être employées dans la pratique, soit pour la classification des herbiers,

dans les ouvrages généraux qui ont pour but de faire connaître les végétaux. Dans l'état actuel de la science, il est donc indispensable d'employer encore pour la classification des genres de cette famille un arrangement artificiel, mais d'une application facile, d'autant plus que le nombre des genres qui y sont renfermés est extrêmement considérable. Nous allons énumérer les genres principaux des Corymbifères en les plaçant dans un ordre qui nous paraît le plus facile et le plus commode dans son application. Nous ferons remarquer que cette énumération est loin d'être complète, et que notre intention a seulement été de citer les genres principaux appartenant à chacune des divisions que nous allons établir.

## CORYMBIFÈRES.

## PREMIÈRE SECTION.

## Phoranthé au.

Point d'aigrette ou aigrette marginale.

## a. Fleurs radiées.

*Calendula*, L.; *Osteospermum*, L.; *Chrysanthemum*, L.; *Matricaria*, L.; *Hellis*, L.; *Conia*, Commers.

## b. Fleurs flosculeuses.

*Cotula*, L.; *Gymnostyles*, Juss.; *Tippia*, L.; *Ethulla*, L.; *Piqueria*, Cavanilles; *Flaveria*, Juss.; *Grangea*, Adans.; *Carpesium*, L.; *Balsamita*, Desf.; *Tanacetum*, L.; *Artemisia*, L.

† Aigrette formée d'écaillés ou d'arêtes.

## a. Fleurs flosculeuses.

*Calanthera*, Vent.; *Sphacanthus*, Burm.; *Ageratum*, L.; *Hymenopappus*, L'Hérit.; *Cephalophora*, Cavan.; *Adenostemma*, Forst.; *Stemodia*, Cavan.

## b. Fleurs radiées.

*Tagetes*, L.; *Schulzeria*, Roth; *Pectis*, L.; *Rottleria*, L'Hérit.; *Bellium*, L.; *Arctotis*, L.; *Gorteria*, L.; *Chabrea*, De Cand.; *Charantharia*, Ruiz. et Pav.; *Anisa*, L.; *Doronicum*, L.

†† Aigrette poilue ou plumose.

## a. Fleurs radiées.

*Inula*, L.; *Ruticaria*, Gaert.; *Helianthus*, L.; *Solidago*, L.; *Senecio*, L.; *Ci-*

*neraria*, L.; *Tussilago*, L.; *Oxhonna*, L.; *Erigeron*, L.

## g. Fleurs flosculeuses.

*Critonia*, Brown.; *Porophyllum*, Cavan.; *Coelastina*, Cavan.; *Eupatorium*, L.; *Chrysocoma*, L.; *Blaccharis*, L.; *Gnaphalium*, L.; *Culcitium*, Humb. et Bonpl.

## SECONDE SECTION.

## Phoranthé paléacé.

## † Aigrette poilue.

*Filago*, L.; *Micropus*, L.; *Balhisia*, Willd.; *Andromachia*, Bonpl.; *Rhantherium*, Desf.; *Athanasia*, L.; *Dumerilia*, D. C.; *Neuroloena*, Brown.; *Conyza*, L.

†† Aigrette formée de paillettes ou d'arêtes.

## a. Aigrette aristée.

*Melananthera*, Rich.; *Spilanthus*, L.; *Salmia*, Bidsen, L.; *Synedrella*, Gaertn.; *Verbesina*, L.; *Coreopsis*, L.; *Cosmos*, Cavan.; *Zinnia*, L.; *Didelta*, L'Hérit.; *Sanvitalia*, Cavan.; *Amellus*, L.

## b. Aigrette paléacée.

*Eclipta*, L.; *Galinsoga*, Cavan.; *Sylphium*, L.; *Helianthus*, Juss.; *Helenium*, L.; *Galardia*, Juss.; *Tithonia*, Desf.; *Persoonia*, Rich. in Mich.

††† Aigrette marginale ou nulle.

## a. Aigrette marginale.

*Rudbeckia*, L.; *Dahlia*, Desf.; *Wedelia*, Jacq.; *Chrysogonum*, L.; *Melampodium*, L.; *Bupthalmum*, L.; *Pascalia*, Ortega; *Anthemis*, L.; *Anatylus*, L.; *Pyrethrum*, Gaertner.

## b. Aigrette nulle.

*Santolina*, L.; *Millertia*, L.; *Blattimora*, L.; *Dysodium*, Persoon; *Alcina*, Cavan.; *Artemisia*, Rich.; *Soteroocarpus*, Jacq.; *Synedrella*, L.; *Unxia*, L.; *Polynisia*, L.; *Parrysonthea*, L.; *Knackia*, Adans.; *Ximenesia*, Cavan.; *Erioccephalus*, L.; *Achillaea*, L.; *Scirpium*, L.; *Parthenium*, L. (A. N.)

## CORYMBIOLÉ Corymbium.

**PHAN.** Genre établi par Linné qui le rapportait à sa Syngénésie Monogynie, mais que Willdenow, Rœmer et Schultes ont placé dans la Pentandrie Monogynie. Persoon, d'un autre côté, en a fait un genre de sa Syngénésie ségrégée. Adanson lui a donné, postérieurement à Linné, le nom de *Contarena*. Ses caractères, d'après Jussieu, sont : calice long, cylindrique, composé de deux folioles glumacées, conniventes, ne renfermant qu'une seule fleur flosculeuse, et muni à la base d'un calicule très-court et tétraphylle; stigmate bifide; akène oblong, velu, couronné par le calice urcéolé et paléacé. Si les auteurs sont loin de s'accorder sur la place que doit occuper ce genre dans le système sexuel, la détermination de ses affinités naturelles est peut-être encore moins résolue. De Jussieu, tout en convenant qu'il n'a point d'analogie parmi les Cinarocéphales, le place dans cette dernière tribu; mais, l'anomalie de ses caractères et la singularité de son port indiquent qu'on doit peut-être l'en éloigner. Attendons qu'une description complète et exacte éclaire nos recherches sur ce point important. On connaît quatre ou cinq espèces de ce genre, toutes indigènes du cap de Bonne-Espérance; ce sont des Plantes herbacées dont la tige, haute de trois à quatre décimètres, est sous-ligneuse; les feuilles radicales longues, alternes, graminiformes, roides et à plusieurs nervures; celles de la tige sont plus courtes et amplexicaules; les fleurs sont nombreuses, terminales et disposées en corymbes. Lamarck (Illustrat. t. 723, f. 1 et 2) en a très-bien figuré deux espèces: les *Corymbium scabrum*, L., et *C. glabrum*, L. (G.N.)

\* **CORYMBIS.** BOT. PHAN. C'est le nom d'une espèce d'Orchidée proposée par Du Petit-Thouars (Hist. des Orchidées des îles australes d'Afrique). Elle appartient à la sous-division que ce savant nomme *Corymborchis*, et au genre *Centrosis* de Swartz. Du Petit-Thouars l'a recueillie à l'île de

Mascartigne, et l'a figurée. (loc. cit. t. 37.) (G.N.)

\* **CORYMBITES.** BOT. PHAN. (Plin.) Probablement l'*Euphorbia Charafias*, L. V. EUPHORBE. (B.)

\* **CORYMBIUM.** BOT. PHAN. V. CORYMBIOLE.

\* **CORYMBORCHIS.** BOT. PHAN. Nom proposé par Du Petit-Thouars (Hist. des Orchidées des îles australes d'Afrique) pour une sous-division de la seconde section des Orchidées. Elle se compose d'une seule Plante qui paraît correspondre au genre *Centrosis* de Swartz. (G.N.)

**CORYNE.** *Coryna.* POLYR. Genre de l'ordre des Polypes nus de Cuvier et de Lamarck, établi par Bruguière d'après Gaertner; nommé Capsulaire par Ocker; Clava par Gmelin, et confondu avec les Hydres par Müller. Il offre un corps renflé en massue ou oviforme, charnu, à bouche terminale, supporté par un pédicule plus ou moins long et charnu, simple ou rametux; alors le Polype est composé de plusieurs individus; ce corps est couvert d'appendices épars et mobiliers. Ce genre, disent Bruguière, Bosc et Lamarck, est très-voisin des Hydres par ses rapports naturels. Il existe cependant une très-grande différence entre les Animaux de ces deux groupes; cette différence est telle que nous ne les avons réunis dans le même ordre que pour suivre l'opinion de nos célèbres professeurs. Dans le premier groupe, des tentacules environnent la bouche; dans le second, ces tentacules n'existent point; ou bien, n'étant plus situés autour de la bouche ou des parties qui en dépendent, on ne peut les regarder comme tels, quoique Gaertner dise expressément que ces appendices servent à saisir la proie et à l'approcher de la bouche; il faut, dans ce cas, que ces tentacules soient susceptibles de beaucoup de mouvements, ou que le corps soit éminemment contractile. Bosc, au contraire, pense que ces prétendus tentacules ne sont que la base des bourgeons qui doivent par la suite donner naissance à de nouveaux



dividus. Cette dernière hypothèse nous semble préférable, ne serait-ce que par les rapports de forme qui existent entre ces appendices et le Pouce parfait.

Les Corynes sont des Animaux resque microscopiques portés sur un pédicule long et très-souple qui leur permet toutes sortes de mouvemens; un bouché, très-apparente, est située au sommet du corps; l'un et l'autre se contractent, se dilatent et s'allongent d'une manière remarquable; les unes sont portées sur un pédicule simple, les autres forment un petit Arbuscule par leur réunion; le pédicule est uni, contourné ou onnelé; à la base du corps et des appendices se voient souvent des bourgeons graniformes qui se détachent à des époques inconnues pour produire d'autres Animaux. Les Corynes paraissent vivre dans la mer Atlantique, depuis l'équateur jusque dans la mer du Nord. On ne connaît pas celles des autres parties de l'Océan, qui ne doivent pas en être dépourvues d'après la dissémination des espèces décrites par les auteurs.

**CORYNE MULTICORNE**, *Coryna multicornis*, Lamk., Anim., II, p. 62, n. 3; Encycl. Méth., pl. 69, fig. 12, 3. Elle est très-petite, à pédicule court et simple, un peu en massue, terminée par un corps oblong couvert de nombreux appendices sétacés; elle a été trouvée sur des Hydrophytes de la mer Rouge.

**CORYNE ÉCAILLEUSE**, *Coryna squamata*, Bosc., II, p. 239; Encycl. Méthod., pl. 69, fig. 10, 11. Elle habite la mer du Nord et présente un pédicule simple, cylindrique, portant un corps ovale, terminé en pointe ou tronqué suivant la forme que l'Animal donne à sa bouche. Des bourgeons graniformes ou écailleux sont placés au bas du corps.

**CORYNE GLANDULEUSE**, *Coryna glandulosa*, Lamk., II, p. 62, n. 2; Encycl. Méth., pl. 69, fig. 15, 16. Cette espèce a été décrite par Gaertner auquel l'on doit la formation du genre Coryne. Elle n'est pas rare sur

les Hydrophytes et les Sertulaires du nord de la France, de l'Angleterre et de la Belgique.

Il faut ajouter à ces espèces la Coryne sétifère de l'Atlantique, Bosc., II, tab. 22, fig. 7. — Coryne amphore, Bosc., pl. 22, fig. 6. Sur le *Fucus natans* comme la précédente. — Coryne prolifique, Bosc., pl. 22, fig. 8. Sur le même *Fucus*. — La fig. 14, pl. 69 de l'Encycl. Méth., représente une Coryne que Lamarck n'a pas décrite. On pourrait la nommer *Coryna pistillaris*. Le *Clava parasitica* de Gmelin est regardé par Bosc comme une Coryne. Le *Conserva stipitata* de l'Engl. Botau. se rapproche de ce genre. (LAM., X.)

**\*CORYNE. BOT. CRYPT.** (*Champignons*.) Sous-genre établi parmi les Tremelles par Nées et adopté par Fries (*Syst. myc.* II, p. 216); il renferme plusieurs espèces dont la forme se rapproche de celle des Clavaires, mais que leur structure ne permet pas de séparer des Tremelles; elles sont droites, en forme de massue; les sporidies sont placées vers le sommet. La plupart des espèces de ce sous-genre avaient été placées par Persoon, dans sa Dissertation sur les Champignons claviformes, parmi les *Acrospermum*. Les espèces les plus connues sont : *Tremella sarcoides*, Pers., Fries, *Engl. Bot.* (*Tremella dubia*, Pers. *Syn.*; *Tremella amethystea*, Bull., tab. 499, fig. 5); *Tremella clavata*, Pers., *Myc. Eur.* T. I, p. 106. (AD., B.)

**CORYNÉPHORE**, *Corynephorus*. BOT. PHAN. Dans son Agrostographie, Palisot de Beauvois a proposé de séparer du genre *Aira* les espèces qui ont la valve externe de la glume entière au sommet, et portant à leur base une arête tordue dans son milieu, et renflée à son sommet, telles sont l'*Aira canescens* et l'*Aira articulata*, L.; mais ces différences nous semblent trop légères pour constituer un genre. V. *AIRA*. (A. R.)

**CORYNETE**, *Corynetes*. INS. Paykull (*Fauna suecica*, p. 55), et par suite Fabricius, ont désigné sous ce



nse candelabre. Les fleurs sont posées en panicules nombreuses, sortent des écailles du spadice, et sont formées d'épis cylindriques pendans. Il leur succède des baies hériques, grosses comme des Pommes de Reinette, lisses, vertes et succulentes, contenant un noyau dont on mande a une chair ferme.

Ce luxe de floraison que la nature ploie dans un Arbre remarquable par sa beauté, entre les Palmiers même, semble être une compensation à la stérilité dont elle l'a frappé pendant de longues années. Jusqu'à trente-cinq ans, le Coryphe ombraculifère ne fait que s'accroître en hauteur, et produire des couronnes de feuilles, qui font un effet magnifique, car leur grandeur est telle, qu'une seule entre elles peut couvrir et protéger quinze ou vingt personnes contre les injures du temps. Mais tout-à-coup l'exercition des fleurs se manifeste, et l'Arbre est orné de superbes spatules florifères, auxquels succèdent les fruits dont le nombre est quelquefois si prodigieux, qu'un seul Palmier en produit, dit-on, jusqu'à vingt mille; ces fruits continuent de mûrir durant quatorze mois. Ce phénomène ne se représente plus, l'Arbre reste épuisé par un tel excès générateur, et sa vie demeure languissante, jusqu'à ce qu'enfin la mort succède à cet excès de fécondité.

Le Coryphe ombraculifère croît dans les endroits montueux des Indes Orientales, à la côte du Malabar et à Ceylan. Rai l'a mentionné dans son Histoire des Plantes, n. 1367; Rhéedé (*Hort. Malab.* III, pl. 1, t. 1 à 12) l'a décrit et figuré sous le nom de *Codapanna*, et on lui a donné aussi le nom vulgaire de Talipot de Ceylan. Nous avons dit que ses feuilles simulaient de vastes parasols, sous lesquels beaucoup de personnes pouvaient se mettre à l'abri; les Indiens ont en cela imité la nature; ils font avec ces feuilles des tentes et des parapluies, et ils s'en servent aussi pour couvrir leurs habitations. Les livres des Malais en sont com-

posés : leur épiderme supérieur, pénétré par la pointe d'un stylet de fer, avec lequel ces peuples tracent leurs caractères, conserve des empreintes ineffaçables. On sait avec les noyaux de ces fruits, tournés, polis et peints en rouge, des colliers qui imitent le Corail. Enfin, il suit des spatules, lorsqu'on les coupe, un suc qui, desséché au soleil, devient un vomitif très-violent, au moyen duquel les matrones du pays expulsent de la matrice le fœtus mort, et dont elles font souvent un usage condamnable.

Ce n'est pas ici le lieu de décrire les autres espèces de *Corypha*, malgré l'intérêt que présentent des Arbres aussi remarquables. Nous nous bornerons à avertir que le *Corypha minor*, Jacq., forme le genre *Sabal* d'Adanson, par ce mot, et qu'on trouve dans le bel ouvrage sur les Plantes équinoxiales de Humboldt et Bonpland, publié par C. Kunth, la description de plusieurs espèces de Coryphes, dont quelques-unes offrent des particularités assez piquantes. (G. N.)

\* CORYPHÉE. ois. Espèce du genre Sylvie, *Sylvia Coryphæus*, Vieill., Levaill. Ois. d'Afr. pl. 120. V. SYLVIE. (D. Z.)

CORYPHÈNE. pois. Pour Coryphène. V. ce mot.

CORYPHÉNOÏDE. *Coryphenoïdes*. pois. V. CORYPHÈNE et CORYPHÉNOÏDE. (B.)

\* CORYPHINÉES. *Coryphinæ*. BOT. PHAN. Nom de la première section des Palmiers, établie par C. Kunth (*in Humb. et Bonpl. Nova Genera et Spec. Plant. equin.* II, l. 1, p. 203), et caractérisée par ses télobes ou trilobes monospermes dont deux avortent le plus souvent. Elle comprend les genres *Corypha*, *Phoenix*, *Moravia*, *Livistonia*, *Chamærops*, etc. (G. N.)

CORYPHOÈNE. *Coryphæna*. pois. Genre de l'ordre des Thoraciques de Linné, placé par Cuvier dans celui des

Après les rayons, familles des Scombroïdes, de la division des ceux qui ont un seul dorsale et des dents en carde ou en scie; enfin rangé par Dinné, il y a parmi les Lophiodontes. Ses caractères sont : dorsale naissant sur la tête, qui est carade, et comme tranchante en dessus; opercules lisses; pas de queue à la queue; corps ovale, allongé, comprimé et revêtu de fort petites écailles. Les Coryphœnes peuvent être mis au rang des plus brillans habitans de la mer. Presque tous habitent les hauts parages, et l'un d'eux la Méditerranée. « Il faut, dit Bosc, avoir vu ces Poissons suivre les vaisseaux en troupes plus ou moins nombreuses, pour se former une idée de leur beauté. En effet, lorsqu'ils nagent à la surface de la mer, et surtout lorsque le soleil luit, leur corps brille de l'éclat de l'or uni à celui des saphirs, des émeraudes ou des topazes, et frappe les yeux de mille nuances plus resplendissantes les unes que les autres, selon l'aspect sous lequel ces Poissons se présentent. La vivacité, la variété et la grâce de leurs mouvemens ajoutent encore au magnifique assortiment de couleurs dont ils sont parés. C'est un spectacle qu'on ne peut se lasser d'admirer, lorsque, isolé au milieu des mers, le voyageur rencontre pour la première fois ces Poissons. » Nous avons, comme Bosc, admiré au plein mer les Coryphœnes nageant en troupes autour des vaisseaux et faisant jaillir du sein des flots ces reflets de lapis, d'or, d'émeraude et d'argent, qui leur valurent une si grande célébrité parmi les marins.

La beauté de ces Poissons ayant frappé tous les regards, on s'est trop peu arrêté à leurs formes; il a suffi de mentionner des reflets dont on était ébloui, et l'on s'est moins occupé de leurs caractères; ces reflets disparaissant dès que l'Animal meurt, trop fugitifs pour être conservés sur leurs dépouilles préparées, nous pensons qu'il en résulte quelque confusion sur l'histoire spécifique des Coryphœnes, dont il existe plus d'espèces, qu'on ne le suppose communément.

Nous avons nous-mêmes été induits en erreur, quand nous avons cru reconnaître un Coryphœne déjà décrit dans l'espèce que nous observâmes dans le grand Océan équatorial, et qui, mieux examinée depuis par Draparnaud, nous avait été dédiée dans une monographie demeurée inédite par la mort de cet ami.

Les Coryphœnes sont des Poissons voraces, hardis et très-agiles; ils paraissent à peine se mouvoir dans les flots qu'ils sillonnent, et l'on pourrait les y croire poussés par une force de projection des plus irrésistibles, si l'on ne découvrait dans la vélocité de leur marche un mouvement d'ondulation continuel sur la longue dorsale dont ils sont ornés; mouvement qui contribue à multiplier les reflets qui jaillissent de leur surface. Ils poursuivent avec acharnement les Poissons volans, et voyagent par bandes à la suite des troupes que forment ces petits Animaux, se renvoyant pour ainsi dire ceux-ci, comme les chasseurs lancent le gibier qu'ils poursuivent avec leurs meutes. L'Exocet qui n'est pas dévoré par le Coryphœne dont la pourpâte le déterminait à s'élancer de l'Océan, l'est par celui près duquel il retombe, lorsque l'Oiseau vorace ne se saisit pas de lui à son passage dans les airs. Les Coryphœnes ne mâchent pas, ils avalent; et l'on a trouvé tout entiers dans leur estomac des grands Poissons volans de six à huit pouces. Telle est la voracité des Coryphœnes, qu'engloutissant tous les objets qui tombent des navires et qui peuvent être admis par leur bouche, on a rencontré jusqu'à de grands clous dans leur ventre. On les prend fort aisément à la seine, et lorsqu'ils se rapprochent des côtes pour jeter leur frai, la ligne est encore une excellente manière de s'en procurer. Il suffit de disposer un bâton auquel on fixe deux petites plumes avec du fil, pour imiter, tant bien que mal, les ailes d'un Exocet, et laisser pendre l'hameçon en guise de queue; et de faire filer ce grossier appât à l'arrière du

nent, pour voir, dès que le mouvement du tarage fait que le bouillissant élançé hors de l'eau, les Coryphènes se disputent à qui doit mourir; s'en avoient vu manquant le bouillant et n'atteignant que le fer aigu, laisser une partie de leur mâchoire, continuant à nager, revenir à la nage, tandis que la mâchoire échappée servait d'amorce à quelque Coryphène qui s'y prenait.

Le genre de pêche n'est pas seulement divertissant, il est fort utile à d'ouïr, lorsque depuis long-temps on vit que de viande salée, d'adonces, de légumes vermoulus, ou de filets malades, la chair fraîche et saine d'un Poisson bon à manger, vient faire diversion à la monotonie de la mauvaise chère. Les Coryphènes ont la chair excellente fort saine. On les accommode de diverses manières; mais on s'en fait une bonne bœuf, peut-être, comme on observe fort judicieusement Bosc, parce que l'on en prend trop, quand on commence à les pêcher, après avoir fait une longue abstinence ou beaucoup de tristes repas.

Le genre Coryphène, tel que Linnaeus l'avait établi, a été divisé en plusieurs genres dont le principal, auquel on a conservé l'ancien nom tiré du grec, se subdivise de la manière suivante, et renferme une quinzaine d'espèces que Draparnaud eût portées dix-huit dans la monographie dont on a été question.

† *CENTROLOPUS*. Ils ont en avant de la dorsale des préminences épineuses, mais tellement courtes qu'elles ne sentent à peine quand on presse la peau avec le doigt; on n'y voit d'ailleurs ni carène à la queue, ni épines nausoires; leur corps est comprimé, leurs écailles menues; leur tête oblongue et obtuse, et les dents fines sur une seule rangée. Lacépède avait formé de ces Coryphènes un genre que Cuvier n'a pas cru devoir adopter.

Le *POMPILE*, Lac., Poiss. T. III, p. 198; *Coryphæna Pompilus*, L., Gmel., *Syst. Nat.*, XIII, t. I, p. 193;

le *Lumpage*, Encycl. Poiss., p. 60, pl. 34, fig. 139; *Centrolophus niger*, Lac., Poiss. T. IV, p. 442, pl. 10, f. 2 (par double emploi). Cette espèce connue des anciens, qui tire son nom d'un mot signifiant pompe et cortège, parce que ces anciens avaient remarqué le goût qu'ont les Pompiles à suivre les vaisseaux, se trouve dans l'Océan et dans la Méditerranée. Il dépasse un pied de longueur; sa forme est postérieurement un peu acuminée; la surface de son corps est grasse et onctueuse au toucher; son dos est marqué de bandes jaunâtres; une raie dorée en forme de sourcils surmonte ses yeux, et lui mérita l'un des noms vulgaires qu'il porte parmi les pêcheurs; la mâchoire inférieure est plus longue que la supérieure, et la caudale un peu moins fourchue que dans la plupart des autres espèces. D. 343, p. 14, v. 6, A. 254, C. 16.

Le *CORYPHÆNA FASCIOлата* de Pallas, Gmel., *Syst. Nat.* XIII, t. I, p. 1293; l'*Ondoyante*, Encycl. Poiss., p. 60, pl. 34, fig. 129, est encore une espèce de *Centrolophus* dont les rayons des nageoires sont : B. 6, D. 54, P. 19, V. 5, A. 27, C. 17.

†† *LEPTOPODES*, Cuv. (Règn. Anim. T. XI, p. 328); *Oligopodes*, Risso. Ils ont, comme les *Centrolophes*, des préminences dorsales sensibles seulement au doigt; mais leur dorsale et leur anale s'unissent à la caudale qui finit en pointe, et il n'y a qu'un rayon aux ventrales. On n'en connaît qu'une espèce.

Le *LEPTOPODE NOIR*, *Oligopodus ater*, Risso, pl. 11, fig. 41. Ce petit Poisson, découvert dans la mer de Nice, faible et timide, se tient toute l'année dans les plus grandes profondeurs des eaux, et n'approche du rivage que vers le mois d'août pour y déposer des œufs d'un bleu foncé liés par un réseau blanc; sa chair, est molle et d'une saveur fade; son museau est arrondi; ses yeux petits, noirâtres, avec l'iris doré; sa taille est de six ponce, et sa teinte générale d'un noir

d'écaille, avec de beaux reflets d'un rouge violet.

†† **CORYPHÆNA**, PROPREMENT DITE. Ils ont leur belle dorsale étendue depuis la nuque jusqu'au voisinage de la caudale, dont elle est cependant toujours distincte. Cette caudale est fourchue, rectiligne, arrondie ou imbécillée.

a. *Caudale fourchue.*

Le **HIPPURUS**, *Coryphæna Hippurus*, L., Gmel., *Syst. Nat.* XIII, t. 1, p. 1189; Bloch, pl. 174; le Dauphin, *Encycl. Pois.*, p. 59, pl. 33, f. 125. Cette belle espèce est la plus grande de toutes; elle atteint jusqu'à cinq pieds de long; elle se trouve dans l'Océan et dans la Méditerranée. Sa longue dorsale est à peu près parallèle au corps, et l'angle que forme la fourche de sa queue très-aigu. Son dos est d'un vert de mer, parsemé de taches oranges; le ventre est argenté; la ligne latérale jaunée; la dorsale, qui est d'un bleu céleste, a ses rayons couleur d'or; la caudale est environnée d'une teinte verte; les autres nageoires sont jaunes. Ce Poisson est celui que les peintres ont l'habitude de représenter, en le défigurant, comme le véritable Dauphin qui, placé sur les enseignes ainsi que parmi les constellations célestes, était devenu l'in-signe armorial d'une province dont le titre est porté par l'héritier de la couronne de France. Les marins supposent qu'il porte une couronne sur la tête, et prétendent qu'il est le mâle de l'espèce suivante. B. 710, D. 60, P. 19-21, V. 6, A. 26-27, C. 18-20.

Le **DORADON**, *Coryphæna æquifolia*, L., Gmel., *Syst. Nat.* XIII, t. 1, p. 1190; *Encycl. Pois.*, p. 50 (sans figure); *Coryphæna aurata*, Lac., *Pois. III*, p. 185, pl. 10, fig. 2. Cette belle espèce que Linné et Cuvier pensent être la même que la précédente, en est cependant parfaitement distincte, ainsi qu'on en peut juger par la figure très-exacte qu'en a donnée Plumier, et que Lacépède a fait graver dans son Histoire des Poissons. Ici la dorsale est plus courte, quoique toujours parallèle au

corps. Cette nageoire est d'un bleu profond, rayonnée de jaunes, mais les rayons de la caudale sont les mêmes, et profondément anguleux et obtus. La queue se termine par une dent de lion pointue. Le reste de ce Poisson est varié des plus riches couleurs; ces teintes sont disposées en la plus suave harmonie. Sa taille est moins grande que celle de l'Hippurus, ce qui sert encore à le distinguer de l'espèce précédente dont les mâles qui l'appellent plus particulièrement Dorade, se disent être la femelle. Le Poisson est des mers de l'Inde, et de son, fort rare. C. 61, D. 35, P. 19, V. 6, A. 23, C. 20.

**CONTRIBUTION DE BORY DE SAINT-VINCENT.** Bory, *Draps*, t. III, p. 116, pl. 10, f. 3, sous le titre de *Hippurus* (planches de ce Poisson). Il n'est pas facile de comparer le dessin de ce Poisson vivant, pour se convaincre qu'il appartient à une espèce très-différente de toutes celles qui avaient été jusqu'ici décrites. Il pourrait bien être le *Guaracapema* de Marcgraf (*Sil.*, p. 166). Nous avons, dans des temps où nous découvrimus cette nouvelle espèce, hésité sur l'identité et en la donnant comme l'Hippurus, auteurs, nous y trouvions des différences. Cette espèce, peut-être la plus belle de tous les Poissons de la mer, tient le milieu entre le Doradon et le Chrysure. Comme ce dernier, sa dorsale commence bien plus en avant, loin d'être parallèle au corps, c'est-à-dire pas plus large en avant qu'en arrière, elle est très-paillante sur le ventre, disposée en crête, et va toujours diminuant vers la queue. Elle est d'un beau bleu de lapis-lazuli, variée de lignes obliques, irrégulièrement parallèles, d'un bleu d'indigo beaucoup plus foncé. Le dessus de sa tête est d'un beau brun qui va se fondant se mariant avec des teintes d'orange de sur le dos; les flancs sont d'un bleu que la queue, couleur d'or, avec des teintes grisâtres et le ventre argentin, le reste des nageoires est jaune. La

lale est si profondément biffée, on dirait que ces deux portions sont implantées sur l'extrémité de l'anal et sans rapport entre elles. L'anal est parallèle au corps, et ne s'élève point intérieurement des os plus longs, comme dans le radon ou dans le Chrysure. La nageoire du Poisson, bien plus ovoïde que celle des congénères et renflée au milieu, rappelle celle de la Sole d'autres Pleuronectes voisins. Cette espèce n'atteint guère plus de dix pieds de long; sa chair est fort dure. Nous l'avons pêchée dans l'océan atlantique intertropical. B. 6, 57, 64, V. 6, P. 20, A. 25, 26.

Le *CHRYSURE*, *Coryphæna Chrysura*, Lac., Pois. T. III, p. 186, et pl. 2, pl. 18, fig. 2. Cette belle espèce a été découverte dans la mer du Sud par Commerson, et gravée par Lépède, d'après le dessin de ce naturaliste. Elle a le corps très-allongé, non ovoïde, comme dans l'espèce précédente; l'anal présente en avant quelques rayons plus longs que les postérieurs, et la queue fourchue est pas disposée en large croissant. Les belles ténues de cet Animal sont haussées par des taches bleues, lenticulaires, disposées au hasard et assez nombreuses; sa queue brille du plus grand éclat et de la teinte de l'or; la gorge et la poitrine ont la couleur de l'argent; le dos d'un bleu bleuté; la dorsale tachetée de jaune, et les pectorales ont la teinte de l'air. La chair des Chysures est exquise. Commerson trouva son estomac rempli de petits Poissons volans. B. 6, 58, P. 20, V. 5, A. 28, c. 5.

Le *SCOMBÉROÏDE*, *Coryphæna Scomberoides*, Lac., Pois. III, p. 192; *C. argentea*, Commers. Mss., et le *Coryphæne jaune*, *Coryphæna lutea*, Schneider, des mers du Sud et de l'équateur, appartiennent encore à cette première division des *Coryphænes*.

β. *Caudale rectiligne.*

Le *RECHONÉ*, Encycl. Poiss., p. 51 (sans figure); le *Camus*, Lacép., Pois. T. III, p. 207; *Coryphæna*

(Sima), Gmel., Syst. Nat. XII, T. 1, p. 1194. Poisson des mers d'Asie. B. 32, P. 16, V. 5, A. 9-16, c. 45.

γ. *Caudale arrondie.*

Le *CHINOIS*, *Coryphæna chinensis*, Lac., Pois. T. III, p. 208. Cette espèce a été décrite d'après une peinture chinoise, de sorte qu'on ne connaît ni les habitudes ni le nombre des rayons des nageoires de ce Poisson dont l'existence n'est pas même suffisamment garantie.

δ. *Caudale lancéolée.*

Le *Coryphæna acuta*, L., Gmel., Syst. Nat. XII, t. 1, p. 1194. Espèce peu connue des mers d'Asie, et la seule dont se compose jusqu'ici cette section. B. 45, P. 16, V. 6, A. 9-16, c. 45.

Les *Coryphæna viridis* et *gobius* sont des espèces si imparfaitement décrites, que la forme de leur queue n'est pas même mentionnée, de sorte qu'on ne sait dans quelle section les ranger.

Les *Coryphæna Navacula*, *dactyla*, *cœrulea*, *Psittacus* et *Albinea* de Linné, ont été détachés de ce genre pour former celui auquel Cuvier a donné le nom de *Rason*. K. 20.

Le *Coryphæna Plumieri*, de Bloch, n'est qu'un *Labre*, et le *rufus* est un *Macroure*.

Il paraît que les *Coryphænes* se rencontrent à l'état fossile. M. Faujas Saint-Fond (Ann. Mus. N. pl. 24) a fait graver l'empreinte d'un Poisson trouvé dans le calcaire de Nanterre près Paris, qui paraît avoir dû être fort voisin du *Chrysure*.

+++ *CORYPHENOÏDES*. Ils diffèrent des *Coryphænes* proprement dits par leur tête encore plus comprimée et tranchante, assez loin de laquelle commence la dorsale beaucoup plus longue que dans les espèces précédentes. L'ouverture des branchies est peu distincte.

L'*HOULTUYNIEN*, Lacép., Pois. III, p. 220; *Coryphæna Branchiostega*, L., Gmel., Syst. Nat. XII, t. 1, p. 1194. Espèce peu connue d'après ce qu'en dit Houttuyn, qui seul l'a mentionnée, et qui la dit des mers du Japon. Ce Poisson n'a guère plus de

six poudres de longueur; sa couleur tire sur le jaune. D. 24, P. 14, V. 6, A. 10, U. 16. Cuvier semble regarder cette espèce comme douteuse.

++++ OLIGOROPES. Ils ont une énorme dorsale et une anale non moins étendue. Cette seconde est si longue qu'elle égale presque la première en grandeur, et détermine l'ouverture de l'anus presque sous la gorge. Les ventrales sont extrêmement petites, formées d'un seul rayon, placées en avant des pectorales. Le corps est fort comprimé; les dents disposées sur un seul rang en haut, et sur deux en bas. Leurs écailles sont plus grandes que celles des autres Coryphœnes, et légèrement épineuses. On n'en connaît qu'une espèce.

L'ÉVENTAIL, Encycl. Poiss., p. 60, pl. 54, fig. 128; *Coryphæna velifera*, Gmel., Syst. Nat., t. 1, p. 1193. Ce beau et singulier Poisson des mers de l'Inde a son corps fort comprimé et oblong, d'une teinte brune, couvert de points blancs, ainsi que les nageoires qui sont prodigieusement grandes, tachetées, et donnent au Poisson la forme générale d'un losange dont les angles seraient arrondis. B. 7, D. 55, P. 14, V. 1, A. 51, C. 22. (B.)

CORYPHŒNOIDES. *Coryphænoides*. POISS. Genre établi par Lacépède, qui n'a pas même été conservé par Cuvier comme sous-genre, mais que nous avons cru néanmoins devoir respecter à l'article CORYPHŒNE. N. co. mot. (B.)

CORYSANTHES. *Coryzanthes*. BOT. PHAN. R. Brown, dans son Prodrôme de la Flore de la Nouvelle-Hollande, a formé ce nouveau genre dans la famille des Orchidées pour trois petites Plantes qu'il avait recueillies sur les côtes de la Nouvelle-Hollande. Voici le caractère qu'il lui assigne: son calice est inégal et comme à deux lèvres; le casque est grand et concave; le labelle est très-grand, également concave, et cache la lèvre inférieure qui est fort petite et à quatre divisions; l'anthère est placée au

sommet du gynostème; elle est persistante, s'ouvre en deux valves incomplètes, et renferme, dans sa loge qui est simple, quatre masses de pollen pulvérulentes.

Les Plantes dont ce genre se compose sont petites, herbacées, et croissent dans les lieux ombragés; leur racine est munie d'un petit tubercule arrondi; leur tige est simple, grêle et parfaitement glabre; elle porte une seule feuille, et se termine par une fleur unique, tantôt droite, tantôt penchée, ayant assez de ressemblance extérieure avec les fleurs du genre *Cypripedium*.

Brown en a figuré et décrit une espèce (*Gener. Remarks*, p. 78, t. 10) avec le soin et l'exactitude qui distinguent cet habile observateur: c'est le *Coryzanthes fimbriata* déjà mentionné par lui dans son Prodrôme, p. 328. Cette petite Plante, remarquable par son labelle cilié sur son bord, est assez commune aux environs de la ville de Sydney dans la colonie de Port-Jackson.

Le genre *Corybas* de Salisbury (*Paradis*, t. 83) paraît devoir être réuni au genre *Coryzanthes* de Brown. (A.R.)

CORYSTE. *Corystes*. ENTOM. Genre de l'ordre des Décapodes, famille des Brachyures, section des Orbiculaires, établi par Latreille et ayant, suivant lui, pour caractères: test ovale; antennes extérieures longues, avancées, ciliées; second article des pieds-mâchoires extérieurs allongé, rétréci en pointe obtuse à son sommet, avec une échancrure au-dessous; yeux écartés, situés à l'extrémité d'un pélicule de longueur moyenne, presque cylindrique, un peu courbe; longueur des trois premières paires de pieds diminuant progressivement; les deux antérieurs beaucoup plus longs dans les mâles que dans les femelles. Les *Corystes* ont de grands rapports avec les *Leucosies* et les *Thies*; ils s'éloignent des premiers par la longueur de leurs antennes, l'allongement du pédoncule des yeux; la forme du second article des pieds-mâchoires, la cavité



ovale qui est carrée, et par leur test qui est moins bombé. Cette partie du corps est oblongue, ovale, tronquée postérieurement. Les régions indiquées par Desmarest y sont légèrement marquées; et représentent dans certains individus une sorte de figure humaine grimacée; les branchiales ou latérales sont très-allongées; la cordiale manque. Les *Corystes* diffèrent des *Thies* par des caractères analogues, à l'exception que leur carapace est plus oblongue; l'abdomen, nommé improprement queue, est composé de sept anneaux dans les femelles, et seulement de cinq dans les mâles; mais ce petit nombre est évidemment dû à la soudure de deux d'entre eux; quoiqu'il en soit, les deux premiers segments sont plus larges que les suivants. L'abdomen des femelles est presque ovale; celui des mâles a la forme d'un triangle allongé.

On ne connaît encore qu'une espèce propre à ce genre, le *CORYSTE DENTÉ*, *Corystes dentata* de Latreille, ou l'*Albunea dentata* de Fabricius (*Suppl.*, p. 398), qui est le même que le *Corystes cassivelaunus* de Leach (*Malacost. Brit.*, fasc. 6, tab. 1). Il a été figuré par Pennant (*Brit. Zool.* T. IV, tab. 7), ainsi que par Herbst qui l'a nommé *Cancer personatus*. On le rencontre sur les côtes d'Angleterre; d'Orbigny l'a souvent pêché dans le golfe de Gascogne, sur une assez grande étendue en mer. Il n'est pas certain que ce genre se trouve à l'état fossile; cependant Desmarest (*Hist. des Crust. foss.*, p. 125) pense qu'on pourrait y rapporter une carapace ellipsoïde, dentelée sur ses bords latéraux antérieurs, découverte dans la craie d'Angleterre par Mantell.

(AUD.)

**CORYSTON.** POIS. Genre formé par Klein pour des Poissons à grosse tête, il n'a pas été conservé, et les espèces en ont été réparties parmi les Gallyonimes, les Uranoscopes, les Trachinès, les Cottés, les Trigles, etc.

V. tous ces mots. (B.)

**CORYTHAIX.** OIS. (Illiger.) Syn. du Touraco. V. ce mot. (B.)

**CORYTHUS.** OIS. Nom scientifique du genre Dur-Bec établi par Cuvier; et qui comprend quelques Gracbees. V. ce mot. Il est tiré de *Corythos* qui, chez les Grecs, désignait un Oiseau qui n'est plus connu. (B.)

**CORYZA.** BOT. PHAN. (Tournefort.) Syn. de *Stoebe africana*, L. V. STOEBE. (B.)

**CORZA.** MAR. La femelle du Baïn dans la péninsule Ibérique. (B.)

**COS.** OIS. Syn. hébreu de la Huppe, *Upupa Epops*, L. V. HUPPE. (B.)

**COS.** MIN. Chez les anciens la Pierre à aiguiser. V. PSAMMITE. (B.)

\* **COSA - COSAMAGHO.** BOT. PHAN. (J. Jussieu.) Le *Pavonia spinifera* au Pérou. (B.)

**COSAIRE.** COSARIA. BOT. PHAN. Pour Kosaria. V. ce mot. (B.)

**COSALON.** BOT. PHAN. (Dioscoride.) Une Sauge. (B.)

\* **COSARIA.** BOT. PHAN. Syn. de *Lysimachia vulgaris* de Frioul. (B.)

**COSATEC OU KOSATEC.** BOT. PHAN. Syn. d'*Iris germanica* dans les dialectes esclavons. (B.)

**COSCAQUAUTLE.** OIS. Syn. mexicain du Catharté *Aura*, *Kultur Aura*, L. V. CATHARTE. (DR..Z.)

\* **COSCINIUM.** BOT. PHAN. Dans le treizième volume des Transactions de la Société Linnéenne de Londres, le docteur Colebrooke fait, sous ce nom, un genre nouveau du *Menispermum fenestratum* de Gaertner (*de Fruct.* T. 1, p. 219, t. 46, f. 5). Le caractère distinctif de ce genre consiste surtout dans ses échantons au nombre de six seulement et monadelphes. Cette Plante est sarmenteuse, grimpante et originaire de Ceylan. V. MENISPERME. (AUR.)

**COSCINODON.** BOT. CHYR. (*Mousses*.) Ce genre, séparé des *Heisia* par Sprengel et par Bridel, en diffère par un caractère trop léger et trop peu constant pour qu'on puisse l'admettre; la seule différence consiste dans les dents de péristome qui présentent, dans les espèces que Bridel range dans son genre *Coscinodon*,

taire série de petits trous ; du reste la structure de la capsule et la forme de la queue est la même que celle des vrais *Weissia*. Le port des espèces est aussi le même ; ainsi le *Cosc. nudum* a trop d'analogie avec le *Weissia nigra*, et le *Cosc. lanceolatum* avec les *Weissia Starkeana* et *affinis*, pour qu'on puisse les placer dans des genres différens. Bridel lui-même avait regardé long-temps cette dernière espèce comme une simple variété du *Weissia lanceolatum* ou *Cocciglossa lanceolatum*. V. WEISSIA.

**COSCOJA.** BOT. PHAN. Et non *Coscoja*. On donne en Espagne ce nom qui paraît dériver du *Quisquilius* de Plin., au *Quercus coccifera*, quand il est chargé de Kermès. V. ce mot et CHÊNE. (B.)

**COSCOROBA.** OIS. Espèce du genre Canard, division des Oies, *Anas Coscoroba*, Linn. V. CANARD.

**COSQUE.** NAM. (Coréal.) Syn. de *Pearl*. V. COCHON. (B.)

**COSH.** MAM. L'un des noms africains du Buffle. V. BOUF. (B.)

**COSLORDILOS.** REPT. SAUR. (Pernamb.) Syn. de *Saellion* dans le Levant. (B.)

**COSMÉE.** *Cosmea*. BOT. PHAN. Ce mot, substitué par Willdenow à celui de *Cosmos*, donné à un genre de Synanthérées par Cavanilles, est aujourd'hui rejeté en faveur du nom primitif. V. COSMOS. (G.N.)

**COSMELIE.** *Cosmelia*. BOT. PHAN. Genre de la famille des Epacridées de R. Brown, établi par cet illustre botaniste, et ainsi caractérisé : calice foliacé ; corolle tubuleuse, portant et renfermant les étamines dont les anthères sont adnées aux sommets ciliés des filets ; cinq petites écailles hypogynes ; fruit capsulaire à placentas adnés à une colonne centrale, et libris à chaque extrémité.

La *Cosmelie rouge*, *Cosmelia rubra*, R. Brown, unique espèce du genre, est un Arbrisseau des marais

(qui croît en abondance dans l'Inde)

des côtes méridionales de la Nouvelle-Hollande, élevé, muni de branches nombreuses et dépouillées sans traces de cicatrices, à feuilles demi-embrassantes et cuculliformes à la base. Les fleurs, d'un rouge vif, sont terminales au sommet des branches latérales, solitaires et penchées. (G.N.)

**COSMIBUENA.** BOT. PHAN. Ruiz et Pavon ont successivement proposé deux genres sous ce nom ; mais l'un rentre dans le genre *Hirtella*, c'est celui qu'ils avaient établi dans leur Prodrome. L'autre ne diffère nullement du genre *Cinchona*. V. QUINA. (A.B.)

**COSMIE.** *Cosmia*. BOT. PHAN (Dombey.) V. TALIN. (B.)

**COSMORO.** OIS. Syn. portugais de l'Ara rouge, *Psittacus Macao*, L. V. ARA. (DR.Z.)

**COSMOS.** BOT. PHAN. Famille des Synanthérées, Corymbifères de Jussieu, section des Hélianthées de Kunth et des Coréopsidées de Cassini, Syngénésie frustranée, L. Ce genre, fondé par Cavanilles (*Icones*, 1, p. 10), a été adopté par Willdenow et Persoon qui, lui ajoutant quelques espèces, ont changé sans nécessité son nom en ceux de *Cosmea* et de *Cosmus*. Rétablissant dans sa pureté le nom donné par son auteur, C. Kunth (*Nova Genera et Spec. Plantar. aquilnoct.* 4, p. 239), exprime ainsi les caractères de ce genre : involucre double, l'un et l'autre à huit divisions profondes ; réceptacle plane paléacé ; fleurons du disque tubuleux et hermaphrodites, ceux de la circonférence, au nombre de huit environ, ligulés et stériles ; akenes tétragones amincis au sommet et surmontés de deux ou quatre barbes persistantes et couvertes de poils dirigés en arrière. De grands rapports de structure unissent le *Cosmos* au *Coreopsis*, et cependant ce sont deux genres bien distincts. Le *Cosmos bipinnatus*, espèce qui a servi de type au genre, et que l'on cultive au Jardin du Roi à Paris, a un aspect très-différent des *Coreopsis* de son genre. Peut-être que les espèces ajoutées

à ce genre, par Willdenow, ne le sont pas.

par Willdenow, telles que les *C. sulphureus* et *C. parviflorus*, qui étaient des *Coreopsis* de Jacquin, se distinguent aussi, de ce dernier genre, par le port. Nous avons sous les yeux la figure du *Cosmos chrysanthemifolius* de Kunth, dont l'aspect rappelle un peu celui du *C. bipinnatus*, quoique la Plante soit naïve en comparaison de cette dernière. Les caractères assignés par les auteurs à ces deux genres, ne sont pourtant pas tranchés, car Willdenow et Persoon, tout en avertissant que la seule différence consiste dans la stricture de l'involucre, n'expriment cette différence que par la distinction des folioles de celui-ci dans le *Coreopsis*, ou, en d'autres termes, que par son involucre absolument polyphyllé. Kunth ne s'est pas contenté de ce caractère unique et si léger, il y a ajouté, pour le *Cosmos*, celui des barbes ou aigrettes à poils rebroussés. Il a donné des descriptions extrêmement soignées de huit espèces, parmi lesquelles se trouvent deux de celles anciennement connues, savoir : le *C. bipinnatus* et le *C. parviflorus*. Ce sont des Plantes herbacées à branches et à feuilles opposées, très-incisées et décomposées. Les fleurs sont terminales ou pédonculées, elles ont des rayons le plus souvent de couleur rose ou pourprée, ce en quoi les *Cosmos* diffèrent encore des *Coreopsis* où les rayons sont presque toujours jaunes. Elles sont exclusivement indigènes du Mexique et des vastes contrées du nord de l'Amérique méridionale. En parlant du *C. bipinnatus*, Kunth assure que sa Plante est bien identique avec celle cultivée sous ce nom au Jardin des Plantes à Paris, et il observe qu'elle ne diffère du *Cosm. bipinnatus* de Cavanilles, que par ses akènes chauves. D'après cela, il serait tenté de réunir cette Plante au *Georgina* ou *Dahlia*. La réalité de ce rapprochement nous semble en effet justifiée et par le port et par les caractères. *GEORGINE.* (G. N.)

**COSMUS.** BOT. PHAN. Persoon n'a doptant ni le mot *Cosmos* imposé à

un genre de *Synanthérées* par Cavanilles, ni son changement en celui de *Cosmea* par Willdenow, a latinisé ainsi de son côté ce nom générique. Cependant la terminaison en *os* étant d'ailleurs admise pour d'autres genres, on se sert aujourd'hui de l'ancien nom. *V. Cosmos.* (G. N.)

**COSQUAUMITI.** ou. Même chose que *Coscanumiti.* *K.* ce mot. (G. N.)

**COSSAO.** ou. Même chose que *Corrac.* *K.* ce mot. (G. N.)

**COSSARD ET COSSARDE.** ou. Syn. vulgaires des Buses. *V. Fanon.* (G. N.)

**COSSE.** BOT. PHAN. Syn. vulgaire de Légume. *V.* ce mot. (G. N.)

**COSSIGNIE.** *Cossignia* ou *Cossinia*. BOT. PHAN. Genre de la famille des Sapindacées et de l'Hexandrie Monogynie, L., établi par Commerson en l'honneur de son ami Cossigny, auteur d'un Traité sur l'Indigoterie et l'un des cultivateurs les plus zélés de l'Île-de-France. Jussieu (*Genera Plantarum*, p. 248) et Lamarck (*Encycl. méth.*) l'ont caractérisé de la manière suivante : calice persistant, divisé profondément en cinq parties ovales, concaves et cotonneuses en dehors; quatre pétales, rarement cinq, ongiculés à la base; six étamines; ovaire supérieur obtusément trigone, surmonté d'un style court et d'un stigmate entier; capsule, ovée, cotonneuse, trigone, s'ouvrant par le sommet en trois loges à deux ou trois graines globuleuses et fixées à un réceptacle central.

Les Plantes de ce genre sont des Arbrisseaux à feuilles ternées ou pinnées composées de cinq folioles. Leurs fleurs sont axillaires, terminales et disposées en panicules. On ne connaît encore que les deux espèces primitivement rapportées par Commerson; l'une, *Cossignia triphylla*, Lamk., qui se trouve au mont du Rempart de l'Île Mascareigne; et l'autre, *Cossignia pinnata*, Lamk., que l'on rencontre à l'Île-de-France. Cette dernière a été

figurée par Lamarck (Illust., t. 256).

(G. N.)

**COSSIPHOS.** ois. Syn. grec du Marle, *Turdus Merula*, L. V. MERLE.  
(DR. Z.)

**COSSIR** ou **CAJU-SOULI.** BOT.

PLAN. Syn. présumé d'*Urtica interrupta* dans quelques-unes des Moluques, K. OATIE.  
(A.)

**COSSON.** *Cossus*. ins. Genre de Hordrus des Coléoptères, section des Tétramères, établi par Clairville (Himatomol. helvétique), adopté par Eschscholtz et rangé par Latreille (Rég. Anthr. de Cuv.) dans la famille des Rhynchophores avec ces caractères : antennes insérées sur un avancement supérieur de la tête, en forme de trompe coudée, n'ayant que neuf articles distincts, dont le dernier en masse ovoïde ou conique ; corps court, allongé et presque cylindrique ; jambes terminées par un fort ongle ; ailes filiformes. Les Cossos, confondus d'abord avec les Charançons, sont très-voisins des Calandres, se rapprochent encore davantage du genre *Bulbifer* qui a été créé à leurs dépens par Megerle. Ce sont des Insectes petits, vivant sous les écorces des Arbres, et dont les espèces sont encore peu nombreuses et très-peu connues. Dejean (Catal. des Coléopt., p. 375) en mentionne six dont il cite : le *Cosson* LESTAJE, *Cossonus lestrajae*, Clairv. (Entom. helv. T. 1, p. 60, tab. 2, fig. 22), figuré par Olivier (Entom. n° 83, pl. 35, fig. 534, a, b, c), qui l'a été regardé comme le type du genre. On le trouve dans toute l'Europe.

Le *Cosson* LYMEXILON, *Cossonus lymexylon*, figuré par Olivier (ibid. ibid., n° 83, pl. 35, fig. 539), a été considéré par Megerle comme type de son genre *Bulbifer*. V. ce mot. (AUD.)

**COSSU.** ois. Espèce du genre Soui-Manga, *Certhia pulchella*, Lath., Cuv. Ois. d'Afrique, pl. 295. V. SOUI-MANGA.  
(DR. Z.)

**COSSUS.** MAM. (Blainville, Nov. Bull. Soc. phil., 1816.) Race indienne de Chèvre. V. ce mot.

**COSSUS.** *Cossus*. ins. Genre de l'ordre des Lépidoptères, famille des Nocturnes, tribu des Bombycites (Rég. Anim. de Cuv.), fondé par Fabricius et adopté avec quelque restriction par Latreille qui lui assigne pour caractères : langue nulle ; palpes extérieurs cylindriques, assez épais, couverts d'écailles ; antennes sétacées de la longueur de la tête et du tronc, avec une série de dents courtes, transverses, obtuses, le long de leur côté intérieur ; ailes en toit. Les Cossus ont quelques rapports avec les Bombyces dont la larve est très-différente, mais qui ne s'en distinguent guère à l'état parfait que par les antennes : ils ressemblent beaucoup aux Hépiales qui s'en éloignent aussi par les antennes. Enfin, ils ont les plus grands rapports avec le genre *Zeuzère* qui a été créé à leurs dépens, et c'est encore dans les antennes que se trouvent les caractères distinctifs. Les *Cossus* volent la nuit et vivent très-peu de temps à l'état de Papillons. Ils déposent leurs œufs aux pieds de plusieurs espèces d'Arbres. Leurs chenilles sont nues ou presque rases, lisses et peu variées en couleurs. Elles ont seize pates. On les trouve dans le tronc des Arbres qu'elles rongent profondément, à la manière des larves des Capricornes, et auxquels elles font le plus grand tort ; elles filent une sorte de coque qu'elles composent avec des débris de bois mêlé de terre, et elles subissent dans son intérieur leur métamorphose en nymphe. Celle-ci présente, au pourtour de chaque anneau, des petites dents ou épines qui leur servent, dit-on, à cheminer dans l'intérieur des galeries, et à se rapprocher de l'écorce de l'Arbre afin d'en sortir facilement à l'époque de la dernière transformation. Cette observation ne pourrait s'accorder avec l'existence d'une coque qu'en supposant qu'elle n'est pour la nymphe qu'une demeure provisoire et que celle-ci s'en échappe avant l'état parfait.

Ce genre n'est pas très-nombreux en espèces.

**Le Cossus GÂTE-BOIS**, *Cossus ligniperda* de Fabricius, peut être considéré comme type du genre ; il a été figuré sous le nom de *Cossus* par Engramelle (Papill. d'Eur. pl. 189, fig. 246, A, 1, et pl. 190, fig. 246, H, 1, K). Il est commun dans toute l'Europe. Sa chenille est très-nuisible à l'agriculture ; elle détruit un nombre prodigieux d'Ormes, et est tellement commune aux environs des villes, qu'il n'est guère d'Arbres de cette espèce, âgé de plus de quinze ans, qui n'en soit attaqué, et que les plus vieux meurent ordinairement par suite de ses ravages. Ce mal est d'autant plus redoutable qu'on ne connaît aucun moyen efficace de préservation. On ne peut jusqu'à présent arrêter l'étendue des désastres, qu'en diminuant le nombre des Cossus au moyen des chasses faites au moment où ils viennent d'éclore et avant qu'ils aient eu le temps de s'accoupler ou de pondre.

Cette chenille, si remarquable par ses dégâts, a fourni au célèbre Lyonnet le sujet d'un travail non moins admirable par son exécution que par la patience qu'il a exigée de la part de l'observateur. Nous donnerons un extrait de ce travail à l'article LARVE.

La chenille du Cossus Gâte-Bois a une odeur extrêmement désagréable ; qui paraît être due au liquide hileux qui s'écoule de toutes les parties de son corps, et principalement de sa bouche. Cette particularité ne permet pas de supposer, avec Linné, que ce soit cette même larve dont parle Pliny sous le nom de *Cossus*, et qui était pour les Romains un mets délicieux. Il paraît très-probable que le Cossus des anciens appartenait au genre Lucane ou Capricorne.

On peut rapporter encore au genre dont il est question, et tel qu'il a été circonscrit par Latreille, les *Cossus teretis* de Fabricius, *lignatus et nebulosus* de Donayan, et la *Phalæna atrix* de Linné ; ces trois dernières espèces sont fort grandes et exotiques.

Le Cossus du Marronnier, *Cossus Eculi*, décrit et figuré par Réaumur

(Mém. Ins. T. 31, p. 468, tab. 38, fig. 3-4), appartient au genre *Zozoma* dont il est le type. *V.* ce mot. (Aub.)

**COSSUTA**, BOT. RHAN. Même chose que *Caladium*. *V.* ce mot. (B.)

**COSSYPHE**, *Cossyphus*, INS. Genre de l'ordre des Coleoptères, section des Hétéromères, établi par Olivier (Entom., n° 44 bis) et rangé par Latreille (Règn. Anim. de Cuv.) dans la famille des Taxisornes avec ces caractères : antennes terminées en une massue perfoliée ; le dernier article des palpes maxillaires plus grand que les précédens, en forme de hache ; corps ovale, très-plat, en forme de boudier ; le bord tout autour par le corselet et les élytres ; prothorax presque en demi-cercle cachant la tête. Les Cossyphes, dont le caractère essentiel est d'avoir la tête entièrement recouverte par le corselet, présentent des antennes plus courtes que le prothorax, composées de onze articles ; et dont les quatre dernières seulement sont en massue ; une levre supérieure cornée, arrondie, ellipsoïdale ; des mandibules cornées, arquées, bifides ; des mâchoires également bifides, avec la division interne, courte, presque cylindrique, et la division externe plus grande, renflée, terminée en pointe ; enfin une levre inférieure cornée, légèrement échancrée, munie de palpes triarticulés, le premier article plus petit, les deux autres presque égaux. Les mœurs de ces Insectes singuliers ne sont pas connues. Olivier ne représente et ne décrit qu'une espèce, le CossYPHE BARBARE, *Cossyphus depressus* ou le *Lampyrus depressus* de Fabricius et de Fuesly (Arch. Ins. T. VII, p. 171, n° 2, tab. 46, fig. 7). Cet Insecte se trouve dans les Indes-Orientales ; en Barbarie et en Egypte.

On a décrit, sous le nom de CossYPHE d'Hoffmannsegg, une seconde espèce qui avait été regardée comme une variété de la précédente. On la trouve en Barbarie, dans l'île de Corse, en Espagne. Enfin on en connaît une troisième espèce encore in-

dite et recueillie en Egypte par Savigny. (AUD.)

**COSSYPHEURS.** *Cossyphores.* INS. Famille de l'ordre des Coléoptères, section des Héthéroptères, fondée par Latreille (Diet. d'Hist. Nat., première édit., tom. 24, p. 52), et comprenant les genres Cossyphe et Héléce; elle a été depuis réunie (Règn. Anim. de Cuv.) à celle des Taxicornes. V. ce mot. (AUD.)

**COSSYPHORES.** INS. Pour Cossypheurs. V. ce mot.

**COSSYPHUS.** ois. Syn. de Martin. V. ce mot. (B.)

**COSTA.** BOT. PHAN. (Camerarius), Syn. d'*Hypochaeris maculata*. (Cesalp.) Syn. d'*Opopanax*. V. PANAIS. Le *Costekraut* des Allemands est la Plante de Camerarius. (B.)

**COSTE.** *Costus.* BOT. PHAN. Famille des Balisiers de Jussieu ou Scitaminees de Brown, Monandrie Monogynie, L. — Lamarck (Encycl. méth.) réunit aux Amomum ce genre établi par Linné et adopté par Jussieu; mais les genres de la famille des Balisiers étaient, à cette époque, trop imparfaitement connus, pour que cette décision fût irrévocable. Tous les auteurs ont ensuite, au contraire, continué de distinguer le *Costus*. W. Roscoe, dans un Mémoire spécial sur les Plantes de la Monandrie (*Trans. Linn. Societ.* T. VIII, pag. 330), après avoir divisé les genres de Balisiers en deux groupes qu'il nomme Canées et Scitaminees, place parmi celles-ci le genre *Costus*, et fixe ainsi ses caractères : anthère double; filet placé en dehors de l'anthère, allongé, plane et ovale, lancéolé à son sommet; capsule trilobulaire, s'ouvrant en dehors, contenant un grand nombre de graines. A ces caractères essentiels nous ajoutons, pour faire mieux connaître le genre *Costus*, ceux qu'il partage plus ou moins avec les autres genres de la famille : le périanthe extérieur est trifide, bossu, l'intérieur papéaloïde; nectaire auquel est joint le filament

la corolée; style filiforme; stigmathe bilobé. Selon Roscoe (*loc. cit.*), les Plantes de ce genre se distinguent des autres Scitaminees par leurs tiges inclinées ou spirales, fréquemment hérissées et quelquefois frutescentes. R. Brown (*Prodr. Floræ Novæ-Hollandiæ*, p. 308) ajoute encore un caractère qui fait distinguer, dit-il, les *Costus* même sans fructification; c'est la structure particulière de la gaine qui, au-dessus de l'insertion de la famille, forme une sorte de réservoir (*Ocrea*) pour la sève. (B.)

On a décrit une quinzaine d'espèces de ce genre, parmi lesquelles figuraient autrefois plusieurs *Aspinæ* de Jacquin. A l'exception du *Costus speciosus*, Smith, espèce fondamentale du genre et dont nous allons donner une description très-succincte, elles sont toutes indigènes des Antilles, de la Guiane, du Pérou et des autres contrées chaudes d'Amérique.

Le *COSTE ÉLÉGANT*, *Costus speciosus*, Sm. et Rosc., pousse des tiges feuillées, simples et hautes d'environ un mètre. Ses feuilles sont alternes, acuminées, très-grandes, vertes supérieurement, et couvertes de poils soyeux en dessous; épi terminal, court, sessile, conoïde et imbriqué d'écaillés ovales et terminées en pointe. Les fleurs ne s'épanouissent que successivement; leur périanthe soyeux extérieurement est blanc ou jaunâtre, composé de trois pièces dont la plus grande et repliée en dehors la racine de cette Plante, est blanche, membraneuse, noueuse, tendre et très-fibreuse. C'est d'elle que Camerarius a tiré un suc qui provenait le *Coste pyramique* si vanté autrefois dans les préparations monstreuuses de la pharmacie. Mais, est-il probable qu'une racine aussi peu odorante et aussi aqueuse que celle de notre Plante, fût, même dans sa patrie, celle qu'on nous décrit comme d'un goût acre, amer et très-émomatique; et selon Lamarck, le *Costus arabicus* des anciens ne serait-il pas plutôt le Gingembre même? Nous ne nous arrêterons pas davantage sur cette substance que l'on distinguait

jadis en Coste arabique, en Coste amer et en Coste doux, à laquelle on attachait un prix d'autant plus grand que son origine était plus mystérieuse, mais qui aujourd'hui est presque entièrement oubliée, soit comme parfum, soit comme médicament. Le *Costus speciosus* croît à Jaya, Sumatra et dans les autres îles de la Sonde. Cette Plante a été très bien figurée par Rhéede (*Hort. Malab.* vol. XI, t. 8) sous le nom de *Tsajana Kua*. Lamarck l'a reproduite, avec quelques modifications dans ses divers organes, sous celui d'*Amomum hirsutum* (Illustr. tab. 3), et lui a donné pour synonyme le *Costus arabicus* de Linné. Mais tout porte à croire que celui-ci avait en vue une toute autre Plante, et, selon Rœmer et Schultes, ce serait une Plante des Antilles, pour laquelle, d'après Willdenow, Boscoe, etc. ils réservent le nom de *Costus arabicus*, dénomination vicieuse, puisqu'elle induit en erreur sur la patrie de l'espèce, et qui ne convient pas même à la Plante figurée par Rhéede, qui est exclusive à l'Archipel Indien. (G. N.)

\* **COSTIPÈDES.** ois. On a donné ce nom à certains Oiseaux dont les jambes se trouvent placées de manière à ce que le corps soit dans un parfait équilibre. (B.)

**COSTOTOL.** ois. Espèce du genre Troupiale, *Oriolus Costotol*, Gmel. Du Mexique. V. TROUPIALE. (DR. Z.)

**COSTUS.** BOT. PHAN. V. *COSMA*.

**COSUA.** BOT. PHAN. Syn. cochinchinois de *Phyllanthus urinaria*. (B.)

\* **COSZHI.** ois. Syn. vulgaire au Malabar de la Poule domestique. V. COCOT. (DR. Z.)

**COT A.** BOT. PHAN. (Dioscoride.) Même chose que *Cotula*, et une espèce de Camomille. V. ces mots. (B.)

**COTAN.** MOLL. Pour *Cotau*. V. ce mot.

**COTANE.** BOT. PHAN. Syn. arabe de *Cicer arietinum*, L. V. CHICHE.

**COTAU.** MOLL. Adanson (Voy.

au Sénégal, p. 224) donne ce nom à la *Venus exoleta* de Linné, qui est pour nous une Cythérée. V. ce mot. (DR. Z.)

**COTAVIA - MARINA.** pois. La Coquillade chez les Portugais. V. BLANNE. (B.)

**COTE.** Costa. MOLL. V. SQUELETTE.

**COTE.** Costa. BOT. PHAN. On donne généralement ce nom aux liges saillantes qui se dessinent sur la surface de certains organes, ou à des saillies plus ou moins volumineuses de cette même surface. C'est ainsi que l'on dit la Côte du fruit dans le Melon et les autres fruits. On donne aussi le nom de Côte à la nervure principale et moyenne des feuilles. (A. B.)

**COTEAU.** géol. Pente douce qui ne mérite pas encore le nom de colline: Premier passage des plaines aux montagnes. (B.)

**COTEE.** ois. Syn. ancien du Morillon, *Anas Fuligula*, L. V. CANARD. On a aussi donné ce nom à la Poulcel d'eau ordinaire, *Gallinula Chloropus*, L. V. GALLINULE. (DR. Z.)

**COTELETS.** BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires du Cathartyle. V. ce mot. (B.)

**COTES.** géol. On désigne par ce mot les rives de la mer. Leur adoucissement indique des fonds bas. Quand elles sont acrores, c'est-à-dire bruesques, elles dénotent un fond considérable, et souvent les traces de grandes révolutions physiques. V. MER. (B.)

**COTETTE.** BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires des Graminées du genre Cynosure. V. ce mot. (B.)

\* **COTEVEF.** ois. Syn. vulgaire de la Corbime, *Corvus Corbe*, L. V. CORBEAU.

**COTHURNO.** ois. Syn. italien de la Bartavelle, *Perdix graeca*, Briss. V. PERDRIX.

**COTIA.** MAMM. L'un des noms de pays de l'Agouti. (B.)

**COTINGA**, *Ampelis*. ois. (Linné.)

Genre de l'ordre des Insectivores. Caractères : bec médiocre, un peu comprimé, plus haut que large, triangulaire à la base, comprimé à l'extrémité, assez dur; mandibule supérieure convexe, carénée, échancrée vers la pointe, qui est courbée, l'inférieure un peu aplatie en dessous; narines obliques à la base et sur les côtes du bec, carénées, à demi-fermées par une membrane; et nouvettes par quelques soies; pieds médiocres; quatre doigts, trois devant, dont les deux extérieurs réunis jusqu'à la deuxième articulation, un derrière, aussi long que l'extérieur; ailes assez courtes; la première rémige moins longue que la deuxième qui surpasse toutes les autres. Ces Oiseaux ont le caractère sauvage, défiant et taciturne, ne répond ni au luxe ni à l'éclat de leur robe, n'ont encore été trouvés que dans les régions méridionales de l'Amérique; ils y vivent solitaires et se tiennent de préférence dans les lieux humides et ombragés; les fruits savoureux et sucrés, quelques Insectes forment leur nourriture. Leurs voyages courts et momentanés ne paraissent être déterminés que par le caprice et la gourmandise, car leurs migrations ne se font point à des époques fixes, ainsi qu'on le voit chez presque tous les Oiseaux voyageurs. Les précautions que prennent les Cotingas pour mettre leurs couvées hors de la portée de quelques Quadrupèdes grimpeurs, qui en sont très-friands, ont jusqu'ici dérobé aux regards de l'Homme le berceau qui renferme la famille naissante de la plupart des espèces qui constituent ce genre; l'on ne saurait établir des généralités sur ce point, d'après quelques nids trouvés au hasard sur les Arbres les plus élevés, et qui même ne sont que soupçonnés être ceux d'une espèce de ce genre; il vaut mieux attendre que l'observation et le temps viennent confirmer des faits qui ne sont encore que des conjectures.

Le genre *Cotinga*, tel qu'il a été établi par Linné, quoique peu nom-

bres en espèces, a fourni des types à plusieurs divisions génériques, et Vieillot, auquel on n'adressera pas le reproche de n'avoir point assez multiplié les genres, a néanmoins laissé parmi ses Cotingas des espèces dont Linné n'a pu s'empêcher de former un genre nouveau qui avait aussi été indiqué par Deamarest. *V. AVÉRANO*.

**COTINGA BLANC**, *AVERANO* CARONCULÉ.

**COTINGA BLEU**, *Ampelis Cotinga*, Lath., Buff., pl. enl. 186. Le plumage d'un bleu azuré éclatant, à l'exception de la gorge, du cou et de la poitrine qui sont d'une belle couleur de pourpre, des rémiges et des rectrices qui sont noires ainsi que le bec et les pieds. Taille, huit pouces six lignes. La femelle est d'un brun noirâtre avec des reflets verdâtres aux parties inférieures; chaque plume est légèrement bordée de blanc; elle a la gorge et les rectrices cannelées inférieurement. Les jeunes ressemblent aux femelles; cependant leurs têtes sont plus sombres, et le liséré des plumes est plus sombre. De la Guayane.

**COTINGA DU BRÉSIL** ou **COTON-BLEU**, Buff., pl. enl. 188. Parties supérieures d'un bleu d'azur très-vif; parties inférieures d'un violet pourpre avec une bande bleue qui traverse la poitrine; rémiges, rectrices, bec et pieds noirs. Taille, huit pouces. Les femelles ont les parties inférieures parsemées de taches de feu. Du Brésil. Cette espèce avait été regardée à l'origine comme une simple variété de sexe, mais Vieillot, d'après les observations de Latham, qui a reconnu deux espèces distinctes dans ces Cotingas, en a effectué la séparation.

**COTINGA BRUN**, *Ampelis fusca*, Vieill. Parties supérieures d'un brun très-foncé, les inférieures brunes, rayées longitudinalement de blanchâtre sur la poitrine et la milieu du ventre; flancs violets; abdomen blanc; bec et pieds noirs. Taille, cinq pouces. Du Brésil.



**COTINGA CARONCULÉ.** *V. AVÉRANO CARONCULÉ.*

**COTINGA DE CAYENNE.** *V. COTINGA QUTREVA.*

**COTINGA CENDRÉ.** *V. CORACINE CENDRÉE.*

**COTINGA CORDON-BLEU.** *V. COTINGA DU BRÉSIL.*

**COTINGA CUIVRE,** *Ampelis cuprea*, Merrem, *Icon. Av. pl.* 2. Parties supérieures d'un olivâtre cuivreux; sommet de la tête rouge; joues orangées; plumes de la poitrine et du ventre d'un rouge sanguin, bordées de vert; bec jaune; pieds bruns. Taille, sept pouces. De Surinam. Espèce douteuse.

**COTINGA DORÉ,** *Ampelis aurata*, Vieill. Parties supérieures pourprées; sommet de la tête, petites rectrices alaires, poitrine et flancs d'un jaune brillant; rectrices blanches. Du Pérou.

**COTINGA A FLANCS ROUX,** *Ampelis Hypopyrra*, Vieill. Parties supérieures d'un gris foncé, verdâtre sur le dos et le bord extérieur des rectrices; parties inférieures cendrées; flancs, poignets, extrémité des petites rectrices alaires et des rectrices d'un roux orangé; bec et pieds noirs. Taille, sept pouces. De la Guiane.

**COTINGA A GORGE NUE.** *V. AVÉRANO A GORGE NUE.*

**GRAND COTINGA.** *V. CORACINE PONCEAU.*

**COTINGA ORIS,** *Ampelis cinerea*, Lath. *V. COTINGA PACAPAC*, dont ce n'est qu'un jeune individu.

**COTINGA GRIS-POURPRÉ.** C'est le jeune Pacapac prenant la livrée adulte.

**COTINGA GUIRA-PANGA.** *V. AVÉRANO CARONCULÉ.*

**COTINGA HUPPÉ,** *Ampelis cristata*, Lath. Parties supérieures rouges avec une huppe de cette couleur sur le sommet de la tête, rémiges et rectrices noires; joues et parties inférieures blanches. Levassant présume que ce Cotinga est une variété d'âge de la Coracine ponceau.

**COTINGA JAUNE,** *Ampelis latea*, Lath. Parties supérieures d'un brun

olive; plus foncé sur les ailes; uneoustache blanche de chaque côté du bec; rectrices jaunâtres; les deux intermédiaires noires dans tout leur lien; parties inférieures jaunes avec l'abdomen blanc; bec et pieds noirs. Taille, six pouces; en ligne. Espèce douteuse.

**COTINGA DES MARAIS,** *Ampelis majuscula*, Lath., Levaill., Ois. rares, pl. enl. Buff., pl. enl. 229. Parties supérieures, poitrine et ventre couverts de plumes d'un violet pourpre; blanches à leur base; bleues à leur extrémité; les plumes de la tête et du cou longues, étroites, brunes à leur base, puis d'un bleu éclatant; rémiges et rectrices brunes, bordées de bleu; gorge violette; bec brun; pieds noirs. Taille, sept pouces.

**COTINGA DU MEXIQUE,** *Ampelis Cacastal*, Briss. Plumage varié de bleu et de noirâtre; tête petite; bec noir allongé; iris jaune. Taille, huit pouces. Espèce douteuse.

**COTINGA OLETTE,** *Ampelis Carnifex*, L., Buff., pl. enl. 378. Parties supérieures d'un rouge obscur; qui s'éclaircit vers le croupion et la queue; une espèce de huppe d'un rouge vif, composée de plumes étroites et roides; extrémité des rectrices d'un rouge brun; rectrices alaires d'un brun roux, bordées de rouge; rémiges brunes rougeâtres; parties inférieures rouges, nuances de brun; bec rougeâtre; pieds jaunâtres, garnis postérieurement d'un léger duvet. Longueur, sept pouces. La femelle est privée de huppe, son plumage tire davantage sur le brun. De l'Amérique méridionale.

**COTINGA PACAPAC,** *Ampelis Pompadora*, L., Buff., pl. enl. 279; Levaill., Ois. rares, pl. 54, 55 et 56. Parties supérieures d'un rouge pourpre foncé, avec la base des plumes blanche; rémiges et rectrices alaires inférieures blanches; grandes rectrices longues, étroites, roides, pointues, formant la gouttière, ayant leurs barbes déssinées; parties inférieures d'un pourpre plus clair de même que la queue; bec d'un brun rougeâtre;

pieds noirsâtres. Taille, sept pouces six lignes. Les jeunes sont d'un gris cendré, plus clair sur les parties inférieures, les remiges et les rectrices. On assure que les femelles ont un plumage mixte entre celui des jeunes et celui de l'adulte. De la Guiane.

**COTINGA A PLUMES ROYALES.** *V.*

**COTINGA DES MAUVAIS.** *Idem.*

**COTINGA ROMBADOUE** et **COTINGA POURPRE.** *V.* **COTINGA PACATIE.**

**COTINGA QUEIREVA.** *Ampelis Cayana*; Latr., Buff., pl. enl. 654; Levaill. Ois. rares, pl. 27, 28, 29 et 30. Parties supérieures d'un bleu changeant en vert; paraissant tachetées de noir par la couleur de la base des plumes, qui porte çà et là; tectrices alaires, remiges et rectrices noires, frangées de bleu verdâtre; un plastron violet pourpre sur la gorge et le haut de la poitrine; parties inférieures un peu plus pâles que les supérieures; bec et piets noirs. Taille, huit pouces. La femelle est un peu plus petite; en outre, elle a les parties supérieures d'un brun nuancé de vert, les tectrices alaires roussâtres, frangées de vert ainsi que les remiges et les rectrices qui sont noires; les parties inférieures d'un brun cendré, nuancé de vert. Les jeunes ont les parties supérieures d'un brun plus ou moins foncé avec chaque plume frangée de roux; les parties inférieures nuancées de roussâtre, dans un âge plus avancé. Ils ressemblent davantage à la femelle; ils ne prennent leur beau plumage de noces qu'à l'âge de dix-huit mois. De l'Amérique méridionale.

**COTINGA ROUGE DE CAYENNE.** *V.*

**COTINGA OUETTE.**

**COTINGA TACHETÉ.** Paraît être le jeune mâle de l'Avérané caronculé. *V.* **AVÉRANO.** (DR..Z.)

**COTINOS.** *BOT. PHAN.* (Théophraste.) Syn. présumé d'Olivier sauvage. (B.)

**COTINUS.** *BOT. PHAN.* Espèce du genre *Sauces*, déjà indiquée sous le même nom au temps de Plin. (B.)

**COTIQUE BLANC.** *MOLL.* Nom

vulgaire et marchand du *Cypræa Annulus.* *V.* **CYPRE.** (B.)

\* **COTNERA - SEGUIAR.** *BOT. PHAN.* L'un des noms égyptiens du Coton. (B.)

**COTO.** *POIS.* Le Chabot, chez les Espagnols. (B.)

**COTOGNA ET COTOGNO.** *BOT. PHAN.* Syn. de Coing et de Coignasier dans les dialectes méridionaux. (B.)

**COTOGNIA MARINA.** *POLY.* Les Italiens et quelques autres nations des bords de la Méditerranée donnent ce nom à plusieurs espèces d'Alcyonées, principalement à l'*Alcyonium Cydonium* et à quelques *Tubulaires*. (LAM..X.)

**COTON.** *Gossypium.* *BOT. PHAN.* *V.* **COTONNIER.**

\* **COTONARIA.** *BOT. PHAN.* (Doëns.) Syn. d'*Athanasia maritima*, L., *Diotis* de Desfontaines. *V.* ce mot. (B.)

**COTONEA.** *BOT. PHAN.* Syn. de Coing. *V.* ce mot. La Plante ainsi nommée dans les pays vénitiens, est probablement l'Origan. (B.)

\* **COTONEASTER.** *Cotoneaster.* *BOT. PHAN.* Lindley, dans sa Dissertation sur le groupe des *Romacées*, a rétabli ce genre proposé par Medicus pour quelques espèces de *Mespilus* qui offrent les caractères suivans : leurs fleurs sont polygames, ayant le calice turbiné, à cinq dents obtuses; la corolle formée de cinq pétales courts et dressés; les étamines incluses, plus longues que les trois styles qui sont glabres; le fruit consiste en trois akènes osseux attachés aux parois du calice qui les recouvre.

Ce genre se compose de quatre espèces qui sont des Arbustes à feuilles simples, entières, lanugineuses à leur face inférieure, portant des fleurs axillaires ou en corymbes latéraux. Ces espèces sont : 1.° Le *Cotoneaster vulgaris*, Lindley, ou *Mespilus Cotoneaster*, Willd., qui croît dans les Alpes de l'Europe et de la Sibérie; 2.° le

*measter tomentosus*, Lindley, ou *pilis tomentosus*, Willd., qui habite les Alpes du Tyrol; 5<sup>o</sup> le *Cotoneaster vis*, Lindley, voisin du précédent; 6<sup>o</sup> distinct par ses feuilles atténuées pointées à leurs deux extrémités; 7<sup>o</sup> le *Cotoneaster acuminata*, Lindley (Ann. Lin. Soc. XIII, t. 9, p. 101), a été découvert dans le Napaul Wallich. (A. R.)

**COTONEUM.** POLYTR. Pallas a donné le nom spécifique de *Cotoneum Alcyonium pyramidale* de Brucke, différent de l'*Alcyon Cydonium* Linné, que des auteurs ont confondu avec le Polypier décrit par Linné. (Lam. X.)

**COTONNEUX.** BOT. CRYPT. Paulet a donné ce nom à l'une de ses familles bizarrement établies et qui rentre dans le grand genre Agaric. (B.)

**COTONNIER.** *Gossypium.* BOT. LAM. Ce genre, l'un des plus intéressants du règne végétal, fait partie de la famille des Malvacées et de la tribu des Malvaceae. On peut le caractériser de la manière suivante : le calice est double; l'extérieur est divisé en trois divisions larges; profondes et angées; l'intérieur, beaucoup plus étroit, est en forme de soucoupe presque plane, ayant son bord sinueux et obscurément lobé. La corolle se compose de cinq pétales dressés; se recouvrant par leurs parties latérales et soudés entre eux à leur base par le moyen de la substance des filets staminaux. Les étamines sont fort nombreuses; leurs filets sont soudés, monadelphes, forment un tube cylindrique plus ou moins allongé, mais généralement plus court que la corolle. Les anthères sont cordiformes. L'ovaire est simple, globuleux, acuminé, et se termine par un style simple, un peu paissi à son sommet, offrant de trois à cinq sillons qui semblent annoncer qu'il se compose de cinq styles intimement soudés. Le nombre des stigmates varie de trois à cinq, et se trouve en rapport avec celui des sillons du

style et des loges de l'ovaire. En effet, quand on coupe transversalement le fruit, il présente de trois à cinq loges contenant chacune plusieurs ovules. Le fruit est une capsule ovale, à trois ou cinq sillons longitudinaux, accompagnée à sa base par le style, offrant de trois à cinq loges qui contiennent chacune de trois à huit graines recouvertes de la substance nommée coton. Cette capsule s'ouvre en autant de valves qu'il y a de loges.

Les Cotonniers sont des Arbustes plus ou moins élevés, généralement parsemés de glandes. Leurs feuilles sont alternes, pétiolées, divisées en lobes digités plus ou moins profonds, et accompagnées à leur base de deux stipules. Leurs fleurs sont grandes, purpurines ou jaunâtres, solitaires à l'aisselle des feuilles supérieures, et portées sur des pédoncules plus ou moins longs.

L'histoire botanique des Cotonniers est loin d'être éclaircie dans tous ses points. La même remarque peut également être faite pour la plupart des Végétaux utiles qui sont l'objet d'une culture étendue et soignée. En effet, quelques auteurs doutent encore de l'existence des Cotonniers en Amérique avant l'arrivée des Européens. Néanmoins tout porte à croire que les habitants du nouvel hémisphère possédaient ce précieux Végétal, mais qu'ils ignoraient tous les avantages qu'on peut en retirer. Il paraît donc prouvé que les Cotonniers sont tout à la fois originaires de l'ancien et du nouveau continent. La détermination des espèces de ce genre est le point le plus difficile de son histoire. Comment en effet pouvoir nettement reconnaître les modifications de forme et de structure, que plusieurs siècles d'une culture assidue ont dû apporter aux espèces primitives de ce genre, lorsque nous songeons au nombre infini de variétés que la culture a produites dans les genres Pomme, Poirier, Pêcher, etc. Par quels caractères peut-on parvenir à distinguer nettement parmi les Cotonniers ce que

l'on doit regarder comme espèce, ou ce qu'il n'est. Peut-être qu'une comme de simples variétés. Cependant, toute distinction des espèces est très-importante, puisque les unes, par exemple, fructifient deux fois par année, les autres une fois seulement; celles-ci donnent un coton dont les fils sont longs, fins et d'une blancheur éclatante; celles-là en fournissent qu'un d'une médiocre qualité; quelques-unes produisent de huit à dix onces de coton par pied, tandis que d'autres en donnent à peine une once. De quelle importance n'est-il donc pas pour le colon, pour le négociant, de pouvoir reconnaître par des caractères certains les variétés qui méritent la préférence? Mais c'est ici que gît la difficulté. Quels sont les organes d'après lesquels devront être pris les caractères? Les feuilles varient dans leur figure; dans le nombre de leurs lobes; non seulement chez les individus d'une même espèce, mais encore d'une même variété; la grandeur et la couleur des fleurs ne sont pas fixes; il y a eu de même des stipules et des glanées qui ont tour à tour été considérées par certains auteurs comme fournissant les caractères les plus constants. Le docteur Rohr qui a résidé pendant un grand nombre d'années à Sainte-Croix, l'une des Antilles, où il a cultivé avec un soin extrême les diverses espèces de Cotonniers, et auquel on doit le meilleur traité sur la culture de ce végétal, a reconnu l'insuffisance des caractères tirés des organes de la végétation. Une longue expérience et une étude approfondie lui ont appris que les graines seules fournissent, par leur forme et les diverses modifications qu'elles peuvent présenter, les vrais caractères distinctifs des espèces. Il est donc arrivé, par ce procédé, à établir les différences caractéristiques qui existent entre elles. Malheureusement il est à regretter que Rohr, qui était très-versé dans la botanique, n'ait pas cherché à établir les botaniquement les espèces qu'il a établies, et qu'il ne leur ait donné que des noms vulgaires.

res, sans les rapporter aux espèces déjà connues et établies par les botanistes, et sortis qu'aujourd'hui l'on ne peut déterminer exactement si les trois variétés qu'il a reconnues et qu'il considère comme des espèces distinctes, doivent être rapportées à une ou à plusieurs espèces établies précédemment. Ce point mérite cependant toute l'attention des naturalistes, et il serait important de l'éclaircir. Pour cela il faudrait posséder des échantillons des diverses sortes de Cotonniers cultivées en Amérique et en Asie, pouvoir les étudier comparativement dans tous leurs organes, en suivre le développement depuis la germination jusqu'à l'époque de leur fructification. Par ce procédé, on parviendrait enfin à connaître ce qui dans ce genre doit être considéré comme une espèce, ou ce qui constitue de simples variétés, et surtout on ferait concorder ensemble les dénominations vulgaires avec les noms systématiques. Ce travail a déjà été fait pour les Orangers et pour une foule d'autres Arbres fruitiers. Les Cotonniers, plus qu'eux tous, méritent la préférence par leur importance dans l'économie domestique, le commerce et les arts manufacturiers.

Nous allons d'abord nous occuper des espèces principales de ce genre, telles qu'elles ont été établies par les naturalistes; nous indiquerons ensuite les variétés cultivées en Amérique et les noms vulgaires sous lesquels on les connaît; nous terminerons cet article par exposer en peu de mots les procédés divers suivis pour la culture des Cotonniers.

Linné n'a décrit (*Species Plantarum*) que quatre espèces du genre qui nous occupe, et leur a donné les noms de *Gossypium herbaceum*, *G. Barbadeuse*, *G. arboreum*, *G. hirsutum*. Dans l'Encyclopédie méthodique, Lamarck en fait connaître huit, savoir les quatre décrites par Linné et quatre autres qu'il nomme *Gossypium indicum*, *G. visifolium*, *G. micropidum* et *G. glabrum*. Cependant, dans la *Système de nomenclature* sur les Plantes

nadelphas, décrit et figure les diverses espèces connues de ses prédécesseurs, et en fait connaître deux nouvelles qu'il appelle *Gossypium micranthum* et *G. parviflorum*. plus il réunit ensemble les *G. villosum* et *G. glabrum* de Lamarck. *Gossypium rubrum* de Forskall a été une simple variété du Cotonnier en Arbre. Enfin Desfontaines, Poir. et Rœusch ont chacun décrit une espèce nouvelle sous les noms de *G. purpurascens*, Desf., *G. tomentosum*, Poir., et *G. glandulosum*, Rœusch. Ces trois espèces nous sont inconnues. En réunissant ces diverses publications on voit que le nombre des espèces de Cotonniers est d'environ douze à treize. C'est à ces espèces, et à quelques autres, ne sont probablement que de simples variétés, qu'il faut rapporter toutes les sortes de cotonniers cultivés dans les quatre parties du monde.

Le COTONNIER HERBACÉ, *Gossypium herbaceum*, L., Cavanilles, Diss. t. 164 p. 2. Cette espèce est fort variable dans son port. C'est quelquefois une Plante herbacée annuelle, élevée à peine à une hauteur de dix-huit à vingt pouces; tandis que d'autres fois elle forme un Arbuste de quatre à six pieds d'élévation, dont la tige est ligneuse et vivace à sa partie inférieure. Le nom de Cotonnier herbacé est donc fort impropre. Elle en a formé deux variétés auxquelles il a donné les noms de Cotonnier herbacé annuel et de Cotonnier herbacé frutescent. Les rameaux sont cylindriques, d'un brun rougeâtre inférieurement, velus et parsemés de petits points glanduleux et brunâtres. Les feuilles sont alternes, longuement pétiolées, vertes, molles, pubescentes, divisées en cinq lobes inégaux, assez courts, entiers, obtus et brusquement acuminés. On remarque sur leur nervure médiane une glande verdâtre située près de la base de la feuille. Les deux stipules sont lancéolées, étroites et entières. Les fleurs naissent à l'aisselle des feuilles supérieures et sont portées sur des pédoncules solitaires. Les

divisions de leur calicule ou calice extérieur sont larges, terminées en pointe très-allongée et déchiquetées profondément sur leurs bords; la corolle est jaune; chaque pétale est marqué d'une tache pourpre à la base de la face interne; par sa forme et sa grandeur, elle ressemble beaucoup à celle de la Ketmie des jardins (*Hibiscus syriacus*, L.). Les capsules sont ovoïdes, acuminées au sommet, enveloppées dans le calice, ordinairement à trois loges et s'ouvrant en trois valves terminées par une pointe brusque au sommet, portant une cloison sur le milieu de leur face interne. Ce Cotonnier croît en Egypte, en Syrie, en Arabie, dans quelques îles de l'Archipel et dans l'Inde. On le cultive, en Sicile et à Malte; c'est également avec cette espèce que l'on a tenté des essais en Italie et dans le midi de la France. Elle se distingue surtout par les lobes de ses feuilles qui sont courts, arrondis et terminés par une pointe brusque, et par la glande qui existe à leur base.

Le COTONNIER ARBORESCENT, *Gossypium arboreum*, L., Cavan., loc. cit., t. 165, constitue un Arbrisseau qui peut s'élever jusqu'à la hauteur de quinze à vingt pieds. Sa tige est tout-à-fait ligneuse dans sa partie inférieure; ses rameaux cylindriques sont glabres, excepté dans leur partie supérieure où ils sont pubescents. Les feuilles, portées sur de longs pétioles velus, sont divisées en cinq lobes digités, profonds, lancéolés, terminés par une petite pointe sétiforme; à la base des pétioles existent deux stipules subulées. Les fleurs sont pédunculées, axillaires et solitaires; tout-à-fait purpurines; les trois divisions de leur calicule sont quelquefois entières, plus rarement un peu denticulées; les capsules sont ovoïdes, acuminées, à trois ou quatre loges et à autant de valves; on trouve dans chaque loge trois ou quatre graines recouvertes d'un Coton d'une excellente qualité. Cet Arbrisseau croît dans l'Inde, l'Arabie et l'Egypte. Il a été transporté aux Canaries et en

Amérique, on le cultive depuis fort longtemps.

**Le COTONNIER DE L'INDE**, *Gossypium indicum*, Lamk., Enc. T. 11, p. 134; Cavan., loc. cit., t. 169. Cette espèce paraît tenir le milieu entre les deux précédentes. Sa tige, ligneuse inférieurement, est élevée de dix à douze pieds et persiste pendant plusieurs années; ses rameaux sont velus et même presque laineux à leur partie supérieure; ils portent des feuilles alternes, pétiolées, généralement petites, à trois ou cinq lobes allongés aigus, et non arrondis et acuminés comme dans le Cotonnier herbacé. Leur face inférieure est pubescente, et, selon Cavanilles, porte une glande sur la nervure médiane. Lamarck, au contraire, dit qu'elles en sont dépourvues. Les fleurs sont généralement jaunes, avec une tache pourpre à la base de chaque pétale. Nous possédons un échantillon de cette espèce qui a les fleurs entièrement rouges comme dans le Cotonnier arborescent. Les divisions du calicule sont généralement entières. Les capsules sont ovoïdes, allongées, à quatre loges et à quatre valves. Ce Cotonnier est originaire de l'Inde.

**Le COTONNIER VELU**, *Gossypium hirsutum*, L., Cavan., loc. cit., t. 167. L'Amérique méridionale est la patrie de ce Cotonnier, qui se distingue des autres espèces par sa tige herbacée annuelle ou bisannuelle, cylindrique, rameuse, velue ainsi que les pétioles qui soutiennent des feuilles larges, molles, pubescentes des deux côtés, divisées en cinq lobes peu profonds, acuminés à leur sommet, inégaux, celui du milieu étant manifestement plus grand que les autres. Une glande est placée sur la nervure médiane de chaque feuille. Les stipules sont lancéolées. Les fleurs sont jaunes et solitaires. Les divisions du calicule sont entières ou trifides à leur sommet.

**Le COTONNIER A FEUILLES DE VIGNE**, *Gossypium vitifolium*, Lamk., loc. cit., Cavan., loc. cit., t. 166. Cet Arbruste porte des feuilles grandes, découpées en cinq lobes profonds.

(Les feuilles de la partie supérieure des rameaux sont plus grandes que les autres.) Ces lobes sont ovales, pointus, très-aigus, glabres, mais légèrement pubescents à leur base inférieure, et portant à leur base un point de leur nervure, s'élevant au-dessus de leur base. Les ramifications sont très-longues et étroites. La surface des feuilles supérieures, portant les fleurs qui sont grandes, pubescentes, solitaires, jaunes, avec une tache rouge à la base interne de chaque pétale. Les découpures du calicule sont très-grandes, profondément laciniées. Le calice est court, est à cinq dents. La capsule est ovoïde, à trois loges qui contiennent chacune de six à dix grames noires. On trouve ce Cotonnier dans les Indes Orientales. On le cultive à l'île de France, où Commerson l'a observé. On en a des observations manuscrites de cet admirable naturaliste, il en a des dessins et à la base du calicule et du centre trois grosses glandes. Le nombre de stigmates et celui des loges de la capsule varient de trois à cinq.

**Le COTONNIER RELIGIEUX**, *Gossypium religiosum*, L., Cavan., loc. cit., t. 164, fig. 1; *Gossypium trispicidatum*, Lamk. L'un des caractères les plus marqués de cette espèce consiste dans son style extrêmement long et qui, même avant l'épanouissement de la fleur, est saillant au-dessus de la corolle. Lamarck a vu indistinctement que son Cotonnier à trois points n'était probablement pas différent du Cotonnier religieux de l'Inde. C'est un petit Arbruste de trois à quatre pieds d'élévation, dont le tige est dressée, cylindrique, lisse, et poilue, dont les feuilles sont pétiolées, glabres, tantôt entières, tantôt à plus fréquemment, partagées en trois ou cinq lobes peu profonds. Une seule glande est placée sur la nervure moyenne de chaque feuille. Les fleurs axillaires, solitaires et pédonculées, sont d'abord blanchâtres, puis roses et enfin rouges. Les lanières du calicule sont velues et laciniées. Le style est saillant au-dessus de la corolle. La

le est ovale, acuminée, à trois et à trois valves. On ne sait pas vraiment la patrie de ce Cotonnier. Ark dit qu'il la croit originaire contrées les plus chaudes de l'Afrique. Cayenne prétend qu'il est du cap de Bonne-Espérance. On cultive dans diverses contrées, à l'Inde, à la Guiane française, à la Louisiane, à la France par exemple. Il paraît offrir deux variétés principales. Dans l'une, le Coton est d'une blancheur éclatante; dans l'autre, il est de couleur rousse.

La nature de ce Dictionnaire ne nous permet pas de décrire les autres espèces de ce genre. Nous allons seulement indiquer les variétés principales de Cotonniers qui sont l'objet de la grande culture.

Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons dit précédemment des difficultés attachées à la distinction des variétés de Cotonniers qui sont cultivées. Nous possédons sur ce sujet important de nombreuses notions que nous a transmises Rohrer dans son excellent ouvrage : mais il n'a-t-il parlé que des variétés cultivées à Sainte-Croix, les autres natives de la Guiane française. Mais nous n'avons rien de positif sur celles des autres parties de l'Amérique, ni sur celles des Indes. A chaque pas de l'histoire du Cotonnier, on sent le besoin d'une monographie de ce genre, faite par un homme qui, à des connaissances botaniques, joigne des notions sur la culture et le commerce de ce précieux Végétal dans le nouveau monde, ainsi que dans l'ancien continent. C'est, ainsi que nous l'avons dit, après les diverses modifications des graines que, selon Rohrer, on peut reconnaître les nombreuses variétés de Cotonniers cultivées. Cet habile observateur en a établi trente-quatre, qu'il range en quatre sections. On pourrait aussi diviser ces variétés en deux groupes, suivant qu'elles donnent une ou deux et même plusieurs récoltes dans l'année. Cette distinction nous paraît même de la plus haute importance pour décider le choix du planteur qui, toutes choses égales d'ailleurs, devra préférer les variétés

qui donnent deux récoltes, si ces variétés viennent aussi bien dans le terrain qu'il cultive. Il y a encore une distinction à faire entre les Cotonniers, suivant que le Coton qu'ils produisent est blanc, ce qui a lieu pour la plupart, et suivant qu'il est blanc ou roussâtre comme dans le Coton de Siam et plusieurs autres. Il est à remarquer que les variétés ou espèces qui donnent deux ou même plusieurs récoltes dans une année, joignent à cet avantage celui de fournir en général un Coton de la plus belle qualité et des plus estimés. Telles sont, par exemple, les variétés désignées sous les noms de Sorel rouge, Cotonnier indien, Cotonnier de la Guiane ou de Cayenne, Cotonnier de Siam couronné brun, Cotonnier de Siam blanc, Cotonnier de Saint-Domingue couronné, etc. Mais à laquelle des espèces précédemment décrites faut-il rapporter ces variétés? Nous l'ignorons, qu du moins nous n'avons rien de certain à cet égard. Indiquons sommairement les caractères des variétés reconnues par Rohrer.

#### A. Cotons dont les graines sont rattachées et noyées.

Coton nu ou sauvage. — Nullement estimé. Il produit à peine deux gros de Coton épluché par Arbre.

Coton à petits flocons. — Peu estimé, peu cultivé. Sa graine porte seulement quelques fils en haut, des deux côtés de sa suture.

Coton couronné vert ou Coton fin de la Martinique. — Ainsi nommé parce que le duvet qui se trouve sur la pointe de la graine fraîche est vert. Ses fils sont très-fins, estimés et très-blancs. Ils s'élèvent à trois pieds environ, s'étendent peu. Sa récolte est facile, et donne environ deux onces et demie de Coton net par pied.

Sorel vert. — La pointe de la graine est garnie de quelques fils clairs, semés, plus courts que la pointe. S'étendant un peu le long de la suture. Bonne variété, donnant à peu près quatre onces de Coton net par récolte.

Sorel rouge. — On le confond gé-

nément aux Antilles avec le précédent, dont il diffère par la teinte rouge répandue sur ses tiges et ses feuilles. Il donne deux récoltes par an et fournit de sept à huit onces d'un Coton très-fin et très-blanc. C'est une des variétés les plus estimées. Il réussit mieux dans les terrains secs et sablonneux.

**Coton à barbe pointue.** — La graine est longue et très-pointue. Le duvet qui garnit la pointe est court et frisé. Il donne environ trois onces de Coton net.

**Coton à crochet barbu.** — La graine porte une petite houppe de duvet au-dessus du crochet qui la termine. Il produit chaque année environ cinq onces de Coton fin et blanc.

**Year Rend.** — La graine a une petite houppe de duvet sur la pointe et au-dessus du crochet. On en distingue deux sortes : Year Rend grossier et Year-Rend fin. L'un et l'autre donnent un Coton fin blanc, très-long, mais plus fin dans la seconde sorte. Chaque récolte fournit environ sept onces de Coton net.

**Coton à gros flocons.** — Les graines sont grosses et portent autour de la pointe un duvet qui s'étend le long de la suture. Quelques taches velues s'observent fréquemment sur leur surface. Il est peu estimé, parce que son Coton se salit très-facilement. Il donne à peu près quatre onces de Coton net.

**Coton de la Guiane.** — Il est aussi connu sous les noms de Coton de Guyenne, de Surinam, de Demerary, de Berbice et d'Essequibo. C'est un des plus estimés en Europe, à cause de la blancheur, de la finesse, de la force et de la longueur de ses fils. Aussi est-ce celui que l'on cultive en plus grande abondance dans la Guiane et une partie des Antilles. Il lui faut un terrain humide. Il prend alors un très-grand accroissement, donne deux récoltes par an et fournit de dix à douze onces du plus beau Coton. Dans chaque loge de la capsule les graines sont étroitement serrées les

unes contre les autres, en forme de pyramide longue et étroite.

**Coton du Brésil.** — Il diffère du précédent par ses graines qui ont une pyramide courte et large dans chaque loge du fruit. Son Coton est également très-fin. C'est l'espèce cultivée principalement au Brésil. Il n'existe ni à la Guiane ni dans les Antilles.

**B. Cotons dont les graines sont brunes d'un brun noir et veinées.**

**Coton indien.** — L'une des variétés qui portent deux fois l'année. La pointe de sa graine n'a que des fils sur le dos; la suture et le crochet sont peu marqués. Son Coton est très-blanc et plus fin qu'aucune des variétés précédentes. Il donne de sept à huit onces de Coton net. On le cultive dans quelques parties de l'Amérique.

**Coton lisse de Siam brun.** — La graine est très-pointue. La pointe est plus élevée que la suture, et porte quelques fils sur le dos. Son crochet est très-visible. Ses fils sont très-fins et de couleur nankin, mais il ne donne guère que trois onces de Coton net.

**Coton de Saint-Thomas.** — Quoique ce Cotonnier ne soit pas extrêmement productif, puisqu'il ne donne guère que trois onces à trois onces et demie par année, il est fort estimé, parce que son Coton est très-fin, très-blanc et très-long. On le reconnaît à sa graine oblongue ayant sur la pointe un duvet épais, à peine perceptibles plus longs que la pointe. Le crochet est très-apparent.

**Coton aux cayes.** — Sa graine est comprimée d'un côté, convexe de l'autre. Le crochet est à peine marqué; la pointe est garnie d'un duvet court. Son Coton est fin, très-long et de bonne qualité. Son produit n'est que de deux onces et demie par récolte.

**Coton de Siam brun court.** — Il produit deux récoltes par année. Ses fils sont très-fins, élastiques et d'une couleur nankin pâle. Néanmoins sa culture est peu étendue, parce qu'il ne donne qu'environ trois onces de Coton net par année.



**Coton de Carthagène.** — On en distingue deux sortes sous les noms de Coton Carthagène à petits flocons et de Coton Carthagène à gros flocons. Ils donnent l'un et l'autre, mais en petite quantité, un Coton fin et lanc.

**Coton de Siam blanc.** — Il réunit des fils d'une blancheur éclatante, très-fins, très longs et très-élastiques, avantage de produire deux récoltes par année et environ six onces d'un coton extrêmement recherché. Sa graine est courte, presque globuleuse inférieurement; le duvet placé autour de la pointe est long. Le crochet est peu marqué.

2. **Cotons à graines dont la surface est garnie de poils courts et clair-semés.**

**Coton de Curaçao.** — La graine est petite, garnie d'un petit nombre de poils couchés. La pointe est courte et recourbée. Son Coton est extrêmement fin et d'une grande blancheur. On récolte sur chaque pied environ sept onces et demie de Coton nettoyé.

**Coton de Saint-Domingue couronné.** — Il donne deux récoltes par année et fournit jusqu'à douze onces et demie d'un Coton très-fin et très-blanc. Sa graine, oblongue et garnie de poils clair-semés, a la pointe courte, droite, et le crochet très-marqué.

**Coton rampant.** — Ainsi nommé parce que sa tige s'étale et rampe sur le sol. Peu estimé et peu productif.

3. **Cotons à graines couvertes presque en totalité de duvet très-serré qui la cache entièrement.**

**Coton à poils tachetés.** — Sa graine est grosse, à angles obtus, raboteuse et toute couverte de poils roux. Son Coton est fin, d'une couleur de rouille claire.

**Coton gros.** — La graine, presque cylindrique, est couverte d'un duvet grisâtre. Il est peu productif et généralement peu cultivé.

**Coton de Siam brun.** — Le duvet qui recouvre sa graine est d'un brun rougeâtre. Ses fils sont très-fins et de

couleur isabelle, très-forts et élastiques.

**Coton Mousseline.** — On en connaît quatre variétés : le Coton Mousseline à gros grains, dont les fils sont rudes, blancs, et la récolte de trois à quatre onces; le Coton Mousseline rougeâtre ayant les fils fins, incarnat, mais ne produisant au plus qu'une once et demie par Arbre; le Coton Mousseline de la Trinité; ses fils sont extrêmement fins et d'une blancheur pure : il donne quatre onces de Coton par année; enfin le Coton Mousseline Remire ne donne qu'un Coton grossier d'un blanc sale.

**Coton à feuilles rouges ou Coton rouge.** — Ses jeunes pousses, ses pétioles et les veines de ses feuilles sont d'un rouge intense. Sa graine est couverte de poils à l'exception de la pointe. Son Coton est extrêmement fin; mais on n'en récolte qu'une once et demie par année.

**Coton des nonnes de Tranquebar.** — La graine est petite, presque globuleuse, couverte d'un duvet gris blanchâtre. Il fournit très-peu. C'est la seule variété que Rohraut rapporte à une espèce décrite; c'est, selon lui, le *Gossypium religiosum*, L.

**Coton de Porto-Rico.** — Ses graines sont disposées en pyramide longue et étroite comme dans le Cottonnier de la Guiane; elles sont de plus toutes couvertes de duvet. Chaque pied donne environ douze onces d'un beau Coton.

Telles sont les diverses variétés observées par Rohr dans la petite île de Sainte-Croix, une partie des Antilles et la Guiane; mais combien d'autres n'en existe-t-il pas sur le continent américain, dans les Indes-Orientales et les autres contrées du globe où l'on s'occupe de la culture du Cottonnier! Il serait maintenant important de comparer les variétés des Indes avec celles du nouveau continent.

Le Coton paraît avoir été connu par les anciens; mais cependant l'usage d'en former des tissus n'était pas aussi répandu que celui des tissus de laine. On lit dans Plin

qu'il existe dans la partie de la Haute-Egypte qui avoisine l'Arabie un petit arbuste que les uns nomment *Kilon*, et les autres *Gossypion*, et dont les graines sont entourées d'un duvet d'une blancheur éclatante, qui sert à fabriquer des tissus précieux appréciés par les prêtres égyptiens; mais ce ne fut qu'à une époque beaucoup plus reculée que l'usage d'employer les étoffes de Coton à faire des vêtemens devint plus général. L'Europe dut, à cet égard, être l'une des dernières à profiter de cet avantage, ne possédant pas le Cotonnier parmi les Végétaux de son sol. En effet, ceux qui aujourd'hui sont cultivés dans les îles de l'Archipel, à Malte, en Sicile et dans quelques parties méridionales du continent européen, y ont été transportés primitivement, à une époque plus ou moins reculée, soit de l'Egypte, soit de l'Asie-Mineure ou de la Perse. Mais aujourd'hui que la libre communication entre l'Europe et les autres contrées du globe a facilité l'introduction des denrées coloniales, et en a si considérablement diminué le prix, l'usage des étoffes de Coton est devenu presque universel, et a considérablement diminué la consommation des tissus de Chanvre et de Lin. Cependant ces derniers l'emportent de beaucoup sur les autres dans une foule de circonstances, et, malgré la modicité du prix du Coton, les toiles faites avec nos tissus indigènes sont incomparablement préférables pour l'usage et la durée. Aujourd'hui le Coton doit être considéré comme une des denrées les plus importantes dans la balance commerciale. Le gouvernement français l'avait bien senti à une époque où le système continental séparait en quelque sorte l'Europe du reste du globe. Aussi chercha-t-on alors à introduire la culture du Cotonnier en Italie, en Corse, et jusque dans nos départemens méridionaux. Cette culture a réussi dans plusieurs endroits, mais on a peu à peu abandonné cette branche d'agriculture, qui, malgré son importance, ne peut offrir d'avantage

qu'en temps de guerre, lorsque les Cotons européens n'ont pas à soutenir de concurrence avec les Cotons étrangers, ni pour le prix ni pour la qualité.

Kirkpatric, consul des États-Unis à Malaga, introduisit aux environs de cette ville la culture du Cotonnier, qui avait été négligée même des Arabes. Cet utile citoyen planta ce Végétal précieux dans le village de Churriana, au pied de la Sierra de Mijas. Notre collègue Rory de Saint-Vincent a visité ces lieux qui peu auparavant étaient incultes. Le Coton a tellement réussi dans cette exposition, ainsi qu'à Motril et jusqu'à Almería, le long de la côte méditerranéenne, qu'il y est aujourd'hui la source d'un commerce considérable. L'exportation en était telle quand nos armées occupaient l'Andalousie, en 1810, que le gouvernement français, imaginant que l'on introduisait sous le nom de Coton d'Espagne des Cotons étrangers, exigea un rapport des autorités militaires au sujet de l'état prospère où étaient les plantations de Malaga, et quelle quantité elles fournissaient. Gêné dans ses exportations, Kirkpatric imagina d'établir des filatures; celles-ci faisaient vivre plus de trois mille ouvriers dans un village qui, peu d'années auparavant, était des plus misérables. Mais, à l'instigation d'un agent anglais, la populace détruisit ces filatures, et arracha même les plants de Cotonniers dont Churriana tirait son aisance, dès que les troupes françaises furent parties. La culture du Cotonnier a cependant repris faveur sur les côtes d'Andalousie, et Motril en produit toujours abondamment et d'excellente qualité.

Les Cotonniers en général sont peu difficiles sur la nature des terrains: ils viennent à peu près dans tous les sols et à toutes les expositions. Cependant ils réussissent beaucoup mieux au voisinage de la mer, dans des lieux très-aérés, dans des terres légères, légèrement sèches et chaudes. Quelques variétés ne viennent bien que dans un sol humide et profond. Le Coton-

nier de la Guiane, l'une des variétés les plus estimées, est dans ce cas; et à cet égard il est difficile d'établir des règles générales bien fixes, car il est quelques variétés qui demandent un terrain dont la nature est entièrement opposée. Lorsque l'on a choisi un emplacement pour y établir une plantation de Cotonniers, il faut commencer par le préparer au moyen de labours profonds et d'engrais que l'on répand à sa surface; on pratique ensuite des trous de quelques pouces de profondeur que l'on espace à trois pieds environ les uns des autres. La graine doit être bien choisie pour la qualité et pour l'espèce qui convient le mieux à la nature du terrain et à son exposition. Ces graines doivent avoir été dépouillées des fils de Coton. Quelques planteurs ont l'habitude de les laisser tremper dans l'eau pendant quelques heures, et de les rouler ensuite dans du sable, de la cendre ou une terre légère, afin de les isoler les uns des autres et de faciliter ainsi leur dispersion. D'autres les y laissent pendant vingt-quatre heures, surtout lorsque le temps est très-sec. Par ce procédé on accélère singulièrement leur germination. On place deux ou trois graines dans chaque trou que l'on recouvre ensuite de terre. Au bout de huit jours, surtout quand il a plu, les graines commencent à se montrer au-dessus du sol. Quelquefois cependant elles mettent un temps beaucoup plus long, ce qui en général a lieu quand le temps est resté sec. Lorsque les jeunes pieds sont levés, on retranche ceux qui sont les plus faibles, de manière à n'en laisser qu'un seul à chaque trou. Il faut avoir soin de sarcler fréquemment, et de biner autour des Cotonniers afin d'enlever toutes les mauvaises herbes qui nuiraient au développement des jeunes plants, et finiraient même par les étouffer. Dans les lieux où cela est possible, on suppléera au manque de pluie par des irrigations fréquentes. Lorsque les jeunes plants ont acquis à peu près un pied de hauteur, on pince leur bourgeon terminal. Cette pratique a pour

but de retarder leur accroissement en hauteur, de faciliter le développement des branches latérales, et de donner de la force au pied. On retranche aussi, à mesure que l'individu s'accroît; quelques-unes des feuilles inférieures qui absorbent inutilement une grande quantité de sève. Ces soins doivent être continués jusqu'à l'époque de la floraison et de la maturité des fruits, époque qui varie singulièrement suivant les contrées et les variétés cultivées, puisque quelques-unes donnent deux récoltes chaque année. Cette époque s'annonce constamment par l'écartement spontané des valves de la capsule. Il est alors temps de commencer la récolte. Celle-ci se fait par deux procédés différens; dans l'un, qui se pratique généralement en Orient, on cueille les capsules entr'ouvertes, et on les place dans des sacs ou des paniers; dans l'autre, qui est beaucoup plus répandue, on se contente d'en enlever les graines en laissant les capsules en place. Le premier de ces procédés qui paraît plus expéditif offre cependant d'assez graves inconvénients en ce que les folioles qui forment le calice se brisent en fragmens très-petits, qui se mêlent au Coton dont il est difficile, et surtout fort long de les séparer. Quel que soit le procédé que l'on mette en usage, cette opération doit être faite le matin, avant que le soleil, en entr'ouvrant trop les capsules, n'en ait détaché les graines, qui, en tombant à terre, se salissent et se détachent. On doit continuer la récolte tous les quatre à cinq jours, et tant que l'Arbre donne de nouvelles capsules. En général, lorsque la saison a été favorable, on peut récolter le Coton sept à huit mois après qu'il a été semé. Un arpent de Cotonniers peut, dans un bon terrain et dans une année favorable, donner de trois à quatre cents livres de coton net et épluché. On ne doit pas s'occuper de récolter le Coton immédiatement après la pluie; il faut attendre que le soleil l'ait séché de nouveau.

C'est principalement aux Antilles,

à la Guinée et dans les vastes contrées du Brésil, qu'on cultive la plus grande quantité de Cotonniers. Les variétés y sont très-multipliées ; ainsi qu'on a pu le voir par l'énumération que nous en avons donnée d'après Rohr. En général ils n'y darent guère que de quatre à six ans, après quoi il faut les renouveler. Quand les sujets sont parvenus à une hauteur de quatre à cinq pieds, on les étête afin d'en faciliter la récolte. Lorsque celle-ci est faite, on recèpe les jeunes pieds de la base afin de renouveler les jeunes branches. Dans quelques contrées, cette opération ne se pratique qu'à tous les deux ou même tous les trois ans.

A mesure que la récolte du Coton a lieu, l'on doit s'occuper de le faire sécher. Pour cela on l'étend sur des claies ou des nattes que l'on expose au soleil ou que l'on place dans une étuve. Cette opération est indispensable. En effet, si l'on emmagasine le Coton encore humide, ou bien il pourrait se moisir, ou bien il entrerait en fermentation, et l'on a vu dans ce cas d'énormes quantités de Coton s'enflammer. Tantôt on épluche le Coton et on le prive de ses grâmes immédiatement après la récolte, tantôt on attend qu'il soit sec. Cette dernière opération est la plus dispendieuse et la plus longue ; car les fils du Coton adhèrent fortement à la graine, et si l'on réfléchit à la légèreté de cette denrée, on verra combien il faut de temps pour le bien nettoyer. Avant l'emploi des machines à cylindres, un homme ne pouvait guère faire au-delà d'une livre de Coton net dans l'espace de vingt-quatre heures, ce qui, devait augmenter considérablement le prix de cette denrée ; mais aujourd'hui, par l'emploi de machines fort simples et qui se composent surtout de deux cylindres tournant en sens inverse et entre lesquels on fait passer les grâmes chargées de Coton, un seul homme peut nettoyer de trente à cinquante livres de Coton, suivant la construction de la machine. On en trouve la description détaillée et

la figure dans le Traité de la culture du Cotonnier par Lestevrie. Le même auteur dit qu'en ces derniers temps on a inventé sur le continent de l'Amérique du nord des moulins qui expédient de huit à neuf cents livres de Coton par jour, et qui n'exigent, pour être servis, qu'un petit nombre d'ouvriers. Ici l'on pourrait se demander si, par ces procédés économiques, on n'altère pas la qualité et par conséquent la valeur du Coton, en détruisant le parallélisme de ses fils ? Mais l'expérience a déjà répondu à cette question, et comme les négocians et les fabricans ne s'en plaignent pas, il est très-probable qu'ils ne portent aucun préjudice à ceux qui en font usage. Cependant dans la plus grande partie de l'Inde, l'usage des machines est inconnu, et tout le Coton se nettoie à la main. Plusieurs personnes attribuent à cette coutume la supériorité des fils et des tissus de Coton des Indes. Ce point aurait besoin d'être éclairci ; mais néanmoins on ne fera jamais renoncer le planteur à l'immense économie qu'il retire de l'emploi des machines à cylindres.

Le Coton, bien épluché et bien sec, est mis en balles et enveloppé dans des toiles de chanvre très-fortes pour être livré au commerce de l'exportation. Celui qui nous vient d'Orient est contenu dans des toiles faites avec des poils de Chèvre. Le poids de ces balles varie de trois cents à trois cent cinquante livres. On a inventé en certains endroits des machines propres à fouler le Coton, afin de lui faire occuper le moins d'espace possible. Cette pratique est surtout avantageuse pour le Coton que l'on importe en Europe, afin d'en pouvoir placer une plus grande quantité sur les navires.

Les grâmes dépouillées du Coton servent à plusieurs usages : une partie est réservée pour servir à la semence. En général on peut conserver les grâmes de Cotonniers pendant un ou deux ans ; cependant quelques variétés doivent être plantées

presque immédiatement après avoir été récoltées. Le surplus de celles qui sont employées à la semence sert à la nourriture des Chevaux, des Bœufs, des Ânes, des Mulets, etc. On peut aussi en extraire l'huile grasse qu'elles contiennent, et qui est employée à plusieurs usages économiques. (A.R.)

On a étendu le nom de Cotonnier à d'autres Végétaux, et appelé :

\* COTONNIER DE FLEUR ou COTONNIER D'ÉTÉ, le *Bombax gossypium*.

\* COTONNIER MARON, le *Bombax cotin*. (F. RUMPH.)

**COTONNIÈRE.** BOT. PHAN. On a donné ce nom à des Filages et à des Gnaphalies. V. ces mots. (B.)

**COTORIA ET COTTOBIA.** OIS. Et non *Cotavia*. Même chose que *Cotrelus* en portugais. (B.)

\* **COTORITA.** OIS. Syn. vulgaire au Paraguay de Perruche couronnée d'or, *Psittacus aureus*, L. V. PERROQUET. (DR..Z.)

**COTORRA.** OIS. Espèce du genre Perroquet, *Psittacus Cotorra*, Vieill. Les Espagnols et les Portugais appellent les Perroquets Cotorrero. V. PERROQUET. (DR..Z.)

**COTRELLUS ou COTRIOUX.** OIS. Syn. vulgaire du Cuijelier, *Alauda arvensis*, L. V. ALOUETTE. (DR..Z.)

\* **COTSELETTI.** BOT. PHAN. (Adanson.) Syn. de *Niris*. V. ce mot. (B.)

**COTSJOPRI.** BOT. PHAN. La Plante décrite par Rumph (Herb. Amb. 7, p. 18) sous ce nom, est selon Linné, Hamark et Jussieu, la même que le *Gardenia florida*. V. GARDÉNIE. Ce Végétal n'a aucun rapport avec la Rose de la Chine (*Hibiscus Rosa sinensis*), malgré le rapprochement qu'en a fait Rumph. (A.N.)

**GOTTA.** OIS. (Aldrovande.) Char. (Linn.) Syn. de la Macropode, *Myrica asperna*, L. V. EQUULE. (DR..Z.)

\* **GOTTA-AVERARI.** BOT. PHAN. Syn. des *Sesuvium tetragynum* à la structure interne; ils se rapprochent encore des *Utriculos* par l'apparition

\* **GOTTA.** BOT. PHAN. (Rhéde)

*Malab. 10, tab. 127.* Syn. d'*Oxy-mun. petiolaris*, Lamour. Japon. du genre *Basilia*. (A.N.)

**COTTANA.** BOT. PHAN. (Plin.) Variété de Figue de Syrie. (B.)

**COTTE.** *Cottus*, Linn. Genre établi par Artedi qui lui donna pour désignation scientifique le nom que portait, chez les anciens, le Chabot, l'une de ses espèces; adopté depuis par tous les ichthyologistes; placé par Linné dans l'ordre des Thonaciques, et par Cuvier dans la section de la famille des *Pomoxys* qui sont munies de deux dorsales, section qui précède des *Scombroïdes* dans l'ordre des Acanthoptérygiens. Les espèces de ce genre sont assez nombreuses et d'un aspect généralement hideux, soit par la grosseur de leur tête, soit par la forme de leur corps, soit par la tristesse des teintes de leur peau que recouvre un enduit muqueux auquel ces Poissons doivent la facilité de s'échapper facilement en glissant entre les doigts du pêcheur qui les voudrait saisir. La plupart habitent les eaux douces, vivent de proie, sont agiles; variegés, et se cachent sous les pierres aux lieux obscurs; plusieurs même passent pour se creuser de petits terriers, à l'orifice desquels on les voit épier l'approche des autres petits Poissons ou des Vers et des larves aquatiques sur lesquels ils se jettent; mais leur hardiesse et leur gloutonnerie causent souvent leur perte; les Brochets et autres gros Poissons qui sont friands de leur chair les dévorent. Malgré la chasse que leur font ces tyrans des fleuves et des ruisseaux, la race des Cottés ne diminue guère, et leur fécondité fait qu'ils sont des Poissons généralement fort communs aux lieux qu'ils habitent. Les Cottés ont de grands rapports, surtout par l'arrangement de leur tête, avec les Storpéons; ils s'en rapprochent par leurs grandes pectorales, leurs ventrales, leurs thoraciques, et par toute leur structure interne; ils se rapprochent encore des Uranoscopes par l'apparition horizontale de leur tête, et en

ce que leur dorsale antérieure surpi-  
 noussent, entièrement distincte de la  
 nulle ou postérieure. Leurs intestins  
 et leurs moeurs sont les mêmes. Quand  
 on les irrite, ils ressent encore leur  
 tête en remplissant leurs ouies d'air ;  
 ils peuvent, par ce moyen, vivre  
 assez long-temps hors de l'eau ;  
 plusieurs font entendre un grogne-  
 ment distinct, mais qu'on aurait tort  
 de prendre pour une voix, parce qu'il  
 n'est dû qu'à l'émission violente de  
 cet air, provoquée par l'irritation  
 lorsqu'on tourmente l'Animal. Les ca-  
 ractères d'un genre sont ; tête un peu con-  
 que plus large que le corps ; des aiguil-  
 lons ou des tubercules sur la tête ou sur  
 ces opercules, deux ou trois dorsales  
 dont une adipeuse ; plus de trois  
 rayons aux pectorales ; six rayons aux  
 branchiales. Les yeux sont situés  
 verticalement et munis d'une mem-  
 brane clignotante. Lacépède a formé  
 aux dépens des Cottes ses genres  
*Aspidophore* et *Aspidophoroïde* ; le  
 premier seul, parfaitement caracté-  
 risé par l'absence de toute dorsa-  
 le, nous ayant paru devoir être adop-  
 té contre le sentiment même de Cu-  
 vier, nous a déjà occupé dans ce Dic-  
 tionnaire ; le second ne paraît devoir  
 constituer qu'un simple sous-genre.  
 Nous divisons le genre Cotte en  
 cinq sous-genres :

† **CHABOTS.** Tête presque lisse ; une  
 ou deux épines seulement au préop-  
 ercule ; deux dorsales ; écailles fort pe-  
 lites à peine visibles ; corps arrondi.

Le **CHABOT**, *Cottus Gobio*, L.,  
 Gmel., *Syst. Nat.* XIII, t. 1, p. 1211 ;  
 Bloch, pl. 38, fig. 1-2 ; Encycl.  
 Poiss., p. 68, pl. 37, fig. 149 ; Lacép.,  
 Poiss. T. III, p. 252. Cette espèce  
 commune dans les ruisseaux de l'Eu-  
 rope, de la Sibérie et de l'Amérique  
 septentrionale, n'atteint guère que  
 cinq pouces de longueur ; sa chair,  
 qui n'est pas recherchée, sans doute  
 à cause du dégoût qu'inspirent la figu-  
 re et la viscosité de ce Poisson, n'en est  
 pas moins saine et fort savoureuse ;  
 Aristote l'avait déjà signalée comme  
 l'une des meilleures ; elle devient rouge

en cuisant. Tous seconds, mais encore  
 plus voraces, la femelle dévore quel-  
 quefois ses propres œufs : bien loin  
 de leur porter une grande tendresse,  
 comme on le pense communément,  
 on lit dans Lacépède, et le Diction-  
 naire de Linné l'a textuellement  
 répété : « La femelle plus que le mâle,  
 ainsi que celle de tant d'autres espè-  
 ces de Poissons, paraît comme gon-  
 flée dans le temps où ses œufs sont  
 près d'être pondus. Les protubéran-  
 ces formées par les deux ovaires quise  
 tuméfient pour ainsi dire à cette épo-  
 que, en se remplissant d'un très-grand  
 nombre d'œufs, sont assez élevées et  
 assez arrondies pour qu'on les ait  
 comparées à des mamelles, et comme  
 une comparaison peu exacte conduit  
 souvent à une idée exagérée, et une  
 idée exagérée à une erreur, de célè-  
 bres naturalistes ont écrit que la fe-  
 melle du Chabot avait non-seulement  
 un rapport de forme, mais encore un  
 rapport d'habitude avec les Animaux  
 à mamelles, qu'elle couvait ses  
 œufs et qu'elle perdrait plutôt la vie  
 que de les abandonner. » Quoi qu'il  
 en soit, le Chabot, aussi indifférent  
 pour sa progéniture que les autres  
 Poissons, est d'un brun noirâtre sur  
 le dos, parsemé de taches plus fon-  
 cées dans le mâle et jaunâtres dans la  
 femelle. Le ventre est gris dans l'un  
 et blanc dans l'autre. Les nageoires  
 sont également jaunâtres ou tache-  
 tées. B. 4, D. 7-17, P. 14, V. 4, A.  
 12-13, C. 8-10.

Le **COTTE NOIR**, *Cottus nigriceps*,  
 Lacép., Poiss. T. III, p. 251, dont on  
 n'indique ni la patrie ni le nombre  
 de rayons, et qui a été décrit d'après  
 les manuscrits de Commerson, rentre  
 dans ce premier sous-genre.

†† **SCORPIONS.** Ils ne diffèrent des  
 Chabots que par les épines dont leur  
 tête est hérissée.

Le **SCORPION** ou **CHAPAUD DE MER**,  
*Cottus Scorpis*, L., Gmel., *Syst.*  
*Nat.* XIII, t. 1, p. 1210 ; Bloch, pl.  
 39 ; Encycl. Poiss., p. 67, pl. 37, fig.  
 148 ; Lacép., Poiss. III, p. 256. La  
 figure de ce Poisson est effrayante

sans être positivement horrible; molaire d'agilité, il est armé de piquans redoutables qui menacent la main, qui le voudrait saisir; il parcourt les parages septentrionaux, et à l'abri de toute attaque par ses armes, il fait une guerre cruche aux Clupéas et autres Animaux jetés sans défense au milieu des mers. Sa chair est médiocre: aussi n'est-elle pas recherchée, mais les Groenlandais emploient son foie pour faire de l'huile. Il est extrêmement vorace. Son corps est varié de couleurs qui, pour être sombres, ne sont pas sans beauté et ajoutent à la singularité de sa figure, ainsi que les raies noires, blanches ou rouges, qui, selon les sexes, décorent les nageoires. D. 7-10. 14-17, P. 16. 17, V. 3. 4, A. 10. 13, C. 81. 8.

**Le QUADRICORNE**, *Cottus Quadricornis*, L.; Gmel., *Syst. Nat.* XIII, t. 1, p. 1208; le Quatre-Cornes, Encycl. Pois., p. 67, pl. 57, fig. 146. Non moins vorace que le Scorpion et non moins bien armé, le Quadricorne, à l'aide de ses pectorales encore plus développées, nage avec une plus grande rapidité. Il acquiert une taille moins considérable. Sa chair est meilleure. Il habite les mêmes mers. D. 9-14, P. 17, V. 4, A. 14, C. 12.

**Le BUBALE**, *Cottus Bubalis*, Euphras.; le *Cottus Dicerca*, Pall., et le *Cottus Hemilepidotus*, Til., appartiennent à ce sous-genre.

+++ **CRIPTERES A TROIS NAGEOIRES DORSALES**. Ce sous-genre fort remarquable par une disposition de nageoires, qui pourrait presque suffire pour motiver une séparation plus tranchée, ne se compose jusqu'ici que de deux espèces, le *Cottus hispidus* de Schneider, et le *Cottus acadianus* de Pennant. Ces deux Poissons, qui sont d'une petite taille, habitent les côtes de l'Amérique septentrionale.

++++ **ASPIDOPHORES**. Ce sont des Cottés enrobés enveloppés de plaques écailleuses serrées comme des pavés, et qui rendent leur corps anguleux ou prismatique.

**L'Armé**, *Cottus otophoreus*, L.; Gmel., *Syst. Nat.* t. 1, p. 1205; Bloch, pl. 58, f. 3-4; Encycl. Pois., p. 66, pl. 57, f. 145; l'Aspidophore armé, Lac., Pois. T. III, p. 222. La forme singulière de ce Poisson et la manière dont il est vêtu, le rapprochent des Sygnathes et des Pégases. Il acquiert un peu plus d'un pied de long, a sa mâchoire inférieure munie de barbillons, vit dans les mers du Nord, non loin des rivages sablonneux et semés de rochers. Il se nourrit de petits Poissons et de Crustacés. Moins constitué pour l'attaque que pour la défense, ce Cotté est aussi moins agile et moins adactieux que ne le sont les espèces du second sous-genre. D. 5-7, P. 15; 16, V. 2. 3, A. 6. 7, C. 10. 11. Lacépède pense que le *Cottus Brodame*, reproduit par Bonnaterre (Encycl. Pois., p. 67) d'après Olaffen et Müller, n'est tout au plus qu'une variété de l'Armé.

**Le JAPONAIS**, *Cottus Japonicus*, Gmel., *Syst. Nat.* XIII, t. 1, p. 1215; le Lisiza, Encycl. Pois., p. 67, pl. 58, f. 150; Aspidophore Lisiza, Lac., Pois. T. III, p. 225. C'est le plus allongé des Cottés; il habite les côtes du Japon et des Kuriles, où il atteint un peu plus d'un pied de longueur. B. 6, D. 6-7, P. 12, V. 2, A. 8, C. 12.

Le *Cottus Stelleri* de Schneider avec l'*Agonus decagonus* du même auteur, et l'*Agonus stegophthalmus* de Tilesius, complètent ce sous-genre.

++++ **PLATYCÉPHALES**. Ils ont la tête plus aplatie que les autres Cottés; ses larges sous-orbitaires la font ressembler à une sorte de bouclier ou de disque. Cette tête est moins tuberculeuse, mais seulement armée de quelques épines. Les ventrales, quoique portées sur un appareil suspendu aux épaules, sont cependant chez eux situées manifestement en arrière des pectorales, et très-écartées.

**Le RABOTEUX**, *Cottus asaber*, L., Gmel., *Syst. Nat.* XIII, t. 1, p. 1209; Bloch, pl. 180; Encycl. Pois., p. 67 (sans figure; Cotte raboteux, Lac.,

**Pois. T. III, p. 245.** Ce Poisson a ses écailles petites, mais fortement attachées, dures et dentées; quatre piquans se voient sur sa tête qui est allongée, et dont la mâchoire inférieure est plus longue que la supérieure. Sa bouche est très-grande. Il habite les mers de l'Inde. N. 6, 7, 8, 64, 12, P. 12, V. 6, A. 12, 12, 2, 12, 16.

**L'INSIDIATEUR, Lac. Pois. III, p. 247.** *Coltus insidiator*, Forsk., fig. Arab. p. 26, n° 8; Gmel., *Syst. Nat.* XIV, t. 1, p. 1213; *Platycephalus spatula*, Bloch, pl. 424; le Raked, *Encycl. Pois.*, p. 68 (sans figure). Cette espèce, qui habite la mer Rouge et dont les teintes sombres n'ont rien de remarquable, vit dans le sable, et s'y cache pour saisir sa proie. Cuvier soupçonne que ce Poisson est le *Calibymus indicus* de Linné, dont le compilateur Gmelin aurait fait un double emploi, et le Calliomère indien de Lacépède. N. 8, D. 8-13, P. 19, V. 6, N. 14, O. 15.

**Le MADECASSE, Lac. Pois. III, p. 249, pl. 11, f. 1-2** (en dessus et en dessous); *Cottus Madagascariensis*, Commers., Mass. Cette espèce, observée à Madagascar, aux environs du fort Dauphin, acquiert jusqu'à deux pieds de longueur. Sa tête est armée, de chaque côté, de deux aiguillons recourbés; elle est profondément sillonnée entre les deux yeux. Son corps est couvert d'écailles assez grandes, et la mâchoire inférieure est plus avancée que la supérieure. La caudale paraît échancrée en trois lobes, exemple à peu près unique parmi les Poissons dont l'éducation dans nos viviers ou dans des bécasses n'a pas altéré la forme. D. 8-13, P. 12, V. 5, 6, A. 7, C? (N.)

**COTTERET-GARU. Ois. Syn. vulgaire de Combattant, *Triuga Pugnas*, L. Pl. BÉCASSEAU. (DR. Z.)**

**COTTON-GRASS. BOT. PHAN. Syn. anglais de Linagrette. V. ce mot. (N.)**

**COTTONS. (Labet.) Oiseau des Antilles que divers naturalistes, d'a-**

près le récit des voyageurs, regardent comme des Grenouilles, et d'autres comme des Pétrils. (DR. Z.)

**COTTON-TREE, BOT. PHAN. Syn. de *Populus deltoides* à la Caroline, appelé aussi vulgairement Coton en Arbre. (N.)**

**\* COTTORNO ou GOTURNO. Ois. Syn. italien de la Bartavelle, *Totus rufus*, L. N. F. P. 201. (DR. Z.)**

**COTTUS. POIS. F. COTTE.**

**COTULE. Cottia. BOT. PHAN.** Famille des Syanthérées, Corymbifères de Jussieu; *Syngnæsis superflua*, L.—Vallant (Act. Acad. Paris, 1719, pag. 289) distingue le premier ce genre sous le nom d'*Aphanocyclus*; et Linné, en lui imposant la dénomination définitivement adoptée, le caractérise de la manière suivante: involucre court, hémisphérique, polyphyllé; fleurons du centre hermaphrodites, tubuleux, à corolle quadrifide, et à quatre étamines. Fleurons de la circonférence, femelles, ayant le plus souvent la même apparence que ceux du centre, réceptacle ordinairement dépourvu de paillettes; akènes munis d'un rebord au sommet. Depuis l'établissement de ce genre et même parmi les espèces décrites par Linné, les auteurs ont introduit plusieurs changements. Ainsi, le *Cotula turbinata*, L., est devenu le type du genre *Oenit* de Commerson et Jussieu. Desfontaines rapporte à son genre *Balsamita*, le *Cotula graveolens*, L.; Bergeus a établi, et Jussieu ainsi que Willdow, ont adopté le genre *Lidbeckia*, aux dépens des *Cotula quinquefolia* et *Cotula stricta*, L.; mais Lamarck (Illustr. t. 701) a changé le nom générique en celui de *Laccisia*. Desfont., qui a admis ce changement, ne s'est servi du mot *Lidbeckia* que pour désigner une section de ce genre. D'un autre côté, le *Gnathos* de Adanson, que Linné confondait avec les *Laccisia*, et dont plusieurs auteurs ont fait qu'une sous-division du *Cotula*, en a été séparé par Jussieu, de-





par le stigmate propre de la graine. Ainsi dans le Pois, le Haricot, le Marjonnier, les deux Cotylédons sont charnus et très-épais; ils sont au contraire minces et foliacés dans les graines jaunes d'un endosperme, comme le montrent les Euphorbiacées par exemple. Les Cotylédons, surtout quand il n'y a pas d'endosperme, paraissent destinés à fournir au jeune embryon, au moment où il commence à germer, les premiers matériaux de son accroissement. Aussi les voit-on se faner, diminuer de volume à mesure que le jeune Plant se développe. Tantôt les deux Cotylédons restent cachés sous la tige, après l'évolution du germe, tantôt ils sont élevés au-dessus du sol par l'accroissement de la tige. Dans le premier cas, on dit qu'ils sont *hypogés*; on les nomme *épigés* dans le second cas, où ils forment les feuilles séminales, comme dans le Haricot. Dans les Plantes munies d'un endosperme, les Cotylédons sont en général minces et comme foliacés; c'est dans l'endosperme qui fournit aux premiers développemens du jeune embryon. *V. EMBRYON et GERMINATION.* (A. R.)

**COTYLEPHORE.** *ROS.* Espèce du genre Asprède. *V. ce mot.* (B.)

**COTYLES.** *Cotyle.* *ACAL.* Péron et Leakeur ont donné ce nom à des organes particuliers situés sur les bras de quelques Méduses, appelés par Pallas *bras cotylifères* à cause de ces appendices ou feuilles séminales semblables à certains cotylédons végétaux. Ils n'appartiennent qu'à un très-petit nombre d'espèces, et semblent constituer les organes de la génération suivant Péron et Leakeur.

(LAM. X.)

**COTYLET.** *Cotyledon.* *ROS.* *PHAN.* Genre de la famille des Crassulacées et de la Dénandrie Pentagynis, L., fondé par Tournefort, adopté et caractérisé par Linné de la manière suivante : calice court, à cinq divisions profondes; corolle monopétale, campanulée, ou

tubuleuse, à cinq découpures; dix étamines insérées sur la corolle, à anthères arrondies; cinq ovaires supérieurs, coniques; chacun muni à sa base externe d'une écaille concave, noctériste, et se terminant ainsi chacun en un style de la longueur des étamines, à stigmates simples, courbés en dehors. À ces ovaires succèdent autant de capsules oblongues, ventrues, pointues, uniloculaires et s'ouvrant longitudinalement par le côté intérieur; semences petites et nombreuses. Adanson a séparé de ce genre toutes les espèces dont le système floral est quaternaire, et en a constitué le genre *Kalanchoë*, qui a été adopté par DeCandolle et Hawerth. Nous avons suivi leur exemple, et dans la précédente description générique, nous n'avons eu égard qu'aux Cotylets, décandriques et à corolles quinquécifées. Si nous admettions également le genre *Umbilicus* formé par DeCandolle (*Plantes grasses*, t. 156) avec les deux variétés du *Cotyledon Umbilicus* de Linné, que l'on rencontre fréquemment dans la France méridionale, et auxquels on joindrait les espèces d'Orient et de Sibérie, il s'ensuivrait que tous les vrais Cotylets seraient étrangers à l'Europe, et se réduiraient à environ une trentaine. *V. d'ailleurs les mots KALANCHOË et UMBILICUS.*

Les Cotylets sont en général des Plantes grasses, herbacées ou succulentes, à feuilles opposées, quelquefois alternes, à fleurs terminales, en corymbes ou en épis, indigènes du cap de Bonne-Espérance et de l'Afrique méridionale. On les cultive avec la plus grande facilité dans les jardins d'Europe où la singularité de leurs tiges et de leurs feuilles attire l'attention. Quelques espèces ont, en outre, des fleurs assez agréables à l'œil, tels sont le *Cotyledon orbiculata*, L., *C. fascicularis*, H. Kew, et *C. auria*. Comme ces Plantes sont d'une nature succulente et aqueuse, elles exigent en été une exposition méridionale, abritée des grands vents et de la grêle,

en hiver, une serre sèche, et de  
ais, imprégnée d'une humidité  
nante. Ce sont néanmoins des  
étaux dont la vie est, si l'on peut  
primer ainsi, excessivement ten-  
e; nous avons laissé un individu  
*Cotyledon orbiculata*, L., exposé  
oute la vigueur de l'hiver de 1822  
825, et l'été suivant, la Plante n'en  
as moins continué à végéter avec  
plus grande vigueur. (G. N.)

**COTYLIER.** BOT. PHAN. Même  
ose que Cotylet, *V.* ce mot. (B.)

**COTYLISQUE.** *Cotyliscus*. BOT.  
AN. Desvaux a proposé ce genre  
ur le *Cochlearia nitida* de Delile  
escript. de l'Égypte, p. 101, tab. 34,  
p. 2). De Candolle, dans le second vo-  
me de son *Systema Naturale*, l'érut-  
tan genre *Sonchiera* où il forme une  
ction particulière caractérisée par  
siliques non émarginées au som-  
et, concaves d'un côté, n'ayant  
urs valves ni rugueuses, ni ornées  
une crête sur leur dos. *V.* SÉNÉ-  
TÈRE. (A. R.)

**COTYPHOS** ou **COTYPHOS.**  
is. Syn. grec du Merle, *Turdus Mo-*  
*la*, L. *V.* MERLE. (DR. Z.)

\* **COTZ.** BOT. PHAN. *H.* BRAYERA.

**COU.** ZOOL. et BOT. Partie du  
orps de L'Animal qui unit la tête au  
onc. Il n'existe guère que dans les  
ortébrés; encore n'y est-il pas tou-  
ours distinct, puisque les Cétacés et  
es Poissons n'en offrent pas d'exem-  
le. Il est toujours sensible dans les  
utres Mammifères, quoique grossiè-  
ement prononcé dans quelques-uns,  
els que l'Éléphant, souvent indéci-  
dans les Reptiles, et très-remarquable  
chez les Oiseaux où il s'allonge ordi-  
airement d'une manière démesurée.  
Chez ces derniers la couleur ou la for-  
ne de cette partie a déterminé divers  
oms spécifiques; ainsi l'on a appelé :

**COU BLANC** (Albin), la Motteux.

\* **COU COURT** (au Sénégal), le  
Gros-Bec fauve.

**COU FAUVE** (Buffon), une Fauvette  
de Saint-Domingue.

**COU NOIR** (dans le midi de la  
France), le Rouge-Gorge.

**COU ROSE** (dans le même pays), le  
Torcol, etc.

Des Plantes, par allusion à la res-  
semblance qu'offrent quelques-unes  
de leurs parties, ont aussi reçu le  
même nom, et l'on a appelé :

**COU DE CHAMBAU**, le Narcisse des  
poètes.

**COU DE CICOONE**, l'*Erodium Cico-*  
*nium*.

**COU DE FENDU**, en Provence, une  
variété de Figaes. (A.)

**COUA, COUAS** ou **COULICOU.**  
*Coccyzus*. ORN. (Vieillot.) Genre de  
l'ordre des Zygodactyles. Caractères :  
bec robuste, épais à sa base, comprimé  
dans toute sa longueur, convexe au  
dessus, avec une arête distincte,  
courbé légèrement, fléchi à la pointe;  
narines placées à la base du bec (et  
sur ses côtés, ovales, à moitié formées  
par une membrane nue; pieds; quatre  
doigts; deux devant, dentelés;  
térieur beaucoup moins long que le  
tarse, deux derrière; ongles courts peu  
courbés; ailes courtes, arrondies; les  
cinq premières rémiges étagées, la cin-  
quième la plus longue; dix rémiges  
à la queue.

Les Couas dont la séparation d'avec  
les véritables Coucous a été indiquée  
par Levaillant, s'éloignent de ces  
derniers autant par différentes man-  
ces de mœurs que par quelques ca-  
ractères physiques ou extérieurs dont  
les plus saillants sont : l'absence des  
plumes longues et flottantes qui gar-  
nissent l'origine du tarse chez les  
Coucous; la longueur graduée des ré-  
miges qui donne à l'aile des Couas un  
développement régulièrement arqué,  
etc., etc. Les Couas ont en général  
une forme plus robuste, ils pa-  
raissent plus robustes, leur chant  
grave et plein ne tient aucunement  
des sons plaintifs et languissants qu'ex-  
prime celui des Coucous. Ils com-  
mencent leur migration vers le sud, et les  
placent soit sous l'abri touffu qu'of-

font plusieurs branches entrelacées, soit dans le tronc d'un vieux Arbre carie; leurs pontes consistent ordinairement en quatre ou cinq œufs d'un blanc verdâtre tiqueté de brun; ils élèvent leurs petits, et leur tendresse pour ces fruits de leur amour égale celle que l'on remarque dans la plupart des aimables hôtes des bocages. Ils se nourrissent de fruits et d'insectes.

En citant Levaillant comme créateur du genre Coua, Vieillot n'a cependant pas jugé à propos de lui conserver le nom qu'il avait employé le célèbre voyageur; il lui a substitué celui de Coulicou qui ne paraît pas présenter une idée plus exacte, et qui sans doute, de même que celui de Coua, ne peut exprimer qu'un cri de l'Oiseau. Cuvier paraît tendre à approuver la séparation ou la suite Vieillot du genre Coua ou Coulicou de l'espèce Tacco pour en former un genre nouveau; Temminck et Duméril ont pas jugé cette séparation rigoureusement nécessaire.

**COUA AUX AILES ROUSSSES**, *Cuculus americanus*, Lath., Buff., pl. enl. 366. Parties supérieures grises, s'irisent sous certains aspects; rémiges bordées de roux extérieurement; rectrices latérales noires terminées de blanc; parties inférieures blanchâtres; bec noirâtre; iris rougeâtre; pieds noirs. Taille, onze pouces. La femelle a les parties supérieures brunes sans reflets; on en a fait une espèce sous le nom de Cendrillard ou Coucou de Saint-Domingue.

**COUA ATINGACU**. *C. COUA CORNU*.

**COUA DES BARRIÈRES**, *Coccyzus septentrionalis*, Vieill. Parties supérieures grises; rectrices terminées de blanc; parties inférieures blanchâtres avec la gorge cendrée; bec noirâtre; pieds cendres. Taille, onze pouces. De la Guinée.

**COUA A BEC ROUGE**, *Coccyzus rubrirostris*, Vieill. Parties supérieures d'un gris cendré, passant au noirâtre irisé de vert et de bleu sur les ailes et la queue; rectrices longues, élargées et termi-

nées de blanc; joues gorge et devant du cou d'un roux vif; plumes du ventre cendres; le reste des parties inférieures d'un roux fauve; bec d'un rouge vif; pieds gris. Taille, onze pouces. De Java. Un individu a peu près semblable et que nous ne pouvons être une femelle, nous l'avons envoyé de Bornéo; il n'en diffère que par le plastron qui est d'un brun terne.

**COUA BRUN VARIÉ DE ROUX**, *Cuculus Navius*, L., pl. enl. 81. Parties supérieures brunes variées de cendré et de roussâtre; plumes du sommet de la tête assez longues et terminées par une tache roussâtre qui est aussi la couleur qui borde les scapulaires; gorge et devant du cou roussâtres, avec quelques petits traits bruns; parties inférieures blanchâtres; rémiges et rectrices brunes, bordées de roux; bec noir, roussâtre en dessous; pieds noirâtres. Longueur, dix pouces six lignes. De la Guinée.

**COUA A CALOTTE NOIRE**, *Oxyechus melacoryphus*, Vieill. Parties supérieures brunes avec le sommet de la tête et un trait de chaque œil en dessous de l'œil, pointes des rectrices intermédiaires brunes. Les ailes noires, toutes sont terminées de blanc; parties inférieures blanches, marquées de roux; bec noir; iris rougeâtre; pieds d'un cendré blanchâtre. Taille, dix pouces six lignes. De la Guinée.

**COUA CENDRÉ**, *Coccyzus cinnereus*, Vieill. Parties supérieures d'un brun cendré avec les rectrices terminées de blanc que précède une ligne noire; gorge et devant du cou d'un cendré pâle; parties inférieures blanches avec les flancs roussâtres; bec noir; iris brun; pieds verdâtres. Taille, huit pouces six lignes. De l'Amérique méridionale.

**COUA CENDRILLARD**. *C. COUA AUX AILES ROUSSSES*.

**COUA CROÛTÉ**, *Coccyzus Cacaï*, Vieill. Parties supérieures d'un brun noirâtre avec les plumes bordées de cendré et de roussâtre; celles de la nuque longues, noires et bordées largement de roux foncé; sourcils

rectrices alaires brunes, bordées de roussâtre, ce qui sur l'aile trois espèces de bandes cendrées et roussâtres; rectrices longues, rémiges jaun-blanchâtre; rectrices étagées ou moins terminées de blanc; rales presque entièrement noires; dessous; cette couleur est aussi au poignet; parties inférieures, les, roussâtres sur la gorge et anus, blanchâtres sur les flancs; roussâtre, noir sur l'arête; pieds bruns. Taille, onze pouces. De la Guiane.

**COU GROND VIEILLARD.** *Coccyzus Chrys.* Parties supérieures noires, les plumes de la nuque assés longues et étroites, terminées de; de la base du dos et des scapulaires de roussâtre; quatre traits en dessous et en dessous de l'œil; et en devant du cou, serres, rayés noir; parties inférieures blanchâtres, nuancées de brun; bec noir; rectrices longues, à la base, blanchâtres; Taille, neuf pouces.

Le mâle, dans la saison des nids, a les rectrices et les rémiges bordées de brun vif, et une bande noire sur le milieu de l'aile. De la Guiane.

**COU CORNU.** *Cuculus cornutus et coccyzus cornutus.* Vieill. Parties supérieures d'un brun foncé, avec la nuque garnie de longues plumes formant une double huppe; rectrices latérales terminées de blanc; parties inférieures cendrées; bec verdâtre; iris, rouge; pieds cendrés. Taille, onze pouces. Du Brésil.

**COU GROND VIEILLARD.** *Coccyzus Geoffroyi.* Temp. color. 7. Parties supérieures noires avec le bord des rectrices roussâtre; des plumes écaillées de fauve et de noir sur la front; une huppe bleue d'acier sur le sommet de la tête; bord des moyennes rémiges bleu; grandes rémiges et rectrices d'un brun violet; rectrices latérales bordées de vert; gorge et devant du cou mailles de brun et de fauve; un demi-collier noir sur le haut de la poi-

trique; ventre fauve; ardoise, d'un roux brunâtre. Taille, vingt pouces. Du Brésil.

**COU HUPPE DE MADAGASCAR.** *Coccyzus cristatus.* Lath.; Coulicou Coua, Vieill., Buff., pl. enl. 539. Parties supérieures d'un cendré verdâtre, avec la nuque ornée de longues plumes susceptibles de se redresser; rémiges et rectrices d'un verdâtre grisé évidemment; des dernières étagées et terminées de blanc; parties inférieures blanchâtres avec la poitrine roussâtre; bec et pieds noirs; iris orangé. Taille, quatorze pouces.

**COU GRAND VIEILLARD.** *Coccyzus aux ailes rouges.*

**COU DES PALÉTOUVIERS.** *Cuculus seniculus.* Lath.; Buff., pl. enl. 815.

Parties supérieures cendrées; une bande grise à l'angle postérieur de l'œil; rectrices blanches terminées de blanc, les deux intermédiaires totalement grises; parties inférieures jaunes; bec et pieds noirs. Taille, douze pouces. La femelle a la gorge et le haut de la poitrine blanchâtres. De la Guiane.

**COU NOIR GUYANAIS.** *Coccyzus minutus.* Vieill.; *Coccyzus guyanensis.* Var., Lath. Parties supérieures d'un marron pourpré; rémiges bordées et terminées de brun; rectrices bordées de blanc; gorge et poitrine d'une teinte plus pâle que le dos; parties inférieures d'un marron foncé; bec et pieds bruns. Taille, dix pouces. La femelle a les couleurs moins foncées. De la Guiane.

**COU PETIT VIEILLARD.** *Coccyzus des palétouvières.*

**COU PIAYE.** *Cuculus Caiana.* Lath., Buff., pl. enl. 311. Parties supérieures d'un marron pourpré avec les rémiges terminées de brun et les rectrices blanches à l'extrémité qui a aussi une raie noire; gorge et poitrine d'un marron clair; parties inférieures cendrées; bec et pieds bruns. Taille,

seize pouces. De la Guiane. On trouve quelquefois une variété à tête rousse et à poitrine grise; une autre à tête grise, à poitrine rousse et à ventre noirâtre, etc.

COUA POINTILLÉ, *Coccyzus punctulatus*, Vieill., *Cuculus punctulatus*, Lath. Parties supérieures brunes légèrement irisées, avec chaque plume terminée de roux; rémiges et rectrices d'un brun foncé, tachetées de roux à l'extrémité; parties inférieures blanchâtres; bec noir. Taille, neuf pouces. De la Guiane. Quelques auteurs pensent que ce n'est qu'une variété du Coua Chiriri.

COUA À POITRINE BLEUÂTRE, *Cuculus Caianus*, Var., Lath. Parties supérieures d'un cendré bleuâtre; front, gorge et partie du cou d'un roux vif; sommet de la tête, dessus et côtés du cou, poitrine d'un bleu cendré; parties inférieures d'un brun marron; bec rougeâtre; pieds cendrés. Taille, quinze pouces. Du Brésil.

COUA QUARACTOL, *Cuculus ridibundus*, Lath. Parties supérieures d'un brun fauve; gorge, devant du cou et poitrine cendrés; ventre et rectrices caudales inférieures noirs; bec noirâtre; iris blanc; pieds noirs; Taille, seize pouces. Du Mexique.

COUA ROUX, *Coccyzus rutilus*, Vieill. Parties supérieures d'un roux ardent; nuque garnie de longues plumes susceptibles de se relever en huppe; gorge et poitrine roussâtres; parties inférieures cendrées; bec jaunâtre; pieds bruns; queue très-étagée. Taille, dix pouces. Du Brésil.

COUA DE SAINT-DOMINGUE. V.

COUA AUX AILES ROUSSES.

COUA TACCO, *Cuculus vetula*, L., *Cuculus pluvialis*, L., *Saurathera vetula*, Vieill., Buff., pl. enl. 772. Parties supérieures d'un cendré olivâtre; rectrices étagées, les latérales terminées par deux taches, l'une noire et l'autre blanche; gorge et poitrine cendrées; parties inférieures rousses; bec brunâtre; iris brun; peau nue qui entoure les yeux rouge; pieds cendrés. Taille, seize pouces. La femelle est plus petite; elle a les couleurs plus

claires, la gorge et la poitrine blanchâtres, etc. De la Guiane.

COUA TACHETÉ DE CAYENNE, V. COUA BRUN VARIÉ DE ROUX.

COUA TACHETÉ DE LA CHINE, *Cuculus maculatus*, Lath., Buff., pl. enl. 764. Parties supérieures d'un gris verdâtre, variées de blanc et de brun à reflets dorés; tête et cou noirs avec quelques taches blanches au-dessus des yeux; rectrices rayées de blanc et de brun; gorge et poitrine variées de blanc et de brun; les parties inférieures rayées de ces mêmes couleurs; bec noirâtre; jauné en dessous; pieds jaunâtres; couverts par les plumes tombantes de la jambe. Taille, quatorze pouces.

COUA TAIT-SOU, *Cuculus caruleus*, Buff., pl. enl. 295, fig. 5. Tout le plumage d'un bleu foncé irisé sur les ailes et principalement sur la queue où les reflets verts et violets sont très-éclatants; bec et pieds noirs; yeux entourés d'une membrane rouge. Taille, dix-sept pouces. Les jeunes sont d'un bleu vert sans reflets. De Madagascar.

COUA À TÊTE NOIRE, *Cuculus auriceps*, Miller, pl. 48. Parties supérieures d'un cendré brun, plus clair sur le cou, avec le croupion et la tête jaunes; rectrices alaires noires, bordées de cendré; rectrices jaunes rayées transversalement de noir; gorge jaune; poitrine grise rayée de brun; parties inférieures blanchâtres; bec et pieds bruns; yeux entourés d'une tache noirâtre. Taille, huit pouces six lignes. De l'Amérique méridionale.

COUA À TÊTE ROUSSE, *Coccyzus fuscicapillus*, Vieill. Parties supérieures variées de blanc et de brun; sommet de la tête garni de longues plumes rousses; une tache rousse de chaque côté de la tête; nuque et parties inférieures blanches; bec et pieds rougeâtres. Taille, huit pouces. De l'Australasie.

COUA TINGAZU, *Coccyzus Tingazu*. Parties supérieures d'un brun jaunâtre; rémiges et rectrices brunes; gorge et devant du cou brunâtres;

ties inférieures cancrées, tantes  
oux; bec verâtre; iris et paupières  
rouges; pieds noirs. Taille,  
neuf pouces. De l'Amérique mé-  
ridionale.

COUA VERPATER. *Cuculus maculatus*. Lath. Buff. pl. angl.

Parties supérieures brunes; vanes d'olivâtre; rectrices latérales linées de blanc; gorge olivâtre; ancée de jaune; poitrine fauve; ties inférieures brunes; bec noir; orange; pieds d'un brun jaunâtre. Taille, vingt-un pouces. D'Afrique.

COUA VINILLARD. *V. COUA TACCO*.

COUA-BOUE. ois. Syn. de Merle roche en Piémont.

COUACHO. ois. L'un des noms qu'on donne aux Berges de la Bergeronnette.

COUAGGA. MAM. Espèce du Cheval. *V. ce mot.*

\* COUAHOUGH. ins. (Gaimard.) Nom d'une Panaise des bois à Owhyhee, îles Sandwich.

\* COUAL. ins. (Gaimard.) Syn. des îles Carolines de *Pediculus carolinensis*. *V. Pou.*

COUALE. ois. L'un des noms vulgaires de la Corneille mantelée.

COUALIOS. ins. Les œufs tardifs de la couvin de rebut des Vers à soie dans les provinces de France où l'on élève de ces Animaux.

COUAMELLE ET COUANELLE. OT. CRYPT. *V. COLMELLE.*

COUANA. BOT. PHAN. Chou, ou plutôt bourgeon fort bon à manger qui a le goût de la Noisette, provenant d'un Palmier du genre Avoira Cayenne.

COUANDOU. MAM. PORE. Genou. *V. ce mot.*

COUA-NEIRA. ois. Le Merle à castron blanc en Piémont.

\* COUAOUROU. BOT. PHAN. (Gai-

nard.) Nota que les insulaires de Nouvelle Owhyhee et de l'Archipel des Sandwiches donnent à un genre de palmier.

\* COUAQUE. BOT. PHAN. La Cassave à la Guiane.

COUABCH. BOT. PHAN. *V. COUABCH.*

COUA-ROUS COUA ROUSSA ET COUA ROUSSOT. ois. Noms vulgaires du Rouge-Queue dans les Alpes.

COUAS. ois. *V. Coua*, espèce de Corneille dans quelques parties de la France.

COUATA. MAM. Même chose que Coaita. *V. ATÈLES et SAPAJOU.*

COUATI. MAM. ROME. Caiman. *V. ce mot.*

\* COUB. ZOOL. (Gaimard.) Syn. d'Ongle aux îles Carolines.

COUBLANDIE. *Coublandia*. BOT. PHAN. Dans sa Flore de la Guiane, Aublet avait formé ce genre et lui attribuait la saillie d'une Mimosa et le fruit de *Mullera*. Le professeur Richard, qui a visité pendant huit années les mêmes contrées qu'Aublet, a reconnu que ce prétendu genre n'existait pas et que cette erreur avait été causée par l'entrelacement de *Mullera montifrons* et d'une espèce de *Mimosa*.

COUCAL. ois. L'un des noms vulgaires de l'Épouvantail, *Sterna fissa*, pes, L.

COUCAL, *Centropus*. ois. (Illiger.) Genre de l'ordre des Zygodactyles. Caractères : bec robuste, dur, plus haut que large, courbé surtout à la pointe, comprimé; aile élevée en carène; narines placées à la base du bec et sur les côtés, étroites, diagonalement fendues, à demi-formées par une membrane nue; quatre doigts; deux devant soudés à la base, deux derrière dont l'extérieur versatile; ongle du pouce allongé, presque droit, subulé; ailes courtes; les trois premières rémiges également étalées; la quatrième presque égale à la cinquième.





*nis maculatus*, Vieill. *V. COU-*  
*RENGINUS.*

*CAL RUFUM.* *V. COUCAL*  
*RU.*

*CAL RUFIN.* *Corydonis rufinus*,  
Levaill., Ois. d'Afrique, pl. 221.

supérieures d'un roux bru-  
rayées longitudinalement de  
roux; rectrices alaires rou-  
x; rectrices secondaires largement  
de brun; rectrices d'un roux  
avées transversalement de brun;  
s inférieures blanchâtres, lavées  
de roux; bec et pieds jaunâtres. Taille,  
pouces. D'Afrique.

*UCAL TOULOU.* *Cuculus Tolu*,  
Buff., pl. enl. 295, fig. 1. Parties  
supérieures d'un brun noirâtre, avec  
lieu des plumes d'un blanc roux;  
scapulaires et rectrices alaires  
brun marron, bordées de noi-  
r; gorge rousse variée de brun;  
s inférieures, croupion et rec-  
trices d'un vert noirâtre; bec brun;  
s noirâtres. Taille, quatorze pou-  
ces. De Madagascar.

*OUCAL VARIÉ.* *Corydonis varie-*  
*us*, Vieill. Parties supérieures bru-  
n, variées de roux et de noir, avec  
parties du dos et du croupion gar-  
dées de plumes noires, à barbes fila-  
menteuses, désséchées; rectrices très-  
gros, étagés, bruns, rayés trans-  
versalement de roux; parties inférieu-  
res d'un brun roussâtre avec la tige  
des plumes blanche et soyeuse; bec et  
pieds rougeâtres. Taille, vingt-un pou-  
ces. De la Nouvelle-Hollande.

*COUCAL A VENTRE BLANC.* *Cory-*  
*donis leucogaster*, Vieill. Parties su-  
périeures noires, rayées transversale-  
ment de blanc; tête, cou et parties  
inférieures noires avec la tige des  
plumes blanchâtre; plumes des jambes  
brunes; bec et pieds noirs. De l'Aus-  
tralie.

*Coucou.* *Cuculus.* *AVICULUS.* *Cory-*  
*donis viridis*, Vieill.; *Cuculus aegy-*  
*ptius*, Var.  $\beta$ , Lath. Le plumage d'un  
vert noirâtre, à l'exception des ailes  
qui sont d'un rouge brun foncé; les  
barbes des plumes noires et effilées  
portant elles-mêmes d'autres barbes  
assez longues; bec et pieds noirs.

Taille, trois pouces. De la Nouvelle-  
Guinée.

*\*COUCARELA.* *BOU PHAN.* (Couv.)  
Variété de Figue jaune en dehors,  
rouge en dedans.

*COUCARELO.* *BOU PHAN.* L'un  
des noms vulgaires du *Corylus Ombi-*  
*lic.*

*COUCHES.* *OIS.* *V. TERNAN.*

*COUCHES CORTICALES.* *BOU*  
*PHAN.* *V. BOUS.*

*COUCHES LIGNEUSES.* *BOU*  
*PHAN.* *V. BOUS.*

*COUCHES LIGNEUSES.* *BOU*  
*DROPH.* Aucun naturaliste ne recon-  
naît de véritables Couches ligneuses  
dans les Hydrophytes; cependant nous  
en avons démontré l'existence dans un  
Mémoire lu à la Société Philomatique  
de Paris. Un extrait en a été inséré  
dans le Bulletin, que publie cette sa-  
vante compagnie, ainsi que dans  
notre Essai sur les genres des  
Thalassiphytes particulièrement les  
Couches ligneuses sont très apparen-  
tes dans les tiges desséchées des gran-  
des Laminaires, des Fucus, et de  
quelques autres Plantes de la classe  
des Hydrophytes qui vivent plusieurs  
années.

*\*COUCHILLE.* *BOU PHAN.* (Ouv.)  
Vieux nom du *Chenopodium*. *V. COUCH.*

*CODEHOCHA.* *OIS.* Syn. langue-  
dozien de Litorne.

*\*COUCLA.* *OIS.* Syn. de Pigeon  
Pompadoir, *Columba Pompadora*,  
Lath. *V. PIGEON.*

*\*COUCODE.* *OIS.* Espèce du genre  
Faucon, *Falco cuculoides*, Temm. pl.  
color. 110. *V. FAUCON*, division des  
Autours.

*COUCOU.* *Cuculus.* *OIS.* (Linné.)  
Genre de l'ordre des Zygodactyles.  
Caractères: bec médiocre, de la lon-  
gueur de la tête, légèrement arqué  
compagné; mandibules non échancrées,  
massives, placées à la base du  
bec et presqu'au bord de la mandibule,  
entourées d'une membrane saillante;  
pieds emplumés au dessous

du genou, assez courts; deux doigts devant soudés à leur base, et deux derrière entièrement digisés, dont l'extérieur réversible; queue longue, ordinairement étagée; dix rectrices; ailes médiocres; la première rémige de moyenne longueur; la deuxième un peu plus courte que la troisième qui est la plus longue.

Une habitude que des physiologistes ont prétendu faire dépendre de la position de quelques viscères dans la constitution physique des Coucous, distingue, isole même ces Oiseaux de tous les autres. Cette habitude, en opposition avec les lois naturelles, et qui, d'après divers observateurs dignes de foi, n'est point particulière à certaine espèce, mais commune à toutes celles qui composent le genre, porte les femelles à déposer le fruit de leurs amours dans des nids étrangers, souvent même dans ceux de très-petites espèces de Sylviés. Ce fait, unique dans l'histoire des Oiseaux, devait nécessairement ne point échapper à l'observation des premiers temps; aussi a-t-il donné lieu aux conjectures les plus ridicules et les plus erronées sans que l'on soit parvenu encore à en pénétrer la véritable cause. Parmi les probabilités suggérées par l'imagination, on remarque celle du collaborateur de Buffon; elle serait déduite de l'instinct de la femelle du Coucou à dérober sa future famille à la glotonnerie du mâle qui, devant en général dans les nids les œufs qu'il y rencontre, n'épargnerait pas même sa progéniture. Cette supposition, bien hasardée, est néanmoins celle à laquelle il répugne le moins de s'arrêter. Aux conjectures sur ce qui peut condamner la triste femelle du Coucou à ignorer les douceurs de l'incubation, douceurs bien grandes sans doute, puisque souvent on les a vues préférées à la conservation de l'existence, en ont snecédé d'autres sur les motifs qui faisaient choisir le nid d'un très-petit Oiseau, plutôt que tel autre où le jeune Coucou, en sortant de l'œuf, se trouverait plus à l'aise; on a pensé que le même

instinct portait les femelles à démolir, parmi les Oiseaux, l'espèce qui témoignait le plus de tendresse dans l'éducation de ses petits, celle qui se nourrissait des mêmes alimens, celle encore peut-être qui ne serait pas douée d'une force suffisante pour se venger sur le jeune Coucou, à l'instant où il viendrait à éclore, de la supercherie de la mère. Ces conjectures ne sont pas moins admissibles que les précédentes, mais qu'elles peuvent être loin encore de la réalité! On a cru long-temps que la femelle du Coucou faisait sa ponte directement dans le nid qu'elle avait choisi; mais comment penser qu'un aussi-gros Oiseau pût s'accroupir dans un très-petit nid sans le déformer et le détruire, qu'il pût se soutenir sur le branchage faible et flexible où se trouve construit un semblable nid? Levailant, qui assure avoir saisi sur le fait la mère trop prudente ou la marâtre insensible, selon que l'on voudra prendre la chose, dit que l'œuf, d'abord déposé par terre, est immédiatement avalé par la femelle, de manière qu'il passe intact de l'oviducte dans l'œsophage avant d'arriver au nid, ce qui est un fait absolument particulier. Les quatre à six œufs, dont se compose la ponte, sont ainsi successivement déposés dans autant de nids différens; ce seul œuf n'alarme pas la couveuse, dont l'attachement pour les siens lui fait surmonter la répugnance de partager ses soins entre eux et un étranger, lequel, presque aussitôt après sa naissance, se trouve forcé d'user d'ingratitude et de rejeter surivement l'un après l'autre, du lit qui ne pourrait les contenir tous ensemble, ses possesseurs naturels et légitimes.

Le vol des Coucous est en général bas et tortueux; on ne les voit presque jamais se poser à terre; il est vrai que la conformation de leurs pieds et de leurs cuisses les rend peu propres à la marche; leur chant, que tout le monde connaît, a beaucoup d'analogie dans les diverses espèces, et toutes ne le font entendre que pendant la saison des amours; ils fré-

tiennent de préférence les bois et y sont solitaires; quoique peu sauvages, ils se laissent difficilement approcher; bien des fois ils ont, par un mouvement continu, qui indique à eux beaucoup d'inquiétude, passé à bout la patience du chasseur; ils ne se nourrissent que d'Insectes, de larves et de Vers, ce qui les confine dans les pays chauds et les porte à visiter les climats tempérés que dans la saison où les Insectes y montrent.

Le genre Coucou, que Linné avait rendu très-nombreux, a été partagé, dans les méthodes plus récentes, en divers autres genres; tels sont: les Coucous proprement dits, les Coua, Coucal, Courol, Indicateur, Malha, Couraco, etc.

**COUCOU D'ANDALOUSIE**, *Cuculus andalusæ*, Briss.; *Cuculus glanialis*, Gmel. Parties supérieures brunes noirâtres; tête garnie de plumes soyeuses, assez longues pour relever en huppe; une bande noire traversant les yeux; rémiges et rectrices alaires terminées par une tache blanche; rectrices étagées, noirâtres en dessus, cendrées en dessous; les térales terminées de blanc; parties inférieures d'un roux brunâtre; bec et pieds noirs. Taille, seize pouces. Afrique; de passage dans le midi de l'Europe.

**COUCOU ARAVEREVA**, *Cuculus Taiensis*, Lath. Parties supérieures brunes, rayées et traversées de roux; deux traits blancs de chaque côté de la tête; rectrices longues, étagées, recouvertes de nombreuses raies brunâtres, terminées de blanc; parties inférieures blanchâtres, rayées de brun; bec noirâtre en dessus, blanc en dessous; iris jaune; pieds noirâtres. Taille, dix-huit pouces. De l'Océanie.

**COUCOU BARIOLE**, *Cuculus variegatus*, Vieill. Parties supérieures variées de brun et de blanc; rémiges brunes, avec des espèces de festons blancs; rectrices brunes, bariolées de blanc, égales; gorge, devant du cou et poitrine bleuâtres; parties infé-

rieures blanches. Longueur, quatorze pouces. De l'Australasie.

**COUCOU DU BENGAL**, *V. Coucal ferrugineux*.

**COUCOU BLEU DE LA CHINE**, *Corbeau-Pie bleue à bec rouge*.

**COUCOU BLEU DE MADAGASCAR**, *V. Coua Tait-Sou*.

**COUCOU BLEUÂTRE**, *Cuculus corallæscens*, Vieill. Parties supérieures d'un brun cendré; rectrices longues, rayées de noir et de blanc; parties inférieures d'un cendré bleuâtre, blanches sur l'abdomen; bec brun; pieds rougeâtres. Taille, huit pouces. De l'Australasie.

**COUCOU BOUTSALLICK**, *Cuculus scolopaceus*, Lath., Buff., pl. enl. 586. Parties supérieures brunes, tachetées de fauve; parties inférieures tachetées de blanc, de roux et de noir; queue étagée; bec et pieds jaunâtres. Taille, quatorze pouces. Du Bengale.

**COUCOU BRUN ET JAUNE À VENTRE RAYÉ**, *Cuculus radiatus*, Lath. Parties supérieures d'un brun noirâtre; sommet de la tête cendré; côtés de la tête et gorge rougeâtres; rectrices noires, rayées et terminées de blanc; parties inférieures jaunâtres, rayées de noir; bec noir; iris orange; pieds roux. Taille, quatorze pouces. Des Indes.

**COUCOU BRUN RIQUETÉ DE ROUX**, *Cuculus punctatus*, Lath., Buff., pl. enl. 771. Parties supérieures brunes, rayées et tachetées de roux; une bande rousse de chaque côté de la tête; parties inférieures rousses, finement rayées de noirâtre; queue étagée; bec grisâtre; pieds bruns. Taille, dix-sept pouces. La femelle a les taches moins marquées et les parties inférieures d'un roux très-clair. Des Indes.

**COUCOU BRUN RAYÉ À CRUPION ROUSSÂTRE**, *V. Coucou commun*, femelle.

**COUCOU BRUN ET TACHETÉ DES INDÉS**, *V. Coucou Boutsallick*.

**COUCOU BRUN VARIÉ DE NOIR**, *V. Coucou Araveréva*.

**COUCOU BRUN VARIÉ DE NOIR.** *Coua CROCH.*

**COUCOU DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.** *Cuculus Capensis*, L., Buff., pl. enl. 390. Parties supérieures d'un brun roussâtre; rectrices terminées de blanc; rémiges brunes; gorge et devant du cou roussâtres; parties inférieures blanches, rayées transversalement de cendré; bec et pieds noirs. Taille, douze pouces. Divers auteurs pensent que c'est une variété du Coucou d'Europe.

**COUCOU DE LA CAROLINE.** *Coua AUX AILES ROUGES.*

**COUCOU DE CAYENNE.** *Coua PRAYE.*

**COUCOU CENDRÉ.** *Cuculus cinereus*, Vieill. Plumage cendré, plus clair sur le ventre et l'abdomen; rémiges et rectrices bordées inférieurement d'une petite dentelure blanche; queue étagée; bec brun; pieds gris. Taille, onze pouces. De la Nouvelle-Hollande.

**COUCOU CENDRILLARD.** *Coua AUX AILES ROUGES*, femelle.

**COUCOU CHALCIDE.** *Cuculus Chalcide*, Hlig., Temm., pl. color. 102, fig. 2. Parties supérieures d'un brun faiblement bronzé, avec le bord des rectrices d'un brun fauve foncé; sommet de la tête et dessus du cou d'un fauve foncé; rémiges et rectrices bordées de fauve; ces dernières étagées et terminées de blanc; les latérales coupées de taches blanchâtres; parties inférieures blanches; bec cendré; pieds bruns. Taille, cinq pouces six lignes. De la Nouvelle-Hollande.

**COUCOU A COLLIER.** *Coucou HOPPE* A L'ESPÉRANTO. *Coucou HOPPE* A COLLETT.

**COUCOU COMMUN.** *Coucou* D'EUROPE.

**COUCOU CORNU.** *Coucou CORNU.*

**COUCOU COUA.** *Coua* ESTRE COULICOU.

**COUCOU COUKEL.** *Cuculus orientalis*, Lath., Buff., pl. enl. 274, fig. 1. Tout le plumage noir, irisé en vert, violet et pourpre; bec et pieds gris. Taille, seize pouces. Du Bengale.

**COUCOU CILIAN.** *Cuculus ciliatus*,

Lath., Levaill., pl. 204 et 205. Plumage d'un noir bleuâtre; rémiges noires vers l'extrémité; rectrices étagées, terminées de blanc; bec noir; pieds jaunâtres. La femelle a les plumes des parties inférieures bordées de roux, et le jeune mâle a les parties traversées de lignes rouges. Taille, douze pouces. De l'Afrique, où ses cris, presque continus et diversément répétés, ont valu à cet Oiseau le nom qui lui a été imposé.

**COUCOU COUL.** *Cuculus hombrinus*, L., Buff., pl. enl. 294. Parties supérieures noires, avec deux taches blanches à l'extrémité de chaque plume; une seule tache termine les rectrices caudales; rémiges cendrées; rectrices noirâtres; les unes et les autres rayées transversalement de blanc; parties inférieures blanches, rayées de cendré; bec et pieds gris; iris orangé. Taille, douze pouces. Des Indes.

**COUCOU CUYRE.** *Cuculus eupreus*, L. Parties supérieures vertes, à reflets cuivreux, brillants; une tache triangulaire blanche à l'extrémité de chaque rectrice latérale; parties inférieures d'un beau jaune; bec et pieds noirs. Taille, huit pouces. D'Afrique.

**COUCOU DIDRIS.** *Cuculus didris*, L., Buff., pl. enl. 657; Levaill.; Ois. d'Afrique, pl. 210 et 211. Parties supérieures d'un vert doré, avec cinq bandes blanches sur la tête; rémiges d'un brun verdâtre, tachetées de blanc; rectrices peu étagées; terminées de blanc; les latérales tachetées de blanc; parties inférieures blanches; bec et pieds bruns; iris orangé. Taille, sept pouces six lignes. La femelle a les parties supérieures roussâtres et les inférieures roussâtres. Le jeune mâle a ces dernières parties nuancées de gris.

**COUCOU DE SAINT-DOMINGUE.** *Coua AUX AILES ROUGES*, femelle.

**COUCOU SOLATANT.** *Cuculus solitarius*, Lath., Temm., pl. color. 102, fig. 1. Parties supérieures brunes, à reflets brillants, dorés et verdâtres; chacune des plumes bordée de blanc.

châtre; parties inférieures blanchâtres, rayées transversalement de brun doré; rectrices inférieures rousses à leur origine; les latérales entièrement tachetées de blanc et de noir; bec et pieds noirâtres. Taille, six pouces. La femelle a le sommet de la tête d'un brun cendré; les reflets des parties supérieures absolument verts; les parties inférieures d'un blanc sale, rayées de brun. Elle paraît être le

*Coucou Péopo-Aworo*. *Cuculus* *ater*, Gmel.; *Oedolus*, Ouv.; *C. surdus*, Spar., Levaill., Ois. d'Afrique, pl. 207 et 208, Buff., pl. enl. 872. Plumage

noir, avec les plumes de la queue longues et effilées; rémiges et rectrices à reflets verts; une plaque blanche sur les rémiges intermédiaires; bec noir; pieds bruns. Taille, douze pouces. La femelle, Buff., pl. enl. 872, a les parties inférieures et l'extrémité de la queue blanches. Le jeune mâle a les parties supérieures d'un noir brunâtre et les inférieures d'un blanc grisâtre. D'Afrique et des Indes.

*COUCOU A ÉPAULETTES*. *V. COUABEUN*. VARIÉ DE ROUX.

*COUCOU FAISAN*. *V. COUCAL FAISAN*.

*COUCOU (GRAND) DE MADAGASCAR*. *V. COUCOU VOUDOUZOU*.

*COUCOU (GRAND) TACHETÉ*. *V. COUCOU D'ANDALOUSIE*.

*COUCOU ORNÉ-MONTE*. *Cuculus* *ornatus*, Vieill., Levaill., Ois. d'Afrique, pl. 218. Parties supérieures d'un vert foncé et brillant; les inférieures grises, avec quelques reflets verts; bec jaunâtre; pieds noirs. Taille, douze pouces. D'Afrique.

*COUCOU ORNÉ D'EUROPE*. *Cuculus* *canorus*, L., Buff., pl. enl. 811. Parties supérieures d'un cendré bleuâtre, plus foncé sur les ailes, plus clair sur la gorge et la poitrine; des taches blanches sur les barbes internes des rémiges; rectrices noirâtres, tachées et terminées de blanc; parties inférieures blanchâtres; rayées transversalement de noir; bord du bec, iris et pieds jaunes. Taille, onze pouces. Les jeunes ont les plumes tachées de roux

et bordées de blanc; dans un âge très-avancé, la teinte générale est olivâtre, avec des bandes roussâtres; les parties inférieures sont blanchâtres, rayées transversalement de cendré, de roussâtre et de noir. C'est cette espèce si répandue dans nos campagnes sur laquelle on a débité tant de fables, et qui sert vulgairement de texte à de vieilles plaisanteries rejetées de la bonne société.

*COUCOU A GROS-BEC*. *Cuculus* *crassirostris*, Vieill., Ois. d'Afrique, pl. 214. Entièrement noir, avec des reflets bleus sur les ailes et la queue; bec verdâtre; pieds d'un brun jaunâtre. Taille, douze pouces. La femelle a les parties inférieures d'un brun brunâtre. D'Afrique.

*COUCOU HUPPÉ DU BRÉSIL*. Syn. de *Cuculus* *Piriquia*, Vieill. *V. ANT.*

*COUCOU HUPPÉ A COLLIER*. *Cuculus* *coromandus*, L., Buff., pl. enl. 274, fig. 4; Levaill., Ois. d'Afrique, pl. 215. Parties supérieures noirâtres avec les plumes bordées de roux; des plumes longues et larges forment sur la nuque une huppe assez roide; une petite tache grise près de l'œil; un collier blanc sur le cou; parties inférieures blanches avec la gorge rousse ou noirâtre; queue noirâtre, longue et étagée; bec et pieds cendrés; iris jaunâtre. Longueur, douze pouces. La femelle a les ailes roussâtres et la gorge blanche. De la côte de Coromandel.

*COUCOU HUPPÉ DE COROMANDEL*. *V. COUCOU HUPPÉ A COLLIER*.

*COUCOU HUPPÉ DE LA CÔTE DE COROMANDEL*. *V. COUCOU ÉDOLIO*.

*COUCOU HUPPÉ DE GUINÉE*. *V. TOUTRACO*.

*COUCOU HUPPÉ DE MADAGASCAR*. *V. COUABEUN*.

*COUCOU ENROATEUR*. *V. INDICATEUR*.

*COUCOU JACOBIN HUPPÉ*. *V. COUCOU ÉDOLIO*, femelle.

*COUCOU DE LA JAMAÏQUE*. *V. COUATACO*.

*COUCOU KLAAS*. *Cuculus* *Klaasi*, Ouv., Levaill., Ois. d'Afrique, pl. 212. Parties supérieures d'un vert

enivreux; un petit trait blanc au-dessus de l'œil; remiges d'un vert noirâtre bronzé; taches de blanc en desquels; rectrices cuivrées, les trois latérales presque entièrement blanches; parties inférieures blanches avec quelques traits longitudinaux sur l'abdomen; bec et pieds bruns; iris jaune. Taille, huit pouces. D'Afrique.

COUCOU A LONG BEC DE LA JAMAÏQUE. *V. COUA TACOO.*

COUCOU A LONGS BEINS. *V. DRONGOLA HAQUETTES.*

COUCOU DE MADAGASCAR. *V. COUCOU TAVIO.*

COUCOU DE MALABAR. *V. COUCOU CENDRÉ.*

COUCOU MAROC OU MOROCCO. *V. COUCOU LEBYNNIQUES.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU NOIR DU BENGAL. *V. Cuculus bengalensis niger.*

COUCOU (PETIT) DE L'ÎLE PANAY. *V. PETIT COUCOU A TÊTE GRISE ET VENTRE JAUNE.*

COUCOU (PETIT) NOIR DE CAYENNE. *Cuculus tenebrosus*, Lath., Buff., pl. enl. 505. *V. TAMATIA A PIEDS JAUNES.*

COUCOU (PETIT) SONNERAT OU DES INDES. *Cuculus sonneratii*, Lath. Parties supérieures d'un brun rougâtre, rayées transversalement de noir; quelques taches noires irrégulières sur la tête des rectrices; parties inférieures blanches, rayées transversalement de noir; bec, iris et pieds jaunes. Taille, dix pouces.

COUCOU (PETIT) A TÊTE GRISE ET VENTRE JAUNE. *Cuculus flavus*, Lath., Buff., pl. enl. 804. Parties supérieures brunes; sommet de la tête et gorge cendrés; rectrices noires, rayées de blanc; parties inférieures d'un jaune roussâtre; bec jaune, noir à la base; iris et pieds jaunes. Taille, huit pouces. De l'île Panay.

COUCOU DES PHILIPPINES. *V. COUCAL DES PHILIPPINES.*

COUCOU PIAYE. *V. COUA PIAYE.*

COUCOU PIRIBIQUA. Vieill. *V. AN.*

COUCOU A PLAQUES DENTELÉES AUX AILES. C'est le Coucou Edolip, mâle.

COUCOU POPO-AROWKO. *V. COUCOU ÉCLATANT, femelle.*

COUCOU A QUEUE EN ÉVENTAIL. *Cuculus flabelliformis*, Lath., Symp. pl. 106. Parties supérieures noires; rectrices, à l'exception des deux intermédiaires, pendulées de blanc à l'intérieur; parties inférieures d'un jaune obscur; bec noir; pieds jaunes. Taille, dix pouces. De la Nouvelle-Hollande.

COUCOU RAYÉ DE ROUX. *Cuculus rufus-vittatus*. Parties supérieures d'un brun noirâtre, rayées de roux vif; plumes du front blanches à leur base; rectrices brunes dentelées de roux à leurs bords; rectrices largement bordées de roux, avec l'extrémité blanche, d'un roux fauve en dessous; gorge, devant et côtés du cou, poitrine blancs, finement rayés de roux; parties inférieures d'un blanc roussâtre; bec noir, brun en dessous.

à s'élèver; pieds d'un jaune rougeâtre. Taille; sept pouces. La femelle a fauve tout ce qui est d'un roux, vis-à-vis le mâle; elle a le sommet de la tête cendré; la gorge et les côtés du cou teints de fauve, et toutes les parties inférieures rayées de noirâtre. De Java.

COUCOU ROUGE HUPPÉ DU BRÉSIL. *V. COUCOU A VENTRE ROUGE.*

COUCOU ROUGEÂTRE A VENTRE TACHETÉ DE BLANC ET NOIR. *V. COUCAL FERRUGINEUX.*

COUCOU ROUSSÂTRE, *Cuculus rufus*, Vieill. Parties supérieures variées de brun et de roussâtre; rémiges cendrées; rectrices grises, bordées de roussâtre; gorge et poitrine roussâtres, pointillées de blanc; parties inférieures d'un cendré blanchâtre; bec noir; pieds gris. Taille, neuf pouces. De la Nouvelle-Hollande.

COUCOU ROUX ET BRUN, *Cuculus pyropterus*, Vieill. Parties supérieures brunes; tête d'un cendré blanchâtre; rectrices terminées de blanc; parties inférieures rousses; bec et pieds noirâtres. Taille, huit pouces. La femelle et le jeune ont les teintes plus pâles et les pieds rougeâtres. De la Nouvelle-Hollande.

COUCOU RUFALBIN. *V. COUCAL ROUGE.*

COUCOU DE SAINT-DOMINGUE. *V. COU GENDRILLARD.*

COUCOU DU SÉNÉGAL. *V. COUCAL ROUGE.*

COUCOU SOLITAIRE, *Coccyus solitarius*, Vieill. Parties supérieures noirâtres; avec l'extrémité des barbeilles cendrées; rectrices terminées de blanc; les tiges des latérales tachées de blanc; grandes rémiges noirâtres; gorge roussâtre; devant du cou, poitrine et ventre bariolés et rayés transversalement de noirâtre; parties inférieures rousses; bec brun; jaunâtre en dessous à en bas. Taille, dix pouces. La femelle a les parties supérieures rousses, rayées de brun. Le jeune est d'un brun roux en dessus et roussâtre en dessous. Il se rapproche beaucoup, si toutefois ce n'est pas la même espèce,

du Coucou du cap de Bonne-Espérance.

COUCOU SONNERAT. *V. PETIT COUCOU DES INDES.*

COUCOU TACHETÉ DU BÉNIGAL. *V. COUCOU BOUTSALLICK.*

COUCOU TACHETÉ DE CATENNE. *V. COUCOU BRUN VARIÉ DE NOIR.*

COUCOU TACHETÉ DE LA CHINE. *V. COU TACHETÉ DE LA CHINE.*

COUCOU TACHETÉ DE L'ÎLE PAPAZ, *Cuculus Panayanus*, Juss. Sonnerat, Voy. pl. 78. Parties supérieures brunes, tachetées de roux; jaunâtres; rémiges rayées de roux et pointillées de blanc; rectrices rousses, rayées de noir; gorge noire tachetée de roux; parties inférieures roussâtres, rayées de noirâtre; pieds cendrés. Taille, douze pouces.

COUCOU TACHETÉ DES INDES. *V. COUCOU BRUN PIQUETÉ DE ROUX.*

COUCOU TACHETÉ DE MALABAR. *V. COUCOU CUIL.*

COUCOU TACHETÉ DE MINDANAO, *Cuculus Mindanensis*, Lath. Buff., pl. enlum. 277. Parties supérieures d'un brun verdâtre, irisées, tachetées de blanc et de roussâtre; rémiges rayées transversalement de blanc roussâtre; rectrices égales irisées en vert doré brillant, rayées transversalement de roussâtre et souvent terminées de blanc; parties inférieures blanches, tachetées et rayées en travers de noirâtre; bec noir, roussâtre en dessous; pieds d'un gris brun. Taille, quatorze pouces six lignes.

COUCOU TACHIROU. Est, selon Lévassier qui l'a figuré pl. 216 des Oiseaux d'Afrique, le même que le Coucou CUIL.

COUCOU TAIT-SOU. *V. COU TAIT-SOU.*

COUCOU A TÊTE BLANCHE, *Coccyus cyanocephalus*, Lath. Parties supérieures brunâtres, pointillées et rayées de blanc; sommet de la tête, nuque et côtés du cou d'un bleu noirâtre; rectrices longues et presque égales; gorge et devant du cou jaunâtres; parties inférieures blanches, rayées transversalement de noir; bec

capots blanchâtres. Taille, neuf pouces. De la Nouvelle-Hollande.

**COUCOU A TÊTE GRIS.** *Cuculus poliocephalus*, Lath. Parties supérieures d'un cendré plus obscur sur la tête, et le cou; rectrices blanchâtres, rayées transversalement de noirâtre; parties inférieures blanches, rayées de cendré; bec et pieds brunsâtres. Taille, huit pouces. De l'Inde.

**COUCOU A TÊTE GRIS ET VENTRE JAUNE.** *Cuculus leucogaster*, Lath. **COUCOU A TÊTE GRIS ET VENTRE JAUNE.** *Cuculus leucogaster*, Lath.

**COUCOU RIQUETÉ DE BLANC.** *Cuculus albopunctulatus*. Plumage d'un noirâtre, avec des points blancs sur la tête, les rectrices alaires et les parties inférieures; rémiges inférieures marquées d'une tache blanche; rectrices terminées par un petit point blanc sur la tige, les deux latérales beaucoup plus courtes et rayées de blanc en dessous, de même que les rectrices caudales inférieures; bec et pieds noirs; quelques plumes à miltin blanches sur les plumes des jambons qui garnissent aussi un côté des ailes. Taille, huit pouces. De Java. Nous regardons comme variété d'âge ou de sexe, un individu entièrement privé des points blancs qui, dans cette espèce, ornent la tête, les ailes et le dessous du corps; quant au reste, il est absolument semblable et nous a été envoyé des mêmes régions.

**COUCOU A TROIS DOIGTS.** C'est le coucou Mayon dont la description a été faite d'après un exemplaire incomplet.

**COUCOU VARIÉ DE MINDANAO.** *Cuculus variatus*, Lath. **COUCOU TACHÉ DE MINDANAO.** *Cuculus tatus*, Lath.

**COUCOU A VENTRE FAUVE.** *Cuculus pyrogaster*. Parties supérieures d'un brun bronzé, rayées transversalement de fauve; sommet de la tête tirant sur le cendré; rémiges intermédiaires bordées à l'extérieur de taches fauves; rectrices intermédiaires dentelées de fauve, les latérales de blanc, toutes étagées et terminées de blanc; gorge, dessous du cou, poitrine et ventre d'un fauve pâle; rayées transversalement de brun et de blanc; parties les plus inférieures fauves;

les bois, brunsâtres et bruns en dessous; pieds rougeâtres. Taille, huit pouces aux lignes.

**COUCOU A VENTRE NOIR.** *Cuculus melanogaster*, Vieill. Parties supérieures ferrugineuses; sommet de la tête cendré; rectrices longues, étagées, noires et terminées de blanc; gorge, devant du cou et poitrine roussâtres; parties inférieures noires. Taille, quinze pouces. De Java.

**COUCOU A VENTRE RAYÉ.** *Cuculus striatus*. Parties supérieures d'un brun cendré, blanchâtre; rémiges brunes, frangées de blanchâtre, les deux premières dentelées de roussâtre; rectrices peu étagées, noires, avec l'extrémité et des taches le long de la tige, blanches; gorge et devant du cou d'un cendré bleuâtre, très-clair; parties inférieures blanchâtres, rayées transversalement de noir; bec noir, roussâtre en dessous à sa base; pieds rougeâtres. Taille, douze pouces. De Java. On nous a communiqué sous le nom de *Cuculus Dasyptera*, une espèce de même taille, venant également de Java, qui pourrait bien être le Coucou à ventre rayé dans son jeune âge; il en diffère en ce que les parties supérieures sont toutes traversées de bandes rousses, et que la gorge et le devant du cou sont semblables au reste des parties inférieures.

**COUCOU A VENTRE RAYÉ EN SUE DE PANAY.** *Cuculus leucogaster*, Lath. **COUCOU A VENTRE RAYÉ.** *Cuculus leucogaster*, Lath.

**COUCOU VERT DE MINDANAO.** *Cuculus viridis*, Lath. **COUCOU VERT D'ANTIQUE.** *Cuculus viridis*, Lath.

**COUCOU VERT EN INDE.** *Cuculus palliolatus*, Lath. Parties supérieures d'un vert sombre; sommet de la tête, côté du cou et rémiges noires; rectrices courtes, tachetées de blanc à l'extrémité; parties inférieures blanches; dessous des ailes fauve; bec brun; iris orangé; pieds blanchâtres. Taille, douze pouces. De la Nouvelle-Hollande.

**COUCOU VERT EN SUE DE BONNE ESPÉRANCE.** *Cuculus leucogaster*, Lath.



**COUCOU VERT BORD DE BLANC.** *PHAN.*  
**COUCOU DARRIO.**

**COUCOU VERT HUPPÉ DE GUINÉE.**  
*PHAN.* **TOURACO.**

**COUCOU VERT HUPPÉ DE SIAM.** C'est le Drongo à raquettes dans son jeune âge, et dont on a cru les plumes assez longues de la nuque susceptibles de se relever en huppe. (DR. Z.)

On a étendu le nom de **COUCOU** non-seulement à d'autres Oiseaux qui n'ont pas de rapport avec les espèces qui composent le genre dont il vient d'être question : *Coucou rouge*, par exemple, pour l'Engoulevent d'Europe, et *Coucou vert* pour un Touraco et un Drongo; mais encore on l'a donné à des Animaux de classes différentes, et même à des Plantes. Ainsi l'on a appelé **Coucou** : une Raie et un Trigle, la Cocon du Ver à soie, une variété de Fraisiers; la Primevère officinale et l'Agaric Orange. (B.)

**COUCOU (FLEUR DE).** *BOT. PHAN.* Nom vulgaire du *Lychnis Flos Cuculi* et du *Narcissus Pseudo-Narcissus*. *PHAN.* **LYCHNIDE** et **NARCISSE.** (B.)

**COUCOU (PAIN DE).** *BOT. PHAN.* Nom qu'on donne vulgairement à la Primevère officinale. *PHAN.* **PRIMEVÈRE.** (A. R.)

**COUCOUAT.** *OIS.* Nom vulgaire donné aux jeunes Coucous. (DR. Z.)

\* **COUCOUDA.** *OIS.* (Pallin.) Syn. vulgaire de la Poule dans diverses provinces de l'Inde. *PHAN.* **COQ.** (DR. Z.)

**COUCOULJADO.** *OIS.* Syn. vulgaire du Cochevis, *Alauda cristata*, L. *PHAN.* **ALOUETTE.** (DR. Z.)

**COUCOUMELLES.** *BOT. GRÆC.* On donne ce nom, en Languedoc, à plusieurs espèces d'Amanites, et particulièrement à l'Orange blanche, *Amanita poroides*, et à l'Amanite en gaine, *Amanita vaginata*. La première, et plus spécialement le nom de **Coucounelle** blanche, et la seconde celui de **Coucounelle** grise. On donne quelquefois celui de **Coucounelle** jeune au péronée, à la véritable Orange. *PHAN.* **ORONGE** ou **AMANITE.** (AD. B.)

**COUCOUNASSOU.** *BOT. PHAN.* Vieux nom du Concombre. (B.)

**COUCOURDE.** *BOT. PHAN.* Pour Cougourde. *PHAN.* ce mot.

**COUCOURELO.** *BOT. PHAN.* Nom provençal de la variété de Figue nommée petite Violette. (B.)

\* **COUCOURREN-MASSON.** *BOT. PHAN.* Nom provençal du *Momordica Elæagnifolia*, L. (B.)

**COUCOUT.** *OIS.* Et non *Coucu*. Syn. gascon de *Cuculus Canorus*. *PHAN.* **COUCOU.** (DR. Z.)

\* **COUDA.** *MAM.* (Gaimard.) Syn. timorien de Chèvre. (B.)

\* **COUDE.** *MAM.* C'est, dans l'Homme, l'articulation du bras et de l'avant-bras, qui sert de comparaison en botanique pour désigner les parties des Végétaux qui font un angle, et qu'on appelle *Coudées* ou *en coudes*. (B.)

**COUDERLO.** *BOT. GRÆC.* Nom languedocien d'un Champignon qu'on ne spécifie pas. (B.)

**COUDEY.** *OIS.* Espèce du genre Jacana, *Parra indica*, Lath. *PHAN.* **JACANA.** (DR. Z.)

**COUDIOU.** *OIS.* Syn. vulgaire du Coucou gris d'Europe, *Cuculus Canorus*, L. *PHAN.* **COUCOU.** (DR. Z.)

**COUDOU ET COUDOUS.** *MAM.* Mêmes chose que **Condems**. *PHAN.* **APRILOFF.** (B.)

\* **COUDOUGAN** ou **COUDOU-GNAN.** *OIS.* (Levaillant.) Syn. de Lorient à tête noire de la Chine, *Oriolus melanocephalus*, L. *PHAN.* **LORIENT.** (DR. Z.)

**COUDOUGIE** ou **COUDONIER.** *BOT. PHAN.* Syn. languedocien de Coignassier. *PHAN.* ce mot. (B.)

**COUDOUMBRE.** *BOT. PHAN.* L'un des noms du Concombre dans les dialectes méridionaux. (B.)

**COUDRE.** *BOT. PHAN.* Ce nom vulgaire s'applique indifféremment au Coudrier et au Viorne. *PHAN.* ces mots. (B.)

**COUDRIER.** *Corylus.* *BOT. PHAN.*

D'abord placé dans la famille des Anacardiées de Jussieu et dans la Monocotyléedrie, L., ce genre fait aujourd'hui partie du groupe établi par le professeur Richard sous le nom de Cupulifères. V. ce mot. Le Coudrier se rattache aux caractères suivants : ses fleurs sont monoïques ; les mâles forment de longs chatons cylindriques et pendans. Chaque mâle se compose d'une corolle profondément bilobée, d'un calice à cinq lobes, d'un tube plus ou moins entier, plus grande que la précédente et l'enveloppant, de huit étamines à filets courts et grêles, d'anthères ovales allongées ou uniloculaires, marquées d'un seul sillon longitudinal par lequel elles s'ouvrent. Les fleurs femelles sont en général réunies plusieurs ensemble à l'aisselle d'échilles qui constituent quelquefois une sorte de bourgeon conoïde. On trouve pour chaque fleur un involucre monophylle, persistant, recouvrant complètement la fleur, tantôt profondément biparti, tantôt simplement denté à son bord, et que tous les auteurs considèrent à tort comme le calice. Celui-ci, en effet, est adhérent avec l'ovaire qui est infère et plus ou moins globuleux ; son limbe est fort court et irrégulièrement identifié. Coupé en travers, l'ovaire offre deux loges, très-petites comparativement à sa masse ; et dans chacune d'elles, un ovule renversé est attaché à la paroi supérieure et un peu interne. Du sommet de l'ovaire naissent deux stigmates tubuleux, plus ou moins longs, et finement glanduleux. Le fruit est un véritable gland osseux, enveloppé dans un involucre monophylle ou cupule foliacée plus longue que large, au fond de laquelle il est attaché par une base large. Le péricarpe est osseux, indéhiscent, plus ou moins globuleux, terminé en pointe à son sommet où il offre un petit ombilic formé par les dents du limbe staminal. Ce péricarpe offre en général une seule graine et une seule loge, plus rarement deux loges et deux graines séparées par une cloison mince, irrégulière et cellu-

leuse. Le grain est dépourvu d'endosperme et se compose d'un gros embryon dont les deux cotylédons sont très-épais.

Ce genre se compose d'environ six espèces dont deux existent en Europe (*Corylus Avellana* et *Corylus orbiculata*) ; une en Orient (*Corylus Olearia*) et trois dans l'Amérique septentrionale (*Corylus americana*, *Corylus rostrata* et *Corylus humilis*). Ce sont des arbres ou plus souvent des arbrisseaux ; à feuilles alternes et entières ; munies à leur base de deux stipules écailleuses et caduques. En général leurs fleurs s'épanouissent avant que leurs feuilles commencent à se développer. Nous allons énumérer quelques-unes des espèces les plus intéressantes.

Le COUDRIER COMMUN ou NOISSETIER, *Corylus Avellana*. L., croît en abondance dans nos bois et nos forêts. Il forme un Arbrisseau de six à douze pieds d'élévation, dont les jeunes rameaux sont effilés, cylindriques et pubescens. Ses feuilles sont alternes, courtement pétiolées, cordiformes, arrondies, acuminées, et souvent, doublement dentées qu'on ne voit leurs bords, pubescentes et un peu rudes au toucher sur leurs deux faces. Les deux stipules qui accompagnent chaque feuille, et qui couvrent les écailles du bourgeon, dans lequel elles étaient d'abord renfermées, sont très-caduques. Les chatons mâles sont longs, cylindriques, et sortent de la partie supérieure des jeunes rameaux de l'année précédente. Chaque fleur se compose de huit étamines à anthères vraiment uniloculaires et barbues à leur sommet. Les femelles constituent une sorte de petit bourgeon conique. Il leur succède des fruits ou glands désignés sous le nom de Noisettes, enveloppés dans un involucre ou cupule monophylle foliacée, plus longue qu'elle n'est large. Le grain est dépourvu d'endosperme et se compose d'un gros embryon dont les deux cotylédons sont très-épais. On cultive dans nos jardins, soit par le moyen de la culture, soit par le moyen de la greffe, quelques variétés remarquables. Les principales sont :

**Coudrier** fruit à fruits blancs ; le coudrier à amandes rouges et l'Avénier. Cette dernière variété, la plus estimée de toutes, se distingue par ses fruits et ses amandes très-grosses et rugueuses. L'amande du Noisetier est très-agréable et très-recherchée, surtout lorsqu'elle est récente. Elle a un saveur douce et contient une quantité considérable d'huile grasse, que l'on peut en extraire par le moyen de la pression. Le Coudrier n'est pas difficile sur la nature du terrain dans lequel on le plante. Cependant les terres légères et un peu humides sont celles qui lui conviennent le mieux. On le multiplie soit par le moyen des jets nombreux qui poussent de son pied, soit par les graines. Les sujets que l'on obtient par ce dernier procédé sont plus vigoureux. Le bois du Coudrier est blanc, tendre et peu estimé. Les vanniers l'emploient à former la charpente de leurs ouvrages.

Le **COUDRIER DE BYZANCE**, *Corylus Coturnia*, L., *Corylus Byzantina*, Desf. Cette espèce se distingue de la précédente par sa tige en arbre, par ses stipules éroliées et lancéolées, par ses feuilles plus velues et comme anguleuses, par ses fruits enveloppés d'un double involucre, l'un extérieur multipartit, l'autre interne à trois divisions. Ces fruits sont plus gros que dans l'espèce vulgaire, mais leur enveloppe osseuse est plus épaisse et plus dure. Cet arbre que l'on cultive fréquemment dans nos jardins croît naturellement aux environs de Constantinople. L'Ecluse fut le premier botaniste qui cultiva le Coudrier de Byzance. Il en reçut des graines de Constantinople en 1582. Linné dit qu'en 1736 il en existait un très-bel individu dans le Jardin botanique de Leyde, qui avait été planté par L'Ecluse.

Le **COUDRIER D'AMÉRIQUE**, *Corylus americana*, Michx. Fl. Bor. Am. Cette belle espèce qui croît dans les divers contrées de l'Amérique septentrionale, et que nous conservons facilement en pleine terre sous le climat

de Paris, se fait distinguer par ses feuilles beaucoup plus larges que dans les deux espèces mentionnées plus haut. L'involucre qui enveloppe ses fruits est évasé et comme campanulé, irrégulièrement découpé, chargé de poils glanduleux. Le fruit est déprimé. On mange son amande.

On cultive encore quelquefois dans nos jardins le **COUDRIER CORNE**, *Corylus rostrata*, Michx., qui vient de l'Amérique septentrionale, et qui se distingue par son involucre très-allongé, un peu tordu, et formant une sorte de corne. Ses fruits mûrissent en France et donnent des amandes bonnes à manger. (A. R.)

\* **COUË ET COUL**. HAM. (Gaimard.) Syn. de Marsouin aux îles Galolines. (A. R.)

\* **COUË-COË**. ANNEL. (Gaimard.) Syn. de Ver de terre ordinaire, *Lumbricus terrestris*, L., à Owhyhée, îles Sandwich. (A. R.)

**COUENDOU**. HAM. F. COENDOU.

**COUËPI OU COUPI**. *Couepia* et *Acioa*. BOT. PHAN. Aublet (Plantes de la Guiane, p. 520 et 699) a distingué sous ces deux noms deux Arbres de Cayenne que les Galibis nomment l'un *Couepi* et l'autre *Coupi*. Jussieu et Lamarck ont indiqué les grands rapports qui unissent ces Plantes. Enfin, Schreber et Willdenow les ont comprises dans un seul genre auquel ils ont donné le nom d'*Acioa*. Ses caractères sont : calice tubuleux ou turbiné à cinq lobes ; corolle de cinq pétales inégaux ; étamines nombreuses dont les filaments sont soudés en une membrane épaisse insérée sur le calice entre les deux plus petits pétales ; ovaire légèrement pédicellé ou fixé à un processus du fond du calice ; un seul style et un seul stigmate ; drupe ovée, sèche, couverte d'une écorce épaisse et coriace qui se fendille par la maturation ; sémence unique, grosse, enveloppée dans un tégument fragile.

Ce genre a été placé par Jussieu dans la famille des Rosacées, selon

des Amygdalées, et il appartient à l'icosandre Monogynie, L. Les deux espèces dont il se compose habitent les forêts de la Guiane; ce sont deux Arbres d'une élévation considérable, à feuilles stipulacées, alternes et ovales, très-rarement et garnis de fleurs terminales, disposées en corymbes. L'un est le *Coupioguyanensis*, Aubl. (loc. cit. t. 307) ou *Acioa amara*, Willd.; l'autre, l'*Acioa guianensis*, Aubl. (loc. cit. tab. 280), ou *Acioa duteis*, Willd. L'amande du premier est très-amère, tandis que celle du second, au contraire, a une saveur si agréable que les habitants de la Guiane les mangent avec autant de plaisir que nous mangeons en Europe nos Noisettes et nos Cerneaux. Elle fournit aussi une huile analogue, pour sa fluidité et sa saveur, à l'huile d'Amandes. (G.N.)

**COUETTE.** ois. et BOT. Syn. vulgaire de la Mouette rieuse, *Larus cinerarius*, L. V. MAUVE. Ce mot désigne encore la queue dans les dialectes méridionaux de la France, et de-là le nom donné vulgairement à l'*Alopurus monspeliensis*, L. (DR.Z.)

**COUGAR ET COUGUAR.** MAM. Espèce du genre Chat. V. ce mot. (B.)

**COUGHIOULO.** BOT. PHAN. Ce nom s'applique indifféremment dans quelques parties du midi de la France au *Frimula verta* et à l'*Avena fatua*. (B.)

**COUGOURDE ET COUGOURLE.** BOT. PHAN. Vieux nom du *Cucurbita lagenaria*, L. (B.)

**COUGOURDETTE.** BOT. PHAN. Duquesne, dans son travail sur les Courges, conserve ce nom vulgaire à une sous-variété de Pépons. V. ce mot. (A.R.)

**COUGOURLO, COUGHETE, COURJHETO ET COURJHO.** BOT. PHAN. Les Gourdes et Calabasses en Languedoc. (B.)

**COUGUAR.** MAM. V. COUGAR et CHAT.

**\* COUGUERECOU.** BOT. PHAN.

**Syn. de Xylopia frutescens à la Guiane.**

**COUGOUU.** ois. L'un des noms vulgaires du Coucou gris d'Europe. *Cuculus Canorus*, L. V. COUCOU. (DR.Z.)

**COUHIEH ou COURYEH.** ois. Genre établi par Savigny dans la famille des Accipitrius pour y placer un Oiseau d'Egypte, le Blac de Levant. *Falco melanopterus*, Lath. V. FAUCON. (DR.Z.)

**COUI.** MFF. CHRL. Espèce de Tortue. (B.)

**\* COUI.** BOT. PHAN. Syn. de *Crescentia Cufete* à la Guiane. On a étendu ce nom à tous les fruits dont l'enveloppe peut se travailler en vases, et ces vases ont pris le même nom. (B.)

**\* COUIARELI.** BOT. PHAN. (Surtan). Espèce d'Erigeron, voisine du *Canadense*, si elle n'est la même. (B.)

**\* COUIGNIOP.** ois. Syn. de Merle vert d'Angole, *Turdus nives*, Var., L. V. STOURN. (DR.Z.)

**\* COUIL.** ois. C'est, suivant Paulin de Saint-Barthélemy, le nom malabare d'une espèce de Merle qui, sans doute, se trouve décrite sous quelque autre dénomination. (DR.Z.)

**\* COUIPO.** BOT. PHAN. (Préfontaine). Arbre indéterminé de la Guiane, dont on distingue deux variétés, le blanc et le rouge. Ce nom, qui signifie Cœur de roche, indique la dureté de son bois. (B.)

**\* COUIROU.** BOT. PHAN. (Surtan). Nom caraïbe d'un Liseron et du *Daléchampia*. (B.)

**\* COUIS.** BOT. PHAN. Même chose que Coui. V. ce mot. (B.)

**COUY.** MAM. (Azzara.) Le Coshou au Paraguay. (B.)

**\* COUJA.** MAM. (Dapper.) Race de Coshous rouges de la côte d'Afrique. (B.)

**COUJHO.** BOT. PHAN. V. COUGOURDE.

**\* COUREE.** ois. Espèce du genre

coucou, *Cuculus orientalis*, L., Buff.,  
enl. 274. *P. Coucou*. (DR. Z.)

COULA et COULAK, rom. Même  
rose que Cou et Cécac. Syn. d'A-  
se sur les bords de la Garonne et  
la Dordogne. (B.)

\* COULABOULE, bot. PHAN. (Sp.  
in.) Syn. caraïbe d'*Eugenia raco-  
osa* et de *Fagara trifoliata*. (Ni-  
lson.) Syn. de *Serjania tritarnata*.  
(A.)

COULACISSI, arb. Parruche que  
vers ornithologistes regardent com-  
me une espèce particulière, et d'autre  
comme une variété de la Parruche à  
te blanc, *Ptilinopus galgulus*, Lath.  
es Philippines. H. BERROQUET.  
(DR. Z.)

\* COULACOUANEU, bot. PHAN.  
Syn. caraïbe d'*Emilia fruticosa*.  
(B.)

COULARD ou COULART, bot.  
HAN. Variété de Cerisier, appelé  
aussi Cerisier de Hollande, et qui  
porte de très-petits fruits. (B.)

COULASSADE, om. Syn. vulgaire  
de la Calandree. *Alda Calandra*,  
F. ALBERTUS. (DR. Z.)

COULAVAN, ois. Espèce du genre  
oriole, *Oriolus sinensis*, L., Buff.,  
enl. 570. *P. LORiot*. (DR. Z.)

\* COULCOUL-HÉBULBEN, bot.  
HAN. Nom tatar de *Staphylea pin-  
ata*, L. F. STAPHYLE. (B.)

COULECOU, ois. *P. Cotroucou*.

COULEMELLE, COLOUMELLE,  
COLEMELLE, ou COUAMELLE.  
bot. CRÉT. (*Champignons*.) Nom  
qu'on donne, suivant les provinces,  
à l'*Agaricus procerus* et à l'*Agaricus  
olubrinus*, l'un des *Champignons*  
les plus délicats, et qu'on mange dans  
tous les pays. La tige, droite, ferme,  
parfaitement cylindrique et sembla-  
ble à une colonne, leur a peut-être  
fait donner ces divers noms vulgaires.  
Paulet a donné les noms de Coule-  
nelles de terre et de Ceulemelles des  
Arbres à diverses espèces d'*Agarics*.  
Les premières sont des variétés de

l'*Agaricus procerus*; les secondes pa-  
raissant se rapporter à l'*Agaricus  
subgymnosus*, Schæff. (AD. B.)

COULEQUIN, bot. PHAN. Syn. de  
Cécropie. *P. ce mot*. (B.)

\* COULESANG, REPT. ORN. Nom  
qu'on donne à la Martinique à la Vi-  
père Fer-de-lance. *P. Viper*. (B.)

COULEUVRE. *Coluber*. REPT.  
ORN. Genre, fort nombreux en espèces,  
de l'ordre des vrais Serpens non veni-  
meux, caractérisé par l'absence de  
crochets mobiles dans la bouche, par  
des scutelles ou plaques abdominales,  
et par de doubles plaques sous la  
queue. Quoiqu'on en ait à juste ti-  
tre séparé les espèces venimeuses,  
les Couleuvres, telles qu'on les distin-  
gue aujourd'hui, forment la gent la  
plus difficile à étudier de la classe des  
Reptiles, se ressemblant entièrement  
par leur forme extérieure, les Couleuvres  
susceptibles de s'altérer par la con-  
servation, la taille et le nombre des  
plaques, plus ou moins variables, en  
forment presque les seuls caractères  
qu'on ne peut pas toujours appré-  
cier exactement. La tête des Couleuvres  
est généralement aplatie, ovale  
ou oblongue, ayant le museau obtus  
et même un peu échancré, couverte  
de plaques plus grandes, au nom-  
bre de neuf; la langue est four-  
chue, et s'agit avec vivacité. Le vul-  
gaire la prend pour un dard, et pense  
que dans ses pointes réside un venin  
mortel qui n'existe cependant pas.  
Des écailles un peu plus grandes que  
celles du reste du corps revêtent les  
lèvres; des dents aiguës et recourbées  
garnissent les mâchoires; des écailles  
imbriquées, ordinairement en forme de  
losange, couvrent le corps. Toutes les  
espèces paraissent être ovipares, et dé-  
posent, dans les lieux où la chaleur  
peut les faire éclore, leurs œufs de  
forme arrondie, oblongue, souvent dis-  
posés en chapelets, et revêtus d'une  
enveloppe blanchâtre, membraneuse  
comme du parchemin, se durcissant  
à l'air. Le jeune Animal, contourné  
et nageant dans une matière albu-  
mineuse semblable au blanc de l'œuf

de la Roule, et est assés d'insupportable  
 certain oniblical qui abouit nous le  
 ventre un peu au dessus de l'anus.  
 Les Couleuvres fort innocentes, sus-  
 ceptibles de se familiariser avec l'hom-  
 me et d'acquérir une certaine éduca-  
 tion, inspirent cependant une sorte  
 d'horreur aux Européens, tandis que  
 des peuplades sauvages ou demi-  
 civilisées les révèrent et regardent  
 comme d'un bon augure, qu'elles  
 fréquentent leurs habitations. L'ac-  
 couplement des Couleuvres n'a pas été  
 bien observé. Ces Animaux changent  
 de peau comme les autres Serpens; ils  
 se nourrissent de proie et de substances  
 animales, telles qu'Insectes, petits  
 Poissons, Têtards, Grenouilles, Rep-  
 tiles, petits Oiseaux, Souris et Co-  
 quillages. Pour se comparer de ces di-  
 verses proies, elles nagent dans les  
 eaux, s'insinuent dans les terriers,  
 et grimpent agilement aux Arbres.  
 Leurs mâchoires sont très-dilatables;  
 et l'on voit les Couleuvres avaler des  
 Animaux beaucoup plus gros qu'elles.  
 C'est ainsi que nous avons trouvé des  
 Crapauds gros comme le poing, dans  
 le corps de Couleuvres communes  
 qui n'avaient pas le cou épais d'un  
 pouce; et plusieurs fois nous y avons  
 trouvé des Grenouilles qui n'étaient  
 pas mortes, ce qui protive qu'avant  
 d'avalir leur victime, les Couleuvres  
 ne les brisent pas toujours dans leurs  
 replis. C'est un préjugé générale-  
 ment reçu des gens de la campagne,  
 que les Couleuvres, très-friandes de  
 lait des troupeaux, ont l'habitude de  
 têter les Vaches, et que, non conten-  
 tes d'épuiser les mamelles de celles-  
 ci du suc nourricier qu'elles y ven-  
 raient chercher, elles sucent jusqu'à  
 ce que le sang vienne. Certains ber-  
 gers ignorans sont persuadés, que les  
 Couleuvres se tortillent autour des  
 jambes des Vaches pour atteindre à  
 leurs pis. D'autres disent qu'elles en-  
 trent souvent dans le corps des cam-  
 paguards assez imprudens pour s'en-  
 dormir sous l'ombrage des bois habi-  
 tés par les Couleuvres, et des médecins  
 ont gravement répété ces erreurs, en  
 indiquant les moyens de faire sortir

du corps les Couleuvres qui s'y se-  
 raient introduites; ces préjugés tiennent  
 du temps d'Hippocrate et d'Aristote.  
 Il est des espèces qui n'excèdent  
 pas quelques pouces de longueur; il  
 en est qui acquièrent plusieurs toises.  
 Leurs couleurs sont souvent fort bril-  
 lantes et de la plus grande élégance;  
 leur voix est une sorte de sifflement,  
 quelquefois très-aigu; elles s'enfon-  
 cent en hiver dans la terre où la plu-  
 part s'engourdissent. Nous en avons  
 alors rencontré dans les trunks des  
 racines d'Olivier et autres Arbres, ou  
 sous les pierres et dans les endroits  
 sombres des habitations. Aux pre-  
 miers jours du printemps, on les voit  
 sortir pour venir se réchauffer aux  
 rayons du soleil; elles se pressent à  
 s'en pénétrer, et deviennent d'autant  
 plus agiles qu'il fait plus chaud; elles  
 se roulent alors dans des endroits les  
 plus exposés à la lumière, comme  
 pour en savourer l'influence dans un  
 grand état de repos; et pour peu que  
 le moindre bruit appelle alors leur  
 attention, on les voit lever la tête  
 en regardant de tout côté, net prêtées  
 à fuir comme un trait; au moindre  
 péril. Lorsqu'on les irrite, elles  
 s'élancent sur qui les menace et mor-  
 dent comme les Lézards; mais sans  
 qu'il en résulte le moindre danger.  
 On assure que leur existence est fort  
 longue; elles peuvent supporter une  
 longue abstinence, et, transpirant  
 peu, vivre long-temps dans les lieux  
 presque privés d'air. Linné, qui ne  
 distinguait pas les Couleuvres des  
 Vipères, en comptait cent soixante-  
 onze espèces, et quoique le nom-  
 bre des espèces réelles de Couleuvres  
 se soit augmenté, ce genre, de-  
 puis qu'on en a séparé celles qui  
 sont munies de crochets, se trouve  
 réduit à cent douze par Battelle, dans  
 le Buffon de Deterville. Ce nombre  
 sera certainement doublé quelque  
 jour, si l'on réfléchit que, depuis qu'on  
 a mieux examiné celles d'Europe, on  
 en a trouvé beaucoup plus qu'on n'en  
 supposait exister. L'ancienne méde-  
 cine employait la chair des Couleuvres  
 comme remède; on la mange en

vers cantons, où les *Amphibies* sont  
algairément appelés *Anguilles* de  
nie; on prétend même qu'ils ont  
t excellent et surtout fort sauté;  
ur grasse pelle pour un des motifs  
topiques calmes et résolutive  
on puisse employer. Les genres  
nés par Daudin entre les Cou-  
uvres de Linné, n'ont été adoptés  
r Cuvier que comme des sous-  
nes que nous allons successive-  
ent faire connaître.

† **PYTHONS.** Ils ont des plaques  
entrales plus étroites et des crochets  
l'anus. Les Pythons deviennent fort  
ands; ils ont beaucoup de ressem-  
ance, pour l'aspect et pour la taille,  
ec les Boas, et il paraît que tous les  
étendus Boas de l'ancien continent  
e sont que des Pythons.

La COULEUVRE DE JAVA, *Coluber Ja-*  
*nicus*, Schn., Python Améthiste,  
aud., ou grande Couleuvre des îles de  
Soude, appelée vulgairement dans  
pays *Oularsawa* ou *Ular-Sawa*, et  
ont Séba a donné plusieurs figures,  
arvient à plus de trente pieds de  
ng. On voit au Muséum d'Histoire  
naturelle un fort beau squelette de  
ette Couleuvre.

Le BAY-ROUGE, *Coluber annulatus*,  
., Encycl. Oph., p. 19, pl. 25, f. 51;  
Anneles de quelques ouvrages, qu'il  
e faut pas confondre avec le *Coluber*  
*olatus*. Cette Couleuvre américaine,  
ui acquiert à peu près deux pieds de  
ngueur, est remarquable par les  
ches hémisphériques qui forment,  
n alternant, une ligne sur le dos. P.  
90, E. 96.

Le PYTHON TIORÉ de Daudin, qui  
avait été le *Boa castanea* de Schnei-  
er, les *Boa reticulata*, *ordinata* et  
*hombea*, du même Schneider, et le  
*Bora* de Rossel, appartiennent à ce  
ous-genre. Le *Coluber Bojin* de Cey-  
an en fait peut-être également par-  
tie, ainsi que l'*Ilikkanelle*.

†† **HURRIA.** Ils ont les plaques de la  
base de la queue constamment simples,  
mais celles de la pointe doubles. Cu-  
vier regarde de tels caractères comme  
les simples anomalies. L'espèce de ce

sous-genre; à laquelle on a conservé  
son nom de pays et qu'a figurée Ros-  
sel, a été reproduite par Daudin. Elle  
est de l'Inde.

††† **DIPSAS.** Leur corps est com-  
primé, moins large que la tête, et  
la rangée d'écaillés qui regne le long  
de l'épine du dos, est plus grande  
que les autres, comme dans les Bon-  
gares avec lesquels Oppel les a con-  
fondus. C'est à Laurenti qu'on doit  
l'établissement de ce genre. Le nom  
de Dipsas est emprunté des Grecs  
qui le donnaient à un Serpent dont  
ils prétendaient que la morsure cau-  
sait une inextinguible soif, et qui  
lui-même était si tourmenté du besoin  
de boire, qu'il buvait souvent jusqu'à  
en crever. Il ne faut pas confondre  
comme l'ont fait Linné et Daudin, le  
*Dipsas indica* avec le *Vipera atrax*,  
qui est un Serpent venimeux.

La GARENÉE, *Coluber carinatus*, L.,  
appartient peut-être à ce sous-genre;  
du moins Linné nous dit que cette  
Couleuvre de grande taille présente  
sur le dos une carène dont les écail-  
les paraissent avoir une autre forme  
que celles du reste du corps. On pour-  
rait peut-être y rapporter encore le  
Minime, *Coluber pullatus*, L., Encycl.  
Oph., pl. 27, f. 57; et le Moqueur,  
*Coluber vittatus*, L., Encycl. Oph.,  
pl. 15, f. 22, qui ont le corps latéra-  
lement comprimé et le dos consé-  
quemment disposé en carène.

†††† **COULEUVRES PROPERES**  
TES, qui sont les plus nombreuses et  
celles qui réunissent sans aucune sorte  
d'aberration les caractères imposés au  
genre *Coluber*. Daudin, qui en men-  
tionne déjà soixante-dix espèces, les  
divise en huit sections.

α. Qui ont deux dents simples, plus  
longues, et dont le type est la Couleuvre  
cannelée.

β. A tête de Vipère; Couleuvre à  
stries.

γ. A neuf grandes plaques sur la  
tête; Couleuvre à coiffe.

δ. A ventre plat; Couleuvre com-  
primée.

ε. Filiformes; le Boiga.

a. A large tête; la Couleuvre tête large.

α. A tête cylindrique; la Couleuvre à tête écarlate.

β. Anguiformes; la Couleuvre anguiforme.

On a encore divisé les Couleuvres en deux grandes sections, selon que leurs écailles sont plates et unies ou qu'elles sont relevées par une cannelure longitudinale en saillie.

Nous nous bornerons à mentionner ici les espèces auxquelles on a donné un nom particulier, et à faire connaître avec quelque détail celles qu'on sait aujourd'hui se trouver en Europe.

#### † Espèces européennes.

**COULEUVRE A COLLIER**, *Coluber Natrix*, L., Gmel. *Syst. Nat.* T. 1, p. 1100; *Encycl. Oph.*, p. 44, f. 55, f. 3 (fort bonne description, mais mauvaise figure). Espèce fort commune en France, où on la nomme vulgairement Serpent d'eau ou Serpent nageur, parce qu'on la trouve ordinairement au voisinage des mares, où elle nage avec facilité par un mouvement sinueux rempli de grâce, et tenant sa tête hors de l'eau. Elle acquiert jusqu'à trois pieds de longueur. Une tache lui forme derrière la tête un collier qui lui valut son nom. Le dessus de son corps est brun tirant sur la teinte de l'acier et varie un peu pour la couleur; on assure que ce Serpent innocent est élevé en Sardaigne par des dames qui, loin de le craindre, lui prodiguent toutes sortes de caresses. On lui a rapporté comme variétés des Serpens bleus ou verts, diversement variés, qui n'ont pas le même nombre de plaques et de demi-plaques soit sous le corps, soit sous la queue, et qui conséquemment deviendront des espèces distinctes quand on les aura mieux examinées. P. 168-170, c. 53-80.

**La CORONELLE**, *Coluber Coronella*, Laurenti; la Lisse, *Encycl. Oph.*, p. 31, pl. 56, f. 2. Cette Couleuvre, quoique assez commune dans nos provinces septentrionales, avait, dit

Bonnaterre, échappé jusqu'ici aux naturalistes. Elle diffère surtout de la précédente par ses écailles parfaitement lisses. Deux taches triangulaires jaunes se voient derrière la tête qui est ovale et revêue de très grandes écailles. Le dessus du corps est bleuâtre, avec deux rangs de taches noires lenticulaires, placées de manière que celles d'une rangée correspondent aux intervalles de celles de l'autre; les côtés sont roux, obscurcis de quelques nuances plus foncées. Ce Serpent a l'œil fort brillant. On dit qu'il se retrouve aux Grandes-Indes. Il se plaît dans les endroits humides et ombragés. P. 178, E. 46.

**La COULEUVRE COMMUNE** ou VERTE ET JAUNE, *Coluber viridiflavus*, Lac., *Serp.*, pl. 6, fig. 1; *Encycl. Oph.*, p. 38, pl. 38, f. 3. Cette belle espèce est la plus répandue dans le midi de la France, particulièrement aux environs de Bordeaux où nous eûmes souvent occasion de l'examiner et où elle acquiert de deux à cinq pieds de long. Sa tête est assez grosse; tout le dessus de son corps est de la plus grande beauté, chaque écaille étant au d'un noir brillant ou d'un vert agréable. La ventre et les parties inférieures du corps sont d'un jaune tendre. On voit souvent cette espèce dans les Arbres. Elle fait la guerre aux petits Oiseaux; le moindre coup sur le dos lui cause la mort; la queue est ornée de lignes jaunes et noires. P. 206, E. 107.

**La LISSE**, *Coluber austriaca*, Laurenti. D'un gris roussâtre, très-luisant en dessus, à cinq petites lignes derrière les yeux; une bande derrière la tête, et deux rangs de taches alternes le long du dos brunes ou noires; le dessous est marbré et de couleur d'acier. Cette espèce ne se trouve pas seulement en Autriche, comme l'indiquerait son nom; nous l'avons fréquemment retrouvée aux environs de Bordeaux et jusqu'en Espagne. Elle est de la taille des petites Couleuvres à collier.

**La VIPÉRINE**, *Coluber viperinus*, Latreil. D'un brun grisâtre, avec



s taches dont le centre est jaune et pourtour noirâtre, formant un zigzag le long du dos; une rangée d'autres petites taches occellées règne de chaque côté. Le ventre est tacheté en damier de noir et de grisâtre; les écailles sont carénées. Nous avons rencontré en Espagne cette espèce qui se trouve assez fréquemment dans le midi de la France.

La TETRAGONE, *Coluber tetragonus*. Atreille nous apprend que cette petite Couleuvre, qui atteint rarement un pied de longueur et qui se trouve dans quelques parties de la France, est luisante; a ses écailles lisses, sa couleur d'un gris verdâtre, cendré, avec une série dorsale de points noirs; deux lignes pareilles règnent sur les côtés de l'abdomen dont la couleur est sur le fauve. Le corps est quadrangulaire. P. 188, E. 40.

La COULEUVRE A QUATRE RAIES, *Coluber quadrilineatus*, Lacép., Encycl. Oph., p. 44, pl. 39, f. 1; *Coluber Elaphis*, Shaw. C'est le plus grand de nos Serpens d'Europe. Il parvient à plus de six pieds de long. On le trouve en Provence et en Italie. Il est probable que c'est ce Serpent que les anciens désignaient sous le nom de Boa. Le dessus de son corps est fauve, avec quatre lignes longitudinales noires ou brunes. Le ventre est noir, luisant, semblable à de l'acier poli. Les écailles du dos sont carénées; celles des flancs sont lisses. P. 18, E. 75.

Le SERPENT D'ESCLAPE, *Coluber Esculapii*, Shaw; *Coluber flavescens*, Scop., qu'il ne faut pas confondre avec le *Coluber Esculapii* de Linné, si mal à propos appelé du nom d'une divinité grecque, puisque le Serpent désigné ainsi est un Animal américain que les anciens ne purent conséquemment consacrer au Dieu Epidaure. Cet Animal, l'un des plus grands de son genre, proportionnellement à sa longueur, se trouve dans le midi de la France et sur les côtes de l'Adriatique. Nous l'avons rencontré quelquefois dans les environs de Bordeaux. Son sifflement est plus fort que

celui des autres Couleuvres européennes; sa couleur est d'un gris terreux, avec une bande longitudinale plus obscure sur chaque côté du corps; les écailles voisines des plaques abdominales sont blanches, bordées de noir en dessous; le ventre est blanchâtre; marbré de gris; les écailles du dos sont lisses ou presque lisses. Jacquin rapporte qu'un individu de cette espèce qu'il tua, et dont le corps était fort renflé, avait dans l'estomac cinq Fauvettes, un Muge et un Lézard commun.

La PROVENCALE, *Coluber meridionalis*, Daud. Son dos est grisâtre, avec de grandes taches cendrées sur la tête et derrière les yeux, ainsi que des plaques latérales vertes; quatre rangées longitudinales de taches cendrées, nombreuses, marquées presque toutes de noirâtre autour des écailles. Les taches dorsales se touchent alternativement, et toutes celles des flancs sont séparées. L'extrémité des plaques transversales est noire, leur milieu est blanc avec des taches noires, carrées, alternes. Le dos est légèrement caréné. Cette petite espèce se trouve dans l'Occitanie et la Provence. P. 148, E. 50.

La BORDELAISE, *Coluber Girondicus*, Daud. Cette espèce, que nous avons dès long-temps observée dans nos départemens méridionaux avant que Daudin la fît connaître, a sa tête comprimée sur les côtés. Elle est teinte d'un gris cendré, a ses écailles lisses, des bandes transversales nombreuses, et formées par le bord noir des écailles; le ventre tacheté de jaune et de noir en damier, avec une marque en croissant sur le front. Elle acquiert tout au plus deux pieds de long.

La SANGUINOLENTE, *Coluber sanguinolenta*, N. Cette espèce, que nous avons trouvée quelquefois dans le département de la Gironde, et qui a échappé à tous les naturalistes, ressemble assez, pour la forme, à la Couleuvre d'Esculape dont elle a à peu près la taille et les mœurs. Sa couleur est d'un brun cendré; des ta-

ches arrondies d'un rouge tirant sur le brun, et quelquefois munies au centre d'un point noir, sont disposées sur tout son corps, comme seraient des gouttes de sang; sa tête est épaisse; ses écailles sont carenées.

Nous avons observé plusieurs autres espèces de Couleuvres, soit dans nos départemens méridionaux, soit en Espagne; mais ayant égaré les descriptions et les figures que nous en avions faites, il nous devient impossible de les publier.

Rasoumofsky, dans son Histoire Naturelle du mont Jura, a fait encore connaître deux Couleuvres européennes qui doivent se trouver en diverses parties de la France; il appelle l'une d'elles la Chatoyante, et l'autre la Vulgaire. Celle-ci est la Suisse de Lacépède. La première n'est pas plus grosse qu'une plume d'Oie. La seconde acquiert deux pieds de longueur. Ces Animaux sont aussi innocens que les autres Couleuvres, encore que les habitans de la campagne les disent venimeux.

Scopoli mentionne comme habitant du Tyrol un *Coluber bipes* qui vit, dans les eaux, de Poissons et de Grenouilles, et qu'il dit être brun tacheté de blanc, ainsi qu'un *Coluber Tyrolensis* dont il ne donne aucune description. Laurenti mentionne encore sous le nom de *Coluber longissimus* un autre Ophidien européen, qui est le Très-Long de l'Encyclopédie par ordre de matières.

#### †† Espèces exotiques.

L'AFRICAIN, *Coluber africanus*, Bonnat, Vulgairement Serpent bleu d'Afrique. Espèce élégante dont le dos est bleuâtre et le dessous blanc avec des taches transversales. P. 142, E. 60.

L'AGILE, *Coluber agilis*, L., Encycl. Oph., p. 48, pl. 16, f. 26. Sa tête est ovale, un peu aplatie; son corps est alternativement marqué de bandes brunes et de bandes blanchâtres. Cette espèce habite les Indes. P. 181-184, E. 44-50.

L'ALBALE, *Coluber Albidus*, L., En-

pèce des Grandes-Indes dont la couleur est entièrement blanche, P. 121, E. 58.

L'ANGULEUSE, *Coluber angulosus*, L., Encycl. Oph., p. 41, pl. 10, f. 11. Sa tête ovale est à peine distincte du tronc; le corps est anguleux, d'une couleur grisâtre tirant sur le brun, avec des bandes transversales. Elle est asiatique. P. 117, 120, E. 60, 70.

L'ANNELÉE, *Coluber doliatus*, L.; la Cerclée de quelques-uns. Très-petite espèce qui n'a guère que six à huit pouces de long, dont le corps blanchâtre est marqué d'anneaux noirs circulaires qui, de deux en deux, sont plus rapprochés. Cette espèce vient de la Caroline. P. 164, E. 43.

L'APRE, *Coluber scaber*, L., Encycl. Oph., p. 22, pl. 22, f. 43. La nuque marquée d'une tache noire fourchue; les écailles carenées; des taches noires disposées en nœuds sur tout le corps. Cette espèce est indienne. P. 228, E. 44.

L'ARABE, *Coluber arabicus*. On ne sait pourquoi Bonnaterre, en décrivant ce Serpent d'après Gronow, lui donne Surinam pour patrie. Il est bien véritablement arabe. Sa couleur est sombre; il atteint à plus de trois pieds de longueur. P. 170-174, E. 54-60.

L'ARGENTÉE, *Coluber argenteus*, Daud. On ignore le pays de cette Couleuvre dont l'individu décrit avait trois pieds de longueur. P. 270, E. 177.

L'ARGUS, *Coluber Argus*, L., Encycl. Oph., p. 25, pl. 30, f. 66. Cette belle espèce a sa tête large et comme formée postérieurement de deux lobes prononcés. Son corps est couvert de plusieurs rangs de taches oculiformes. Il est africain. Le nombre de ses plaques n'a pas été compté.

L'ASIATIQUE, *Coluber asiaticus*, Lacép. Cette petite espèce, envoyée au Jardin des Plantes sous le nom de Malpolon, ne paraît pas être la même que les Serpens décrits par Séba et par Ray sous ce nom. Elle n'a

reste rien de remarquable. F. 187, E. 56.

L'AUDACIEUX, *Coluber audax*, Audin qui, le premier, fit connaître ce Serpent d'après un individu conservé dans sa collection; et dont il ignorait la patrie, assure, sur son étiquette quelle indication, qu'il est fort agile et très-hardi. F. 205, E. 99.

L'AULIQUE, *Coluber aulicus*, L.; le lézard orange, Encycl. Oph., p. 40, pl. 16, E. 28; la Couleuvre Lappiati de quelques-uns. Espèce américaine, grisâtre, avec plusieurs fascies linéaires blanches et deux taches trigones convergentes sur la nuque. Elle n'a guère plus de six pouces de longueur. F. 84, E. 60.

L'AURORE, *Coluber Aurora*, L., Encycl. Oph., p. 53, pl. 14, f. 30. Cette espèce à laquelle sa couleur orangée a mérité le nom qui la caractérise. Elle n'a que deux pieds de longueur; mais sa circonférence n'a pas moins de deux pouces; on la trouve dans les parties chaudes de l'Amérique. F. 17, E. 37.

L'AZURÉE, Lacép., Serp., p. 276. Cette belle Couleuvre, de couleur azur, vient du Cap-Vert. F. 171, E. 64.

La BALI, *Coluber plicatilis*, L., Encycl. Oph., p. 53, pl. 9, f. 7. Serpent épais, de couleur livide, avec une bande brunâtre sur chaque côté. Originaire de Ternate. F. 130, E. 56.

La BANDE NOIRE, *Coluber nigro-asciatus*, L., Encycl. Oph., p. 40, pl. 15, f. 23. Ce Serpent, qui parvient à la longueur de deux pieds, paraît se trouver dans la région chaude des deux Mondes; on en cite des individus rapportés de l'Inde, de Guinée et de l'Amérique méridionale. Son corps est gris, traversé par des bandes qui lui ont mérité le nom qu'on lui a donné. On pourrait cependant que plusieurs espèces fussent ici confondues, si l'on ne juge par la différence d'habitat et un nombre des grandes plaques ombrées sur différens Serpens rapportés à cette espèce. F. 158-189, E. 42-44.

La BANTOLÉE, *Coluber variegatus*.

On ignore la patrie de cette espèce décrite par Gronou, et qui, toute blanche, a son dos traversé de petites lignes noires. F. 153, E. 50.

La BLANCHE, *Coluber albus*, L., Encycl. Oph., p. 10, pl. 11, f. 13. Ce Serpent, totalement blanc et sans taches, est originaire de l'Inde. Il n'a qu'un pied de long, et n'est pas plus gros que le doigt. F. 170, E. 20.

La BLANCHÂTRE, *Coluber candidus*, L., Encycl. Oph., p. 39, pl. 21, f. 41. Sa tête est semblable pour la forme à celle de l'Anguille; sa couleur blanchâtre est parsemée de quelques taches brunes sur le dos. Ce Serpent se trouve dans les Indes-Orientales. F. 220, E. 50.

La BLEUATRE, *Coluber caeruleus*, L., Encycl. Oph., p. 13, pl. 29, f. 61. Ce joli Serpent, dont le nom indique la couleur, vient des Indes; il présente quelque ressemblance avec le Boiga. F. 215, E. 170.

Le BLUET, *Coluber caeruleus*, L., Encycl. Oph., p. 20, pl. 10, f. 12. Grande espèce américaine, dont la queue fort déliée est d'une couleur bleue beaucoup plus foncée que celle du reste du corps. F. 165, E. 24.

Le BOIGA, Lac., Serp., pl. 223, pl. XI, f. 1; *Coluber Alutilla*, L., Encycl. Oph., p. 28, pl. 27, f. 55. Il n'était pas nécessaire d'exagérer la beauté de cet admirable Serpent de l'Asie. Pour en donner une idée brillante, il suffisait de le décrire exactement sans lui prêter l'éclat du diamant, du saphir et du cristal. Un Serpent en pierres précieuses serait fort éblouissant sans doute; mais il n'en existe pas de tels dans la nature qui a orné le Boiga par la seule disposition de ses teintes d'un bleu vif et d'un brun tendre agréablement nuancés. Ce beau Serpent fort délié, que nous ne comparerons pas au Paon, mais aux Couleuvres les plus agiles, a le dessus de la tête d'un vert brillant, d'où s'échappent des lignes minces longitudinales qui règnent sur tout le dos, dont certains reflets changeans relèvent l'élégance en donnant quelque chose de métallique et de caillé.

vreux à l'Animal lorsqu'il se meut; le ventre est blanc; une bandelette noire règne de l'extrémité du museau jusque derrière les yeux, en séparant ainsi les couleurs qui ornent la tête. Le Boiga s'apprivoise; les habitans de Bornéo, où ce Serpent se trouve le plus communément, se plaisent à l'entortiller autour de leur cou comme un ornement; et nous avons des raisons de croire que la Couleuvre américaine qu'on a confondue avec le Boiga est notre *Coluber Richardi* ou Serpent Liane, animal fort différent, quoiqu'il offre quelque ressemblance avec l'espèce qui nous occupe. Le Boiga fait la chasse aux petits Oiseaux; et se plaît sur les Arbres; il fait entendre un sifflement qui lui est propre, et qui ressemble à celui des habitans de l'air dont il fait sa proie. P. 163, E. 150.

Le BRUN, *Coluber brunneus*. Cette espèce, décrite par Gronow, et qui lui venait de Surinam, est d'un brun pâle avec des taches plus foncées sur le dos et sur les côtés. Il a près de deux pieds de longueur. P. 202, E. 96.

La CANÈRE, *Coluber Caberus*, Daud. Cette Couleuvre, dont Schneider a fait une Hydre, et qui a sa tête assez grosse, a les couleurs et l'aspect de la Vipère noire; on la trouve au Bengale; ses écailles sont larges et carennées. P. 144, E. 59.

Le CALAMAR, *Coluber Calamaria*, L., Encycl. Oph., p. 43, pl. 8, f. 5. Ce petit Serpent américain n'a guère que huit pouces de long, et la grosseur d'un tuyau de plume d'Oie; le dessous de son corps, peint de taches carrées, imite le damier le plus régulier. P. 140, E. 22.

Le CAMUS, *Coluber Simus*, L. La forme de la tête de ce Serpent de la Caroline, qui rappelle la tête d'un Singe, suffit pour le rendre remarquable. Son corps est panaché de noir et de blanc. P. 124, E. 46.

Le CARACARA, *Coluber Caracara*. Une figure élançée, une queue mince qui occupe le tiers de la longueur totale de l'Animal, des couleurs brillantes disséminées en taches noires,

vertes et pourpurines sur un fond angéâtre, caractérisent ce Serpent du Brésil et de Surinam, qui a sept ou huit pieds de longueur. P. 130, E. 135.

La CARENÉE ou le CARINÉ, *Coluber carinatus*, V. le sous-genre *Phasas*. P. 157, E. 115.

La CATÉNULAIRE, *Coluber catenularis*, Daud. Cette espèce du Bengale, longue de deux pieds environ, est nommée dans le pays *Tra-Tuta*. P. 229, E. 95, 97.

Le CENCHREUS, Lac., Serp., etc. Il ne faut pas confondre cette espèce asiatique avec un Serpent figuré par Séba sous le même nom. Cette Couleuvre n'a rien de remarquable. P. 150, E. 17.

Le CENCO, *Coluber Cencus*, L. Encycl. Oph., p. 36, pl. 29, f. 1. Cette charmante Couleuvre est l'un des plus sveltes qui existent; mais que sa taille s'étend à plus de quatre pieds, son diamètre n'excède guère celui d'une plume d'Oie; la queue équivalant au tiers de la longueur totale; la tête est presque globuleuse; le dessous du corps d'un blanc éblouissant, ainsi que des bandes au nombre de plus de vingt qui courent dans toute la longueur du dos sur un fond brunâtre parsemé de taches pâles. Il en existe une variété non moins élégante, également originaire de l'Amérique méridionale. P. 220, E. 124.

Le CENDRÉ, *Coluber cinereus*, L. Le corps de ce Serpent de l'Inde est de la couleur qu'indique son nom; le ventre est anguleux. P. 200, E. 117.

La CHAÎNE, *Coluber Gekulus*, L. Encycl. Oph., p. 45, pl. 18, f. 3. Cette belle espèce, originaire de la Caroline où la découvrit Catesby, est d'un bleu noirâtre en dessus, et de petites lignes transversales jaunes imitant la figure de chaîne, et qui s'arrêtant aux plaques centrales du font pas le tour de l'Animal, lequel n'a guère que deux pieds de longueur. P. 215, E. 44.

Le CHAPELET, *Coluber marginatus*, Lac., Serp., p. 226, Encycl.

1. , p. 56, pl. 47, f. 12. On ignore la patrie de cette jolie Couleuvre, et le corps est orné de trois bandes longitudinales blanches; celle milieu est formée de petites taches tant un chapelet. P. 166, E. 103.

La CÉLÉLIE, *Coluber Celia*, Daud. espèce rare de Surinam, qui a deux trois pieds de longueur; le dessus cou et du dos est d'un brun foncé; la queue est marquée d'une grande bande transversale blanche; le ventre blanchâtre. P. 209, E. 93.

Le CORAL, *Coluber Corolla*, L., Encycl. Oph., p. 49, pl. 12, fig. 16. Il réunit sous ce nom plusieurs Couleuvres de Surinam qu'on regarde comme des variétés d'une même espèce, et dont les caractères communs consistent dans la forme de la tête qui est ovale oblongue, et dans la couleur du corps qui est noire avec de petites lignes transversales blanches. P. 158-159, E. 51-62.

Le COLIER, *Coluber Monilia*, L. Cette petite espèce, qui se trouve également en Amérique et au Japon où on la nomme *Kokara*, ne parvient guère à dix-huit pouces; son corps est brun avec des bandes transversales, blanchâtres, bordées de noir. P. 164-170, E. 82-85.

La COURELLE, *Coluber cursor*, Lac., Serp. p. 281; Encycl. Oph., p. 7, pl. 42, fig. 3. Son corps est vert en dessus, marqué de taches blanches allongées, disposées sur deux rangs; le dessous et les côtés du corps sont blanchâtres. Cette espèce habite la Martinique. P. 285, E. 105.

La GRIVATE, *Coluber torquatus*, L. Son corps de couleur livide; l'extrémité des écailles est blanche, ainsi qu'un collier qui caractérise cette Couleuvre dont la patrie est la Guinée. P. 201, E. 68.

La CUIRASSÉE, *Coluber scutatus*, Pall. Cette espèce, qui atteint jusqu'à quatre pieds de longueur, se trouve sur les bords du Jaïk dans l'Asie septentrionale. Sa couleur est noire, mais le dessous présente des taches carrées d'un jaune blanchâtre, posées alternativement de droite à gauche.

Elle a les habitudes du Natrix. P. 190, E. 80.

Le DASSON, *Coluber Dabois*, Lac., Serp. p. 285; Encycl. Oph., p. 18, pl. 42, fig. 1. Ce Serpent innocent et d'une humeur familière purge le voisinage des habitations de l'Afrique occidentale d'Insectes, de Rats et de Serpens venimeux. Aussi, méritant la reconnaissance des peuples de ces contrées, il est devenu l'objet d'un véritable culte. C'est le Serpent idolâtré de Juda, tant célébré par les voyageurs. Sa taille n'excède guère trois pieds. Ses couleurs sont agréables, et les rois nègres qui punissent, dit-on, de mort ceux qui tuent ce Serpent, ont défendu, à ce que rapportent les voyageurs, qu'on en livrât les dépouilles aux étrangers. On leur élève des autels, on leur construit des temples. Leur retraite est un lieu d'asile, et si les hommes civilisés trouvent une telle superstition ridicule, qu'ils se rappellent le Serpent d'Épidaure, et cette Rome pour laquelle nos études de collège inspirent tant de respect, recevant avec une admiration religieuse le Reptile que la Grèce révérait comme le compagnon d'Esculape. P. 169, E. 46.

Le DARD, *Coluber jaculatrix*, L. Ce Serpent de Surinam a sa tête ovale et petite, et son corps de couleur de cendre relevé par trois bandes noirâtres. P. 153, E. 77.

Le DÉCOLORÉ, *Coluber exoletus*, L., Encycl., p. 10, pl. 33, fig. 47. Cette espèce, assez ressemblante au Boiga, à l'éclat des couleurs près, et qui, de même que ce dernier, habite les Indes, a son corps d'un gris bleuâtre. P. 147, E. 132.

Le DHARA, *Coluber Dhara*. Forsk. a le premier fait connaître ce Serpent qu'il a observé dans l'Arabie Heureuse; il n'a que deux pieds de long; ses écailles sont roussâtres, bordées de blanc. P. 235, E. 48.

La DIONE, *Coluber Dione*. Pallas a fait connaître cette Couleuvre qui se plaît dans les déserts imprégnés de sel et parmi les rochers arides des environs de la mer Caspienne.

Le dessus de son corps est d'un gris bleuâtre, relevé par trois bandes lées brunes et blanches alternativement placées. P. 190-209, E. 58-66.

Le DOUBLE RAIE, *Coluber bilineatus*, Lacép., Serp., p. 220; Encycl., p. 42, pl. 40, fig. 5. On présume que cette espèce vient de l'Inde. Son corps est d'un roux foncé avec deux bandes lées d'un jaune doré. Les écailles sont bordées de la même couleur. P. 205, E. 99.

Le DOUBLE TACHE, *Coluber bimaculatus*, Lacép., Serp., p. 220. On ignore la patrie de cet Animal, remarquable par deux grandes taches situées sur la partie postérieure de la tête qui est fort élargie, et par d'autres taches ocelliformes répandues sur son corps roussâtre. P. 207, E. 72.

L'ÉCLATANT, *Coluber splendidus*. On ignore la patrie de ce Serpent, décrit par Gronou, dont le museau est large et obtus, et la couleur noire, relevée par la belle couleur de citron de son ventre et de ses flancs. P. 164, E. 115.

Le FARINEUX, *Coluber farinosus*, L. Cette espèce, qui vient de Guinée, a le corps brun parsemé de petits points d'une blancheur éclatante, disposés avec une certaine symétrie. P. 142, E. 35.

Le FER À CHEVAL, *Coluber Hippocrepis*, L., Encycl. Oph., p. 26, pl. 28, f. 58. Ce Serpent américain porte une marque en forme de croissant sur la nuque. P. 252, E. 94.

Le FIL, *Coluber filiformis*, L., Encycl. Oph., p. 37, pl. 27, f. 56. Cette Couleuvre, qui égale à peine un tuyau de plume ordinaire en diamètre, et qui n'a pas moins d'un pied et demi de longueur, vient des Indes. Elle est parfaitement noire en dessus, et totalement blanche en dessous. Elle est d'un naturel fort doux et vit habituellement sur les Arbres des Indes. P. 165, E. 158.

La GÉMONE, *Coluber Gemonensis*. On ignore le pays d'où vient ce Serpent que Laurenti fit connaître d'après des individus conservés dans la

belle collection du comte de Turri. Son corps est couvert de taches jaunes bordées de brun, disposées symétriquement sur la partie antérieure du dos, et confusément sur la postérieure. On n'a mentionné le nombre, ni des plaques ventrales, ni des demi-plaques caudales.

Le GRENOUILLER, *Coluber raninus*. Gronou a fait connaître cette espèce de Surinam, qui se nourrit de Grenouilles, et fréquente les marais, n'a guère que dix-sept pouces de longueur, et dont le corps blanchâtre est varié de lignes et de taches noires. P. 219, E. 68.

Le GLIRICAPA, *Coluber Gliricapa*. On peut regarder comme fort douteuse l'existence de ce Serpent que Gronou n'a fait connaître que d'après un individu mutilé, dont il ne put déterminer la forme de la queue qu'il dit être pentagone. On ne sait si le Gliricapa vient positivement de Ceylan ou de Surinam. P. 176, E. 166.

La GRIVELLE, *Coluber virgata*. Cette espèce, qui est originaire de Surinam, a le corps noirâtre sur le dos, et varié sur les côtés de lignes transversales noires, brunes et blanches; les écailles du dos sont grandes et carrées. Il a dix-huit pouces de longueur. P. 160, E. 60.

Le GRISON, *Coluber griseus*, L., Encycl. Oph., p. 59, pl. 28, f. 52. Cette Couleuvre, qu'on dit se trouver indifféremment dans les Indes et dans l'Amérique méridionale, est blanchâtre, marquée de bandes transversales brunes, tachetées de points couleur de lait de chaque côté. P. 288-290, E. 64-70.

La GRONOVienne, *Coluber Gronovianus*. Laurenti a dédié cette espèce à Gronou, auquel les naturalistes doivent la connaissance de tant de Serpens. On ignore sa patrie. Son corps est bleuâtre, orné de petites lignes noires transversales. Le dessous est noir. P. 178, E. 46.

Le GROS-NER, *Coluber Nerion*. Suivant Gronou, ce Serpent a un pied environ de longueur. Son museau est surmonté d'une membrane ronde et

relevée qui donne à sa tête un aspect particulier. Son corps brun est parsemé de petites taches noires. P. 149-154, E. 42-45.

**La Grosse tête, *Coluber capitatus*,** Lac., Serp., p. 280; Encycl. Oph., p. 46, pl. 42, f. 2. Cette espèce se trouve en Amérique. Sa couleur est foncée avec des zones plus pâles. P. 193, E. 77.

**Le Guitre, *Coluber oivorus*, L.** C'est sur une indication de Marcgraff et de Pison que l'on connaît ce Serpent brésilien. Des voyageurs disent qu'on leur en apporta un individu long de quatre pieds, et dont le ventre était d'une couleur argentée fort éblouissante. Le reste du corps est mélangé de noir et de blanc. Ce Serpent entre dans les basse-cours pour y dévorer les œufs des Poules. P. 203, E. 75.

**Le Goudot, *Coluber Gulteenensis*.** Ce Serpent, dont le nom indique la patrie, a sa tête ovale, aplatie, le corps blanchâtre, parsemé de taches transversales, contrastées de noir et de blanc. P. 196, E. 42.

**L'Hérissier, *Coluber Viridis*.**

**L'Hérib, *Coluber Hebe*, Daud.** La tête générale de cette Couleuvre qu'on croit à tort venimeuse sur la côte de Gironde; est d'un gris cendré avec des taches obscures, et une vingtaine de bandes transversales étroites sur le dos; toutes blanches ou jaunâtres; le ventre est nacré. P. 199, E. 62.

**L'Hélène, *Coluber Helena*, Daud.** Cette espèce de l'Inde est remarquable par sa beauté qui lui mérite le nom qu'elle porte. Très-agile, elle étouffe les Poulets dans ses replis, et devient souvent un fléau des basse-cours. P. 222, E. 93-95.

**L'Houmabala, Gronou** à qui l'on doit la connaissance de cette Couleuvre dit qu'elle vient de Ceylan; que son corps est d'un roux tirant sur le blanc, avec le derrière de la tête jaunâtre. Sa longueur est environ deux pieds. P. 159, E. 42.

**L'Hydre, *Coluber Hydus*, Pallav,** qui nous a fait connaître cette Cou-

leuvre, dit qu'elle habite la Caspienne et les fleuves qui se jettent dans cette mer, sans qu'il l'ait jamais vue sur le rivage. P. 180, E. 66.

**L'Isiboca, *Coluber Ithiboca*, Daud.** Cette Couleuvre vient de Coromandel; elle a le dessus du corps orangé varié de beau noir luisant; sa taille dépasse trois pieds de longueur. P. 209, E. 129.

**L'Isiboca, *Coluber Ithiboca*, Encycl. Oph., p. 25; *Coluber Corais*, Daud.** Corais est le nom qu'on donne au Brésil à ce Serpent, tandis qu'Ithiboca, employé par Séba, désigne le Mangeur de Chèvres. C'est une grande espèce qui acquiert jusqu'à cinq pieds et demi. P. 176, E. 121.

**La JANTHINE, *Coluber Janthinus*, Merrem.** Très-Verte de Daudin, *Col. viridissimus*, L. C'est une espèce de Surinam, qui est fort élégante et n'a guère que dix-huit pouces de long. P. 217, E. 128.

**Le LACTÉ, *Coluber lacteus*, L.** Encycl. Oph., p. 16, pl. 16, fig. 27. Cette petite espèce qui pourrait être confondue avec le Rouleau, F. Ouwet, si des caractères génériques ne l'en distinguaient, vient des Indes. P. 203, E. 52.

**Le LABÉRIS, *Coluber Laberis*, L.** est une espèce peu connue du Canada, dont le corps est marqué de raies noires. P. 110, E. 50.

**Le LEMNISQUE, *Coluber lemniscatus*, L.** Encycl. Oph., p. 47, pl. 24, f. 49. Cette petite Couleuvre qui n'a guère plus de six pouces de longueur, et dont la grosseur est celle d'une plume de Cygne, est décorée de fascies blanches et noires disposées par anneaux. Elle est asiatique. P. 241-250, E. 30-37.

**Le LIEN, *Coluber constrictor*, L.** Encycl. Oph., p. 25, pl. 25, f. 46. Catesby rapporte que ce Serpent qui parvient souvent à la longueur de six pieds, fait la guerre aux Rats; les poursuit avec une incroyable vitesse jusque sur les toits des maisons; et qu'il dévore même les Serpents à sonnette. Il est brave, se défend avec acharnement et s'entortille autour du corps et des jambes des chasseurs qui

l'attaquent. Du reste il n'est pas venimeux, et on le considère comme très-utile. Ses couleurs sont fort sombres. Il est noir en dessus et bruni en dessous. P. 186; n. 99.

**Le LUTRIS**, *Coluber Lutrix*, L. Ce beau Serpent dont on ne connaît pas la patrie a le dos et l'abdomen blanchâtres avec les côtes jaunes. P. 134, n. 27.

**Le MALPOLL**, *Coluber sibilans*, L., Encycl. Oph., p. 55, pl. 19, f. 34; *Coluber Malpollon*, Daud. Ce serpent, dont les couleurs produisent le plus agréable effet, parvient à une grande taille; il habite l'Inde. P. 160, n. 100.

**Le MAURE**, *Coluber Maurus*, L. Le dos de ce Serpent est brun avec deux lignes longitudinales qui finissent par se confondre avec l'abdomen, lequel est d'un beau noir; ses écailles sont carénées. Il se trouve sur la côte d'Afrique aux environs d'Alger. P. 152, n. 66.

**Le MEXICAIN**, *Coluber mexicanus*. On n'a d'autre indication sur ce Reptile que ce qu'en dit Linné qui nous apprend qu'il a cent trente-quatre grandes plaques abdominales et vingt-sept paires de plaques sous la queue.

**Le MILIAIRE**, *Coluber miliaris*, L. Ce Serpent de l'Inde, qui n'a guère plus de six pouces et qui n'est pas plus gros que le doigt, a sa tête ovale, couverte d'écailles vertes et le corps brun tacheté de blanc. Il est d'une certaine élégance. P. 162, n. 59.

**La MINERVE**, *Coluber Minerva*, L. Cette espèce se trouve dans les Indes. On ne sait ce qui lui a mérité le beau nom qu'elle porte. Elle n'est pas plus grosse que le petit doigt. Sa couleur est le vert de mer avec une bandelette brune sur le dos. P. 158, n. 90.

**Le MOLOSS**, *Coluber Molossus*, Daud. Cette espèce que Latreille a nommée Cannelée se trouve à la Caroline, et ressemble par sa taille au Molure et par ses couleurs au Boa Devin. Ses mœurs sont très-douces. P. 222-226, n. 60-64.

**Le MOLURE**, *Coluber Molurus*, L., Encycl. Oph., p. 26, pl. 40, f. 2;

est l'un des plus grandes espèces de ce genre, si elle ne les surpasse toutes par sa taille. Elle dépasse six pieds de longueur, et présente par sa forme assez d'analogie avec les Boas. On la trouve dans les Indes. P. 249-255, n. 59-65.

**Le MORMONÉ**, *Coluber guttatus*, L., Encycl. Oph., p. 26, pl. 23, f. 48. Ce beau Serpent, qui joint l'élégance des formes à l'éclat des couleurs, habite la Caroline où l'on dit qu'il se nourrit de Potates; il est couvert de taches d'un rouge vif. P. 253-250, n. 60.

**Le MUQUUX**, *Coluber muscous*, L., Encycl. Oph., p. 36, pl. 28, f. 59. Cette Couleuvre des Indes est des plus tristes, et n'a guère qu'un pied de longueur. P. 200, n. 140.

**Le NASIGU DU BÉNIGALE**, *Coluber Mycteriscus*, Daud. Il ne faut pas confondre cette Couleuvre avec le *Myctiscus* de Linné, qui est le Nez retroussé, Serpent américain. Celle-ci n'est pas plus venimeuse que l'autre. Elle est extrêmement grêle et souvent mutilée. P. 273-278, n. 46-66.

**Le NÉBULEUX**, *Coluber nebulosus*, L., Encycl. Oph., p. 36, pl. 20, f. 38. Son corps est nuancé de brun et de gris; le dessous est blanchâtre et nuancé de brun. Il habite l'Amérique. P. 185, n. 81.

**Le NEZ RETROUSSÉ**, *Coluber Mycteriscus*, Encycl. Oph., p. 63, pl. 58, f. 62; le Fouet de cochon, *Coluber flagelliformis*, Daud. La mâchoire supérieure de ce Serpent d'Amérique se prolonge en nez retroussé; ainsi que l'indique son nom. Le corps est couleur de chair avec une bandelette pâle sur chaque côté. Cet Animal varie pour les couleurs. Il est des individus bleus, d'autres qui sont variés de vert et de brun. Ce Serpent n'est pas venimeux, quoique Linné l'ait signalé comme tel. P. 190, n. 269.

**L'OEILLÉ**, *Coluber ocellatus*. Laurenti mentionne deux variétés de ce Serpent qui paraissent être originaires de l'Afrique, de Ceylan et de la Chine. L'une et l'autre ont sur le



os des taches oculiformes de couleur écarlate. Les plaques abdominales n'ont pas été comptées.

Le **PANDÉ, Coluber Pandera**, L. Ce serpent des Indes, long d'un pied, a le corps blanc, avec des taches noires, disposées par paires sur le dos et réunies par une petite ligne longitudinale. D'autres taches isolées se voient sur les côtés. p. 198, n. 55.

La **PALE, Coluber pallidus**, L. Encycl. Oph., p. 33, pl. 16, f. 29. Espèce des Indes dont le corps pâle, semé de taches grises et de points bruns, a deux étroites lignes noires de chaque côté. p. 153-158, n. 94-98.

Le **PANACHÉ, Coluber varius**. On ne connaît pas la patrie de ce Serpent. Le Gronou dit être panaché de blanc, de bleu, de noir et de couleur de mille. p. 136, n. 49.

La **PANTHÉRINE, Coluber Pantherinus**, Daud. Sa taille est de trois pieds; sa couleur générale, le brun cendré, recouvert de quelques taches plus brunes. Sa patrie est inconnue: c'est peut-être un Bongare: ses plaques paraissent ne pas avoir été comptées.

Le **PARQUETÉ, Coluber tessellatus**. Laurenti qui ne donne ni le nom du pays de ce Serpent, ni le nombre de ses plaques abdominales, le dit marqué de taches noires et brunes qui forment une sorte de compartiment très-régulier.

Le **PÉLIAS, Coluber Pelias**, L.; la lie de l'Encyclopédie. Ce Serpent est connu que par une note de Linnaeus, qui nous apprend qu'il est de l'Inde; qu'il a deux bandelettes noires sur le dos, le dessous vert et une bandelette jaune de chaque côté. p. 7, n. 103.

Le **PÉTALAIRE, Coluber petaliarius**, Encycl. Oph., p. 48, pl. 26, f. 54. On prétend que cette Couleuvre, qui se trouve à Amboine et dans les Indes, se rencontre aussi au Mexique; son corps brun est marqué d'environ cinquante bandelettes transversales couleur blanche, et qui s'élargissent sur les côtes. p. 219-212, n. 109-5.

Le **PÉTHOLE, Coluber Pethola**, L.,

Encycl. Oph., p. 43, pl. 25, f. 62. Espèce africaine assez triste, de couleur plombée, avec des bandes brunes annulaires; sa taille est de deux pieds environ. Laurenti avait fait de cette espèce le type de son genre *Corynalla*, lequel contenait sept autres espèces qui ne paraissent être que de simples variétés selon Gmelin. Ses caractères consistaient dans la grandeur des plaques supérieures de la tête, dont la frontale plus considérable que les autres. p. 207-209, n. 85-90.

La **PLUTONIE, Coluber Plusionius**, Daud. On ignore la patrie de ce Serpent dont l'aspect est effrayant, et que Merrem confondit à tort avec le Minime. p. 222, n. 107.

Le **PONCTUÉ, Coluber punctatus**, L. Cette Couleuvre de la Caroline a le corps cendré en dessus, jaune en dessous, et marqué de trois rangées de points noirs. p. 136, n. 45.

Le **POURPRÉ, Coluber purpurascens**. Selon Scheuchzer et Gronou, cette Couleuvre de Surinam a le corps pourpré, avec des taches noires irrégulières sur le dos. p. 189, n. 122.

La **PYTHONISSE, Coluber Pythonissa**, Daud., qui est une Hydre de Schneider, a les mêmes habitudes que l'Hydre de Pallas, mais habite le Bengale; ses écailles dorsales, relevées par une cannelure, ont encore cette particularité qu'elles sont ciliées. p. 159, n. 52.

Le **RAYÉ, Coluber lineatus**, L. Encycl. Oph., p. 58, pl. 17, f. 30, est un Serpent d'Asie dont le corps est blennâtre, marqué de quatre lignes brunes avec une bande plus bleue sur le milieu du dos. p. 165-169, n. 80-85.

Le **RÉGINE, Coluber Regina**, L. Encycl. Oph., p. 14, pl. 12, f. 17. Ce petit Serpent, qui vient des Indes, n'a guère que dix pouces de longueur; il a une bandelette verte derrière les yeux, le corps brun en dessus, et tacheté en dessous de blanc et de noir. p. 137, n. 70.

Le **RÉSEAU NOIR, Coluber atro-reticulata**. Ce Serpent de Guinée, figuré par Scheuchzer (*Phys. sacr.*, pl. 746, f. 5), a le corps d'un blanc tirant sur

le bleu, avec ses écailles bordées de noir. P. 141, z. 56.

**Le RÉTICULAIRE**, *Coluber reticulatus*, Lac., Serp., 553; Encycl. Oph., p. 24; pl. 42, f. 4. Cette Couleuvre a été rapportée de la Louisiane; elle a le corps couvert d'écailles lisses, grises, bordées de blanc. P. 218, z. 80.

**Le RHOMBOÏDAL**, *Coluber rhomboides*, Encycl. Oph., p. 29, pl. 44, f. 44. Cette espèce est originaire des Indes; trois rangées de taches jaunâtres, rhomboïdales et bleues vers l'arrière, sont disposées sur son dos qui est bleuâtre. P. 157, z. 70.

**La COULEUVRE DE RICHARD**, *Coluber Richardi*, N. (V. pl. de ce Dict.) Le nom vulgaire de Couleuvre Liane, donné à cette élégante espèce par les habitants de la Guiane, indique d'avance sa forme élancée et sa flexibilité. En effet, ce Serpent que nous allons faire connaître, et que nous dédions à la mémoire de Richard, notre illustre maître, est l'un des plus sveltes, des plus élégans et des plus minces qui existent. Nous en avons fait la description sur trois individus rapportés par feu notre savant ami; sa taille est de trois à quatre pieds; la queue très-fine est fort longue et équivalait pour le moins au tiers de la longueur totale; le corps n'est guère plus gros que le doigt; le cou, très-aminci et bien distinct, supporte une tête allongée, ovale, un peu élargie vers l'occiput qui est aplati; elle est couverte de neuf grandes plaques d'un beau vert de topaze; les écailles sont légèrement carenées sur le dos, mais le sont plus sensiblement sur les flancs; le ventre blanc est plat; le dessus est d'un brun chatoyant, qui produit des reflets comme le ferait du cuivre de Rosette; trois lignes d'un brun clair vif et brillant règnent dans toute la largeur du Serpent; une petite bande noire, partant de la pointe du museau et passant sous l'œil, sépare la teinte verte du vertex, de la couleur blanche qui règne sur les mâchoires; celles-ci ont leurs lèvres garnies d'écailles un peu plus grandes que celles qu'on trouve

sur le reste de l'Animal, y compris les écailles des commissures, et une impaire en avant; il y en a dix-neuf en haut, et treize en bas. Cette espèce présente quelques rapports avec le Boiga, et a peut-être été confondue avec ce Serpent que nous croyons être particulier à l'ancien monde, et conséquemment fort différent. Il a également quelque ressemblance avec le Saurite; mais la forme de sa tête l'en distingue; il est d'ailleurs encore plus mince et proportionnellement plus allongé. P. 163-171; z. 150.

**Le ROUGE-GORGE**, *Coluber jugularis*, L. Cette espèce, qui se trouve en Egypte, est bien caractérisée, selon Hasselquitz; par sa tête blanche, son corps noir et sa gorge rouge; sa longueur est de quatre pieds. P. 195, z. 102.

**La ROUSSE**, *Coluber rufus*, Lacép. On ignore la patrie de ce Serpent dont le corps est rouge en dessus et blanc en dessous; sa longueur est d'un pied et demi environ. P. 212, z. 68.

**Le RUBANÉ**, *Coluber fasciata*, Laurenti lui attribue des yeux à peine visibles, un corps blanc d'une grosseur égale, et orné de bandelettes brunes irrégulières, obliquement disposées. Cet auteur n'indique ni son pays ni le nombre de ses plaques abdominales.

**Le SAURITE**, *Coluber Saurita*, L., Encycl. Oph., p. 68, pl. 23, f. 45. Ce Serpent, fort allongé, élégant et agile, se trouve dans la Caroline; ses écailles sont brunâtres, avec trois minces longitudinales bleuâtres ou blanches. P. 156, z. 121.

**Le SATURNIN**, *Coluber Saturninus*, L., Encycl. Oph., p. 46, pl. 22, f. 40. Ce Serpent est peut-être le plus mince de tous; il n'a pas quatre lignes de diamètre; et sa longueur, dont la queue fait le tiers, est au moins de trois pieds; il est assez élégamment nuancé de teintes bleuâtres et blanches, et se trouve depuis l'Inde jusqu'en Guinée. P. 147-149, z. 120-125.

**Le SCHOKARI**, *Coluber Schokari*, Fossalini a fait connaître cette Cou-

uvre qu'il a trouvée en Arabie; elle est remarquable par deux bandelettes blanches qui règnent le long de son corps, et dont une seule est lissée de noir. P. 183, E. 144.

Le SERPENT DES DAMES, *Coluber bimacellus*, L., Encycl. Oph., p. 38, l. 9, f. 8. Cet Animal est encore d'un ombre de ceux chez lesquels l'éclatance des couleurs obtient grâce pour sa forme. On prétend que les dames du Malabar en élèvent un certain ombre, et qu'elles se plaisent à le mettre dans leur sein, pour se rafraîchir durant les grandes chaleurs; il a guère que huit à dix pouces de long; il est gracieusement varié de blanc et de noir. P. 118, E. 60.

Le SERPENT DOMESTIQUE, *Coluber oresticus*, L. La familiarité avec laquelle ce Serpent entre dans les maisons, lui a valu le nom qui le désigne; on le trouve en Barbarie; on l'est fort commun. P. 245, E. 94.

Le SIBON, *Coluber Sibon*, L., Encycl. Oph., p. 33, pl. 19, f. 35. Cette Couleuvre est africaine; sa couleur est un mélange de rouille et de blanc; ses parties inférieures sont tachetées de brun. P. 180, E. 85.

La SILLONNÉE, *Coluber porcatius*, Lac., à qui l'on doit la connaissance de cette espèce, l'a trouvée dans la Caroline, et dit ses écailles carenées; le vit de Grenouilles et habite le bord des eaux. P. 128, E. 88.

Le SIPPON, *Cotaber Sipedon*. On ne connaît cette espèce, qui est de l'Amérique septentrionale et de couleur brune, que parce que Linné lui assigne cent quarante-quatre plaques abdominales et soixante-treize paires de caudales.

Le SIRTALE, *Coluber Sirtalis*. Linné nous apprend que cette Couleuvre, qui se trouve au Canada, a cent cinquante plaques abdominales et cent quatorze caudales.

Le SITULE, *Coluber Situla*, L. Ce serpent a trois pieds de longueur environ; il est d'une couleur gris-rembrun; une ligne noirâtre règne latéralement de chaque côté comme pour parer le dos du ventre. On trouve

cette espèce en Égypte. P. 265, E. 43.

Le SOMBRE, *Coluber Aeneus*, L., Encycl. Oph., p. 18, pl. 20, f. 39. Cette espèce, qui offre quelques rapports de conformation avec le Blige; mais qui n'en a pas les brillantes couleurs, habite l'Asie. P. 149, E. 117.

Le STRIE, *Coluber striatus*. Le Serpent de la Caroline a de cent vingt-six à cent trente-huit plaques abdominales, et de vingt-cinq à quarante-cinq caudales.

Le SUPERBE, *Coluber speciosus*. Gronou assigne près de quatre pieds pour la taille de ce Serpent du Brésil, qui a le corps rayé de blanc et de noir. P. 272, E. 70.

Le SYMÉTRIQUE, *Coluber symetricus*, Lac., Serp., p. 250. Cette espèce, qui vient de Ceylan, parvient à dix pouces environ de longueur. Elle a le corps brun avec de petites taches noires de part et d'autre, rangées en file. P. 142, E. 26.

Le TACHETÉ, *Coluber maculatus*, Lac., Serp., p. 329. On trouve cette Couleuvre à la Caroline et à la Louisiane; elle y acquiert deux pieds de longueur; son corps, blanchâtre ou d'un brun pâle, a sur le dos des taches rousses rhomboidales, bordées de noir et formant une bande en zigzag. P. 119, E. 70.

La TÊTE-NOIRE, *Coluber melanocephalus*, L., Encycl. Oph., p. 54, pl. 12, f. 15. Ce Serpent, qui est originaire d'Amérique, a sa tête variée de blanc et de noir, avec tout le corps brun. P. 140, E. 62.

Le TIGRÉ, *Coluber Tigrinus*, Lac., Serp., p. 130. Le nom de cette Couleuvre, dont on ignore la patrie, indique la disposition des couleurs qui la décorent. Elle a treize pouces et demi de longueur. P. 233, E. 67.

Le TRIANGLE, *Coluber Triangulum*, Lac., Serp., p. 331. Ce Serpent vient d'Amérique. Sa tête, un peu ovale, est marquée sur le sommet de deux figures en triangle; le corps est blanchâtre avec des taches rousses bordées de noir et éparses sur le dos, et disposées à la file sur les côtes. P. 213, E. 48.

**Le TRIANGULAIRE**, *Coluber Buccatus*, L. Le corps de ce Serpent des Grandes-Indes est brun avec environ trente bandes blanches transversales. P. 107, Z. 72.

**Le TRIANGLE**, *Coluber Trissalis*, L. Ce petit Serpent des Indes, qu'on dit se trouver aussi en Amérique, a le dessus du corps d'une belle couleur de vert de mer avec quatre lignes rouges qui se réunissent en une seule à l'extrémité du corps. P. 195, Z. 86.

**Le TRIPLE-RANG**, *Colabertetrdinatus*, Lac., Serp., p. 332; Encycl. Oph., p. 50, pl. 42, f. 5. Le corps blanchâtre de ce Serpent d'Amérique offre trois rangées de taches brunes sur le dos. P. 160, Z. 59.

**Le TROIS-RAMES**, *Coluber terlineatus*, Lac., Serp., p. 254; Encycl. Oph., p. 42, pl. 41, f. 3. Le nom de cette Couleuvre, dont on ignore la patrie, indique que trois fascies longitudinales règnent sur son corps qui est de couleur rousse. P. 169, Z. 34.

**Le TYPIR**, *Coluber Typhius*, L. Ce Serpent des Indes a son corps d'un vert foncé avec ses écailles relevées en arêtes. P. 140, Z. 53.

**Le TYRIE**, *Coluber Tyria*, L. Hasaelquits, qui a trouvé ce Serpent en Egypte, dit qu'il a sa bouche dépourvue de dents et le corps blanchâtre, avec des taches brunes rhomboidales disposées sur trois rangs. P. 210, Z. 85.

**Le VAMPUR**, *Coluber fasciatus*, L., Encycl. Oph., p. 51, pl. 11, f. 14. Cette espèce est encore l'une de celles que la vivacité de ses couleurs fait rechercher dans les collections. Elle habite la Caroline. P. 228, Z. 67.

Le Verdâtre, le Vert, le Vert et Bleu, la Violette, sont des espèces exotiques dont les noms indiquent la couleur et à peu près le principal caractère. Le Serpent Nain de l'Encyclopédie méthodique, ainsi que l'Anguiforme, la Tête-Ronde, et la Spatule du même ouvrage, *Coluber anguiformis*, *cerastoides* et *latiros-*

*iris* de Laurenti, sont d'autres espèces trop imparfaitement connues pour que nous devions nous y arrêter.

Le Chagque ou Chayquerna, que quelques naturalistes comptent à placer parmi les Couleuvres, nous paraît devoir être une Vipère, quoique les crochets venimeux dont elle est munie soient très-petits. Il n'en existent pas moins au fond de la gorge de ce Serpent.

La Peinte, l'Obscure, la Pécule, la Couleuvre à bandes folles, la Triale, la Couleuvre Thalie, l'Escariote, la Maligine, la Serpentina, la Contaline, la Treillissée, l'Ombres, la Salamandrine, le Porte-Croix, le Dore, le Daperric, la Couleuvre à ventre étroit, l'Againe, ne complètent pas encore toutes les espèces qu'ont mentionnées Linné, Gmelin, Daudin et autres naturalistes. D'autres Serpens, décrits comme des Couleuvres par les mêmes auteurs, appartiennent à des genres différens. Telles sont la Couleuvre à lunette qui est un Naja, la Couleuvre Cherses qui est une Vipère, le Bryomph et la Couleuvre venimeuse, qui sont des Bongares, etc. P. tous ces mots.

**COULEUVRE**, mot. fran. Nom vulgaire de la Bryomph. (B.)

**\* COULEUVREIN**, mot. fran. Syn. d'Erix. P. ce mot. (B.)

**COULAVAN**, ou. P. COULAVAN.

**COULIGOU**, ou. (Vietn.) P. COU.

**COULILABIN**, ou. **COULILAVAN**. BOT. FRAN. Pour Coulilab. P. ce mot. (B.)

**COULIN**, ou. Syn. vulgaire de Ramier, *Columba Palumbus*, L. P. PIGEON, et de Martin chauve, *Cucula calva*. P. MARTIN. (B.)

**\* COULLOU-CAYANE**, mot. fran. Syn. de *Galego vitina* à la suite de Coromandel. (B.)

**COULLOU**, ou. **COULLOU**, mot. fran. Même chose que Coulou ou Coulmelle. P. ces mots. (B.)

**COULOMBA.** BOT. PHAN. Variété du Mûrier, dont les Vers à soie sont très-frands dans le midi de la France. (B.)

**COULON.** OIS. Syn. vulgaire de tous les Pigeons de colombers. (DR..Z.)

**COULON-CHAUD.** OIS. Nom donné par plusieurs auteurs au genre que, dans la Méthode de Temminck et de plusieurs autres, l'on distingue sous le nom de *TOURNE-PIERRE*, *Streptilas*, Illig. V. ce mot. (DR..Z.)

\* **COULON-DE-MER.** OIS. Syn. vulgaire de la plupart des Mouettes. F. MARTE. (DR..Z.)

\* **COULONT.** BOT. PHAN. (Léche-naulr.) Syn. de *Glycine tomentosa* aux environs de Pondichéry où la racine de cette Légumineuse se donne cuite aux Chèvres en guise d'Avoine. Jussieu dit qu'on étend ce nom à divers Haricots à la côte de Coromandel. F. GLYCINE. (B.)

**COULOUBRIGNÉ ou COULOU-BRINÉ.** BOT. PHAN. Noms vulgaires du Sureau dans diverses parties de la France. (B.)

**COULOU-CAVALAY.** BOT. PHAN. F. CAVALÉ. Ce nom désigne encore le *Galega villosa*. (B.)

**COULOUMB, COULOM et COULOUN.** OIS. Vieux noms français des Pigeons, du latin *Columba*. (B.)

**COULOUMBADA.** OIS. Syn. piémontais du Lagopède, *Tetrao Lagopus*, Gmel. F. TETRAO. (DR..Z.)

**COULOUN.** OIS. Même chose que Coulon. F. ce mot.

**COULSE.** BOT. CRYPT. (*Champhorax*). Nom vulgaire, dans les départements de l'Arriège et des Hautes-Pyrénées, de l'*Agaricus procerus*. F. ce mot. (AD. B.)

\* **COULTERNEB.** OIS. Syn. vulgaire en Ecosse du Macareux, *Alca arctica*, L. F. MACAREUX. (DR..Z.)

**COUMA.** BOT. PHAN. F. COUMIER.

**COUMAROU.** *Coumarouna.* BOT. PHAN. Genre de la famille des Légi-

mineuses et de la Diadelphie Décandrie, L., établi par Aublet et adopté par Jussieu avec les caractères suivans : calice coriace, turbiné, à trois divisions, dont les deux supérieures sont dressées, très-grandes, l'inférieure très-petite, aiguë; corolle papillonacée formée de cinq pétales dont les trois supérieurs dressés et marqués de veines violettes; les deux inférieurs déclinés et plus petits; huit étamines réellement monadelphes, quoique le genre ait été placé dans la Diadelphie du système sexuel. Le fruit est une espèce de noix ovée oblongue, extérieurement drupacée et coténeuse, renfermant une seule semence oblongue ayant l'apparence d'une amande. Willdenow a substitué au nom de *Coumarouna* celui de *Dipterix*, et lui a ajouté comme con-génère le *Taralea oppositifolia* d'Aublet.

Sans nous arrêter à vérifier l'exactitude de ce rapprochement, nous ne parlerons ici que de l'espèce primitive, *Coumarouna odorata*, Aublet (Plantes de la Guiane, t. 198), Arbre qui s'élève jusqu'à vingt-cinq mètres sur un metre de largeur. Il est très-rameux au sommet; ses feuilles sont grandes alternes et pinnées, et ses fleurs purpurines, disposées en grappes axillaires et terminales. Cet Arbre croît dans les grandes forêts de la Guiane, et particulièrement à Sinémari et dans le comté de Gène. Son nom de *Coumarou* est celui que lui donnent les Galibis et les Garipons. L'amande de son fruit que Gaertner a figuré sous le nom de *Baryosma Tongo* (de *Fructib.* 2, p. 73 et t. 93) est remarquable par la suavité de son odeur; on la connaît en Europe sous le nom de *Fève de Tonta* où elle est employée principalement à parfumer le Tabac. Les naturels de la Guiane enflent ces amandes pour faire des colliers odorans. Le tronc de l'Arbre est d'une telle dureté que les créoles l'emploient aux mêmes usages que celui du Gayac, et même lui donnent à tort le nom de Gayac. (G. N.)

\* **COUMAROUVANA**. BOT. PHAN. Syn. *gripum* du *Maral* d'Aublet. Nos mot. (B.)

\* **COUMELON**. BOT. PHAN. Syn. de *Gmelina asiatica* à la côte de Comorandel. (B.)

**COUMÈNE**. BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires du *Lycopo* européen. (B.)

\* **COUMÈTE**. BOT. PHAN. Nom galibi d'un *Eugenia* adopté par Aublet.

**COUMIER**. *Couma*. BOT. PHAN. Genre de Plantes dicotylédones monopétales établi par Aublet (Plantes de la Guiane, Suppl., p. 39, t. 393), et dont on n'a pu jusqu'à présent déterminer ni la place systématique, ni les rapports naturels; ses fleurs étant inconnues. Ce genre avait même paru tellement obscur à un savant auteur du *Genre*, qu'il n'en a fait aucune mention et ne lui a même pas assigné de place parmi les *Genera incerta sedis*. Nous sommes assez heureux pour pouvoir dissiper entièrement cette obscurité, ayant en notre possession la Plante d'Aublet, ornée de ses fleurs, et dans un état parfait de conservation. Cette Plante a été recueillie par feu Richard pendant son séjour à la Guiane. Elle appartient évidemment à la famille des Apocynées et vient se placer auprès du genre *Ambelania*. V. notre Mémoire sur ce genre (*Ann. Hist. Nat.* t. 1.)

Le **COUMIER DE LA GUIANE**, *Couma guianensis*, Aubl. (*loc. cit.*), est un Arbre lacteux qui croît sur le bord des fleuves. Il peut s'élever à une trentaine de pieds. Ses jeunes rameaux sont triangulaires, recouverts d'une écorce grisâtre et glabre. Ses feuilles sont verticillées par trois et non trifoliolées. Elles sont ovales, acuminées, entières, très-glabres des deux côtés, presque cordiformes à leur base qui se termine par un pétiole membraneux en gouttière, long d'environ un pouce. Les pétioles des trois feuilles, surtout dans celles qui occupent le sommet des rameaux, se réunissent, s'em-

boîtent les uns dans les autres, de manière à suruler un pétiole commun portant trois feuilles. C'est ce qui a induit en erreur les auteurs qui ont attribué à cet Arbre des feuilles trifoliolées. Les fleurs sont roses, de la grandeur du Jasmin; elles forment à la partie supérieure des jeunes rameaux des panicules trichotomes, dont les pédoncules et leurs ramifications sont triangulaires et comme articulés. Le calice est turbiné, à cinq divisions étroites, dressées et persistantes; la corolle est monopétale, tubuleuse; son tube cylindrique est un peu renflé vers sa partie moyenne; le limbe est étalé, à cinq divisions étroites, aiguës, réfléchies; l'entrée du tube est garnie d'une grande quantité de poils; les étamines, au nombre de cinq, sont insérées à la partie inférieure du renflement que l'on remarque vers le milieu du tube calicinal. Les filets sont courts, grêles, un peu velus; les anthères sont biloculaires, allongées et sagittées; l'ovaire est déprimé, enveloppé dans sa moitié inférieure par un disque assez mince dont le bord est sinueux. Cet ovaire présente une seule loge, dans laquelle un grand nombre d'ovules sont attachés à deux trophospermes pariétaux. Le style est subulé, glabre, et atteint à peu près la hauteur des étamines; le stigmate est à deux lobes allongés et rapprochés, au-dessous desquels on voit une petite lame disciforme. Les fruits sont de la grosseur d'une Prune, arrondis, un peu déprimés, roussâtres, renfermant de trois à cinq graines dans une pulpe de couleur ferrugineuse. Ces fruits, d'abord âcres, deviennent ensuite doux et agréables. On les vend dans les marchés de Cayenne sous le nom de *Poires de Couma*.

Dans le Choix des Plantes de la Guiane, publié par Rudge, on trouve, pl. 48, sous le nom de *Cerbera triphylla*, le *Couma guianensis* d'Aublet; mais l'auteur, en décrivant la Plante qu'il représente, n'a pas reconnu celle d'Aublet, qui ne peut,

en aucune manière, être rapportée au genre *Cerbera*. (A. R.)

**COUMON.** BOT. PHAN. Fruit d'un Palmier déterminé, de la Guiane, avec lequel on fait une boisson fort agréable. (B.)

\* **COUNANA.** INS. Nom vulgaire à Cayenne de la larve du *Bruchus Bec-tris*, L. V. BRUCHES. (B.)

\* **COUNA-CONATI.** BOT. PHAN. (Surjan.) Syn. caraïbe de *Phyllanthus Niruri*. (B.)

\* **COONDOU-MANI.** BOT. PHAN. On appelle ainsi dans l'Inde l'*Abrus precatorius*. V. ce mot. (A. R.)

\* **COUPAN.** POIS. (Ruysch.) Syn. présumé de Rémora, nommé par les matelots hollandais Coupau-Visch. V. SCHÉNÉIDE. (B.)

**COUPAYA.** BOT. PHAN. V. COPAIA.

**COUPE-BOURGEON, BÊCHE, LISETTE ou PIQUE-BROTS.** INS. On a donné ces noms vulgaires à plusieurs Insectes des genres Attelabe, Grihonri, Eumolpe, Pyrale; qui sont beaucoup de torts aux bourgeons des Vignes, aux greffes des Abricotiers et des Pêchers. Parmi ces Insectes, on connaît d'avantage l'Eumolpe de la Vigne, *Eumolpus Vitis*, Fabr. V. EUMOLPE. (AUD.)

**COUPE-FAUCILLE.** BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires de la Linnaire et de l'*Anthirinum Orontium*, espèces de Muffier. (B.)

**COUPEROSE ou VITRIOL MIN.** Noms imposés par le vulgaire à la combinaison de l'Acide sulfurique avec quelques bases métalliques. Les Couperoses bleue, verte et blanche sont les Sulfates de Cuivre, de Fer et de Zinc. (DR. Z.)

**COUPET.** MOLL. (Adanson, Voy. au Sénégal. p. 94, pl. 6.) Cône hébraïque. V. CÔNE. (D. H.)

**COUPEUR-D'EAU.** OIS. Syn. qui convient particulièrement au Bec-en-Ciseaux, *Rhynchops*, L.; mais qui, dans diverses relations de voyages, s'étend à presque tous les Pétrels. V. BEC-EN-CISEAUX. (DR. Z.)

TOME IV.

**COUPL.** BOT. PHAN. V. COUPON.

\* **COUPOUL.** BOT. PHAN. Arbriste décrit sous le nom de *Couposit squatica* (Guian., Suppl. p. 16, t. 37) un Arbre originaire de la Guiane dont le fruit seulement est connu, et qui paraît se rapprocher de la famille des Myrtacées. Ses feuilles sont pointues, obovales, aiguës, échanquées en cœur à leur base et très-grandes. Les fruits sont ovoïdes de la grosseur d'un Citron, couronnés par les cinq lobes du calice; ils contiennent une seule amande. (A. R.)

**COUQUELOURDE.** BOT. PHAN. Pour Couquelourde. V. ce mot.

\* **COURAATHES.** INS. L'Insecte de Ceylan ainsi désigné comme une espèce de Fourmi appartient peut-être pas à ce genre, et n'est encore guère connu que par son nom. (B.)

**COURADI et PAI-PAROKA.** (Rhéede, *Malab.* v, t. 46.) Syn. de *Grewia orientalis*, L. V. GREWIA.

\* **COURAGE.** BOT. PHAN. Vieux nom de la Bourrache. (B.)

**COURAKAT.** BOT. PHAN. L'un des noms de l'*Elettaria Coracana* aux environs de Pondichéry. (B.)

**COURANT.** GÉN. Mouvement progressif qui s'exerce dans les fluides en raison d'une impulsion qui imprimant la différence des niveaux et la dilatation ou la raréfaction des milieux environnans. L'air comme l'eau se courants sur lesquels l'effet du poids des diverses couches de l'atmosphère est très-sensible. Les Courans de l'air influent à leur tour et dans beaucoup de circonstances sur ceux des eaux. Ils sont communément produits par l'abaissement ou par l'élévation alternative de la température, et par la figure des continents sur lesquels ils roulent en causant les vents et les tempêtes. Leur action se confond tellement avec celle de ces météores, que c'est au mot VENT que nous en traiterons dans cet article. Il ne sera question, dans cet article, que des Courans de l'eau. On en a cherché la raison dans une

multitude de causes, en les distinguant en deux sortes : les COURANS VARIABLES ou PARTICULIERS et les COURANS SIBÉRIQUES ou GÉNÉRAUX. Ces derniers ne sont proprement point des Courans ; ils appartiennent à un tout autre ordre de phénomènes. Il en sera traité à l'article MARÉES. Les véritables Courans, ceux que l'on comprend dans l'idée commune de ce mot ; ne nous paraissent avoir nul rapport avec la température, ou du moins celle-ci doit peu influer sur leur action que nous attribuons principalement aux pentes sur lesquelles ils glissent.

Quelle hypothèse qu'on ait imaginée sur la différence de niveau de certaines parties de l'Océan, il est impossible de concevoir que les unes soient plus élevées que les autres ; et les lois de la nature auxquelles obéissent les fluides ne sauraient permettre une aberration capable de renverser toutes les idées reçues. Il est vrai que la mer Rouge se trouve, à l'instant du flux, élevée de quelques mètres au-dessus de l'extrémité syriaque de la Méditerranée, et qu'on a des raisons de supposer que la surface des eaux au fond du vaste golfe Mexicain est un peu plus haute que dans le reste de l'Océan ; mais ces deux exceptions, les seules avérées, sur de grandes masses d'eau, tiennent à des circonstances particulières : la première à la forme de la mer Rouge où l'eau de l'Océan Persique-Africain est poussée, comme nous voyons quelquefois les vents s'engouffrer dans une impasse, et en sortir moins vite qu'ils n'y sont entrés ; la seconde à la pression latérale que doit exercer contre les côtes qu'il longe, le grand Courant connu des marins sous le nom de *Gulf-Stream*. Il est même probable que le fond de plusieurs grands golfes allongés et rétrécis, particulièrement de la plupart de ceux qui ne se lient à l'ensemble des mers que par un détroit, sont dans le cas des cornes de la mer Rouge, sur lesquelles les nivellemens des officiers de l'expédition d'Égypte ont opéré. Ainsi la mer Noire et

l'extrémité de la Baltique pourraient bien être un peu plus hautes que l'Océan. De même le côté le plus voisin des rivages longés par les Courans pourrait bien être un peu plus élevé que le côté opposé, auquel l'étendue des eaux ne présente pas tant de résistance. Mais ces faits certains ou probables ne sont rien contre d'imprescriptibles lois. Les fluides tendent sans cesse à se mettre en équilibre ; et ce n'est que de la forme de leur contenant que les eaux de la mer peuvent recevoir quelque impulsion déterminante des Courans qu'on y remarque. Les ruisseaux, les rivières et les fleuves nous indiquent la marche que suit partout la nature dans la production et pour la direction des Courans. Les eaux de ceux-ci, suivant la pente du terrain, roulent avec vitesse, se ralentissent et coulent avec une molle lenteur, selon que le terrain est rapide ou s'aplatit. En débouchant dans la mer, le Courant des fleuves y continue donc à travers une masse d'eau qui repose sur un fond anfractueux, et doit nécessairement suivre encore ces anfractuosités, quoiqu'en se ralentissant. La réunion de ces Courans divers et l'opposition invincible que leur présente bientôt le poids de la masse totale des eaux qu'ils grossissent, doit produire un Courant général, vaste fleuve marin, à peu près parallèle aux côtes, proportionné en étendue et en rapidité aux tributs qu'il reçoit des continents, et dont les rivages sont d'un côté ceux des continents même, et de l'autre la masse centrale des flots amers. Les vents ou Courans atmosphériques peuvent favoriser, accélérer ou contenir les Courans marins. Le flux et le reflux doivent aussi en les déplacer ou causer des altérations alternatives dans leur marche, mais ils demeurent existans, et les pêcheurs qui conduisent leurs bateaux jusqu'au milieu des écueils les connaissent fort bien. L'habitude apprend à ceux-ci à démêler leurs moindres effets. La connaissance et la marche des Courans, dit le savant Rossel, forme une branche im-



portante de l'art nautique. C'est elle qui apprend aux marins que, si le principal du Courant leur devient contraire, ils peuvent dans certains cas se transporter dans les lieux voisins, où ils en trouveront de favorables. Certains livres de navigation sont destinés à leur indiquer ceux qui se rencontrent dans les parages connus; mais une connaissance raisonnée de la matière dont ils agissent peut leur en juger, à l'inspection des côtes et l'aide de la direction du principal courant, quels sont les lieux qui, dans ces parages inconnus, leur procurent les mêmes avantages. »

Les Courants se distinguent aisément dans les rivières et les fleuves, et leur rapidité toujours plus grande, à des objets immobiles de comparaison se présentent aisément aux environs comme pour faire apprécier leur vitesse. Il n'en est pas de même de ceux de la haute mer dont le navigateur éprouve les effets sans distinguer la marche. Cependant les corps entraînés, quelquefois une onde différente du reste des eaux, ils traversent, et une surface au lieu d'écume et de débris flottans, sont de loin à les faire reconnaître. Nous avons plus d'une fois, de la paume du grand mât, distingué au loin, sur mer tranquille, de ces traces sinuées qui ressemblaient aux cours d'eau et on suivait les replis au milieu de la mer démontée par quelque rose soulevée et du sommet duquel on peut contempler la campagne. Ces traces amoncelées de vent ébranlé nous ont servi par les naturalistes voyageurs. Les débris qui les composent et entraînent les Courans marins leur indiquent la direction de ceux-ci. Ils y trouvent dans la Zone torride les productions du Nord, ils en constatent que le Courant passe par le sinistre d'un cercle polaire; si au contraire; vers les glaces septentrionales, on y observe quelques fragments des productions intertropicales, concluront que le Courant vient du sinistre de la ligne équinoxiale. Au lieu de la confusion des corps entraî-

nés, les naturalistes pourront trouver des objets inconnus, mais alors ils doivent se garder d'en indiquer la position au lieu où se sera faite la découverte.

La marche de plusieurs Courans pélagiens est aujourd'hui aussi exactement déterminée que le peut être, sur une carte géographique, celle de la Seine ou de la Loire. Le plus remarquable de tous est le Courant atlantique septentrional, vulgairement appelé Gulf-Stream; il parcourt, en trois ans à peu près, un cercle irrégulier, immergé, de trois mille huit cents lieues au moins de contour. Des Canaries, vers lesquelles il circule à partir des côtes d'Espagne, il pourrait conduire en treize mois aux côtes de Caracas. Il met dix mois à faire le tour du golfe du Mexique d'où il se jette pour ainsi dire, par une accélération de vitesse, dans le canal de Bahama, après lequel il prend le nom de Courant des Florides; il longe alors les Etats-Unis et parvient en deux mois vers le banc de Terre-Neuve qui doit peut-être son existence à ses dépôts, et que Vonneguy ingénieusement comparé à la barre d'un grand fleuve. Ce banc se trouve en effet au point de contact d'un autre grand Courant septentrional qui pourrait bien être déterminé par le fleuve Saint-Laurent. De Terre-Neuve aux Canaries, en passant près des Açores et se dirigeant vers le détroit de Gibraltar d'où il se courbe au sud-ouest, le Gulf-Stream achève de parcourir la fin de sa révolution en dix ou onze mois. C'est dans l'intérieur de ce cercle que se trouvent surtout ces amas flottans de bargasses dont furent si fort surpris les premiers investigateurs du grand Océan, qui les signalaient sur leurs cartes informes; quand ces amas, portés par le balancement des flots, atteignent aux limites du Courant, ils sont entraînés par lui jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque disposition favorable à leur accumulation. Cette disposition se rencontrant surtout dans l'espace de grand bassin que forment les Canaries, les îles du Cap-Vert et les côtes d'Afrique, c'est dans cet espace surtout que les Bargasses

s'accumulent en immenses bancs flottans qui, d'après nos observations, paraissent n'avoir pas végété dans les profondeurs des parages sur lesquels on traverse ces sortes de forêts ou plutôt de prairies océaniques. Un autre Courant, qui part de l'équateur en se dirigeant au nord-est, se porte au fond du golfe de Guinée, et passant ensuite entre les îles du Prince, de Saint-Thomas et la côte voisine, se perd vers l'embouchure du Zaïre. On trouve un autre Courant dans l'hémisphère austral, dont nous avons observé la ligne écumeuse, et qui, se dirigeant vers le cap de Bonne-Espérance, s'y embranche avec un Courant qui paraît venir du canal de Mozambique, doubler la pointe méridionale de l'Afrique et se diriger vers le nord le long des côtes désolées qui s'étendent dans la même direction. Dans les mers de l'Inde, les Courans paraissent alterner et suivre la marche des vents alisés ou réglés. Ce fait est certain : aussi n'avons-nous pas prétendu nier que les vents ne puissent avoir une telle influence, mais nous ne reconnaissons pas à ces vents l'importance exclusive qu'on a voulu leur donner. La Polynésie est remplie de Courans contraires et peu connus, dont plusieurs sont fort dangereux. Du sud de la Nouvelle-Hollande partent encore de grands Courans, et l'Océan Pacifique offre aussi son Gulf-Stream. En général les Courans partiels longent les côtes, tournent les caps et deviennent plus rapides dans les passages rétrécis : c'est ainsi qu'on en trouve de violens dans le détroit de Magellan et dans le canal de Mozambique. Dans le golfe de Gascogne, on observe un Courant très-sensible qui se dirige au nord-est ; il reçoit, en longeant la côte de France, les eaux de la Garonne, de la Charente, de la Loire, et de la Vilaine, et, passant entre les îles et la côte de Bretagne, il va se perdre dans l'Océan. On assure que la Manche n'en offre pas de traces bien sensibles, non plus que le pourtour des îles Britanniques. Le

canal Saint-George, au sud duquel débouche le rivièr de Bristol, devoit cependant en offrir un assez considérable, si l'on en juge par analogie. La côte du Labrador offre un Courant qui, dans toutes les saisons, se dirige du nord au sud. Depuis le mois de mai jusqu'en octobre, un Courant de la mer des Indes se dirige dans le golfe Persique, qui semble se dégorger durant les six autres mois. En général, les Courans, partis du grand Océan, se portent par les détroits dans les différentes mers intérieures : c'est ainsi qu'on voit les eaux de l'Atlantique entrer dans la Méditerranée sous la forme d'un large Courant, dont la vitesse est accélérée par le rapprochement des côtes. Les eaux affluentes, introduites par le détroit de Gibraltar, longent la lisière septentrionale, tournent entre l'île de Crète et les côtes de Syrie, et, baignant les côtes d'Afrique, s'enfoncent dans les régions inférieures de la Méditerranée, d'où elles ressortent pardessous, de façon qu'entre la pointe méridionale de l'Espagne et l'extrémité septentrionale de l'empire de Maroc il existe un Courant supérieur et un Courant inférieur. On observe un fait semblable dans le canal de Bahama.

L'on a pensé que le mouvement de rotation du globe déterminait les Courans de la mer ; si ce mouvement en était la vraie cause, tous suivraient la même direction. Nous avons vu que plusieurs se dirigeaient perpendiculairement à l'écliptique, et que ceux qui se rapprochaient le plus de cette ligne ne le faisaient qu'obliquement. Ce mouvement de rotation ne doit pas avoir plus d'influence sur les eaux que sur le continent, si ce n'est par rapport aux marées que nous ne considérons pas comme l'effet des Courans, mais comme subordonnées à l'influence des astres. La vitesse des Courans est souvent très-rapide ; elle tient à la profondeur des vallées sous-marines qui les déterminent, et l'on peut supposer assez raisonnablement qu'à mesure que les mers diminueront et que les continents aug-

interont; les Courans deviendront grands fleuves dont on pourrait vaince figurer le cours sur la map. monde. *V. FLEUVES.*

Il est des Courans locaux et irréguliers dont on ne peut trop expliquer causes, à moins qu'on ne les suppose déterminés par quelques gouffres s'engloutissant les eaux, et d'où es peuvent être ensuite repoussées. Il est celui de l'Euripe, entre l'Europe et les côtes de la Grèce; tel est surtout ce célèbre Malstrom qui, dans le voisinage de la Norvège et par le cinquante-huitième degré de latitude nord, passe pour attirer et engloutir les Animaux marins, et jusqu'aux vaisseaux qui s'en approchent imprudemment. (B.).

\* COURAQUET. ois. Syn. vulgaire de la Rousserolle, *Turdus arundinaceus*, L. *V. SYLVIE.* (DR. Z.).

COURATARI. BOT. PHAN. Le grand et bel Arbre décrit et figuré par Aublet (Guian., 794, t. 290), sous le nom de *Couratari guianensis*, a ses rameaux étalés, ses feuilles alternes, pendantes, courtement pétiolées, elliptiques, acuminées, très-tières, parfaitement glabres, longues d'environ quatre à cinq pouces, larges de deux à trois pouces, un peu coriaces, ayant les nervures latérales très-rapprochées, dépourvues de stictiles. Les fleurs sont grandes, d'un blanc agréablement lavé de pourpre, formant des épis axillaires plus courts que les feuilles. Chaque fleur est brièvement pédonculée et articulée vers la base de son pédoncule. Le calice est court, turbiné inférieurement, à six divisions très-profondes, guës et persistantes. La corolle, beaucoup plus grande et presque étalée, compose de six pétales un peu inégaux, arrondis, très-obtus, soudés ensemble à leur base par les filets minimaux et semblant former une corolle monopétale rotacée. Les étamines sont fort nombreuses, leurs filets se réunissent pour constituer l'androphore concave, pétaloïde, courbé, un peu plus long que

les pétales, et dont la face supérieure ou concave est chargée d'anthères. Cet organe est généralement décrit comme un nectaire. L'ovaire est semi-infère, déprimé, et se termine par un style simple et assez court. Le fruit offre une forme et une structure extrêmement singulières. C'est une capsule ligneuse, oblongue, évasée et presque campaniforme, tronquée à son sommet, quelquefois à trois angles obtus, peu marqués. Ses parois sont parsemées de points blanchâtres. Elle est fermée supérieurement par une sorte d'opercule circulaire qui se prolonge, dans sa partie interne ou inférieure, en une columelle ou axe central triangulaire, marqué de trois dépressions longitudinales, lequel se prolonge jusqu'au fond de la capsule. Les graines, au nombre de huit à douze, sont oblongues, aplaties, membraneuses sur leurs bords. Elles contiennent un embryon recourbé, ayant la racicule longue, cylindrique et appliquée sur la face d'un des cotylédons qui sont minces, foliacés et chiffonnés. Jusqu'à présent, on ne connaissait que les fruits de cet Arbre qui ont été figurés par Aublet, et qu'on rencontre fréquemment dans les collections. C'est pour la première fois que la fleur de cet Arbre est décrite et figurée (*V. pl. de ce Dictionnaire*). Nous avons tracé ses caractères d'après de beaux échantillons de cet Arbre recueillis par feu le professeur Richard à la Guiane. Ce genre a les plus grands rapports avec le *Lecythis* et pourrait même y être réuni. Néanmoins, il en diffère par la forme de son fruit, ses graines membraneuses, attachées au fond de la capsule, et par la structure de son embryon. *V. LECYTHUS* et *LECYTHIDEE.* (A. R.).

COURATOUN. ois. (Bonelli) Syn. piémontais du Courlis de terre, *Corradrius Edicnemus*, L. *V. OBISCHEN.* (DR. ANI.)

COURBARIL. BOT. PHAN. *V. HYMENEA.*

COURBAS, COURETAS ET

**COURBEAU.** ois. Syn. vulgaires de Corbeau dans le midi de la France.

V. CORBEAU. (DR..Z.)

\* **COURBINE.** pois. Pour Corbine. V. ce mot.

**COURCHO.** ins. Les Vers à soie qui se changent en Chrysalide sans filer de cocon. (B.)

**COURCOUSSOU.** ins. Nom languedocien d'un Coléoptère indéterminé qui vit dans les bois. (B.)

**COURDI.** BOT. PHAN. V. **COURONDI.**

**COURE.** MAM. Syn. guarani de Pécarí. V. COCHON. (B.)

**COUREJHOLO.** BOT. PHAN. Le Liseron commun en Provence. (B.)

**COURELIOU.** ois. Syn. de Courlis. V. ce mot.

**COURESSE** ou **COURERESSE.** REPT. OFH. Espèce du genre Couleuvre. V. ce mot. (B.)

**COUREUR.** *Corrira.* ois. Aldrovande a le premier décrit cet Oiseau que depuis l'on n'a jamais revu. Cet Animal, qui devrait faire le type d'un genre particulier, laissé de grands doutes sur son existence, et plusieurs auteurs présument que la bonne foi d'Aldrovande a été surprise par des récits mensongers ou par un Oiseau fabriqué artificieusement avec des parties empruntées à d'autres Oiseaux de genres différens. On a donné le surnom de Coureur à une espèce du genre Traquet, *Ananthe cursoria*, Levaill., Ois. d'Afrique, pl. 190. V. TRAQUET. (DR..Z.)

\* **COUREUR DE COUSINS.** ois. Syn. présumé de Gobe-Mouche gris, *Muscicapa Grisola*, L. V. GOBE-MOUCHE. (DR..Z.)

**COUREURS.** *Cursores.* ois. Douzième ordre de la méthode ornithologique de Temminck. Caractères : bec médiocre ou court ; pieds longs, nus au-dessus du genou ; les doigts, au nombre de deux ou de trois seulement, dirigés en avant. Cet ordre se compose des genres Autruche, Rhéa,

Casoaïr, Outarde et Couré-Vite. Il en est peu qui renferment moins d'espèces, et nos climats n'en comptent guère que trois ou quatre. Le nom de Coureurs leur a été imposé à cause de la grande aptitude qu'ils ont pour la course aux dépens du vol qui même, faute d'organes convenables à son exécution, est absolument interdit à plusieurs espèces de ce genre. Ils habitent de préférence les plaines les plus vastes et même les déserts. L'herbe tendre, les graines, les Insectes concourent indistinctement à leur nourriture. Ils fuient la société et paraissent se dérober surtout aux regards des Hommes, ils mettent peu de soins à la construction de leurs nids, et ceux qu'ils apportent dans l'incubation se ressentent du peu de tendresse, du peu d'empressement qu'en général on observe dans la recherche mutuelle des deux sexes. (DR..Z.)

**COURE - VITE.** *Cursorius.* ois. (Lath.) Genre de l'ordre des Coureurs. Caractères : bec plus court que la tête, grêle, presque cylindrique, déprimé à la base, faiblement voûté et courbé à la pointe ; narines ovales, surmontées d'une petite protubérance ; tarse élevé, grêle ; trois doigts en avant très-courts, presque entièrement divisés ; l'intérieur moins long de moitié que l'intermédiaire ; ongles très-petits ; point de pouce ; ailes médiocres, la deuxième rémige la plus longue ; tectrices recouvrant entièrement les rémiges.

Les Oiseaux de ce genre sont particuliers aux contrées brûlantes de l'ancien continent, et ce n'est qu'improprement que l'on a donné le nom d'Européenne à l'innée espèce d'Afrique, parce que quelques individus égarés ont été trouvés par hasard sur les plages de l'Italie, de l'Espagne et même de l'Angleterre. Ces Oiseaux sauvages et fugitifs, retirés dans les sables arides et déserts, ont encore été fort peu étudiés, et le petit nombre d'individus qui parent les collections, ont succombé par surprise dans des pièges ; car la rapidité de

leur course peut, à ce qu'on assure, les mettre hors de toute atteinte des armes à feu. Tout ce qui concerne leur nidification, l'incubation, l'éducation de leurs petits et leurs dissembrées mues, est absolument ignoré.

**COURE - VITE DE COROMANDEL**, *Cursorius asiaticus*, Lath.; *Charadrius coromandellicus*, Gmel., Buff., pl. enl. 893. Parties supérieures brunes; croupion et tectrices caudales blancs; sommet de la tête, devant du cou et poitrine d'un roux marron; rémiges et bas-ventre noirs; cuissés et tectrices anales blanches; un trait blanc et un autre noir derrière l'œil; rectrices cendrées, avec une tache noire vers l'extrémité qui est blanche: bec noir; pieds jaunâtres. Taille, huit pouces. De l'Inde.

**COURE-VITE A DOUBLE COLLIER**, *Cursorius bicipitatus*, Temm.; *Tachydromus collaris*, Vieill. Parties supérieures d'un brun cendré; chaque plume bordée de blanc roussâtre; tectrices alaires intermédiaires rousses; rémiges noires; croupion blanc; un collier noir, fort étroit au bas du cou, et un autre plus large sur la poitrine; parties inférieures roussâtres. Taille, dix pouces. D'Afrique.

**COURE-VITE ISABELLE**, *Cursorius europæus*, Lath.; *Cursorius isabellinus*, Meyer; *Charadrius gallicus*, Gmel.; Buff., pl. enl. 795. Plumage d'un roux isabelle; une double raie noire, séparée par un trait blanc derrière l'œil; sommet de la tête roux; tectrices alaires bordées de cendré; rémiges noires; une tache noire entourant l'extrémité des rectrices qui est blanche; les deux intermédiaires unicolores; bec noir; pieds cendrés. Taille, neuf pouces. D'Afrique. Il a été observé quatre fois en Europe. (DR. 2.)

**COURGE**. *Cucurbita*. BOT. PHAN. L'un des genres les plus considérables de la famille des Cucurbitacées, qui en a tiré son nom. On peut le caractériser de la manière suivante: ses fleurs sont thymiques; dans les mâles, le calice est campanulé, à cinq dents ou à cinq lanières étroites;

la corolle est monopétale, régulière; campaniforme, ou plus ou moins plane, à cinq lobes quelquefois très-profonds; les étamines, au nombre de cinq, sont portées sur trois androphores, dont deux soutiennent chacun deux anthères, et la cinquième une seule; ces anthères sont linéaires, repliées plusieurs fois sur elles-mêmes; les filets des étamines sont plus ou moins rapprochés à leur base, et recouvrent un corps central et glanduleux, qui paraît être le pistil avorté. Les fleurs femelles ont la corolle absolument semblable à celle des fleurs mâles; leur calice est ovaïde, allongé et intimement adhérent avec l'ovaire infère; le style est court, terminé par trois stigmates plus ou moins profondément échancrés; le sommet de l'ovaire est couronné, soit par une sorte de disque circulaire, soit par trois appendices courts qui sont les étamines avortées. Le fruit offre les plus grandes variétés de forme et de consistance. Sa grosseur varie depuis un jusqu'à trente et même trente-six pouces de diamètre. Il est tantôt globuleux et lisse, tantôt relevé de côtes, ovaïde, allongé en forme de bouteille, de massue, etc. Sa consistance ne varie pas moins; dans quelques variétés, son péricarpe, lorsqu'il est parfaitement mûr, est sec, dur et crustacé; d'autres fois il reste charnu; dans tous les cas, il est indéhiscant et pulpeux intérieurement. Les graines sont ovoïdes, très-comprimées, tantôt échancrées en cœur à leur sommet et minces sur leurs bords, tantôt entières et entourées dans leur contour d'un rebord un peu élevé.

Ce genre est extrêmement voisin du Concombre (*Cucumis*), dont il ne diffère essentiellement que par ses graines échancrées en cœur; quand elles sont minces sur les bords, ou entourées d'un rebord saillant lorsqu'elles sont entières. Il se compose d'un assez grand nombre d'espèces qui toutes sont originaires des contrées les plus chaudes de l'ancien et du nouveau Continent. Ce sont tou-

tes des Plantes herbacées, annuelles, ayant la tige charnue, armée de vrilles, et acquérant souvent de très-grandes dimensions. Les fleurs sont généralement grandes et portées sur des pédoncules axillaires. Elles sont tantôt blanches et tantôt jaunes. Les fleurs mâles sont en plus grand nombre que les femelles. Les espèces de ce genre qui ont les fleurs jaunes, la corolle campaniforme, les graines entières et relevées d'un rebord saillant, constituent le genre Pépon du professeur Richard, qui ne laisse dans le genre *Cucurbita* que les espèces dont la corolle est étalée, et qui ont les graines minces sur les bords et échancrées en cœur à leur sommet. Nous considérerons seulement le genre Pépon comme une simple section du genre *Cucurbita*.

§ I. PÉPON, *Pepo*, Rich. Fleurs jaunes à corolle campanulée, à graines entières, entourées d'un rebord saillant.

COURGE POTIRON, *Cucurbita Pepo*, L.; *Cucurbita maxima*, Duchesne; *Pépo macracarpus*, Rich. Le Potiron est l'une des Plantes herbacées qui, dans le cours de quelques mois, acquièrent les plus grandes dimensions et produisent les fruits les plus volumineux. En effet, sa tige, qui reste étalée sur la terre, s'y étend quelquefois de vingt-cinq à trente pieds. Dans quelques variétés, cependant, elle est beaucoup moins longue. Elle est toujours cylindrique, fistuleuse, ramifiée et couverte de poils rudes, qui existent également sur les feuilles et les calices. Les feuilles sont fort grandes, alternes, pétiolées, cordiformes, arrondies, à cinq lobes obtus. Les fleurs sont très-grandes, jaunes, monoïques et placées à l'aisselle des feuilles. Les fruits sont d'une grosseur énorme. On en voit qui ont deux pieds et demi et même plus de diamètre, et qui pèsent de quarante à cinquante livres. Ils sont, en général, globuleux, déprimés au sommet et à la base, relevés de côtes peu marquées. Leur chair est jaunâ-

tre, peu fondante; leur écorce mince et non crustacée; leur intérieur est creusé d'une vaste cavité aux parois de laquelle sont attachées les graines, au moyen de filamens cellulaires. Celles-ci sont blanches, ovoïdes, très-comprimées, entourées d'un rebord saillant; et entièrement recouvertes par le tissu cellulaire qui pend aux parois de la cavité. Cette Plante est originaire de l'Inde. On la cultive dans nos jardins; ou elle n'exige pas de très-grands soins. On sème ses graines dans des pots que l'on met sous châssis. Lorsqu'elles sont bien germées et qu'on n'a plus à redouter la gelée, on les met en place dans des trous que l'on a remplis de bon terreau. On doit encore pendant quelque temps les recouvrir d'une cloche et de paille pendant la nuit. Ses fruits sont mûrs vers les mois d'octobre et de novembre.

Cette espèce présente quatre variétés principales, savoir : 1<sup>o</sup> le gros Potiron jaune, qui est la plus commune; 2<sup>o</sup> le petit Potiron jaune, qui est la plus hâtive; 3<sup>o</sup> le gros Potiron vert; 4<sup>o</sup> enfin le petit Potiron vert. Le Potiron est généralement peu estimé. Sa chair est ferme et peu savoureuse. On en forme, en le faisant cuire dans du lait, des potages assez bons.

COURGE POLY MORPHE, *Cucurbita polymorpha*, Duchesne; *Cucurbita Pepo*, Var. Il nous semble bien difficile de distinguer cette espèce de la précédente, si ce n'est par sa corolle plus allongée et comme infundibuliforme; et par ses fruits dont la peau est généralement dure et crustacée. Elle offre une foule de variétés qui, pour la plupart, sont recherchées et conservées comme ornemens, plutôt qu'elles ne sont employées comme aliment. Les plus remarquables sont : 1<sup>o</sup> les ORANGERS et les COLOQUINÈLES, *Cucurbita colocyntha*, Duch. Les premiers ont le fruit de la grosseur et de la couleur d'une Orange, avec la peau crustacée. On les appelle aussi fausses Oranges. Les Coloquinelles ou fausses Colo-

quintes n'en diffèrent que par leur peau plus mince, panachée de blanc et de vert. 2°. Les **CUCURBITES**, leurs fleurs sont fort petites et très-nombreuses; les fruits ont la forme d'une Poire ou sont ovoides; leur peau est solide, crustacée, d'un vert foncé, parsemée de taches blanches; les graines sont fort allongées; la pulpe est fibreuse. 3°. La **BARBARINE** ou **BARBARESCQUE SAUVAGE**, *Cucurbita verrucosa*, L. Plus grosse que les précédentes, tantôt déprimée, tantôt ovoïde et allongée; sa peau, qui est quelquefois verruqueuse et bosselée, est mince et non crustacée. On mange ses jeunes fruits. 4°. Le **TURBANÉ**, *Cucurbita piliformis*, Duch. Remarquable par sa forme singulière, il semble formé de deux fruits superposés, dont l'inférieur présente des côtes très-saillantes; tandis que le supérieur, qui est plus et moins gros, se termine par quatre cornes dressées. Ces deux moitiés sont séparées par un étranglement circulaire, garni de petites verrues grises; leur peau est solide, mais leur pulpe est bonne à manger quand elle est cuite. 5°. Les **CITROUILLES** et les **GIRAUMONS**. Cette race a des fruits beaucoup plus gros; dont la chair, qui est bonne à manger, est recouverte d'une pellicule mince et crustacée. Le nombre des variétés que présente cette race, est extrêmement considérable. 6°. Le **PASTISSON**, *Cucurbita Melopepo*, Duchesne; *Pepo clypeiformis*, Rich. Les Pastissons ont la peau très-fine; la chair farine. Leur forme est extrêmement variable; on en voit de ronds, avec des côtes très-saillantes; se prolongeant à la partie supérieure ou inférieure, et formant une sorte de cornue; d'autres sont allongés et en forme de Concombre; quelques-uns ont la forme d'un Champignon non épanoui, c'est-à-dire qu'ils sont très-renflés dans leur moitié supérieure qui se prolonge inférieurement en une sorte de pédicule; leur chair est en général peu savoureuse et ne se mange que cuite et apprêtée de diverses manières.

**COURGE PÂTÈQUE**, *Cucurbita Citrullus*, L.; *Cucurbita Anguria*, Duchesne. C'est à cette espèce que l'on donne vulgairement le nom de Melon d'eau et que l'on cultive en si grande abondance dans toutes les contrées de l'Europe méridionale. Elle se reconnaît facilement à ses feuilles, dont les lobes sont profondément laciniés; à ses fruits globuleux ou ovoïdes, lisses, verts, mouchetés de blanc; sa chair est rose; son intérieur est plein et ne présente pas de cavité centrale, comme les Melons et les Potirons; les graines sont violettes, un peu rugueuses, placées dans un grand nombre de petites cavités creusées dans la chair. Celle-ci est très-aqueuse et fondante; d'une saveur fort agréable. Aussi les Pastèques sont-ils extrêmement recherchés dans les contrées méridionales de la France, en Espagne, en Italie, en Egypte, etc.

La **COURGE MELONÉE** ou **CITROUILLE MUSQUÉE**, *Cucurbita moschata*, Duch., n'est, suivant plusieurs auteurs, qu'une simple variété de la Courge polymorphe, dont elle ne diffère que par son calice resserré dans sa partie supérieure et ses feuilles plus molles et couvertes d'un duvet plus doux. Le fruit est globuleux, déprimé ou ovoïde. Sa chair est jaune ou rougeâtre. On cultive en abondance cette plante dans les provinces méridionales de la France, où elle est très-recherchée comme aliment.

§ II. **COURGE**, *Cucurbita*. Fleurs blanches, à corolle étalée; graines minces et sans rebords, échancrées en cœur à leur sommet.

**COURGE CABBASSE**, *Cucurbita Lagaria*, L.; *Cuc. lacantha*, Duch. Cette espèce, qui est mollement pubescente et gluante dans toutes ses parties, se reconnaît facilement à sa tige grimpante et sillonnée; à ses feuilles cordiformes, dentelées, molles et blanchâtres; ses fleurs sont monoïques, blanches et grandes; leur corolle est étalée et à cinq lobes; les fruits ont toujours leur partie externe dure et crustacée; mais leur forme

varie à l'infini; les graines qu'ils contiennent sont presque planes, miroirs sur les bords, et légèrement échanquées à leur sommet. On cultive en abondance cette variété qui ne demande d'autre précaution que d'être placée près d'un treillage, afin de pouvoir s'accrocher et grupper. Les variétés principales sont les suivantes : 1<sup>o</sup> la COUGOURDE ou GOURDE DES PÉLERINS. Le fruit a la forme d'une bouteille; lorsqu'il est parfaitement mûr, on le vide avec soin et l'on en fait des bouteilles dont se servent les militaires et les voyageurs; 2<sup>o</sup> la GOURDE est plus grosse que la précédente et presque globuleuse; 3<sup>o</sup> la MASSUE ou la TROMPETTE: dans cette variété singulière, les fruits sont très-allongés, presque cylindriques, renflés dans leur extrémité supérieure, de manière à ressembler beaucoup à une massue.

Nous aurions pu augmenter de beaucoup l'énumération des variétés que présentent les espèces de ce genre, et insister davantage sur leurs caractères; mais nous aimons mieux renvoyer les personnes, qui voudraient avoir des détails plus étendus sur ce sujet, aux articles que Duchesne de Versailles a donnés sur ces Plantes dans l'Encyclopédie méthodique.

(A. R.)  
COURGNÉ. BOT. PHAN. Syn. de Cornouiller. V. ce mot. (B.)

COURICACA. OIS. (Buffon, Vieill.) V. TANTALE.

\* COURIKIL. OIS. (Paulin.) Syn. vulgaire, au Malabar, d'une espèce d'Hirondelle qui n'a pas encore été déterminée avec exactitude. (N. Z.)

\* COURIL. OIS. (Gaimard.) Syn. de *Psittacus Nova-Hollandiae*, L., à la Nouvelle-Galles du sud. V. PERROQUET. (B.)

COURIMARI. BOT. PHAN. Le Végétal décrit par Aublet dans son Supplément des Plantes de la Guiane, p. 28, pl. 584, est trop imparfaitement connu pour qu'on en puisse déterminer les rapports naturels. C'est un Ar-

bre de quatre-vingts pieds d'élévation dont le tronc est supporté à sa base par des espèces d'arcades de six à huit pieds de hauteur, formées par les racines qui s'élèvent ainsi au-dessus du sol. Les feuilles sont simples, alternes, entières, vertes et glabres à leur face supérieure, couvertes inférieurement de poils roussâtres et ferrugineux. Leur longueur est de quatre à cinq pouces sur une largeur de deux pouces à deux pouces et demi. On n'en connaît pas les fleurs. Mais à en juger par ce qui en reste avec le fruit non parvenu à sa maturité, elles se composent d'un calice et d'une corolle persistante à cinq découpures très-profondes. L'ovaire est libre, et devient un fruit globuleux, charnu, à cinq loges, qui contiennent chacune une seule graine. (A. R.)

COURINGIE. *Couringia*. BOT. PHAN. Les *Brassica orientalis* et *Brassica campestris* avaient été retirés du genre Chou par Heister qui en avait formé un genre sous le nom de *Couringia*. Ce genre n'a point été adopté. V. CHOU et CORINGIA. (A. R.)

COURITIS. BOT. PHAN. (Dioscoride.) Syn. de Verveine.

COURJO ET COURJETO. BOT. PHAN. V. COUGOURLO.

COURLAN ou COURLIRL. *Aramus*, OIS. (Vieillot.) Genre de la seconde famille de l'ordre des Gralles. Caractères : bec plus long que la tête, dur, épais, comprimé latéralement, droit, incliné à la pointe qui est renflée; mandibule supérieure légèrement sillonnée; l'inférieure renflée vers le milieu, angulaire, pointue; narines linéaires, latérales, placées assez loin de la base du bec dans de longues fossettes, nasales et percées de part en part; tarse élevé; quatre doigts entièrement divisés; trois devant, lisses en dessous, longs et grêles; un derrière, articulé sur la partie postérieure du tarse et portant à terre sur plusieurs articulations; ailes médiocres; la première rémige



assez courts, la troisième la plus longue.

L'histoire du Courlis, encore très-peu connue, ne nous offre que des données assez incertaines sur les mœurs et les habitudes de cet Oiseau sauvage et solitaire. Habitant les plaines arides et désertes des contrées équatoriales du nouveau continent, il semble prendre un soin particulier à se dérober aux regards, et part comme un trait pour s'élever à perte de vue, lorsqu'il se croit découvert. On présume que, pour la nourriture et la reproduction, il se rapproche des Hérons avec lesquels il a pendant long-temps été confondu. Cependant Azzara, qui a découvert dans le Paraguay une seconde espèce de Courlis, assure que cet Oiseau n'est point pêcheur, que jamais il n'entre dans l'eau, qu'il dédaigne pour sa nourriture les Poissons et les Serpens, etc. Cet observateur ajoute qu'il cache soigneusement son nid au sein des savannes; que la ponte consiste en deux œufs, et que les petits, aussitôt après leur naissance, se trouvent en état de suivre leurs parents. Il est possible qu'Azzara ait été induit en erreur, car les faits qu'il rapporte sont un peu contradictoires.

Le CARAU, *Aramus Carau*, Vieill. Parties supérieures d'un brun noirâtre, qui prend une teinte pourprée sur le dos et le croupion; plumes des côtés de la tête, de la gorge et du cou, blanches à leur centre; parties inférieures brunes, tachetées de blanc sur le ventre; bec jaune, noirâtre aux deux extrémités; iris roussâtre; pieds cendrés. Taille, vingt-six pouces. Du Paraguay.

Le COURLAN, *Ardea scolopacea*, Gmel., Buff., pl. enl. 848. Plumage d'un brun foncé, irisé de vert et de rougeâtre sur les rémiges et les rectrices; gorge blanche dans sa partie supérieure; les plumes du cou de cette couleur, mais bordées de blanc; bec d'un cendré roux, bleuâtre à la pointe; pieds noirâtres. Taille, trente-deux pouces. De la Guiane.

Il faut avouer qu'il y a bien peu de

différence entre ces deux espèces, et Temminck, dont l'opinion en ornithologie est d'un grand poids, les regarde comme identiques. (DR. Z.)

GOURLERET. ois. Syn. vulgaire du grand Courlis cendré, *Scolopax areolata*, L. V. COURLETS. (DR. Z.)

GOURLERIC. ins. Même chose que Courbrole. V. ce mot. (B.)

COURLÉROLE. ins. Nom vulgaire de la Courtilière et de la larve du Hannelon commun. (B.)

COURLI. MOLL. Nom vulgaire et marchand du *Murex honestum*, L. V. ROCHER. (B.)

COURLI ÉPINEUX. MOLL. L'un des noms vulgaires et marchands de la Massue d'Hercule, *Murex Brandaris*, L. (B.)

COURLIRI. ois. V. COURLAN.

COURLIS ou COURLIEU. *Numenius*. ois. (Briss.) Genre de la seconde famille de l'ordre des Gralles. Caractères : bec très-long, grêle, arqué, un peu comprimé, presque rond; mandibule supérieure dépassant l'inférieure, faiblement obtuse vers l'extrémité, cannelée jusqu'aux trois quarts de sa longueur; narines placées latéralement dans la cannelure près de la base du bec, linéaires et longitudinales; face entièrement emplumée; pieds grêles; quatre doigts, les trois antérieurs réunis jusqu'à la première articulation; le postérieur articulé sur le tarse et posant à terre; ailes médiocres, la première rémige la plus longue.

Les rives fangeuses, les marais bourbeux sont les retraites favorites des Courlis; on les trouve aussi quelquefois sur les dunes humides; mais ce n'est que pendant leurs voyages, lorsque sur leur route ils ne trouvent point de plages marécageuses; forcés de descendre pour prendre leur nourriture, ils s'abattent sur ces sables trempés où la multitude énorme de Vers et de Mollusques dont ils sont le refuge, serait plus que suffisante pour nourrir des milliers de Courlis, si la

nature, en donnant à l'extrémité du long bec de ces Oiseaux une consistance assez flexible, ne les eût destinés en quelque sorte à choisir de préférence la vase des marais. Quoi qu'il en soit, les Courlis s'éloignent peu des côtes; et rarement on les rencontre à une grande distance de celles-ci ou des rivages des grands fleuves; ils entreprennent de longs voyages, en troupes assez nombreuses, et ne se séparent qu'au temps de la ponte; cette ponte consiste en quatre ou cinq œufs que l'on trouve ordinairement sur quelques brins de Juncus ou Gramens amoncelés au centre de quelques touffes d'Herbes ou de Bruyères élevées qui les cachent; quelquefois ces œufs sont déposés dans des fossettes sur le sable des dunes arides et sauvages. Les Courlis soignent peu leurs petits qui, lorsqu'en naissant, sont aptes à chercher eux-mêmes leur nourriture et à se passer des soins paternels. Quoique d'un naturel beaucoup plus farouche que les Chevaliers et les Bécasseaux, les Courlis se plient cependant à la domesticité dans les jardins clos; mais les Vers et les Limaces qu'ils y trouvent ne pouvant suffire à leurs besoins, ils ne tardent pas à périr autant d'inanition que d'ennui. Ces Oiseaux sont peu estimés des amateurs de gibier; dans certains cantons l'on recherche leurs œufs; avec lesquels on confond ceux de presque tous les autres Gralles qui nichent dans les mêmes lieux. Les Courlis dont le nom français dérive de leur cri, et que la forme du bec a fait appeler *Numenius* par les latinistes, paraissent avoir partagé avec les Ibis les honneurs divins chez les peuples de la haute antiquité soumis au culte d'Isis: du moins on en reconnoît des figures sur les hiéroglyphes qui sont parvenus jusqu'à nous. Ce genre, quoique peu nombreux en espèces, est répandu sur tous les littoraux des deux mondes; il doit sa formation à Brisson qui l'a détaché des *Scolopax* de Linné. Cuvier a distrait de ce genre le Corlieu,

dont il a fait le sous-genre *Phalaropus*, et le plus petit des Courlis qui est devenu le sous-genre *Falcinelle* Temminck, en adoptant cette dernière séparation, s'est contenté de placer l'espèce qui en est l'objet parmi les Bécasseaux.

**COURLIS ANDARANA**, Rafinesque. *Numenius aterrimus*, Vieill. Tout le plumage noir ainsi que le bec et les pieds. Cette espèce paraît être l'*Ibis noir* de Savigny, laquelle n'est elle-même qu'une variété de l'*Ibis noir*, *Ibis FALCINELLE*.

**COURLIS D'AFRIQUE**, *Scolopax africana*, L. Parties supérieures brunes; les inférieures blanches, tachetées de brunâtre; bec et pieds bruns. Taille, huit pouces. C'est le Bécasseau Cocorli dans son plumage d'hiver.

**COURLIS DE LA BAIE D'HIVER**, *Numenius Hudsonicus*, Lath. **COURLIS CORLIEU**.

**COURLIS À BEC GRÈLE**, *Numenius tenuirostris*, Vieill. Parties supérieures brunes avec les plumes bordées de roussâtre; rémiges brunes; rectrices rayées transversalement de blanc sur un fond brun; parties inférieures, devant du cou, poitrine, ventre couverts de taches allongées brunes; bec long et mince, pointu à sa base, brun dans sa longueur; pieds bruns. Taille, quinze pouces. D'Egypte.

**COURLIS À BEC NOIR**, *Numenius melanopsis*, Vieill.; *Scolopax atripes* Var., Gmel. Parties supérieures roussâtres, striées de brun noirâtre; sommet de la tête noir; les quatre premières rémiges noires à l'extrémité; celles rapprochées du dos entièrement tachetées de brun; rectrices roussâtres tachetées de brun à l'intérieur; parties inférieures d'un brun roussâtre avec quelques traits bruns; bec noir; pieds noirâtres; plumes des jeunes un peu différentes; ils ont la tête brune avec une bande roussâtre le milieu, les sourcils blancs, des taches noires sur le dos et brunes sur les flancs; de larges raies noires sur les rectrices, etc., etc. Taille, seize

x-huit pouces. De l'Amérique septentrionale.

COURLIS BLANC. *V. IBIS BLANC AMÉRIQUE.*

COURLIS NOIRÉAL, *Numenius borealis*, Lath. Parties supérieures brunes avec les plumes bordées de gris blanchâtre; front brun tacheté de brunâtre; tête blanchâtre, tachetée de brun; parties inférieures d'un blanc unâtre, avec le cou et la poitrine nement tachetés de brun; rémiges brunes; rectrices courtes; brunes, rayées de blanchâtre; bec très-mince, noirâtre, avec la base de la mandibule inférieure jaune; pieds noirs. Taille, douze pouces. De l'Amérique septentrionale.

COURLIS DU BRÉSIL. *V. IBIS ROUGE.*

COURLIS BRILLANT. *V. IBIS ROUGE.*

COURLIS BRUN. *V. IBIS BRUN.*

COURLIS BRUN D'AMÉRIQUE. *V.*

COURLIS GOUARAUNA.

COURLIS A CALOTTE NOIRE, *Numenius atricapillus*, Vieill.; *Scolopax luzoniensis*, Gmel. Sonnerat Voyage la Nouvelle-Guinée, pl. 48. Parties supérieures brunâtres avec le bord des plumes tacheté de blanc; sommet de la tête noir; parties inférieures blanches avec des traits longitudinaux noirs; rémiges noires; rectrices roussâtres rayées de noir; bec et pieds noirs. Taille, dix-huit pouces. De l'île de Luçon.

COURLIS CARNAY ou COURLIS CHIHU, *Numenius chihui*, Vieill. Parties supérieures noirâtres, insérées de vert et de violet; tête et cou garnis de plumes très-serrées, d'un brun foncé, bordées de blanc; parties inférieures noirâtres avec des reflets violets; bec cendré; pieds bruns. Taille, dix-huit pouces. Du Paraguay.

COURLIS COMMUN. *V. GRAND COURLIS CENDRÉ.*

COURLIS CORLIEU, *Scolopax phodopus*, L., Buff., pl. enl. 842. Parties supérieures brunes, avec les plumes bordées de brunâtre; sommet de la tête brun avec une raie variée de blanc dans le milieu; joues blanchâtres, finement rayées de noirâtre,

traversées par une raie obscure qui part de l'angle du bec et s'étend un peu au-delà de l'œil; grandes rémiges noirâtres avec la tige blanchâtre; les autres bordées de taches blanches et terminées de cette couleur; rectrices cendrées, rayées de brun; gorge et abdomen d'un blanc tacheté par le reste des parties inférieures marqué de taches et de traits bruns; bec court et presque droit dans les jeunes, long et arqué dans les adultes, brun avec la base de la mandibule inférieure blanchâtre; iris brun; pieds cendrés. Taille, seize pouces. D'Europe, d'Asie, etc.

COURLIS A COU BLANC. *V. IBIS A COU BLANC.*

COURLIS A COU VARIÉ ou CURUCAU. *V. COURLIS CHIHU.*

COURLIS CHIARD, *Numenius vociferus*, Lath. Tout le plumage cendré avec les plumes bordées de blanc; rectrices brunâtres, les intermédiaires les plus longues, les latérales les plus courtes et entièrement blanches; bec très-long, d'un noir verdâtre, plus clair à la base; yeux grands placés près du sommet de la tête; iris brun; pieds grêles et longs, cendrés. Taille, vingt-quatre à vingt-cinq pouces. De l'Amérique septentrionale.

COURLIS D'ÉGYPTE. *V. COURLIS A BEC GRÊLE.*

COURLIS EPHOUSKICA, *Tantalus pictus*, Bart. *V. COURLIS CHIARD.*

COURLIS DES ESQUIMAUX. *V. COURLIS CORLIEU.*

COURLIS ESPAGNOL. *V. IBIS BLANC D'AMÉRIQUE.*

COURLIS D'EUROPE. *V. GRAND COURLIS CENDRÉ.*

COURLIS GOUARAUNA, *Scolopax gouarauna*, L.; *Numenius americanus fuscus*, Briss. Parties supérieures brunes variées de roussâtre, avec des reflets verts; tête et cou bruns avec les plumes bordées de blanchâtre; rémiges et rectrices brunes, insérées à l'extérieur, tachetées ou rayées à l'intérieur; parties inférieures d'un brun marron; bec jaunâtre à sa base, brun à la pointe; pieds cendrés. Taille,

vingt-cinq pouces. Du Brésil et de la Guiane.

**COURLIS (GRAND) D'AMÉRIQUE. V. TANTALE D'AMÉRIQUE.**

**COURLIS (GRAND) DE CAYENNE. V. IBIS A COU BLANC.**

**COURLIS (GRAND) CENDRÉ, *Scolopax arcuata*, L., Buff., pl. enl. 818.** Parties supérieures d'un cendré clair varié de brun noirâtre; sommet de la tête brun, avec le bord des plumes cendré; front brunâtre; joues et cou cendrés avec chaque plume rayée longitudinalement de brun dans son milieu; ocrupion blanchâtre; rémiges noirâtres extérieurement, tachetées de cendré à l'intérieur; rectrices cendrées, rayées transversalement de brun et de roussâtre; gorge et parties inférieures blanchâtres; poitrine et ventre rayés longitudinalement de brun; bec noirâtre, jaunâtre à la base de la mandibule inférieure; iris brun; pieds cendrés. Taille, vingt-cinq à vingt-six pouces. D'Europe et d'Asie.

**COURLIS DE L'ILE DE LUÇON. V. COURLIS A CALOTTE NOIRE.**

**COURLIS D'ITALIE. V. IBIS FALCINELLE.**

**COURLIS DE MADAGASCAR, *Scolopax madagascariensis*, Buff., pl. enl. 198.** Parties supérieures brunes avec les plumes bordées de cendré; rémiges noirâtres à l'extérieur, tachetées de blanc à l'intérieur; rectrices cendrées, rayées transversalement de brun; gorge blanche; devant du cou blanchâtre, rayé de brun; poitrine d'un gris-roussâtre, tachetée de brun; abdomen blanc; tectrices caudales inférieures roussâtres, variées de brun; bec rougeâtre à la base, noir vers la pointe, blanchâtre en dessous; pieds d'un brun rougeâtre. Taille, vingt-six pouces.

**COURLIS MARRON. V. IBIS FALCINELLE.**

**COURLIS (PETIT). V. COURLIS CORLINUS.**

**COURLIS (PETIT) D'AMÉRIQUE. V. IBIS MATUITI.**

**COURLIS A PIEDS BLEUS, *Numenius cyanopus*, Vieill.; *Numenius arcua-***

**tus, Var., Lath.** Plumage d'un brun ferrugineux varié de noirâtre; bec très-long; iris jaune; pieds bleuâtres. Taille, vingt-cinq pouces. De la Nouvelle-Hollande. Divers ornithologistes pensent avec Latham que ce n'est qu'une variété du grand Courlis cendré, altéré par la différence de climats.

**COURLIS (LE PLUS PETIT des), *Numenius pygmaeus*, Lath. V. BÉCASSEAU COCORLI.**

**COURLIS ROUGE. V. IBIS ROUGE.**

**COURLIS ROUSSÂTRE. V. COURLIS A BEC NOIR.**

**COURLIS DE SURINAM. V. IBIS.**

**COURLIS TACHETÉ. V. COURLIS A CALOTTE NOIRE.**

**COURLIS DE TERRE. V. OEDICÈME CRIARD.**

**COURLIS A TÊTE BLANCHE, *Numenius leucocephalus*, Lath.** Plumage d'un bleu très-foncé avec les rémiges et les rectrices noires; tête et partie du cou blanches; bec rouge; pieds cendrés. Taille, vingt-quatre pouces. Du cap de Bonne-Espérance.

**COURLIS A TÊTE NUE. V. IBIS A TÊTE NUE.**

**COURLIS TEWREA, *Numenius Tahitiensis*, Lath.** Parties supérieures brunes, bordées de brun roussâtre; tête et cou d'un blanc rougeâtre avec de petites lignes longitudinales brunes; sommet de la tête brun; sourcils blanchâtres; rémiges noirâtres; rectrices fauves, rayées de brun; parties inférieures d'un brun roussâtre avec quelques taches noires sur les cuisses; bec brun, rougeâtre à la base; pieds d'un cendré bleuâtre. Taille, douze pouces. De l'Océanie.

**COURLIS VARIÉ DU MEXIQUE. V. IBIS ACALAT.**

**COURLIS VERT. V. IBIS FALCINELLE.**

**COURLIS VERT DE CAYENNE. V. IBIS DES BOIS. (DR. Z.)**

**COURMOTTE. BOT. OLYT. MÊME chose que Coulinotte. V. CÉ MOT. (B.)**

**COURNAC. OIS. Syn. piémontais**

Freux, *Corvus Frugilegus*, L. V.  
CORBEAU. (DR. Z.)

JOURNAJA. OIS. Syn. piémontais  
de la Corneille mantelée, *Corvus*  
*nix*, L. V. CORBEAU. (DR. Z.)

JOURNÉ. BOT. PHAN. Une variété  
Courge longue dans le midi. (B.)

COURNEBIOU. BOT. PHAN.  
Linn.) Syn. de *Vicia lutea* et hy-  
ta en Provence et en Languedoc.  
(B.)

COURNIAOU. BOT. PHAN.  
Linn.) Nom languedocien et pro-  
vençal d'une variété d'Olive fort al-  
gée. (B.)

COURROL. *Leptosomus*. OIS. (Vieil-  
lot) Genre de l'ordre des *Zygodacty-*  
Caractères : bec presque triangule,  
déprimé à la base, comprimé  
à pointe ; mandibule supérieure  
faiblement crenelée, un peu courbée,  
inférieure droite ; narines placées  
au milieu du bec, fendues diagonale-  
ment, légèrement évasées, recou-  
vertes et à demi-fermées par le pro-  
jetement de la substance cornée ;  
trois doigts, deux devant soudés à  
la base ; deux derrière ; ailes allon-  
gées ; les trois premières rémiges étan-  
gées, la quatrième la plus longue ;  
les rectrices toutes égales et lon-  
gues.

COURROL. VOUROUDRIOU, *Cuculus*  
*corrol*, Lath., Buff., pl. enl. 587 et  
Levaill., Ois. d'Afr., pl. 226 et  
Parties supérieures et sommet de  
la tête d'un vert foncé irisé ; front,  
les yeux, gorge, devant du cou cendrés ;  
dessous du cou d'un gris  
sombre ; un trait noir entre l'œil et  
le bec ; parties inférieures blanchâ-  
tres ; bec brun ; iris orangé ; pieds  
grêles. Taille, quinze pouces. La  
tête est sensiblement plus grande ;  
les parties supérieures rousses,  
maillonnées de brun ; le croupion,  
la gorge et la poitrine orangées avec  
bord des plumes brun ; des parties  
inférieures blanchâtres avec de larges  
taches rousses ; les grandes rectrices  
d'un brun noirâtre irisé. Les

jeunes mâles tiennent du plumage  
des femelles. De l'Afrique.

La grande différence que l'on ob-  
serve dans la robe des deux sexes a fait  
penser à plusieurs auteurs qu'il aurait  
bien pu se faire que ce fût deux espè-  
ces ; mais Levaillant a dissipé les doutes  
à cet égard en publiant diverses  
observations qu'il a été à portée de  
faire sur ces Oiseaux pendant son sé-  
jour en Afrique. Le Courrol, séden-  
taire dans les parties les plus boisées,  
ne se montre guère à la lisière des for-  
êts ; il s'y nourrit particulièrement  
de fruits et de quelquefois d'insectes.  
L'on n'a aucune donnée certaine sur  
sa nidification, mais Levaillant est  
très-porté à croire que la ponte com-  
mence en deux fois, car il n'a jamais  
vu au-delà de deux petits sous la sou-  
dure protectrice des parents. Les  
mâles de ces Oiseaux sont appelés  
par les naturels *Pourqu-Driou* et  
les femelles *Cromb*. On ignore les mo-  
tifs qui ont déterminé Vieillot à sub-  
stituer au nom imposé par Levaillant  
au type unique de ce genre, celui que  
l'on avait ajouté comme spécifique.  
L'un et l'autre n'offrant pas à l'esprit  
un sens plus déterminé, l'innovation  
est purement gratuite et ne peut  
qu'embrouiller la nomenclature au  
lieu de la simplifier. Le seul Courrol  
qui soit encore connu avait été pré-  
cédemment placé parmi les *Cuculines*.

(DR. Z.)

COURONDI. BOT. PHAN. Rhéode  
a décrit sous ce nom (*Hort. Malab.*,  
4, p. 103, t. 50) un grand Arbre du  
Malabar que l'on n'a pu encore rap-  
porter à aucun genre connu ni déter-  
miner ses affinités naturelles. Il porte  
des feuilles opposées, ovales, lancéo-  
lées, lisses ; des fleurs assez nombreu-  
ses groupées aux aisselles des feuilles.  
Ses fleurs sont petites ; leur corolle  
est formée de cinq pétales ; les étam-  
ines sont nombreuses. L'ovaire est  
libre et se change en un fruit char-  
nu, arrondi, mou, de couleur safran-  
née, contenant un seul noyau dans  
son centre. Cet Arbre est aussi dési-  
gné sous le nom de *Courde*. On ne  
pourra déterminer la place que ce

genre doit occuper dans la série des ordres naturels, que quand de nouveaux renseignemens, et surtout la possession de la Plante, que l'on ne connaît encore que par la description incomplète et la figure de Rhéde, en auront mieux fait connaître la structure. (A. R.)

**COURONNANT.** *Coronans.* BOT. PHAN. Les feuilles des Palmiers placées en forme de couronne au sommet du stipe; celles de quelques Joubarbes, de la *Fritillaire impériale* sont couronnées. (A. R.)

**COURONNE.** *zoon.* Nom donné à plusieurs Animaux, particulièrement de la classe des Mollusques.

**COURONNE DE VÉNUS.** le *Andrisa mitella*, L.

**COURONNE D'ÉTÉRIQUE,** une Volute et un Cône.

**COURONNE IMPÉRIALE,** un autre Cône.

**COURONNE ROYALE;** le *Voluta Mitra*, etc. (B.)

**COURONNE.** *Corona.* BOT. PHAN. II. Cassini appelle ainsi dans la famille des Synanthérées l'ensemble des fleurs qui occupent la circonférence d'un capitule; quand ces fleurs sont manifestement différentes de celles du disque, comme dans la plupart des Corymbifères, des Centaurées, etc. De-là les noms de Capitule ou Calathide couronnée ou incuronnée, suivant que les fleurs extérieures sont ou ne sont pas plus grandes et différentes. Cette expression n'a pas été adoptée par les autres botanistes. (A. R.)

On a donné vulgairement le nom de Couronne à plusieurs Plantes, avec quelque épithète caractéristique. Ainsi l'on a appelé :

**COURONNE D'ARIANNE** (Rumph, *Amb.*, t. 5), une espèce d'Apocinée encore mal connue.

**COURONNE DES FRÈRES,** le *Carduus Eriophorus*.

**COURONNE DE MOINE,** le Pissenlit.

**COURONNE DE SOLEIL,** le *Helianthus annuus*.

**COURONNE DE TERRE,** le *Glécome hederacé*.

**COURONNE IMPÉRIALE,** le *Fritillaria imperialis*.

**COURONNE ROYALE,** le *Mallot officinal*, etc. (B.)

**COUROUALY.** BOT. PHAN. L'un des noms malabares du *Canna indica*, L. P. BALISTIER. (B.)

**COUROUCOU,** *Trogon*, ois. (Linné.) Genre de l'ordre des Trogonidées. Caractères : bec plus court que la tête, épais, convexe, plus haut que large à la base qui est garnie de poils roides et longs; mandibule supérieure arquée, courbée à la pointe qui est émousée, l'inférieure presque droite; à toutes deux les bords dentelés chez les adultes; narines placées à la base du bec, simples, ouvertes et cachées sous les poils; ailes très-courtes; tarse moins long que le doigt externe; ongles petits, courbés et agus; ailes médiocres; les trois premières rémiges étagées, les quatrième et cinquième les plus longues; queue large et longue.

Le luxe et l'éclat de la parure sont pour ainsi dire les seuls dons étendus en partage aux Couroucons : l'élégance de formes, la noblesse de maintien, l'agilité de vol, la docilité et l'amabilité de caractère, se retrouvent chez eux. On pourrait les comparer à ces Orientaux stupides qui s'efforcent de cacher des difformités naturelles sous de brillans tissus d'or et de pourpre. Leur cou très-raccourci, joint à la volumineuse accumulation de leurs plumes sous lesquelles se cachent de très-petits pieds, enlèvent à ces Oiseaux toute espèce de grâce, et leur donnent, à ce que l'on assure, l'aspect d'un paquet de feuilles mortes. Perchés ou blottis sur une branche du bocage touffu qui les dérobe aux regards, il est difficile de les apercevoir. Ils conservent silencieusement cette attitude pendant toute la journée, et s'ils viennent à être découverts, loin de chercher leur salut dans une fuite tortueuse, ils se laissent nonchalam-

ment approcher, et donnent au chasseur qui les recherche pour la délicatesse de leur chair tout le temps de les enlever sans les manquer. La nourriture des Couroucous consiste exclusivement en Insectes, et, pour la rechercher, ils abandonnent leur retraite aux lieux extrêmes du jour, ce qui tendrait à faire croire que, comme les Houettes, ces Oiseaux peuvent avoir un organe de la vue extrêmement sensible. L'époque des amours, qui se renouvelle plusieurs fois dans l'année, tend à attacher le Couroucou à la solitude; pendant toute sa durée aussi, il rompt le silence, et fait entendre ses chants ou plutôt des cris assez distincts exprimés à peu près par son nom qui en est dérivé. Le mâle et la femelle unissent leurs soins pour élever ou préparer assez négligemment un nid dans le tronc carié de quelque vieux Arbre; ce nid reçoit ordinairement quatre œufs. En naissant, les petits sont absolument nus, et ce n'est qu'au bout de quelques jours qu'un léger duvet commence à les couvrir. Ils tardent peu à pousser leur robe, qui, sujette à plusieurs changemens successifs, a conduit à la confusion qui peut n'être pas encore totalement dissipée dans la détermination rigoureuse des espèces. Le caractère sombre et taciturne des Couroucous se décèle de bonne heure chez les jeunes. Dès qu'ils ont su se passer des soins de leurs parents, ils les quittent pour se réfugier dans les forêts, et probablement ne se reconnaissent jamais. Leur peau, cet organe si faible chez un grand nombre d'Oiseaux, quoiqu'il soit chez tous destiné à résister aux grands efforts, à supporter directement l'appareil pennaire, est d'une tendresse extrême chez les Couroucous: la plus légère tension la déchire, et les plumes s'en détachent avec une facilité qui fait le tourment de ceux qui cherchent à rendre à la détermination des Oiseaux les formes et les attitudes des Animaux vivans. L'on n'a observé en outre que les Couroucous ont vers la région occidentale un grand espace dénudé, ce

qui ajoute encore aux difficultés dont nous parlons.

**COUROUCOU ALBANE, Trogon Albanus**, Levaill., Ois. Cour., pl. 5. Parties supérieures vertes, irisées en bleu et en violet; scapulaires et grandes tectrices alaires noires ainsi que la face; tête, cou et haut de la poitrine d'un bleu purpurin; parties inférieures blanches, avec les flancs noirs; rectrices latérales noires terminées de blanc; bec et pieds gris. Taille, onze pouces. De l'Amérique méridionale. Les jeunes ont la tête, le cou, la poitrine et les flancs d'un oendré foncé, tirant sur le roussâtre; les parties inférieures d'un blanc roussâtre, etc. Vieillot regarde cette espèce comme identique avec le Couroucou Leverian, et Temminck comme un individu décoloré de l'espèce Ouroucouni.

**COUROUCOU AURORA, Trogon rufus**, Gmel., Levaill., Cour., pl. 9; Buff., pl. enl., 736. Parties supérieures d'un roux ferrugineux, ainsi que la gorge et le haut de la poitrine; tectrices rayées de noir et de blanc; rectrices intermédiaires d'un rouge vif, terminées par un liséré jaune et une bande noire; les latérales noires rayées de blanc; parties inférieures jaunes; bec et pieds bruns. Taille, huit pouces. De l'Amérique méridionale.

**COUROUCOU A BANDE BLANCHE, Trogon fasciatus**, Lath., Ind. Zool., pl. 5. Parties supérieures bronzées; tête et cou noirs; tectrices alaires variées de blanc et de noir; rémiges noirâtres bordées de blanc; rectrices longues, terminées de noir; une bande blanche sur la poitrine; parties inférieures orangées; bec et pieds noirâtres. Taille, dix pouces. De l'Inde.

**COUROUCOU DU BRÉSIL. V. COUROUCOU ROSALBA.**

**COUROUCOU BUNGUMMI, Trogon indicus**, Lath. Parties supérieures noirâtres, tachetées de roussâtre; tête et cou noirs rayés de blanc; une ligne blanche partant de l'angle du bec et se dirigeant au-delà de l'œil; rectrices longues, rayées transversalement de noirâtre; parties inférieures

res d'un blanc jaunâtre, rayé de noirâtre; bec bleuâtre, très-crochu; pieds cendrés. Espèce douteuse.

COUROUCOU CALEÇON ROUGE. *V.*  
COUROUCOU DAMOISEAU.

COUROUCOU CANNELLE, *Trogon rutilus*, Vieill., Levaill., Cour., pl. 14. Parties supérieures d'un roux brunâtre; tête et cou d'un vert foncé; rectrices intermédiaires terminées de noir, les latérales noires et tachées de blanc à l'extérieur; rémiges noires avec la tige blanche; rectrices alaires finement rayées de vert noirâtre et de blanc; parties inférieures d'un rose foncé; bec et pieds noirâtres. Les jeunes ont les parties supérieures d'un roux pâle, et les inférieures blanches. De Ceylan.

COUROUCOU DE CAYENNE. *V.* COUROUCOU OURROUCOUAI.

COUROUCOU CENDRÉ DE CAYENNE, *Trogon Strigilatus*, Lath., Buff., pl. enlum. 765. *V.* COUROUCOU OURROUCOUAI, femelle.

COUROUCOU A CHAPERON VIOLET, *Trogon violaceus*, Lath. Parties supérieures d'un vert foncé à reflets dorés; rectrices alaires brunes, pointillées de blanc; rémiges d'un brun noirâtre; rectrices intermédiaires terminées de noir, les latérales noires et terminées de blanc; front et côtés de la tête noirs; sommet de la tête; cou, gorge et poitrine d'un violet foncé; bec cendré à la base, blanchâtre à la pointe; pieds noirâtres. Taille, neuf pouces six lignes. De l'Amérique méridionale. Espèce douteuse que l'on soupçonne identique avec le Couroucou Ourroucouai.

COUROUCOU DAMOISEAU, *Trogon Roseigaster*, Vieill., Levaill., Cour. pl. 13. Parties supérieures d'un vert d'aigue-marine très-brillant; rectrices alaires finement rayées de noir verdâtre et de blanc; rémiges noires tachées de blanc; rectrices intermédiaires d'un bleu verdâtre, les latérales étagées, blanches en dehors et à l'extrémité; la plus extérieure a une tache d'un noir verdâtre; gorge, devant du cou et poitrine d'un gris clair, irisé; le reste des parties inférieures

d'un rose foncé; bec et pieds jaunes. Taille, trois pouces. De l'Amérique méridionale.

COUROUCOU DAME ANGLAISE. *V.*  
COUROUCOU DAMOISEAU.

COUROUCOU GÉANT, *Trogon Gigas*, Vieill., Levaill., Cour., pl. 12. Parties supérieures d'un vert jaunâtre doré; rectrices alaires finement rayées de blanc et de vert noirâtre; rémiges d'un noir brun en dessus et cendrées en dessous; rectrices cendrées en dessous, étagées; poitrine et parties inférieures blanches; bec jaune; pieds bruns. Taille, dix-huit pouces. De Java.

COUROUCOU A GORGE BLEUE, *Trogon asiaticus*, Lath. Parties supérieures vertes; front rouge bordé de blanc; tête rougeâtre variée de blanc et de noir; rémiges et rectrices noires; gorge bleue avec une tache rouge; parties inférieures verdâtres ainsi que les pieds. Taille, huit pouces six lignes. De l'Inde.

COUROUCOU (GRAND) A VENTRE BLANC. *V.* COUROUCOU GÉANT.

COUROUCOU (GRAND) A VENTRE JAUNE DE LA GUIANE. *V.* COUROUCOU OURROUCOUAI.

COUROUCOU (GRAND) A VENTRE ROUGE DE LA GUIANE. *V.* COUROUCOU ROCOU.

COUROUCOU GRIS A LONGUE QUEUE DE CAYENNE, Buff., pl. enl. 757. *V.* COUROUCOU ROCOU, jeune âge.

COUROUCOU DE LA GUIANE, Buff., pl. enl. 765. *V.* COUROUCOU OURROUCOUAI, jeune âge.

COUROUCOU RONDEA. *V.* COUROUCOU A BANDE BLANCHE.

COUROUCOU LEVERIAN, *Trogon Leverianus*, Lath. Parties supérieures vertes à reflets dorés; tête, cou et poitrine d'un violet foncé, irisé en bleu; rémiges noires, les plus grandes bordées de blanc; rectrices noires, irisées en vert, les deux latérales bordées de blanc; parties inférieures d'un blanc roussâtre; bec d'un cendré bleuâtre; pieds noirs. Taille, onze pouces. De l'Amérique méridionale. Temminck pense que cette espèce est



une variété du Couroucou Ourroucouai.

**COUROUCOU DU MEXIQUE**, Briss. Oiseau mal décrit et que l'on a vraisemblablement placé au hasard parmi les Couroucous.

**COUROUCOU MONTAGNARD**, *Trogon Oreskios*, Temm., Ois. color. pl. 184. Parties supérieures d'un brun marron tirant sur l'orangé; ailes noires avec les rectrices rayées transversalement de blanc; soupirail de la tête, joues et nuque d'un vert olivâtre; rectrices intermédiaires brunes, terminées de noir, les autres noires avec les trois extérieures terminées de blanc; devant du cou et abdomen jaunes; le reste des parties inférieures orangé; ailes noires; bec et pieds d'un noir bleuâtre. Taille, neuf à dix pouces. De Java.

**COUROUCOU NARINA**, *Trogon Narina*, Vieill., Levaill., Ois. d'Afr., pl. 27 et 28, Cour. pl. 10 et 11. Parties supérieures d'un vert doré, ainsi que la gorge et le devant du cou; grandes rectrices alaires grises, rayées de zig-zags noirâtres; rectrices latérales blanches en dehors, noires intérieurement; parties inférieures d'un rouge de roses foncé; bec jaune avec la pointe noire; pieds bruns. Taille, neuf pouces. La femelle a le front, la gorge et le devant du cou d'un roux brunâtre, le haut de la poitrine d'un vert cendré; les rémiges noirâtres avec la tige blanche, etc., etc. Les mâles ont la gorge, le cou et la poitrine d'un cendré roux; les parties inférieures d'un gris rosé. D'Afrique.

**COUROUCOU ORANGA**, *Trogon atrillius*, Vieill., Levaill., Cour., pl. 78. Parties supérieures vertes à reflets dorés; front, joues et gorge irisés; rectrices alaires grises, finement rayées et pointillées de noirâtre; rémiges d'un noir brunâtre avec les tiges jaunâtres; rectrices intermédiaires terminées de noir, les latérales étagées, noires, rayées et terminées de blanc; devant du cou et parties inférieures jaunes; bec jaune; pieds bruns avec le tarse duveteux,

noir. Taille, huit pouces six lignes. Les jeunes ont la majeure partie du plumage d'un roux brunâtre avec le ventre fauve. Temminck pense que cette espèce est identique avec le Couroucou Aurora. De l'Amérique méridionale.

**COUROUCOU OURROUCOUAI**, *Trogon viridis*, Lath., Buff., pl. enlum. 765; Levaill., Cour., pl. 3 et 4. Parties supérieures d'un vert doré; irisé en bleu; front, joues et gorge noirs; cou bleu; rectrices intermédiaires terminées de noir, les latérales blanches en dehors, noires à l'intérieur; rémiges primaires lisérées de blanc; poitrine et parties inférieures d'un jaune orangé; bec et pieds verdâtres. Taille, onze pouces. La femelle a la tête, le cou, la poitrine, les scapulaires, les rémiges et les rectrices d'un noir nuancé de gris; les rectrices alaires sont grises, très-finement rayées de noir; les rectrices latérales sont noires, barrées de jaune et de blanc; le ventre est d'un jaune rougeâtre, etc., etc. De l'Amérique méridionale.

**COUROUCOU (PETIT) A VENTRE JAUNE D'AMÉRIQUE**. *V. COUROUCOU ORANGA*.

**COUROUCOU (PETIT) A VENTRE ROUGE D'AMÉRIQUE**. *V. COUROUCOU ROSALBA*.

**COUROUCOU A QUEUE ROUSSE DE CAYENNE**. *V. COUROUCOU AURORA*.

**COUROUCOU REINWARDT**, *Trogon Reinwardtii*, Temm., Ois. color. pl. 124. Parties supérieures d'un vert doré, tirant à l'olivâtre sur la tête et le cou; rémiges noires, frangées extérieurement de blanc; rectrices noires à reflets brillants verts et bleus; les trois latérales étagées, bordées extérieurement et terminées de blanc; gorge et devant du cou d'un beau jaune; poitrine d'un vert olivâtre; parties inférieures d'un jaune vif qui prend une teinte orangée vers l'anus; bec rouge; pieds d'un brun rougeâtre. Taille, treize pouces. De Java.

**COUROUCOU ROCOU**, *Trogon Chircui*, Lath., Buff., pl. enlum. 452; Levaill., Cour. pl. 1 et 2. Parties su-

périeures d'un vert brillant, doré et irisé de pourpre; face et menton noirs; rémiges noires avec la tige blanche; tectrices alaires cendrées, rayées de zig-zags d'un vert noirâtre; rectrices latérales noires, la plus extérieure marquée de zig-zags cendrés; devant du cou vert, entouré d'une ligne blanche; parties inférieures rouges; bec orange; pieds bruns. Taille, huit pouces six lignes. Le jeune a les parties supérieures d'un cendré noirâtre; les inférieures d'un rouge terne, et les rectrices latérales rayées de noir et de blanc. De l'Amérique méridionale.

**COUROUCOU ROSALBA**, *Trogon collaris*, Vieill., Levaill., Cour., pl. 6. Parties supérieures d'un vert d'émeraude; gorge verte; un collier blanc sur le cou; parties inférieures rouges; les trois rectrices latérales barrées alternativement de noir et de blanc; bec et pieds bruns. Taille, sept pouces. Les jeunes ont les parties supérieures roussâtres et les inférieures d'un cendré rouge. De la Guiane.

**COUROUCOU ROUX A VENTRE JAUNE** DES MOLUQUES. *V.* **COUROUCOU AURORA**.

**COUROUCOU ROUX A VENTRE ROUGE** DE CEYLAN. *V.* **COUROUCOU CANELLE**.

**COUROUCOU SURUCURA**, *Trogon Surucura*, Vieill. Parties supérieures vertes à reflets dorés; tête et cou noirs, irisés en bleu et en pourpre; croupion d'un bleu doré; rémiges noirâtres, bordées de blanc; grandes tectrices alaires tiquetées de blanc et de noir; rectrices intermédiaires bleues, terminées de noir, les latérales tachées de blanc à l'extrémité, et la plus extérieure blanche sur ses bords avec le reste noir; parties inférieures rouges; bec blanchâtre; pieds bruns. Taille, dix pouces. Le femelle a les parties supérieures d'un cendré noirâtre, les tectrices alaires noires rayées de blanc, les six rectrices intermédiaires terminées de noir, les six autres noires, terminées de blanc. Du Paraguay.

**COUROUCOU TEMMINCK**. *V.* **COUROUCOU GÉANT**.

**COUROUCOU TACHETÉ**, *Trogon maculatus*, Lath., Brown, Illustr., pl. 13. Parties supérieures d'un vert foncé avec les rémiges terminées de blanc; rectrices noirâtres rayées transversalement de blanc; cou, poitrine et parties inférieures brunes, rayées transversalement de noirâtre; bec et pieds bruns. Taille, six pouces. De Ceylan. Espèce douteuse.

**COUROUCOU VARIÉ DU MEXIQUE**, Briss. Espèce mal déterminée et douteuse.

**COUROUCOU A VENTRE BLANC D'AMÉRIQUE**. *V.* **COUROUCOU LEVERIAN**.

**COUROUCOU A VENTRE JAUNE DES MOLUQUES**. *V.* **COUROUCOU AURORA**.

**COUROUCOU A VENTRE JAUNE DE SAINT-DOMINGUE**. *V.* **COUROUCOU OURROUCOUAI**, passant à l'état adulte.

**COUROUCOU A VENTRE ROUGE D'AFRIQUE**. *V.* **COUROUCOU NARINA**.

**COUROUCOU A VENTRE ROUGE DE CAYENNE**. *V.* **COUROUCOU ROCOU**.

**COUROUCOU A VENTRE ROUGE DE CEYLAN**. *V.* **COUROUCOU CANELLE**.

**COUROUCOU A VENTRE ROUGE DE SAINT-DOMINGUE**. *V.* **COUROUCOU DAMOISÉAU**.

**COUROUCOU VERT DU BRÉSIL**. *V.* **COUROUCOU ROCOU**.

**COUROUCOU VERT DE CAYENNE**. *V.* **COUROUCOU OURROUCOUAI**.

**COUROUCOU VERT A VENTRE BLANC DE CAYENNE**. *V.* **COUROUCOU LEVERIAN**. (DR. Z.)

**COUROUCOUAI**, **COUROUCOALS** ou **CURUCUIS**. ois. Syn. brésiliens de *Coucouabu*. *V.* ce mot. (S.)

**COUROUCOUQU**. ois. Cet Animal n'est connu que d'après une figure qu'en a donnée Séba dans le tome 1<sup>er</sup>, p. 102, de son *Thesaurus*. Quoique depuis Séba plusieurs auteurs aient placé, ainsi qu'on lui, cet Oiseau dans le genre *Coucou*, rien n'est moins certain, non-seulement que ce soit sa véritable place; mais encore que l'auteur hollandais n'ait pas décrit une espèce identique. Quel qu'il en soit, on le représente ayant la tête rouge surmontée d'une huppe d'un rouge plus vif et

variée de noir; le bec rougeâtre, ainsi que le dessous du corps; le dessous d'un rouge brillant, avec les remiges et les rectrices jaunes, nuancées de noirâtre. Sa taille seroit de dix pouces.

(DR. 2.)

\* **COUROUGOBROU.** BOT. PHAN. (Gaimard.) Syn. d'Orange aux îles Carolines.

(B.)

**COUROU-MOELLI** ou **CAROU MOELLI.** BOT. PHAN. (Rhéede, *Malab.* vol. 6, t. 39.) Syn. de *Flacurtia sipriaria* de Roxburg, et que Linné avait rapporté mal à propos au *Sideroxylum spinosum*.

(B.)

**COUROUMOU.** OIS. Syn. de Roi des Vautours, *Vultur Aura*, L., à la Guiane. V. CATHARTE.

(DR. 4.)

**COUROUPITE.** *Couroupita.* BOT. PHAN. Aublet, dans ses Plantes de la Guiane, a décrit et figuré sous le nom de *Couroupita guianensis*, p. 708, t. 282, un Arbre très-singulier qui croît dans les forêts de la Guiane. Son tronc s'élève à une hauteur de trente à cinquante pieds, et se divise en branches et en rameaux plus ou moins étalés, recouverts d'une écorce grisâtre, qui se sépare facilement en longues lanières avec lesquelles on peut fabriquer diverses espèces de cordages; les feuilles sont alternes, très-rapprochées les unes des autres à la partie supérieure des jeunes rameaux; l'Arbre s'en dépouille deux fois dans l'année. Elles sont obovales allongées; entières, acuminées au sommet, glabres, finissant insensiblement à leur base en un pétiole canaliculé de huit à douze lignes de longueur; les fleurs sont extrêmement grandes, ayant de trois à quatre pouces de diamètre, et d'une belle couleur pourpre; elles forment des épis de plus d'un pied de longueur, qui naissent en général sur les grosses branches, mais quelquefois cependant sur les rameaux; chaque fleur est pédonculée, articulée avec la partie supérieure du pédoncule qui est accompagné à sa base d'une bractée étroite; ces fleurs sont très-caduques, mais les pédoncules persistent pendant un

temps plus ou moins long; le calice est turbiné à sa base qui est adhérente avec l'ovaire, ouvert et à six divisions épaisses et obtuses dans sa moitié supérieure; il est persistant; la corolle est formée de six pétales un peu inégaux; concaves, très-obtus, réunis à leur base par l'intermède des étamines, et simulant ainsi une corolle monopétale rotacée; elle tombe en effet d'une seule pièce, comme cela a lieu dans un grand nombre de Malvacées, emportant avec elle les étamines; celles-ci sont excessivement nombreuses, monadelphes et réunies toutes ensemble par leurs filets de manière à former un androphore urcéolé, concave, très-peu saillant d'un côté, déjeté du côté opposé et formant une sorte de languette très-large, très-creuse, laciniée à son sommet qui est tronqué et recouvert dans toute sa paroi interne d'une multitude innombrable d'étamines; les filets de ces étamines qui sont libres dans une certaine étendue sont renflés dans leur partie supérieure, qui se termine par une anthère cordiforme, biloculaire, échan-crée à ses deux extrémités. L'ovaire est à demi-infère; la partie saillante au-dessus du tube calicinal est déprimée, et vers son centre elle se termine par un petit mamelon con-ique, tenant lieu de style, et offrant six petits lobes dressés glanduleux sur leur face interne, et qui sont au-tant de stigmates ou les divisions d'un stigmate unique; coupé transversale-ment, l'ovaire présente six loges; de l'angle interne de chacune d'elles on voit saillir un trophosperme longi-tudinal sur lequel sont attachés un très-grand nombre d'ovules. De toutes les fleurs qui composent chaque épi, une seule en général est fertile: toutes les autres sont caduques et infécondes. Le fruit parvenu à sa maturité est sphérique; de la grosseur de la tête d'un enfant; très-pesant lorsqu'il est frais, offrant vers la réunion de son tiers supérieur avec ses deux tiers inférieurs une sorte d'anneau, légè-rement saillant, présentant les six

lobes du limbe calicinal qui ont éprouvé peu d'accroissement; la surface externe du péricarpe est d'une couleur brune et ferrugineuse, rude et inégale, et ressemble beaucoup à un objet de fer un peu rouillé, ce qui, joint à la forme du fruit, lui a fait donner le nom vulgaire de *Boulet de canon*; le péricarpe est épais de cinq à six lignes; sa partie externe est dure et presque osseuse, assez mince; la partie interne est pulpeuse, charnue, et renferme une énorme noix de la même forme que le péricarpe lui-même dont elle est la paroi interne. Assez souvent la partie charnue intermédiaire entre la noix et l'épiderme se dessèche, et la noix est vacillante dans l'intérieur du fruit. Cette noix est elle-même pulpeuse à son intérieur, qui est partagé par six cloisons membraneuses. Les graines sont éparses au milieu de la pulpe, à laquelle elles adhèrent fortement par toute leur surface externe. Ce fruit reste constamment indéhiscent. Chaque graine se compose d'un double tégument; l'externe plus épais et recouvert de fibrilles à sa face intérieure; l'interne mince et comme pellucide renferme immédiatement l'embryon. Celui-ci offre une racine très-longue, cylindrique, roulée en cercle et recouvrant au centre de l'anneau qu'elle forme les deux cotylédons qui sont minces et chiffonnés sur eux-mêmes.

Ce genre singulier a les plus grands rapports avec le *Lecythis*; et Willebrordus l'y avait réuni sous le nom de *Lecythis bracteata*. Néanmoins il s'en distingue par la forme de son stigmate et par son fruit, qui reste constamment indéhiscent. Il appartient à la Monadelphie Polyandrie, L. Jussieu l'avait placé à la fin de la famille des Myrtées, dont il se distingue par plusieurs caractères importants. Le professeur Richard l'a placé dans sa nouvelle famille des Lécythidées; qui se compose des genres *Bertholletia*, *Gustavia*, *Lecythis*, *Couroupita* et *Coararari*. Cette petite famille nous paraît tenir le milieu entre la fa-

mille des Myrtées et celle des Malvacées dont elle se rapproche peut-être davantage. *V. LECYTHIDÉES.* Cet Arbre, dont le fruit porte le nom vulgaire de *Boulet de canon*, est désigné sous les noms de *Calebasse-Bois*, *Calebasse à Colin*. (A. R.)

\* *COUROUPITOUTOUROL*. BOT. PHAN. Nom galibi du genre *Couroupita* d'Aubl. *V. ce mot.* (B.)

\* *COURPATA*. POIS. (Risso.) Syn. de *Tetragonurus Cuvieri* à Nice: *V. TÉTRAGONURE.* (B.)

*COURPATAS*. OIS. Syn. vulgaire de Corbeau, *Corvus Corax*, L. *V. CORBEAU.* (DR. Z.)

\* *COURPENDU*, *COURT-PENDU*. OIS. Syn. vulgaire du Loriot d'Europe, *Oriolus Galbula*, L. *V. LORIOT.* (DR. Z.)

*COURREGEOLO*. BOT. PHAN. Même chose que *Courejholo*. *V. ce mot.* (B.)

*COURRETTE*. REPT. OPH. Couleuvre de la Martinique encore indéterminée. (B.)

*COURRIER*. OIS. Syn. vulgaire du Chevalier aux pieds rouges, *Tringa gambetta*, Gmel. *V. CHEVALIER.* (DR. Z.)

*COURRUGIANO*. POIS. Syn. d'Ophtidie barbue à Marseill. *V. OPHIDIE.* (B.)

*COURTE EPINE*. POIS. Syn. de *Diodon Attinga*. *V. DIODON.* (B.)

\* *COURTE - LANGUE*. OIS. *V. OKETSOK.* (DR. Z.)

*COURTEMOTTE*. BOT. CHYPT. Même chose que *Coulmotté*. *V. ce mot.* (B.)

*COURTEROLLE*. INS. *V. COURLEROLE.* (B.)

*COURTILIERE*. *Gryllo-Tetpa*. INS. Vulgairement *Taupe-Grillon*. Genre de l'ordre des Orthoptères, famille des Sautiers (Règn. Anim. de Cuvier), établi par Latreille aux dépens des Grillons de Fabricius, et ayant pour caractères : pieds posté-

riens propres pour le saut ; tarsi à trois articles ; ceux des pattes moyennes et postérieures terminés par deux crochets ; antennes composées d'un grand nombre d'articles ; jambes et tarsi des deux pieds antérieurs , larges , aplatis , dentés , en forme de mains et propres à fouir la terre. Ces Insectes ont beaucoup de rapports avec les genres *Tridactyle* et *Grillon* proprement dit ; ils se distinguent du premier par les tarsi des deux paires de pattes postérieures , ainsi que par les antennes ; ils diffèrent du second par la présence de pieds servant à fouir la terre , et par l'absence d'une tarière saillante à l'extrémité postérieure de l'abdomen. Les *Courtilières* ont une forme très-singulière ; leur corps est allongé ; leurs yeux sont petits , ovales , de couleur brune ; les yeux lisses sont assez apparens ; leur tête est ovale , avancée , non verticale , mais penchée et profondément enfoncée dans le prothorax. Celui-ci ; beaucoup plus long d'avant en arrière , que transversalement , est remarquable par le développement du tergum ou de la pièce supérieure ; en effet elle ressemble à la carapace d'un Crustacé , en ce sens qu'elle se prolonge sur les côtés , et que , au lieu de s'aboucher avec les flancs , elle les recouvre et semble les protéger. Si on enlève cette pièce supérieure , on voit au-dessous d'elle le sternum à peine visible à l'extérieur , et les flancs composés de l'épisternum et de l'épimère , qui se rapprochent insensiblement l'un de l'autre , finissent par se souder vers leur sommet et constituent une sorte d'anneau corné tout-à-fait indépendant du tergum ou de la pièce supérieure. Nous reviendrons sur cette particularité importante , aux mots *PROTHORAX* et *THORAX* ; nous l'avons d'ailleurs signalée dans nos travaux sur les systèmes solides des animaux arthropodes (*N. Annales des Sciences naturelles*, 1.<sup>re</sup> année, 1804). Les élytres sont courtes chez le mâle , beaucoup plus encore dans la femelle , où elles recouvrent des ailes plus longues que l'abdomen , et terminées en lanières plus ou moins recourbées et

enroulées sur elles-mêmes ; les deux pattes antérieures sont remarquables par leur volume et leur forme. L'abdomen est allongé , très-mou , terminé postérieurement dans chaque sexe par deux appendices sétacés et articulés , dont on ne connaît pas bien l'usage. Quelques observateurs ont étudié anatomiquement ces Insectes. Marcel de Serres a décrit avec soin le canal intestinal dans la *Courtilière* de notre pays (*Ann. du Mus. d'Hist. Nat.* T. XX, p. 213). Suivant lui , le tube intestinal est très-allongé : il se compose d'un œsophage étroit , cylindrique , fort long , s'étendant jusque dans l'abdomen. L'estomac , dont la forme approche de celle d'une cornemuse , est situé sur le côté et forme un angle obtus avec l'œsophage. Quant aux ouvertures cardiaque et pylorique , elles sont situées à côté l'une de l'autre et presque conniventes , tandis que le ventricule présente à son autre extrémité un cul-de-sac très-ample , et qu'il est susceptible d'acquiescer un grand volume. De l'ouverture pylorique , part un canal étroit de même nature que l'œsophage , qui en paraît une continuation et qui fait communiquer le ventricule avec le gésier. Celui-ci , situé en arrière de l'estomac , est charnu et fort épais ; sa forme approche assez d'une sphère allongée ; si on l'examine à l'intérieur , on y voit six rangées doubles d'écaillés saillantes , dentées , et d'une nature cornée , analogue à celles dont sont composées les dents des mâchoires des Insectes. La disposition de ces rangées est telle , que toutes sont parallèles , et vont se terminer avant l'extrémité supérieure et inférieure du gésier , par des écaillés moins fortes et moins cornées. Il en résulte que le gésier peut , dans ses contractions , acquiescer un très-petit diamètre à ses deux extrémités. Le gésier se trouve comme enveloppé par deux poches biliaires qui s'insèrent vers son extrémité , ayant cependant leurs ouvertures dans le duodénum. Ces poches , très-larges et très-développées , sont arrondies et garnies à leur sommet qui est comprimé d'une

houppes de petits vaisseaux capillaires dont la longueur est peu considérable. Ces vaisseaux sont secréteurs. Enfantant ces poches que Marcel de Serres nomme biliaires, on observe qu'elles sont plissées longitudinalement : leurs plissures, très-amples, sont au nombre de six ou de huit. Quant à leurs membranes, la seule muqueuse est très-développée; enfin, l'ouverture de ces vaisseaux hépatiques supérieurs est telle, qu'elle correspond à la partie inférieure du gésier, au lieu précis où commence le premier intestin et un peu au-dessus du point où se terminent les écailles dont le gésier est revêtu. Suivent les intestins qu'on peut distinguer en plusieurs portions; la première est cylindrique et assez étroite; elle paraît moins remplir les usages de duodénum que la seconde. Celle-ci, ou le duodénum proprement dit, est la plus longue et la plus grosse des trois portions. Vers son milieu sont placés les vaisseaux hépatiques qui y sont fixés par un seul canal déférent; dans lequel tous les autres viennent s'ouvrir. Ces vaisseaux très-longs, fort délics et fort nombreux, flottent librement dans l'intérieur du corps où ils ne sont retenus que par le seul canal déférent : Cuvier les compare à une queue de cheval en miniature. La membrane muqueuse du duodénum est très-prononcée et garnie d'une infinité de lacunes ou de cryptes, disposés chez quelques individus avec une certaine régularité et comme sur quatre lignes parallèles; la valvule qui ferme le duodénum, résulte de l'étranglement des membranes de cet intestin, dont les plis se rapprochent toujours de plus en plus. Le rectum ou la troisième portion de l'intestin est la plus grosse et la plus extensible. On remarque encore des cryptes glanduleux dans les membranes; un sphincter assez distinct termine le tube intestinal. On trouve la représentation du canal intestinal dans un Mémoire de Cuvier sur la nutrition dans les Insectes (Mém. de l'ancienne Société d'hist. nat. de Paris, an VII). Les Courtilières dont le nom paraît

évidemment dériver du vieux mot français *Courtille*, qui signifiait un grand jardin entouré de murailles, sont des Insectes très-nuisibles à l'agriculture, et malheureusement très-communs dans toute l'Europe; ils creusent dans l'intérieur de la terre de nombreuses galeries et font périr les Végétaux en coupant leurs racines. On les désigne vulgairement sous les noms de *Jardinière*, et encore sous celui de *Taupe-Grillon*, à cause de la ressemblance qu'ils présentent pour la forme avec les Grillons, et pour les mœurs avec les Taupes.

Ce genre est peu nombreux en espèces. Celle de notre pays, la *COURTILIÈRE*, COMMUNE, *Gryllo-Talpa vulgaris*, Latr., ou le *Gryllus Gryllo-Talpa* de Linné, est figurée et décrite par Roesel (Ins. tom. II, Grill. tab. 14, 15), et représentée par Panzer (*Faun. Ins. Germ. fasc. 88, fig. 5*). Février, membre de la société d'Agriculture de Versailles, a donné (Nouv. Cours d'Agriculture, deux. édit. tom. V, p. 163) des détails fort curieux sur cette espèce, et que nous allons extraire. La Courtilière commune pratique de préférence ses galeries dans les jardins légumiers, dans les pépinières, et souvent même dans les prairies et les terres à blé. Après avoir passé l'hiver dans un trou plus ou moins profond, suivant la qualité de la terre et l'intensité du froid, sans avoir fait de provisions, comme quelques auteurs la supposent, mais dans un état d'engourdissement, elle remonte au retour de la belle saison, en prolongeant son trou par une ligne verticale jusqu'à la surface de la terre, à moins que quelques obstacles ne la forcent à l'incliner; rendue à la surface, elle travaille à former une infinité de galeries à un demi-pouce, un pouce et quelquefois deux pouces de la surface, suivant la saison. Elle les prolonge plus ou moins, en raison de l'abondance de la nourriture, et elle a l'attention de faire plusieurs galeries en pente, et qui viennent aboutir au trou vertical, à quatre, six pouces, et jusqu'à un pied de profon-

deur pour parvenir à sa retraite et s'échapper quand elle est poursuivie. Cet insecte travaille fort vite et ruine en peu de temps les espérances du cultivateur, s'il ne prend promptement des mesures pour leur destruction, non parce qu'il mange les racines des Plantes, comme on l'a prétendu, mais parce qu'il les coupe quand elles se trouvent sur son passage; en effet les Courtilières, suivant l'observation de Féburier, sont carnivores; il le prouve à l'aide de plusieurs faits. On remarque d'abord que leurs galeries sont d'autant plus multipliées que la terre contient moins d'insectes; on voit ensuite que dans les jardins où les Végétaux sont plantés avec ordre, et où on a l'attention de détruire les mauvaises herbes, leurs galeries ne vont pas d'une Plante à une autre en ligne directe, qu'elles passent même fréquemment à un quart de pouce des racines sans y toucher, et qu'elles ne les détruisent que lorsqu'elles sont tendres et offrent moins de résistance que la terre qui les environne; si celle-ci est humide, elles préfèrent allonger leur route pour la creuser. Enfin, si on place auprès d'un terrain où il y a des Courtilières un tas de fumier, et principalement de celui de Vache, elles s'y rendront quand il n'y aurait pas un brin d'herbe sur ce fumier, et ce n'est pas pour y pondre, comme on l'a cru, afin que la chaleur fasse éclore plus facilement leurs œufs, puisqu'elles choisissent toujours un terrain dur pour y faire leurs nids, et que lorsque la terre des planches n'a point de consistance, elles préfèrent les sentiers pour y pondre; elles ne sont donc attirées vers les fumiers que par la certitude qu'elles ont d'y rencontrer un plus grand nombre d'insectes. Féburier a d'ailleurs acquis positivement la preuve qu'elles sont carnivores, en ayant placé plusieurs dans un pot de terre, l'une d'elles a été dévorée par ses compagnes.

Lorsque la température devient plus élevée, les mâles viennent à l'entrée de leurs galeries, et se font entendre des femelles par un petit bruis-

sement assez analogue à celui du Grillon, mais beaucoup plus faible; il paraît résulter du frottement de quelques parties extérieures, peut-être du corselet sur les autres pièces du thorax, ou des pattes contre les ailes, ou de celles-ci entre elles. L'accouplement ayant eu lieu, la femelle s'occupe de construire son nid. Après avoir choisi une terre ferme pour que les pluies ne la fassent pas ébouler, elle trace une galerie circulaire, et se creuse une nouvelle retraite à quelques pouces de-là, si la sienne est trop éloignée. Ensuite elle fait son nid au centre de cette galerie, à un, deux, trois pouces et plus de profondeur, suivant la chaleur, c'est-à-dire qu'elle le creuse plus profondément à mesure que la chaleur augmente. Il en est de même des galeries. Ce nid consiste en un trou dont les parois sont lisses et consistantes: il adhère fortement aux terres environnantes, et il est impossible à la Courtilière de le remuer, ainsi qu'on l'a prétendu, pour élever ou enfoncer ses œufs suivant le changement de temps et de température. La ponte a lieu dans le printemps, à des époques variées suivant le retard ou l'avancement de la chaleur; elle est très-considérable, on compte depuis cent quatre-vingts jusqu'à deux cent vingt œufs. Les petits éclosent après un mois; ces petits en sortant de l'œuf sont blancs; ils ne diffèrent de leur mère que par la couleur et par l'absence des ailes qui ne leur poussent qu'au retour du printemps et après la quatrième ou la cinquième mue. Féburier pense qu'ils ne sont susceptibles de se reproduire que la troisième année. Suivant quelques auteurs les petits se disperseraient après le premier changement de peau; ce qui est certain, c'est que jusqu'au moment de leur émigration la mère en prend le plus grand soin, et ne les quitte que pour aller chercher des provisions.

Les agriculteurs ont dû s'occuper de trouver des moyens de détruire cet insecte nuisible, ou du moins d'en arrêter le plus possible les ravages.

Les procédés mis en usage se réduisent aux suivans : le premier point était de savoir distinguer les lieux habités par les Courtilières. On les reconnaît à plusieurs signes ; on voit souvent dans les prés, les champs et les potagers de grandes places jaunes dont la végétation est éteinte, qui sont leur ouvrage. On remarque aussi des élévations qui représentent en petit celles des Taupes, et qui correspondent aux galeries supérieures que l'Insecte s'est creusées ; elles aboutissent au carrefour de leur habitation ou à ce trou vertical qui s'enfonce en terre. On aperçoit encore, surtout au commencement de l'été, des ouvertures nombreuses pratiquées à la surface de la terre ; chacune d'elles aboutit à un nid. La présence du nid se manifeste encore dans les champs ou sur le gazon par de petits espaces presque circulaires où la végétation est languissante. C'est principalement dans ces divers endroits que l'agriculteur doit tenter un moyen de destruction fort simple, mais qui n'est guère exécutable à cause du temps qu'il exige ; c'est de faire la chasse aux nids et aux Insectes comme on la fait individuellement aux Taupes. Comme les Courtilières aiment beaucoup le fumier, on a proposé d'en établir de petits tas de distance en distance ; elles s'y réfugient, et on peut ensuite les atteindre et les faire périr plus facilement. On emploie aussi l'huile en arrosage ; mais ce procédé qui fait périr l'Insecte en bouchant les trachées ne produit l'effet désirable que dans les couches. On se sert encore de pots remplis aux deux tiers d'eau ; on les enfonce en terre au niveau ou même un peu au-dessous de sa surface, et les Courtilières tombent souvent dedans. Ces divers moyens et plusieurs autres que nous passons sous silence sont consignés en détail dans l'ouvrage de Féburier. Cet observateur, s'étant aperçu que les Chats étaient très-tristes de Courtilières, a mis à profit cette découverte, et il est parvenu à dresser ces Animaux pour faire la

chasse pendant la nuit ; mais nous doutons fort que de pareils chasseurs puissent être très-avantageux aux agriculteurs ; la recherche de leur proie devant entraîner des dégâts d'un autre genre.

La COURTILIÈRE DIDACTYLE, *Gryllo-Talpa didactyla*, originaire de Cayenne et de Surinam ; avait été regardée par Olivier comme une variété de la Courtilière commune. Latreille en fait une espèce distincte ; elle est de moitié plus petite que la nôtre.

(ABB.)

COURTINE. BOT. PHAN. Nom vulgaire de *Plantago Lagopus*. V. PLANTAIN. (B.)

COURT-PENDU. ois. V. COURT-PENDU.

\* COURT-PENDU. BOT. PHAN. V. CAPENDU.

COURTRIAUX. ois. Syn. vulgaire de l'Alouette Lulu, *Alauda arborea*, L. V. ALOUETTE. (DR..Z.)

\*COURTRIOUX. ois. Syn. vulgaire du Proyer, *Emberiza miliaris*, L. On donne aussi ce nom, comme celui de Courtriaux, à l'Alouette Lulu, *Alauda arborea*, L. V. BRUANT. (DR..Z.)

COURY. ois. (Edwards.) Syn. du Gros-Bec tacheté de Java. V. GROS-BEC. (DR..Z.)

COUS. rois. Espèce de Pimélode. V. ce mot. (B.)

COUSAMBI. BOT. PHAN. On présume que la matière grasse et végétale connue à Timor sous ce nom, et dont on fait des chandelles dans cette île, provient du *Croton sebiferum*. V. CROTON. (B.)

COUSCOU, COUSSECOUCHE et COUSSECOUSSE. BOT. PHAN. Syn. d'*Holcus apicatus*, L., à Saint-Domingue où l'on étend ce nom aux graines mondées du Maïs. (B.)

COUSCOUL. INS. Même Chose que Courcoussou. V. ce mot.

COUSCUILLE. BOT. PHAN. (De Candolle.) Syn. de *Ligusticum pelt-*



*penne* dans certaines parties des Pyrénées. (A.)

**COUSI-COUSI.** *HAM.* Nom de Pays du Singe-de-Nuit. *K. SAPAJOU.*

(B.)

**COUSIN.** *Culic. INS.* Genre de l'ordre des Diptères, établi par Linné et rangé par Latreille (Regn. Anim. de Cuv.) dans la famille des Némocères, tribu des Culicides. Ses caractères sont : antennes filiformes de quatre articles, plumeuses dans les mâles, simplement poilues dans les femelles; trompe longue renfermant un suçoir de cinq pièces; ailes couchées horizontalement sur le corps, avec des écailles sur les nervures. A l'aide de ces caractères, on pourrait distinguer facilement les Cousins des Tipules, des Tanypes, des Cératopogons et autres genres voisins; mais nous allons entrer dans plusieurs détails d'organisation extérieure qui rendront la distinction encore plus facile. Les Insectes dont ils s'agit ont le corps fort allongé, grêle; cylindrique et monté sur des pattes très-longues et très-minces. La tête est petite, arrondie, beaucoup plus basse que le thorax; elle est privée d'yeux lisses; mais elle supporte de grands yeux à réseau, verdâtres, et à reflets rouges dans quelques espèces; des antennes poilues qui, dans les mâles, sont très-longues, verticillées, et représentent des panaches; enfin une rompe sur l'organisation de laquelle il est important de fixer ses idées; elle se compose de deux parties assez distinctes : 1° le fourreau ou l'étui, endu supérieurement dans presque toute sa longueur, est composé de deux portions égales soudées sur la ligne moyenne, et qui, terminées en bouton, représentent la lèvre inférieure des Mouches; 2° l'aiguillon, c'est-à-dire les autres pièces de la bouche au nombre de quatre, selon Réaumur, et de cinq suivant Swammerdam, sont réunies, mais non soudées entre elles, et contenues dans le fourreau. Deux de ces pièces paraissent ordinairement dentées; elles pénètrent

toutes ensemble dans les corps que le Cousin pique; ces corps sont la chair de l'Homme et des Animaux, et quelquefois aussi les Végétaux. Réaumur (Mém. Ins. T. IV, p. 583) est le premier observateur qui ait examiné avec soin ce curieux mécanisme. Il le décrit de la manière suivante : « Après qu'un Cousin m'avait fait la grâce de se venir poser sur la main que je lui avais offerte, je voyais qu'il faisait sortir du bout de sa trompe une pointe très-fine, qu'il tâtait avec le bout de cette pointe successivement quatre à cinq endroits de ma peau. Il sait choisir apparemment celui qui est le plus aisé à percer, et celui au-dessous duquel se trouve un vaisseau dans lequel le sang peut être puisé à souhait. Enfin il a bientôt fait son choix, et on sent qu'il l'a fait; on en est averti par la petite douleur que la piqure cause sur-le-champ. La pointe de l'aiguillon composé, car, pour nous exprimer plus brièvement, nous ne regarderons désormais que comme une seule pointe celle qui est formée de plusieurs pointes extrêmement fines, et que comme un seul aiguillon l'assemblage de plusieurs; la pointe, dis-je, de l'aiguillon s'introduit dans la peau; elle y pénètre; elle sort par le bout du bouton qui termine l'étui. A quoi sert donc la fente qui est presque tout du long de cet étui? C'est ce qui mérite le plus d'être expliqué, ou plutôt d'être vu ici; c'est ce que la mécanique de la trompe des Cousins a de plus particulier. L'aiguillon doit pénétrer dans la chair, et la nature ne l'a pas fait capable d'être allongé, ou au moins d'être allongé d'autant qu'il doit y pénétrer. Cependant il ne saurait s'introduire dans la chair couvert de son étui; car le diamètre de cet étui étant beaucoup plus grand que celui de l'aiguillon, l'ouverture capable de laisser passer l'étui serait beaucoup plus grande que celle que l'aiguillon peut faire; le bout de l'étui reste donc nécessairement sur le bord de la plaie. Si cet étui n'était composé que d'une seule membrane très-mince et très-

flexible, il pourrait se plisser pendant que l'aiguillon s'enfonce, et lorsque l'aiguillon serait sorti de la chair, le ressort de cette membrane lui ferait reprendre sa première forme. Mais les pièces déliées qui composent l'aiguillon demandaient un fourreau plus solide que ne serait une membrane si mince, et quelque mince qu'elle eût été, il eût été difficile qu'elle se fût plissée assez, et qu'elle eût été réduite à assez peu de volume, car l'aiguillon doit pénétrer presque tout entier dans la chair; il s'y enfonce jusqu'àuprès de son origine. La nature a donc eu besoin d'employer ici une toute autre mécanique pour que l'étui auquel de la solidité était nécessaire pût être raccourci, à mesure que la partie de l'aiguillon qui est hors de la plaie devient plus courte. Le moyen auquel elle a eu recours est simple; l'étui, quoique solide, a une sorte de flexibilité; il se courbe à mesure que l'aiguillon pénètre dans la chair; il s'éloigne de l'aiguillon qui doit toujours rester tendu et droit; l'étui qui s'ouvre peut se tirer en arrière, et s'y tirer sans y amener l'aiguillon. Mais celui-ci a besoin d'être soutenu immédiatement au-dessus du bord du trou. Aussi l'étui ne fait-il, comme nous venons de le dire, que se courber. Il devient d'abord un arc dont l'aiguillon est la corde. Le bouton de l'étui doit toujours rester sur le bord du trou pour aider à y maintenir et à empêcher de vaciller un instrument délicat et faible. C'est par un expédient semblable que les ouvriers qui ont percé de très-petits trous dans des corps durs, savent maintenir la pointe déliée du foret. Enfin à mesure que l'aiguillon pénètre, l'étui se courbe de plus en plus. Il s'y fait même quelque part un angle dont le sommet est variable; au moins ne nous a-t-il pas toujours paru placé dans le même endroit. Cet angle d'abord obtus le devient de moins en moins; il passe à être aigu, et l'est à un tel point, quand l'aiguillon a pénétré aussi avant qu'il lui est possible, c'est-à-dire quand la tête du Cousin est prête à toucher la

peau, qu'alors l'étui est plié en deux; sa moitié inférieure est alors appliquée contre sa moitié supérieure. » La piqure d'un seul Cousin, surtout des espèces de notre pays, n'est rien en elle-même; il en résulte une tumeur plus ou moins rouge et plus ou moins cuisante, qui paraît due à un liquide irritant que l'Insecte dépose dans la plaie; mais lorsque ces Insectes sont très-nombreux, ils incommode et singulièrement. L'Homme s'en garantit aisément, mais il est difficile d'en préserver les Animaux. La multiplicité des blessures les affaiblit et les tourmente quelquefois au point de les faire périr. On observe principalement ces fâcheux résultats dans les endroits marécageux des parties chaudes de l'Amérique, où ils portent le nom de *Maringouins*. Ils sont aussi très-communs en Laponie, et les habitans de ces tristes contrées ne s'en garantissent qu'en s'enduisant le corps de matière grasse et en allumant des feux autour de leurs cahutes. Dans les contrées méridionales de la France, on s'en préserve pendant la nuit au moyen de gaz dont on entoure les lits, et qu'on nomme Cousinières. Lorsqu'on a été piqué, le remède le plus simple est de comprimer ou de sucer la petite plaie afin d'en faire sortir un peu de sang qui dégorge les vaisseaux capillaires, et entraîne en tout ou en partie le liquide vénéneux qui y a été introduit. Si l'irritation était trop considérable, on devrait appliquer sur la partie enflammée des cataplasmes de Plantes émollientes.

Les autres parties qu'on observe extérieurement dans le Cousin sont le thorax et l'abdomen. Le thorax est fort élevé, il supporte des pattes très-grêles, munies à leur extrémité d'une petite pelote et de deux crochets; supérieurement il donne insertion aux ailes, qui sont membraneuses et garnies seulement dans l'étendue des nervures de petites écailles pétiolées. Il n'existe pas de cuilleron; mais les balanciers sont très-distincts; l'abdomen est long, cylindroïde et recou-

vert principalement sur les côtés de poils et d'écaillés ; il se termine dans la femelle par deux petits appendices en pelote ; le mâle est pourvu de deux ou quatre crochets qui lui servent à saisir la femelle et à s'accoupler.

L'accouplement paraît avoir lieu le soir et dans les airs ; il dure fort peu de temps, et les entomologistes observateurs ont rarement eu occasion d'en être témoins ; quelques-uns, Dumeril entre autres, ont même pensé qu'il n'y avait pas de jonction des sexes, et que la fécondation des œufs avait lieu après la ponte ; l'existence d'appareils copulateurs très-développés chez le mâle ne nous paraît pas venir à l'appui de cette opinion.

Outre que les femelles sont très-fécondes, et que chacune d'elles donne naissance à deux cents ou à trois cents œufs environ, il y a de cinq à six générations par année. Les œufs sont allongés, oblongs, pointus supérieurement, et rétrécis brusquement à l'extrémité opposée en un petit col dont l'ouverture circulaire paraît bouchée par une membrane. Tous ces œufs sont réunis en un tas qui s'enfonce un peu dans l'eau, et qui vogue à sa surface à la manière d'un radeau dont le dessous serait formé par l'assemblage des espèces de petits goulots dont nous avons parlé, et dont la face supérieure serait hérissée par le bout pointu de chaque œuf. Il était curieux de connaître la femelle au moment de la ponte, et de voir comment elle s'y prenait pour opérer cet heureux arrangement. La difficulté était de saisir l'heure à laquelle tout cela se faisait. Réaumur ayant découvert que c'était vers les six heures du matin, en a été témoin à plusieurs reprises, et il en a donné une description fort exacte. La femelle pour commencer la ponte se fixe, à l'aide des deux paires de pattes antérieures, sur une feuille ou quelque corps plus léger que l'eau. Les pattes postérieures sont croisées en X, et des deux angles qui en résultent, l'intérieur, c'est-à-dire celui compris entre le point de contact des

branches et l'anus, est destiné à soutenir les premiers œufs qui sont pondus ; le pénultième anneau de l'abdomen de la femelle touche l'eau, et le dernier au contraire se redresse au-dessus de la surface du liquide ; c'est alors qu'on voit sortir un œuf qui est poussé dans une direction verticale, et est placé immédiatement dans l'angle formé par l'entrecroisement des pattes. De pondre un œuf, dit Réaumur, et de le mettre en place, est pour le Cousin l'affaire d'un instant ; et dès qu'il en a fait sortir un, il en expulse un autre de son corps, et peut ainsi en pondre plus de trente en moins de deux minutes. Ils ne tardent donc pas à s'accumuler, étant collés les uns aux autres, et toujours soutenus par les pattes à la surface de l'eau ou au-dessus ; mais à mesure que la petite masse s'allonge, l'endroit où les jambes se croisent devient plus éloigné du derrière, et enfin ces deux jambes finissent par se poser parallèlement, soutenant toujours le petit bateau que l'Insecte n'abandonne que lorsque, la ponte étant terminée, il se trouve en état de flotter sans danger.

Au bout de deux ou trois jours environ, des larves sortent par le col de ces œufs. On se rappelle que ce col plonge dans l'eau, et que les larves, qui sont aquatiques, se trouvent à leur sortie dans un milieu indispensable à leur existence. Ces larves sont apodes ; leur corps est allongé et formé par dix anneaux ; la tête qui constitue le premier anneau est grosse, déprimée, arrondie à son contour, et présente une bouche autour de laquelle on voit plusieurs espèces de houppes ou barbillons que le Cousin fait mouvoir avec beaucoup de vitesse, ce qui paraît déterminer des petits courants de liquides qui se dirigent vers elle ; on remarque aussi des espèces d'antennes ou de palpes velus. Le second anneau, qui correspond au thorax de l'Insecte parfait, est garni de trois faisceaux de poils ; chacun des autres segments n'en porte plus qu'un seul ; le dernier anneau du corps est

très-remarquable : il est comme fourchu et se termine par deux tuyaux allongés, dont le premier assez court contient le rectum, et est terminé par quatre lames minces, transparentes, posées par paires; le second tuyau est un organe destiné à venir respirer l'air à la surface du liquide. Ces larves changent trois ou quatre fois de peau en quinze jours ou trois semaines, suivant la température. Lorsque le Cousin veut quitter une dépouille, il se met, dit Réaumur, à la surface de l'eau dans une position différente de celle où il avait coutume de s'y tenir : d'abord allongé et étendu, ayant le dos en dessus, il se recourbe ensuite un peu, enfonce sa tête et sa queue sous l'eau, à fleur de laquelle est l'anneau correspondant au thorax. Suivant Duméril, cet anneau se fend alors par un véritable dessèchement; bientôt la fente se prolonge, et elle devient assez considérable pour laisser sortir le corselet de la larve et successivement les autres parties : à l'époque de la transformation en nymphe, le changement de peau a lieu de la même manière. Cette nymphe a une apparence lenticulaire, la tête et le thorax formant une seule masse qui s'augmente par le repliement de l'abdomen autour de ces parties; mais cette forme change toutes les fois que l'Animal déploie sa queue. Sous cette forme comme sous celle de la larve, le Cousin est porté naturellement par sa légèreté à la surface de l'eau; il est obligé de donner des coups de queue quand il veut descendre dans le liquide; et dès qu'il cesse de se mouvoir il est ramené à la surface. Dans son nouvel état il n'a plus besoin de prendre de nourriture, et il n'a plus d'organes propres à la recevoir; mais il a toujours besoin de respirer l'air. Ce que la métamorphose nous offre ici de plus singulier, c'est la différente position des organes par lesquels il respire; en se délaissant de l'enveloppe de larve, il a perdu ce long tuyau qu'il avait à la partie postérieure de l'abdomen, et il a acquis deux sortes de cornets ou tuyaux respiratoires qui

prennent naissance sur le thorax.

Nous voici enfin arrivés au dernier terme de tous les changements : la nymphe, après dix jours, se transforme en Insecte parfait. La manière simple et agréable dont Réaumur décrit cette intéressante formation, nous engage à ne pas en priver le lecteur. « L'Insecte qui est parvenu au moment où ses enveloppes ne lui sont plus nécessaires, et qui veut s'en tirer, se tient, comme auparavant, en repos à la surface de l'eau; mais au lieu que dans les autres temps où il ne changeait pas de place, la partie postérieure de son corps était contournée et comme roulée en dessous, il redresse alors cette partie, et la tient étendue à la surface de l'eau, au-dessus de laquelle son corselet est élevé. A peine a-t-il été un moment dans cette position, qu'en gonflant les parties intérieures et antérieures de son corselet, il oblige la peau de se fendre assez près de ces deux stigmates, ou même entre les deux stigmates qui ont la figure d'oreilles ou de cornets; cette fente n'a pas plutôt paru, qu'on la voit s'allonger et s'élargir très-vite; elle laisse à découvert une portion du corselet de l'Insecte parfait. Dès que la fente a été assez agrandie, et l'agrandir assez est l'affaire d'un instant, la partie antérieure du Cousin ne tarde pas à se montrer; bientôt on voit paraître sa tête qui se lève au-dessus des bords de l'ouverture. Mais ce moment et ceux qui suivront jusqu'à ce que le Cousin soit entièrement hors de sa dépouille, sont des moments bien critiques pour lui, des moments où il court un terrible danger.

» Cet Insecte qui vivait dans l'eau, qui serait péri s'il en eût été tenu dehors pendant un temps assez court, a subitement passé à un état où il n'a rien autant à craindre que l'eau; s'il était renversé sur l'eau, si elle touchait son corselet ou son corps, c'en serait fait de lui. Voici comment il se conduit dans une situation si délicate. Dès qu'il a fait paraître sa tête et son corselet, il les élève autant qu'il peut au-dessus des bords de

l'ouverture qui leur a permis de paraître au jour. Le Cousin tire la partie postérieure de son corps vers la même ouverture, ou plutôt cette partie s'y pousse en se contractant un peu et s'allongeant ensuite; les rugosités de la dépouille dont elle s'efforce de sortir, lui donnent des appuis. Une plus longue portion du Cousin paraît donc à découvert, et en même temps la tête s'est plus avancée vers le bout antérieur de la dépouille; mais à mesure qu'elle s'avance vers ce côté, elle se redresse et s'élève de plus en plus. Ce bout antérieur du fourreau et son bout postérieur se trouvent donc vides. Le fourreau alors est devenu pour le Cousin une espèce de bateau dans lequel l'eau n'entre point, et où il serait bien dangereux qu'elle entrât. Le Cousin est lui-même le mât du petit bateau qui le porte. Les grands bateaux qui doivent passer sous les ponts ont des mâts qu'on peut coucher; dès que le bateau est hors du pont, on hisse son mât en le faisant passer successivement par différentes inclinaisons; on l'amène à être perpendiculaire au plan horizontal. Le Cousin s'élève ainsi successivement jusqu'à devenir lui-même le mât de son petit bateau, et un mât posé verticalement. Toute la différence qu'il y a ici, c'est que le Cousin est un mât qui devient plus long à mesure qu'il s'élève davantage; à mesure qu'il s'élève une nouvelle partie du corps sort du fourreau; quand il est parvenu à être presque dans un plan vertical, il ne reste plus dans le fourreau qu'une portion assez courte de son bout postérieur. On a peine à s'imaginer comment il a pu se mettre dans une position si singulière qui lui est absolument nécessaire, et comment il peut s'y conserver. Ni les jambes ni les ailes n'ont pu l'aider en rien; celles-ci sont encore trop molles et comme empaquetées, et les autres sont étendues et couchées tout du long du ventre; ses anneaux seuls ont pu agir. Le devant du bateau est beaucoup plus chargé que le reste :

aussi a-t-il beaucoup plus de volume. » L'observateur qui voit combien ce devant de bateau enfoncé, combien ses bords sont près de l'eau, oublie dans l'instant que le Cousin est un Insecte auquel il donnera volontiers la mort dans un autre temps. Il devient inquiet pour son sort, et il le devient bientôt davantage pour peu qu'il s'élève de vent, pour peu que ce vent agisse sur la surface de l'eau. On voit pourtant d'abord avec plaisir la petite agitation de l'air, qui suffit pour faire voguer le Cousin avec vitesse; il est porté de différents côtés; il fait différents tours dans le baquet. (C'était dans un baquet rempli à moitié d'eau ou aux trois quarts que Réaumur faisait ses observations.) Quoiqu'il ne soit que comme une espèce de bâton ou de mât, parce que les ailes et les jambes sont appliquées contre le corps, il est peut-être, par rapport à son petit bateau, une voileure plus grande qu'aucune de celles qu'on ose donner à un vaisseau. On ne peut s'empêcher de craindre que le petit bateau ne soit couché sur le côté, ce qui arrive quelquefois dans les temps ordinaires, et très-souvent lorsque les Cousins se transforment dans des jours où le vent a trop de prise sur la surface de l'eau du baquet. Dès que le bateau a été renversé; dès que le Cousin a été couché sur la surface de l'eau, il n'y a plus de ressource pour lui. Il est pourtant plus ordinaire que le Cousin parvienne à faire son opération heureusement; elle n'est pas de longue durée. Tout le danger peut être passé dans une minute. Le Cousin, après s'être dressé perpendiculairement, tire les deux premières jambes du fourreau, et il les porte en avant; il tire ensuite les deux suivantes. Alors il ne cherche plus à conserver sa position gênante; il se penche vers l'eau; il s'en approche; il pose dessus les jambes; l'eau est pour elles un terrain assez ferme et assez solide qu'il, sans céder trop, peut les soutenir, quoique chargées du corps de l'Insecte. Dès que le Cousin est ainsi sur

l'eau, il est en sûreté; ses ailes achèvent de se déplier et de se sécher, ce qui est fait plus vite qu'on ne peut le dire. Enfin le Cousin est en état d'en faire usage, et bientôt on le voit s'envoler, surtout si on tente de le prendre. » Cette description intéressante que, malgré son étendue, on n'aura sans doute pas eu de regret de trouver consignée ici, a été faite principalement sur le *COUSIN COMMUN*, *Culex pipiens* des auteurs. Il a été décrit et représenté par Degér (Mém. sur les Insectes, T. VI, p. 127 et tab. 27) et par Geoffroy (Hist. des Ins. T. II, p. 579, tab. 19, fig. 4). Réaumur (*loc. cit.* tab. 43 et 44) figure tous les détails dont il vient d'être question. Cet Insecte est très-abondant dans toute l'Europe. *V.*; pour les autres espèces, Meigen (Descrip. systém. des Diptères d'Europe, T. I, p. 1) qui en décrit quatorze espèces, et l'Encyclopédie méthodique. Bory de Saint-Vincent cite, dans la Relation de ses voyages, sous le nom de Bigaye, *V.* ce mot, une espèce de Cousin des îles Maurice et de Madagascar, dont la piqure cause de grandes douleurs. (AUD.)

**COUSIN.** BOT. PHAN. Nom vulgaire dans les Antilles de quelques Plantes dont les fruits chargés d'aspérités s'accrochent aux habits des passans, comme le sont ceux de la Bardane en Europe. Tels sont la plupart des *Triumfetta*. *V.* ce mot. (B.)

**COUSINES** ou **COUSINET.** BOT. PHAN. Noms vulgaires des *Vaccinium Myrtillus* et *Oxycoccus*, L. *V.* ARKELLE et *Oxiooccus*. (B.)

**COUSINETTE** ou **COUSINOTTE.** BOT. PHAN. Variété de Pomme. *V.* POMMIER. (B.)

**COUSSA.** BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires du Houx dans certains cantons de la France occidentale. (B.)

\* **COUSSAIBA.** BOT. PHAN. (Suriar.) Nom caraïbe de bois de Savonnette bâtarde, Arbre du genre *Dalbergia*. *V.* ce mot. (B.)

**COUSSAIRE.** BOT. PHAN. Syn. d'*Urena lobata* à Saint-Domingue. (B.)

**COUSSAPIER.** *Coussapoa*. BOT.

**PHAN.** Genre établi par Aublet (Plantes de la Guiane, p. 955) et placé, par Jussieu et Lamarck, dans la famille des *Urticées* ou parmi les genres qui l'avoisinent. La description incomplète de ce genre rend sa place fort douteuse, quoique Lamarck dise (Encyclop. méth.) qu'il a des rapports avec les *Artocarpus* et les *Mithridatea*. En effet, sa fleur est entièrement inconnue; on sait seulement que le fruit est un réceptacle sphérique chargé de semences ou plutôt de capsules enveloppées dans une pulpe. Les deux espèces décrites par Aublet et figurées (*loc. cit.*, tab. 36 et 365) sont appelées l'une et l'autre *Coussapou* par les indigènes. Ce sont des Arbres pleins d'un suc laiteux, résineux, à feuilles alternes, sont les plus jeunes sont, comme dans le *Figuiér*, accompagnées de stipules toutes caduques et laissant des vestiges. Les réceptacles sont disposés en grappes dans les aisselles des feuilles. (B.N.)

**COUSSAPOUI.** BOT. PHAN. *V.*

**COUSSAPIER.**

**COUSSARÉE.** *Coussarea*. BOT. PHAN. Genre de la famille des *Rubiacees* et de la *Tétrandria Monogynie*, L., établi par Aublet (Plantes de la Guiane, p. 99, t. 38), et adopté par Jussieu (Mém. sur la famille des *Rubiacees*, p. 10) qui lui donne pour caractères: un calice à cinq dents; une corolle dont le tube est court, et le limbe à quatre divisions aiguës; anthères oblongues, presque sessiles, quoique saillantes hors de la corolle; stigmatte à quatre ou cinq lobes; baie environnant une graine sessile (par avortement?), enveloppée d'un tégument coriace. Une seule espèce (*Coussarea guianensis*), décrite et figurée par Aublet, compose ce genre. C'est un Arbrisseau de la Guiane, dont les fleurs peu nombreuses sont portées par un pédoncule commun, court et terminal. Jussieu (*loc. cit.*) donne comme synonyme de ce genre le *Pacheya* de Scopoli. Il doute que dans ce genre le calice soit vraiment quinquéfide; et en effet il serait étonnant que cet organe ne correspondît point,

pour le nombre des parties, à la corolle et aux étamines. (G..N.)

**COUSSEGAL.** BOT. PHAN. Syn. de Blé Météil dans certains départemens. *V. FAUMET.* (B.)

**COUSSINET.** BOT. Nom donné à la Canneberge qui constitue aujourd'hui le genre *Oxycoccus*. *V. ce mot.* C'est encore le nom spécifique d'une Mousse, *Bryum pulvinatum*, L., du genre *Dicranum*. *V. DICRANE.* (B.)

**COUSSOU.** OIS. Syn. de Perroquet dans quelques parties de l'Afrique. *V. PERROQUET.* (DR..Z.)

**COUSSOU.** INS. Syn. languedocien de Calandre des Blés. *V. CALANDRE.* (B.)

**COUTARDE.** BOT. PHAN. Nom appliqué par quelques botanistes français au genre *Hydrolée*. *V. ce mot.* (B.)

**COUTARÉE.** *Coutarea.* BOT. PHAN. Genre de la famille des Rubiacées et de l'Hexandrie Monogynie, L., établi par Aublet, et adopté par Jussieu qui le caractérise ainsi : calice à six divisions subulées; corolle grande, infundibuliforme, dont l'entrée du tube est renflée et courbée, et le limbe à six parties; six étamines insérées au haut du tube, à anthères onguées, linéaires et saillantes; stigmate sillonné; capsule obovée ressemblant à celle du *Cinchona*, mais plane, comprimée, sillonnée sur le milieu de chaque côté, à deux loges et à deux valves carenées, dont les bords rentrants constituent une petite cloison; semences nombreuses, orbiculées, membraneuses sur leurs bords, fixées et imbriquées sur le placenta appliqué aux bords communs des valves par où s'opère la déhiscence du fruit. Linné et Jacquin ont confondu ce genre avec le *Portlandia*, malgré l'anomalie du nombre des étamines. Pour bien en fixer la distinction, il a été nécessaire à Jussieu d'en donner plutôt une description qu'un caractère différentiel.

La **COUTARÉE ÉLÉGANTE**, *Coutarea pectiosa*, Aubl. (Plantes de la Guiane,

t. 122); *Portlandia hexandra*, Jacq. (*Amer., ed. pict.* t. 65), est un Arbre indigène des forêts de la Guiane et de Carthagène en Amérique. Ses belles fleurs, agréablement odorantes, de couleur de chair, et ayant jusqu'à un décimètre de longueur, sont souvent au nombre de trois, pédunculées et munies de bractées. Le nombre des parties du système floral est variable selon Aublet, qui en a rencontré des individus à sept étamines et à sept divisions à la corolle. (G..N.)

**COUTEAU.** POIS. Espèce d'Able. *V. ce mot.* (B.)

**COUTEAU.** MOLL. Nom vulgaire du genre *Solen* ou Manche de couteau. *V. SOLEN.* (B.)

**COUTELO.** ORA. Vieux nom de la Poule, *Phasianus Gallus*, L. *V. COQ.* (DR..Z.)

**COUTELOU.** OIS. Syn. vulgaire de l'Alouette des champs, *Alauda arvensis*, L. *V. ALOUETTE.* (DR..Z.)

**COUTILLE.** BOT. PHAN. L'un des noms vulgaires de la Fétuque dorée. *V. FÉTUQUE.* (B.)

**COUTOIR.** MOLL. Nom vulgaire de la *Venus Clonissa*. *V. VÉNUS.* (B.)

**COUTOUBÉE.** *Coutoubea.* BOT. PHAN. Famille des Gentianées, Tétrandrie Monogynie, L. Ce genre établi par Aublet (Plantes de la Guiane, 1, p. 72), et adopté par Jussieu et Kunth avec les caractères subséquens, avait été réuni aux *Exacum* par Wahl (*Symbol.* 3, p. 17). Schreber, quoique admettant sa distinction générique, a changé inutilement son nom en celui de *Piptum*. Il se distingue des autres genres de Gentianées par les différences suivantes : calice quadripartite et accompagné de trois bractées; corolle hypocratériforme dont le tube est court, la gorge ressermée, et le limbe quadripartite étalé; quatre étamines à filets élargis, munis à leur base de quatre écailles, et à anthères sagittées; un seul style terminé par un stigmate composé de

deux lamelles ; capsule biloculaire selon Kunth , uniloculaire. d'après Jussieu ; mais ce caractère n'a qu'une faible importance, si l'on fait attention à la structure de la capsule des Gentianées, qui, d'uniloculaire qu'elle est dans les genres formant les types de la famille, devient biloculaire dans beaucoup d'autres par l'introflexion de leurs valves. La place de ce genre ne saurait être douteuse; par l'inflorescence de ses espèces, il a des rapports que Jussieu a indiqués avec les *Erythraea* ; mais le nombre quaternaire du système floral, et surtout les écailles des étamines et la forme des anthères suffisent pour l'en distinguer.

Les deux espèces primitives décrites et figurées par Aublet ( *loc. cit.* t. 27 et t. 28 ), sous les noms de *Coutoubea spicata* et *C. ramosa*, habitent les bords des ruisseaux de la Guiane. Ce sont des Plantes herbacées à feuilles oblongues opposées et à fleurs disposées en épis simples ou rameux. Celles-ci sont pourpres dans la seconde espèce à laquelle Lamarck ( *Illust.* p. 319 ) donne pour cette raison le nom de *C. purpurea*. Il a également changé le nom spécifique du *C. spicata* par un motif semblable, et l'a appelé *C. alba*. Cavanilles a décrit et figuré ( *Icon.* IV, p. 14, t. 398 ) une troisième espèce indigène de Panama, à feuilles ternées ; mais il y a lieu de croire que ce n'est qu'une variété accidentelle de la précédente ; les feuilles opposées ayant beaucoup de disposition à devenir verticillées par trois dans les espèces d'*Erythraea* et d'autres genres voisins. Kunth ( *Nova Genera et Species Plant. aequin.*, vol. 3, p. 79 ) a encore ajouté une nouvelle espèce d'une stature exigüe, à laquelle il donne le nom de *C. minor*. Elle a été recueillie par Humboldt et Bonpland sur les rives de l'Orénoque. Ces illustres voyageurs ont aussi trouvé le *C. spicata* d'Aublet près de Honda, dans les montagnes chaudes de la Nouvelle-Grenade, à une hauteur de cent mètres au-dessus du niveau de la mer. (G. N.)

**COUTOUBOU.** BOT. FRAN. Même chose que Conami franc à la Guiane. *V. BAILLÈRE.*

**COUTOUILLE.** ois. Syn. vulgaire du Torool, *Yunx Torquilla*, L. *V. TORCOL.* (DR. Z.)

**COUTRIAUX.** ois. Syn. de Cujelier, *Alauda arborea.* *V. ALOUETTE.* (B.)

**COUTURIÈRE.** ois. Espèce du genre Sylvie, *Sylvia aurora*, Lath. *V. SYLVIE.* (DR. Z.)

**COUVAIN.** ins. On désigne vulgairement sous ce nom les larves d'Abeilles contenues dans les alvéoles. *V. ABEILLES.* On l'applique aussi aux œufs des Vers à soie. *V. BOMBYCE.* (AUD.)

**COUVE.** BOT. FRAN. Syn. de *Pinnus Cembra* dans les Alpes. (B.)

**COUVÉE.** ois. On nomme ainsi la quantité d'œufs que peut faire éclore une femelle. Cette quantité varie, selon les espèces, depuis un jusqu'à vingt et même plus. (DR. Z.)

**COUVERCLE.** moll. Syn. d'Opercule. *V. ce mot.*

\* **COUVERTURES.** ois. *V. TECTRICES.*

**COUX.** ois. Syn. Vulgaire du Coucou, *Cuculus Canorus*, L. *V. COUCOU.* (DR. Z.)

**COUXIO.** MAM. Nom de pays du *Simia Satanas*, Hoffmann. *V. SARAJOU.* (B.)

**COUYON-MARON.** MAM. (Barrière.) Et non Mouron. Syn. de Lamantin à la Guiane. (B.)

**COUYONNE.** BOT. FRAN. L'un des noms vulgaires de l'*Avena fatua*, L. (B.)

**COVALAM.** BOT. FRAN. Même chose que Belou. *V. ce mot et BÉLÉ.*

\* **COVARELLA.** ois. Syn. de Cochevis, *Alauda cristata*, L. *V. ALOUETTE.*

**COVATERRA.** ois. Syn. vulgaire en Italie de l'Engoulevent d'Europe,



*Caprimulgus Europæus*, L. *V. Ex-*  
*COLLEVENT.* (DR..Z.)

\* COVEL. BOT. PHAN. (Rhède.)  
Probablement une espèce du genre  
Momordique. *V.* ce mot. (B.)

COVET. MOLL. (Adanson, Voyag.  
au Sénég. p. 114, pl. 8, fig. 9.) Syn. de  
*Isuccinum Condor*, L. (DR..H.)

\* COVUR. MAM. (Molina.) Nom  
générique des Tatous au Chili. (B.)

COWAGE. BOT. PHAN. Syn. de  
*Dolichos urens* dans les colonies an-  
glaises. *V.* DOLIC. (B.)

COWALAM. BOT. PHAN. Syn. ma-  
labare de *Cratæva Marmelos*, L. *V.*  
CRATÆVA. (B.)

\* COXÈLE. *Coxelus*. INS. Genre  
de l'ordre des Coléoptères, section  
des Hétéromères, établi par Ziegler,  
et adopté par Dejean (Catal. des Co-  
léoptères, p. 67). Ce petit genre dont  
nous ignorons les caractères com-  
prend le *Boletophagus pictus* de  
Sturm. (AUD.)

COXILTLI ou COXILITLI. OIS.  
(Temminck.) Espèce du genre *Hocco*,  
*Crax rubra*, T. *V.* HOCO. (DR..Z.)

COXOCISSO ou COXOLITLI.  
OIS. Espèce du genre *Hocco*, *Crax ru-*  
*ra*, Temm. Du Mexique. *V.* HOCO.  
(DR..Z.)

CO-XUOC. BOT. PHAN. Nom co-  
chininois d'une espèce d'Achyran-  
the dont Loureiro a formé son genre  
*Lyathule*. *V.* ce mot. (B.)

COY. MAM. Nom de pays du *Lepus*  
*timinus*, L., que plusieurs naturalistes  
se regardent pas comme un Lièvre,  
mais croient être le même Animal  
que le Cobaie, ou du moins l'une de  
ses variétés les plus petites. (B.)

\* COYALITI. BOT. PHAN. (Surian.)  
Probablement une espèce du genre  
*aurea*. *V.* ce mot. (B.)

COYAMETL ET QUAUHCAYA-  
ELT. MAM. Syn. de Pécaré. *V.* Co-  
ION. (B.)

COYAU. OIS. Espèce indétermi-  
née du genre *Sparc*, dont Bosc dit que  
on prend de grandes quantités sur

les côtes de Bretagne où sa chair est  
peu estimée. (B.)

\* COYEMBOUC. BOT. PHAN. Il  
est dit dans le Dictionnaire de Le-  
vrault que ce mot signifie la même  
chose que Cohyne, mais Cohyne ne  
se retrouve pas dans l'ouvrage. (B.)

COYOLCOS ou COYOLCOZQUE.  
OIS. (Hernandez.) Espèce du genre  
*Perdrix*, *Tetrax Coyolcos*, L. Du Mexi-  
que. *V.* PERDRIX, division des Co-  
lins. (DR..Z.)

\* COYOLLI. BOT. PHAN. (Hernan-  
dez.) Syn. mexicain de Cocotier. *V.*  
ce mot. (B.)

COYOLTOTOTL. OIS. (Hernan-  
dez.) Syn. mexicain du *Cotinga Quet-*  
*te*, *Ampelis Carnifex*, Gmel. *V.* Co-  
TINGA. (DR..Z.)

\* COYOLXOCHITL. BOT. PHAN.  
(Hernandez.) Probablement une es-  
pèce du genre *Alstroémerie*. *V.* ce  
mot. (B.)

COYOPOLIN. MAM. Pour Cayo-  
polin. *V.* ce mot. (B.)

COYOTÉ. BOT. PHAN. L'un des  
noms donnés dans les îles des Philip-  
pines au Coton de Nankin. (B.)

\* COYOTOMATL. BOT. PHAN. (Her-  
nandez.) Espèce de Physalide du  
Mexique, à qui l'on donne ailleurs le  
nom de Coanénépilli, appliqué ail-  
leurs à une Passiflore. (B.)

COYOTZIN. BOT. PHAN. (Hernan-  
dez.) Syn. mexicain de *Canna*. *V.*  
BALISIER. (B.)

COYPOU, COYPU ou COYPUS.  
MAM. (Molina.) Espèce du genre  
*Hydromis*. *V.* ce mot. (B.)

COYUTA. REPT. OPH. Syn. brési-  
lien de Cenco ou Cencoalt. *V.* BON-  
GARE. (B.)

\* COYYROU. BOT. PHAN. Plante  
grimpante des Antilles, nommée aussi  
Liane aux yeux, mais qui n'est pas  
encore déterminée. (B.)

COZCAQUAUHTLI. OIS. Syn.  
mexicain de Roi des Vautours. (B.)

\* COZIRIHAN. BOT. PHAN. (Bau-

wolf.) Syn. de *Strychnium latifolium* dans le Levant. (B.)

\* COZOLMECATL. BOT. PHAN. (Hernandez.) Espèce de Smilacée indéterminée du Mexique. (B.)

COZQUAUHTLI. OIS. Probablement la même chose au Mexique que Cozcaquauhtli. V. ce mot. (DR..Z.)

\* COZTICPATLI. BOT. PHAN. (Hernandez.) Espèce mexicaine de *Thalictrum*. V. PICAMON. (B.)

COZTIOCOTEQUALLIN ou QUAUHTECALLOTLQUAPACH - TLI. MAM. Dont Buffon a, par con-


traction, fait Coqualin, espèce d'E-cureuil. V. ce mot. (B.)

\* COZTICMETL. BOT. PHAN. Nom mexicain d'une espèce d'Agave indéterminée. (B.)

COZTOTOTOLT ET COZTOTOTL. OIS. La description que fit Hernandez ne particularise point assez cet Oiseau pour lui assigner sa véritable place dans la méthode : aussi quelques auteurs en ont fait un Troupiale, tandis que d'autres le regardent comme un Gros-Bec. Son plumage est jaune avec l'extrémité des ailes noire. Il a la taille du Chardonneret. (DR..Z.)

FIN DU TOME QUATRIÈME.









This book should be returned to  
the Library on or before the last date  
stamped below.

A fine is incurred by retaining it  
beyond the specified time.

Please return promptly.



